



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
596/A/2




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
596/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
596/A/2




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
596/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
596/A/2

596⁽²⁾ / A/2

A. xxix Bac



id est
in Curatio Morbis
Lib. I. II. III. -
in Curatio
Febrilis. IV


43137 (1)
IOANNIS

BACCHANELLI
De cōsensu Medico-
rum in cognoscendis
Simplicibus, Liber.

LVTETIAE.

Apud Carolum Stephanum,
Typographum Regium.

M. D. LIIII.



3

Carolus Stephanus
Lectori s.

LICEAT mihi per tuum fauorem, Lector, hoc de Bacchanello non quidem tibi persuadere, sed tantum affirmare, ac liberè pronunciare, nihil in eius libro de Medicorum in curandis morbis, ac simplicibus dignoscendis consensu me reperisse, quod non baccas myrtheas ac laureas potius, quàm Bacchum redeat: adeò sibi constat in veterum authorum productionibus, adeò compositè ac concinnè quæcunque ad Medicinam faciunt, in memoriam tibi reduxisse mihi visus est. Quo (sive laborem, sive industriam appelles) si quid præstantius esse putes, id verò à te vehementissimè requiro. Non enim dubito, quàm sis in recentiorum vigilijs perscrutandis diligens ac curiosus. Sed hoc ab humanitate tua lubens exposulauerim: nihil ut ob sermonis venustatem (qui in eo haud ita fortasse tersus atque expolitus esse videbitur) iudicij atque auctoritatis illi adimas. Certè perinde non est, ac si de Rhetoricis, aut bene atque ornatè dicendi ratione conscripsisset. Verùm si tu in huius vigilijs succum eum, qui ad medicandi ratio-

A. ij.

4

tionem faciet, exposulabis, hunc à paucis etiā
veterum in ea re superatum fuisse facile iudi-
cabis. Atque hoc quidem est, quod te admo-
nere volui, antequam ad huius vigiliarum le-
ctionem aggrediaris. Vale.

5

IOANNES BACCHAN-
nellus, excellentiss. Medico Ioan-
ni Scutellario s.

CERTVM est mi doctissime
Ioannes, quod olim elegeram qua-
dam Medicorum dogmata, ad medē-
di normā fatis (meo iudicio) oppor-
tuna, tum vt inde labili memoriæ,
quandoque aliis in rebus occupatæ,
succurrerē, cū etiā vt illis satisfacere,
qui non nisi authoritatibus, etiam si
mille rationes probatissimæ adduce-
rētur, acquiescere nolūt. Certē, vt in-
genuē fatear, quod ex mea inuētio-
ne nō poterā, vt Græcē loquar, *ὡς με-
ξάνδρος γὰρ πολλὰς τῶν παλαιῶν ἐκείνων βί-
βλους ἀνδρῶν, ἐν μέσῳ βύτων ἐμαυτὸν ἴδρυ-
σα*, ac flores varios veluti ex pratis
relegēs, ita effeci, vt quod prima na-
uigatione non poterā, *πρὸς τὴν δευτε-
ρον πλοῦν*. me contulerim ac expedi-
uerim. Sed opus adeo vtile ac gratū
esse non potest, vt tuo excellenti in-

A.ij.

genio possit fatissimare : quanquam
 (ni fallor) nihil in eo dictum vel ex-
 cogitatum est, quod authoritate non
 comprobetur, quod planum non sit,
 quod non remediis fultum, quod
 breuitatem etiam non amplectatur:
 in quo multa vno intuitu visuntur
 ac comprobantur, quæ sicco pede
 fortè intacta dimitterentur. Non au-
 derem tamen (quod exoptulas) vt
 formis excusum istud opus in pu-
 blicum prodiret: ne mihi nouo ho-
 mini, & vix intra proprios lares co-
 gnito, id mihi vitii daretur, quod
 plura voluerim amplecti & expri-
 mere, quæ semidocto cuius homini
 nota ac vulgata sunt, & ita trita ac
 explosa, vt vix de illis mentio fieri
 debeat. Urget tamen me tua quoti-
 die humanitas, & potissimis præci-
 pue rationibus adhortatur, vt illud
 iam iam in lucē pariam, & alios iu-
 uenes huiusce mei laboris partici-
 pes efficiam. Certè vereor ego, si tuæ

voluntati obtemperare voluero, ne
 velut inter olores anser primū ob-
 strepere videar. Et quū plurimi no-
 minis apud te sim, ne deinceps de
 me id fiat, vt est apud Theocritū, *ὅ-
 πῶσον ἔχει λάτῃς, ὅσον πόκα θαπέα φανῇ*
Εν δ' ἄλῃ λαοῦν ἐϋπλοκάμου ἀειάδνας.
 Nosti enim (ita varia sunt hominū
 ingenia) quod vni placere solet, mul-
 tis nō placere posse. Nec te præterit,
 q̃ in diuino illo Platone cōfusionē
 criminātur, in Aristotele tenebrosam
 obscuritatem, in Plinio turbulentā
 quandā congeriē, in Paulo Ægineta
 mirā breuitatē, in Auicenna etiā nu-
 per emēdato quādā nominū barba-
 riē, in Galeno nimīā prolixitatē, &
 ad praxim nō desyderatum ordinē,
 in aliis cōfusionē potius, quā cō-
 positionem: qui dū Latini videri non
 possunt, interdū ita loquūtur, vt vix
 à paucis quid velint intelligantur.
 Quid dicā de Hippocrate, qui mo-
 dō laudatur, modō à Galeno dam-

A.iiij.

natur ac reprehenditur? Hunc deinde Auerrhois plurib⁹ in locis, alioqui doctissimum, etiã redarguit. Postremò Thessalus omnium placita medicorum renuit ac cõfutat, adeò vt nihil sit in scientiis ab omni parte beatum. Quare si vera hæc tibi esse videntur: existimare poteris, pauxilla hæc mea, quæ nec nomine digna sunt, si in lucem exierint, quo tandem appulerint ac peruenerint, vt *ὑμῶν περ*, sicut dici solet, *πολὺ τῶν γραφιστορῶν τὰ χρῆμα εἰσί*. Verùm si his rationibus acquiescere nolueris, ecce mitto tibi librum, vt tuo arbitratu eo vtaris ac abutaris: expunge ac resecas quod est superfluum: quod verò deficit, adiunge: fac vt lubet, modò id intelligas animi nostri pignus apud te esse, & tenax nostri amoris intimi quoddam vinculum. Vale, & vt facis, me ama. Ex ædibus nostris, 5. Calendas Maii, Anno 1550.



IOANNIS

BACCHANELLI,
Regiensis, De cōsensu
Medicorum in curan-
dis morbis, Lib. I.

Quid sit Medicina.



MEDICINA, est scien-
tia corporis humani sa-
nitatem reficiens uel cō-
seruans . uel , Medicina
est adiectio & ablatio.
uel , Medicina est scien-
tia, sanitatis conseruatrici, morborūque re-
pulsio. uel, Medicina est , que sanis uictus
rationem præscribit, & agrotos curat. Qua

definitiones, uerae non sunt medicina: non enim haec ipsa efficit, sed ex illis quae efficit haec proueniunt, idque non semper. Quare Medicina erit scientia salubrium, insalubrium & neutrorum.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Galenus 11. Meth. cap. 12, Medicina appositio est & detractio, deficientium quidem appositio, redundantium detractio. Et haec intelliguntur de prima, secunda & tertia descriptione. De quarta loquitur Gal. lib. finitionum med. in principio. Sed quod haec non sint uerae definitiones, ex sequentibus locis monstratur. Gal. in lib. de sectis, ad eos qui introducuntur, Propositum artis medicae est sanitas, finis uero eius adeptio. Quibus autem quis absentem sanitatem recuperet, uel praesentem conseruet, medicis cognoscere est necessarium. Porro quae absentem sanitatem restitunt, curationes & auxilia uocantur: quae praesentem conseruant, salubris uictus est ratio. Quod si ita est, medicina igitur non erit

conseruans uel reficiens, sed salubrium, insalubrium & neutrorum scientia. Quod probatur ex Gal. 1. art. med. cap. 2. Auic. Medicina est scientia, qua humani corporis dispositiones noscuntur ex parte qua sanantur, uel ab ea remouentur, ut habita sanitas conseruetur, & amissa recuperetur. Si scientia est, qua noscuntur humani corporis dispositiones, id igitur non erit, quod adiicit uel auferit, quod reficit uel conseruat, nec quod egros ad sanitatem perducit.

Quot sint partes Medicinæ.

Partes Medicinæ sunt quinque. Prima est φυσιολογική, id est, rerum naturæ contemplatio. Secunda est αιτιολογική & παθολογική, id est, causarum & affectuum consideratio. Tertia est υγιανή, sanitatis tuendæ ratio. Quarta est σημειωτική, id est, signorum observatio. Quinta est θεραπευτική, id est, medendi modus. Physiologica naturam hominis considerat, & elementa quibus componitur: & generationem eius, & partes corporis tam intrinsecas quam extrinsecas.

12 DE CONSEN. MEDIC.

secas. αἰτιολογικὴν uniuscuiusque morbi causam
 & effectus inquirir. υἱεινὴν sanitatem tue-
 tur, præcauendo ne corpora in morbos inci-
 dant, & ubi inciderint, ad sanitatem reducit.
 σημειωτικὴν signorum notitiam, præterito-
 rum cognitionem, præsentium inspectionem,
 & futurorum præsagia nobis declarat. Θε-
 ραπευτικὴν tres in partes diuisa est, unam,
 quæ uictu curat, alteram quæ medicamentis,
 tertiam quæ manu admouet.

Loci consentientes de naturæ contemplatione.

Gal. lib. de constit. art. med. cap. 13. Φιλο-
 λογικὴν non est inter minimas naturalis con-
 templationis partes recensenda, immò opus
 erit medicū in ea esse probè exercitatum. Et
 primo de elem. Naturalis scientia corpora
 quæ generantur ac intereunt, quæ que pror-
 sus sunt exposita transmutationi, contempla-
 tur: quibus deinde ablati pariter & medi-
 cina tollitur. Primum quidem ob id, quòd ea
 sit quasi generationis & interitus ministra.
 Et Meth. tertio cap. quarto, Nihil posse me-

dicum, inquit, de ulla similarium partium
 agitare sine naturali sciētia. Et tertio Meth.
 cap. 7, In eiusmodi sermonis nostri decursu
 perspicuum planè fit, tum agri naturam esse
 considerandam, tum cuiusque hominis esse
 propriam curationem, &c. Et in lib. quòd
 optimus sit medicus & physicus. Hæc ars
 docet corporis nosse naturam, tum eam quæ
 ex primis constat elementis, tum quæ constat
 ex secundis. De cæteris medicinæ partibus
 deinceps suis locis loquemur.

Quid sit Natura.

Natura philosophicè sumpta, est quæ
 deorum, hominum, syderum, plurimorumque
 corporum essentiam, potentiam, uiresque cõ-
 plectitur.

Natura humana, est temperies, uel quædã
 facultas, qua animal regitur.

Loci consentientes de Na- tura philosophica.

Plato loquēs de natura deorum, uim quã-
 dam esse dixit rationis atque ordinis parti-

24 DE CONSEN. MEDIC.

cipem, cuius solertiam, inquit Cicero de natura deorum, nulla ars, nulla manus, nemo opifex consequi potest imitando. Gal. lib. finit. med. de mente Platonis, Natura est uis, quæ ex seipsa mouetur, auctor formationis, generationis & perfectionis. Arist. sec. physic. Natura est principium motus & quietis in quo est primò & per se.

Loci consentientes de Natura humana.

Gal. tert. de temper. & secun. aphor. com. 34, Natura humana nihil aliud est, quàm ex primis quatuor elementis conflata temperies, uel facultas quedam uniuersi corporis reatrix. Et quin. de Sympt. cau. in principio, Natura est omnis illa facultas, qua animal regitur, siue illa pendeat à uoluntatis nostræ imperio, siue secus. Et sext. de Sympt. cau. cap. prim. Natura est aggregatio omnium uirtutum, quæ totum corpus regit. Et lib. fini. med. Nam est spiritus calidus, qui ex sese pro seminarij rationibus mouetur, ac certis temporibus homines generat, perficit & conseruat.

Quot modis accipitur Natura?

Accipitur Natura quadrifariam, primò pro facultate naturali, secundò pro consuetudine, tertio pro temperie & compositione naturali, quarto pro naturali calore.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Quòd pro naturali facultate natura accipiat, hi sequentes loci attestantur. Gal. quinto de Sym. cau. cap. 2, Nam si morbus facultatem uicerit, id est naturam, membrum haudquaquam poterit transferre: si superior manserit facultas, id est natura, nihil eā impediet. Et paulò inferius, Natura facultates attollit & sustinet, id est, natura hoc efficit. Et quarto de uic. in mor. ac. Scire oportet naturam haudquaquā quiescere, sed interdum contentos humores ita aggredi, ut à bonis eos separet, &c. id est, Naturam esse facultatem qua boni humores retinentur, & pravi reijciuntur. Pro secundo, de consuetudine. Gal. 2. de temper. Consuetudo est natura acquisita.

16 DE CONSEN MEDIC.

Et Hip. lib. de Aëre Et aqua: item Auerrhoie
pri. phy. Et Arist. in prædicamentis, Consue-
tudo est altera natura. Pro tertio, de tempe-
rie: Gal. 2. de temper. Hæc in nostra regione,
quæ utique est temperata, subiectarum par-
tium naturam prodit, id est, temperiem de-
monstrat. Nam temperaturas iuxta regiones
ibi considerat. Et Auic. Humor Et natura
mutant animam, id est, humor Et temperies.
Pro compositione sic, Et intelligitur de na-
tura medicinarum. Vnde citatur poeta in
lib. de natura humana ita loquens,

Sic ait à Maia genitus, medicamē Et offert
Euulsum terra, naturamque edocet eius.
id est, compositionem eius explanat. Pro
quarto, de naturali colore, Gal. lib. de tre. Et
pal. cap. 6, Natura Et anima nihil aliud
quàm calidum est, quod semper mobile est. Di-
stinguit autem naturam ab ipsa anima pri-
mò de potentijs naturalibus, dum dicit, Et
motor in corpore aut est natura, aut anima.
Hic pro calido intellige calorē innatum, qui
teste Gal. aphor. pri. comm. 15, est facultatis
nos gubernantis robur, Et omnium natura-

lium operum causa.

Quid est elementum.

Elementum philosophicè sumptum ita describitur, Elementum dicitur id ex quo quidpiam primò componitur, & est in eo, indivisibileque existit specie in aliam speciem. Medicè sic, Elementum est minima rei particula cuius est elementum.

Loci consentientes de elemento philosophico.

Arist. 5. Met. tex. 4, στοιχείον λέγεται ὃ οὐ σὺνκειται μετὰ τὸν ἀνυπάρχοντες ἀδιαρρέπυ τὰς εἶδς εἰς ἕτερον εἶδος. Similiter secundo de generatione à principio, & tertio celi, & de sensu & sensato tex. 20.

Loci consentientes de elemento Medico.

Gal. 8. de plac. Hip. & Plat. Nominatur utique elementum, quodcunque minima sit pars illius rei, cuius fuerit elementum. Similis sententia est pri. elementorum cap. pri. item primo elementorum ad medium, Si elementū

B. i.

18 DE CONSEN. MEDIC.

sic minima & simplicissima rei particula,
atque hoc si sensu metiri oporteat, profectò
os & similia omnia erunt humanorum cor
porum elementa. Et Auic. pri. cau. cap. 3, Ele
menta sunt corpora, & sunt primæ partes hu
mani corporis & aliorum, quæ in partes di
uersarum formarum diuidi minimè possunt.
Intellige quatuor elementa sub ratione ele
menti hîc definiri: nam dixit, sunt corpora, ut
primam materiam, facultates, & id genus
alia excluderet. Dixit primæ partes, ut ne
quis de humoribus membri sue simplicibus, ut
caro, os, &c. quæ in componendo nō sunt, pri
ma intelligeret. Cætera in descriptione sunt
nota.

Quot sunt elementa?

Vniuersalia elementa sunt quatuor à pri
ma materia, ut Ignis, Aqua, Terra, Aer. Par
ticularia erunt duo, membra simplicia &
humores.

Loci consentientes de vniuersali
elemento & de particulari.

Arist. secundo de generatione probat per

quatuor qualitates, esse quatuor elementa. nam sicut sunt quatuor qualitates, ut calida, frigida, humida, sicca: ita erunt quatuor coniugationes, ut calidum cum humido, unde aer: calidum cum sicco, unde ignis: frigidum cum humido, unde aqua: frigidum cum sicco, unde terra. Probat etiam hæc esse quatuor per binas essentielles formas elementorum, quæ sunt gravitas & leuitas. Auic. & Auer. similiter iisdem argumentis hoc probant. De particularibus elementis Galenus secundo elementorum, Hominis uerò propria elementa sunt ipsæ particulae minimæ, quæ similes appellantur: de quibus (inquit) paulò post in dissectionum pertractationibus sermo erit. Et secundo element. in primo, Sanguis enim pituita & utraque bilis sunt non modò generationis hominum, sed cæterorum animalium sanguine præditorum elementa. Probatur etiã tali ratione: Id esse elementum dicitur, quod est principium omnium corporis particularum: sed sanguis cum alijs humoribus in utero matris est huiusmodi, Igitur sanguis & cæteri humores erunt elementa.

B. ij.

20 DE CONSEN. MEDIC.

Authores erronei dissentientes
circa elementa.

- 1 Adserere, elementa esse unum, ut plerique philosophi.
- 2 Adserere, duas qualitates in summo in elementis dari.
- 3 Adserere, idem esse principium & elementum.
- 4 Adserere, elementorum doctrinam esse medico inutilem ac superfluam.

Confutatio dissentientium ex
vera Medicina.

Confutat eos Galenus primo de elementis, si unum est, uel erit patibile, uel impatibile: non patibile, quia unum quatenus unum, non habet in quod transmutari, uel à quo pati possit: non impatibile, quia tunc id alteratione & sensu careret, igitur plura quam unum. Arist. primo phys. contra hos inquit, Quicumque ens unum esse pronuntiant, naturalis philosophiæ principia tollunt: quum maximè in physica contemplentur corpora, quæ generantur & intereunt, & transmuta-

rioni sunt exposita, quæ si auferantur, tum
 medicina tollitur. Ad secun. Arist. secun. de
 generatione inquit, Quod ignis est magis ca-
 lidus, quàm siccus: aer magis humidus, quàm
 calidus. Igitur duæ qualitates non sunt in
 summo in elementis.

Obiectio.

Quomodo dicis hoc? nam Galenus quem
 tantopere sequeris, dari has qualitates in
 summo docet primo elementorum?

Responsio.

Quod in igne sit summus calor & summa
 siccitas, uerum est, ut Galenus asserit, si modò
 intellexeris, in superlatiuo gradu has quali-
 tates reponi non debere, sed quod sint duæ
 qualitates in summo, id est, simplices & sine
 ulla admixtione. Ad tertium, Gal. pri. de ele-
 mentis, Principia sunt eiusdem generis cum
 ijs quorum sunt principia: sed elementa non
 sunt huiusmodi: igitur sunt diuersa. Quod
 principia sint eiusdem generis, probatur ab
 ipso: nam simplex qualitas ita qualitatis cõ-
 positæ, sicut simplex corpus corporis compo-

B. iij.

siti est principium. Differunt etiam, quia elementum dicitur de causa materiali intrinseca: at principium de causa finali & efficiente extrinseca, ut Arist. 12. Meth. Quod uerò elementum dicatur de causa materiali, probatur ex Arist. 8. Meta. dum inquit, Elementum est materia, cuius est elementum.

Ad quartum: Quod hæc doctrina elementorum non sit inutilis, neque superflua, probatur à Galeno primo de elementis, tribus medijs: Primo, quia omne quod nostris corporibus offertur, non impermixtum est, sed cum altero semper mixtum: Secundo, quia omnibus elementis, ut aqua, aere, terra, igne, semper utimur: Tertio, quia hæ qualitates possunt omnem substantiam transmutare, unde fit, ut si quid in qualitatibus modum excesserit, compri indigeat, & si quid defluit, restituatur: igitur nec inutilis, uel superflua. De elementorum utilitate lege uberius Auicennam cap. de elementis.

De temperaturis, & primo de earum descriptione.

Temperies, quæ à Grecis *κράσις* dicuntur

tur, duplices sunt, quarum altera qualitas est,
 quæ ex elementorum qualitatibus conficitur.
 Altera quæ ex mixtorum etiam inuicem actio-
 ne & passione resultat.

Loci consentientes ex vera Medicina.

De utraq; loquutus est Auic. pri. pri. cap.
 de complexionibus, Complexio est qualitas,
 quæ ex actione & passione diuersarum qua-
 litatum in elementis inuentarum prouenit,
 quorum partes ad tantam paruitatem sunt
 redactæ, ut plurimum cuiusque earum, plu-
 rimum alterius contingat. Ac si dicat, Tem-
 peries est quoddam aggregatum, nõ ex actio-
 ne & passione mixtorum, sed ex qualitati-
 bus elementorum, ut res naturales & corpo-
 reas excluderet. Nam dictum est etiam alibi
 ab ipso, quòd ex primis elementorum qualita-
 tibus remissis, quædam media qualitas con-
 stituitur, quæ corporis mixti est propria qua-
 litas. Vide fusiùs de his Arist. quar. Methe.

Quot sunt Temperaturæ.

Novem sunt temperaturæ, octo inæquales,
 B. iij.

24 DE CONSEN. MEDIC.

Et una equalis : unde inaequalium quatuor sunt simplices, ut calida, frigida, humida, et sicca: quatuor ex his composita, ut calida et humida, calida et sicca, frigida et humida, frigida et sicca. A Equalis est, qua corpus in-
colume cum moderatione quadam seruatur.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Quod nouem sint, probatur ex Auic. pri. pri. cap. de complex. Tum, inquit, postquam de complexionem temperata diximus, ad lo-
quendum de distemperatis redeamus. Igitur datur temperata complexio. Quod uero dis-
temperatae sint octo, paulo inferius dicta re-
sumens, inquit, Vnaquaeque autem harum octo complexionum aut est cum materia, aut sine materia, &c. Gal. pri. de temper. cap. pri. Vnum igitur et primum id est, quod tempera-
tam naturam dicimus, quae tamen non uir-
tute modo, sed etiam uiribus reliquis praestat. Et pri. de temper. probat etiam, quod detur ista temperata natura, tali ratione, Calidi-
tas stat cum excellenti siccitate et cum ex-

cellenti humiditate, igitur cum medio inter eas, & sic datur natura media contra philosophos. Quod uerò sint nouem temperaturæ, probatur rursus ex Gal. pri. de temp. cap. 8. dum inquit, Etsi quidem hæc sic se habent, sicut certè se habent, cur nouem dicere uniuersas temperamentorum differentias dubitemus, temperatam quidem unam, non temperatas octo? Quarum quatuor simplices sint, calida, frigida, humida, sicca: quatuor compositæ, ut calida, humida, &c. Quid uerò sit temperies aqualis, Gal. pri. de temper. cap. 6, AEqualis siue temperata ea est, quæ ex contrarijs æqua prorsus inter se portione coeun-
ribus constat.

Authores erronei dissentientes circa temperamenta.

1 Adserere cum antiquis, non esse nisi quatuor temperamentorum coniugationes, duas humidæ, & duas siccas, atque has à calore & frigore diuisas.

2 Adserere cum Auerrhoistis, simplices non dari temperaturas.

3 Adserere, temperatam naturam esse calidam & humidam.

4 Adserere, humiditatem non posse cum abundanti calore consistere, aut siccitatem cum uehementi frigore.

5 Adserere, temperie & mixtionē esse idē.

Confutatio dissentientium ex vera Medicina.

Confutant antiquorum opiniones loci superius citati de nouem temperaturis ex Auicēna & Galeno. Confutat etiam eos Galenus primo de temper. cap. 3. inquit, quod antiqui, quum de sanitatis tuendæ uictu inuestigant, calidius iusto corpus iubent refrigerare, ut omne exuberans æquent. Sed quomodo (inquit) hoc fieri potest, nisi temperatā quandam naturam constituent, ad quam sunt intenti? Quam si constituerint, tunc erunt quinque & non quatuor, &c.

Ad secundum: Auerrhois suis met uerbis uincitur, quum tercio colliger, species octo morborū enumerat, inter quas quatuor simplices reponit. Erunt igitur per ipsum quatuor sim-

plices à compositis separatae. Gal. pri. de re-
per. cap. 8. hanc etiam opinionem improbat
hoc modo, Concedis alteram esse temperiem
humidam & calidam, & alteram siccam &
calidam: si non erit, igitur necesse siccam es-
se, quæ calida est, quoniam & eam esse hu-
midam licet: tunc igitur eam esse mediam li-
cebit, & sic calida tantum. Quod etiam de
frigida & de alijs similiter est ratiocinan-
dum. Igitur quatuor erunt simplices tem-
peratura.

Ad tertium: Hipp. rer. Epidimias, Si to-
tus, inquit, annus calidus & humidus fuerit,
tunc necesse est quod magna succedat pesti-
lencia: igitur quod erit calidum & humidum,
non erit temperatum. Præterea Gal. pri. de
temper. cap. 4. ad hoc probandum tali uti-
tur ratiocinio, Quod est putredini aptum, id
est pessimum temperamentum: sed natura ca-
lida & humida est putredini apta: igitur
erit pessima. unde optimam esse cõcludit re-
periem, quæ in quatuor qualitatuum mixtionis
æqualitate consistit.

Ad quartum: Impugnat Gal. pri. de tem-

18 DE CONSEN. MEDIC.

per. & omnis schola medicorum, nec non & ipsa experientia: nam aqua ex calore feruēti humida manet. Verū num calida magis uel humida dicatur, ab eo quod in mixtura pollet (inquit Galenus) appellatio sumitur, ut si maior erit portio humiditatis, quā caliditatis, humida dicetur, &c.

Ad quintum: lege Arist. secun. de gene. cap. de mixtione, ubi omnes dicunt temperiem esse mixtionem, sed non extra. Item mixtio significat motum, unde complexio provenit, & fit idem: non sunt, &c.

Quot modis aliquid dicatur esse calidum vel frigidum.

Bisariam calidum dici potest, absolute, & sic omnes qualitates absoluto sermone inveniuntur in elementis. Aut per collationem, & sic trisariam: aut per collationem ad mediū: siue ad pondus, siue ad iustitiam, aut ad seipsum, aut ad extraneum medium. Ad iustitiā rursus duplici modo sumitur, scilicet secundum genus, ut animal in genere animalis dicitur calidum: uel secundum speciem, ut homo

in specie hominis est temperatus. Calidum etiam dupliciter intelligitur, energia, quum id sit actu: uel potestate, quum id nondum sit, sed id fieri facile possit.

Loci consentientes ex
vera Medicina.

Gal. prim. de temper. cap. 6, Calidum dicitur per collationem: uel per absolutum sermonem: & hoc simpliciter: uel per mixtionem: uel secundum genus, uel secundum speciem, ut Animal in genere animalis est calidum: secundum speciem, ut bos, leo, canis. Vnde medium temperie in toto genere animalium homo est, medium temperie in hominum specie est, quem Græci εὐκρατῆς, id est, bene temperatum uocant, &c. Quod uero detur temperies ad iustitiam, in hoc capite ad finem ita inquit Galenus, Temperies ad iustitiam est, quæ eo quod pro dignitate conuenit, æqualitatem explorat. Auicenna latius de his omnibus pertractat cap. de complexionibus.

De membrorum temperaturis.

Calidiora in corpore membra uicissim se

30 DE CONSEN. MEDIC.

comitantia sunt spiritus, cor, sanguis, hepar, caro, muscoli, splen, renes, tunica arteriarum, uenarumque, & cutis.

Frigidiora sunt, pituita, pili, os, cartilago, ligamentum, tendones, membrana, nerui, nuca, cerebrum, adeps, pinguedo.

Humidiora sunt, pituita, sanguis, adeps, pinguedo, cerebrum, nuca, caro mamillaris testiumque, pulmo, hepar, renes, muscoli, cutis.

Sicciora sunt, pili, os, cartilago, ligamentum, tendones, membrana, arteria, uena, nerui motrices, cor, nerui sensus.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Gal. pri. de temp. cap. ult. Cor, tum natura, tum omnium animalis particularum maxime sanguineum, tum uero calidissimum, proximum illi iecur. Et sic ibi de singularum partium temperie membratim pertractat. Auic. pri. pri. cap. 2. de complex. hac diffusius enarrat.

De notis temperaturarum in genere.

Cognoscuntur temperatura ex habitu to-

rius corporis, ex operationibus, ex regione, ex colore, ex tactus ratione, & ex ætatibus.

Locī consentientes ex vera Medicina.

Gal. secun. de temperamentis cap. 4, Pinguiore omnes sunt frigidi, sicut mari fœmina: siquidem adeps ex habitus frigiditate gignitur. Corpulenti calidiores, quia carnis abundantia à multa sanguinis abundantia oritur. Mediocritas uerò, quæ inter hæc reperitur, temperatæ naturæ est nota. Et sic ex habitu totius corporis cognoscuntur temperamenta. Auic. prima pri. cap. de complexio. inuestigat etiam ipse notas temperamentorū, ibi, Fœmina frigidiore secundum diuersitatem, &c.

Ex operationibus sic: Gal. sec. de temper. cap. 6, At ubi uaria partium temperies est, ex una earum pronūciare de toto corpore nō licet, sed adeunda singulæ sunt, æstimandūque quo temperamento uenter, quo pulmo, quo cerebrum, ac reliquarum per se unaquæque seorsum sit: atque hæc ex functioni-

bus, &c. & pri. temperaturarū cap. 6, Optime se habere aliquid pro sua natura ex ipsis functionibus intelligitur, quippe animal & stirpem optime se habere dicimus, quum optime suam functionem obeunt: igitur ex operationibus temperies agnoscitur.

Ex regione, Gal. 2 de temper. cap. 6, Pensitandus & continentium partium affectus est, quarum omnium extrema cutis est. Sed corporis temperies in his regionibus, quae à temperie recesserunt, inaequalis uisitur, exterius scilicet, & internis partibus non ad eundem modum se habentibus. Gallis enim & Germanis, & omni Thracio & Scythico generi frigida & humida, cutis est: ideoque etiam mollis, alba, & pilis nuda. Aethiopibus uero & Arabibus, qui ad meridiem incolunt: nam, cutis ex ambientī aestu, & naturali calore foras acta, iusta, dura, sicca, nigra redditur, toto corpore naturalis quidem caloris exiguam obtinente portionem, sed alieno atque ascititio incallescere. Hoc etiam probatur ex Auicenna cap. allegato, ibi, Septentrionales sunt humidiores, & similiter nautae, &c.

Ex colore: Gal. de ruenda sanitate, Succorum corporis color est certissima nota: nam rubeus, croceus, luteus, ac pallidus caliditatem demonstrant: luens, plumbeus, albus, frigiditatem. Aetius ser. pri. cap. de uiribus simpli. Amplius uero nihilo magis ex coloribus cōiungere possumus de iisdem: in singulis enim coloribus inueniuntur & calida, & frigida, & sicca, & humida, &c.

Ex tactus ratione: Gale. secundo de temper. cap. 3, Ergo calidi frigidi que corporis solus tactus est iudex: humidi & sicci una cum tactu ratio, &c. Et 2. de temper. cap. 2, Calidum quod in aetatibus cognoscere cupimus, primum & maxime tactu iudicemus.

De notis temperaturæ optimæ.

Temperaturæ optimæ signa sunt, quæ corpus neque densum, neque rarum, neque durum, neque molle, neque hirsutum, neque glabrum, sed medio quodam modo se habeat. De temperamento calido, frigido, humido, sicco, in particulari non me extendam, neque de singulis partibus corporis loquendo. Nā Gal. in arte med. cap. 52. & Aet. C. i.

34 DE CONSEN. MEDID.

ser. quar. cap. 77. & Paul. A Egi. lib. secun.
cap. 63. usque ad 73. Notato tamen, quod nō
ex temperie unius particula tantum est pro-
nunciandum de toto corpore, sed singulae par-
tes per se consideranda sunt.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. pri. de temper. cap. 9, Quod omnium
extremorum, calidi scilicet, frigidi, humidi,
sicci medium est, quod in duritia mollitie que
medio statu consistit, id corpus erit tempera-
tum. Et in lib. de opt. corp. const. cap. 4, Por-
rō corpus etiam quod conspicuē neque den-
sum, neque rarum, neque durum, neque molle,
&c. optimē temperatum est, &c. Vide etiam
de his Aetium ser. quar. cap. 59. diffusius lo-
quentem.

De ætatum temperaturis, & de earum descriptione.

Ætas siue αἰών, est spatium, in quo ani-
mal crescit, stat, decrescit, & manifestè decli-
nat. Et diuiditur in quatuor partes, in ado-

lescentiam, quæ est calida & humida : in iu-
uentutem, quæ est calida & sicca : in sene-
ctutem, quæ est frigida & sicca : & in ulti-
mum senium, quod est frigidum & humidum.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Quòd ita describatur Aetas, habes ex Al-
berto Magno in lib. de senectute & iuuentu-
te, dum inquit, Aetas est spatium temporis in
uiuente derelictum, in quo uirtus uitæ secun-
dum omnem suæ operationis modum perfici-
tur. Gal. quar. de salub. diata rex. 7, Aetatis
temperamenta sunt quatuor, humida & ca-
lida puerorum, sicca & calida adutorum,
sicca & frigida eorum qui in ætate inclina-
ta sunt, humida & frigida senum. Et Auic.
prima pri. cap. 3. de complex. ætatum, Aeta-
tes omnes sunt quatuor, ætas adolescentiæ
quæ durat usque ad 30. annum. ætas consi-
stendi, quæ durat usque ad 40. ætas minuē-
di, cū uirtus non amittitur, quæ est usque
ad 60. annum: & ætas minuendi, cū mani-
festa uirtutis imbecillitas est, quæ durat usque
C. ij.

ad finem uite.

Obiectio.

Plures uidentur esse ætates quàm quatuor, siquidem Auicennas octo, Galenus & Hippocrates plures etiam enumerant.

Responsio.

Ætates in genere sunt quatuor, sed in specie plures. Nam Hippocrates, teste Galeno, aphor. 3. aphor. 26. mentionem facit de recens natis puerulis: deinde de illis qui dentire incipiunt: deinceps de his qui mediam ætatem habent, quæ ad duodecimum & tertiumdecimum annum progreditur, & est ætas proxima pubertati. Nam pubertatis tempus incipit post quartumdecimum annum, & durat usque ad uigesimumquintum, teste Galen. cōment. aphor. 7. Adolescentia igitur comprehendit sub se infantiam, pueritiam & pubertatem. Sic iuuentus ac senectus alias ætates sub se habent, quæ tãdem ad capita redactæ, in genere sunt quatuor. Possent etiam reduci ad duo capita ut philosophi, ad perfectum scilicet & defectum: uel ad trinam

diuisionem, si his addam statum : sed nos ad quaternam diuisionem ætates reduximus, eò quòd temperamenta sunt quatuor.

Authores erronei dissentientes
circa ætates.

- 1 Adserere, ætatem per quandam qualitatem describi debere, & non per quantitatem.
- 2 Adserere, senium esse frigidum & humidum simpliciter.
- 3 Adserere, ætates posse præfiniri.
- 4 Adserere, in ætatibus fundari temperaturas, seu dicere, ætates temperatas uel distemperatas absque ullius subiecti intelligentia.
- 5 Adserere, ætatum doctrinam esse inutile.

Confutatio dissentientium
ex vera Medicina.

Quòd non per qualitatem, probatur ratione : quia interrogatus, quotennis es, respondetur per numerum, ut biennis, triennis, quæ est quantitas discreta, non qualitas. Præterea ætas nihil aliud est, quàm distantia à primordio uitæ usque ad finem, quæ

C iij.

38 DE CONSEN. MEDIC.

distantia quantitate, non qualitate determinatur. Hanc tamen dico non esse ueram definitionem, sed quandam descriptionem necessitate datam. Nam quod loco generis ponitur, non conuenit rei descriptæ.

Ad secundum: Gal. 2. de temperamentis cap. 2, Senum, inquit, temperies est frigidissima & siccissima, non autem humida. Quod probatur tali ratione ab ipso: Omne id siccum dicitur, quod nutrimentum intra se trahere non potest. Senum autem temperies ob excrementa superflua nutrimentum intra se trahere non potest. Igitur senum temperies erit sicca. Pro exemplo sint arbores: nam quotiens senescunt, magis exiccantur. Et Auic. prima primi cap. de complex. ætatum inquit, Senes & decrepiti præter hoc, quod sunt frigidiores, adhuc etiam sunt sicciores.

Obiectio.

Dictum est superius ex Galeno temperiem senum esse frigidam & humidam. Quomodo nunc probas esse siccam?

Responsio.

Galenus non iuxta propriam opinionem

loquutus est, sed id de mente aliorum disse-
ruisse uoluit, sicuti uberius per totū illud cō-
mentum demonstratur.

Ad tertium: Gal. 3. prognosticorum com-
ment. 28, Ob id igitur Hippocrates quando-
que, inquit, trigesimum commemorat, sæ-
pe etiam trigesimum quintum, quia aliæ alijs
accidunt mutationes: fieri non potest, ut una
mēsura firma, ac cunctis promiscua finiatur.

Ad quartum: Gal. 2. de tempera. cap. 2, In-
telligamus, inquit, recēns formatum animal
in utero matris, quo sciamus, qua ratione hu-
midissimum, calidissimūque sit. Nam prima
eius constitutio ex semine & sanguine est,
quæ humida & calida res sunt: igitur hic de
complexione subiecti, nō autem de ipsa ætate
calida & humida loquitur. Dicitur enim
ætas calida & humida, prout est in corpore
calido & humido. Posset probari hoc ex mil-
le locis, sed tantū hic locus ad probandum
sat sit.

Ad quintum: Gal. 2. de temper. cap. 2, Verū
quum ad ea, quæ nunc sunt proposita, magis
urgeat ætatum consideratio, quæ etiam ma-
C. iiij.

40 DE CONSEN. MEDIC.

ximam nobis ad causarum inuentionem facultatem suggerit: huic nunc insistamus, &c. Ex quibus uerbis doctrinam ætatum non inutilem esse nobis demonstrat.

Obiectio.

Quos putas esse calidiores, puerulos an iuuenes?

Responsio.

In calore tria considerantur, quantitas scilicet naturæ humiditatis & sanguinis influentis: qualitas, id est ipsa caliditas, & formes ipsius caliditatis, quæ est caloris essentia. Dico igitur, si iuxta humiditatem naturam quantitas caloris consideretur, quod pueruli sunt iuuenibus calidiores: at si iuxta sanguinem influentem, quod iuuenes sunt puerulis calidiores, quia sanguine magis abundant. Sic etiam Gal. 3. de temper. cap. 4. considerat in calore qualitatem & substantiam, quæ legere poteris. Aduerte tamen has diuisiones quoniam omne dubium remouere circa hæc poteris.

De Humorū definitione
& diuisione.

Quoniam humores ex primis elementis ori-
ti, sunt causa generationis & corruptionis
hominum, idcirco duplicem etiam definitio-
nem sortiuntur, uniuersalem scilicet & par-
ticularem. Vniuersaliter sic, Humores sunt
corpora, quæ ex prima ciborum mixtione ge-
nerantur. Particulariter sic, Humor est cor-
pus humidum currens, quod ad membra con-
uertitur. Generantur humores ex alimento,
quod ab innato calore alteratur.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Gal. 2. de element. Quatuor humores ex
primis elementis ortos constat, materiâque
esse generationis hominis, causâque esse cor-
ruptionis omnimodam, si quid in generatio-
ne animalis deesset: quoniam uno quidem de-
ficiente humore, totum animal interit ac de-
perditur. Auic. prima. 1. cap. de membris,
Membra sunt corpora, quæ ex prima humo-
rum commixtione generantur: quemadmodum

42 DE CONSEN. MEDIC.

humores sunt corpora, quæ ex prima ciborum commixtione generantur. Et cap. de humoribus, Humor est corpus humidum, fluidum, liquidum, in quod in primis nutriendum conuertitur. Ac si diceret, est corpus humidum, id est, actu fluens, id est, substantia fluida. Nam aliquid esse humidum dupliciter intelligitur, natura uel substantia. Nam quædam res dicuntur in substantia humida, quæ natura & potestate sunt sicca, & sic econuerso: quædam uero utroque modo, tam natura, quam substantia humida dicuntur. Idcirco dixit humidum, fluidum. Gal. aphor. 5. aphor. 39, Superfluum id, quod ex alimento relinquitur, humor existit nature partis similis. Et secundo de facult. naturalibus cap. 8, Demonstratum est, inquit, alimentum, dum in uenis ab innato calore alteratur, sanguinem quidem ex mediocri calore fieri, reliquos uero succos ex eodem modum non seruante. Et sic habes quomodo generentur humores.

De alia diuisione de his qui nutriunt humoribus.

Ex his qui nutriunt humoribus, quædam

Sunt primæ & secundæ humiditates, quarum primæ sunt humores. Secundæ rursus bipartuntur: nam quædam sunt superflue, quædam non. Non superflue erunt, quæ à principali dispositione conuersæ, ad membra relegantur: & iuxta Auicennæ placitum erunt quatuor, scilicet, nomen non habens, ros, cambium, gluten. Humorum uerò, à quibus hæ humiditates proueniunt, sunt quatuor genera, ut genus sanguinis, pituitæ, bilis, melancholiæ.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Auicennæ prima primi cap. de humi. Humiditates quædam sunt primæ, quædam secundæ. Primæ sunt quatuor humores. Secundæ uerò, quæ non sunt superfluitates, sunt humores, qui à dispositione principali conuersi, ad membra relegantur: & sunt, nomen non habens, ros, cambium, gluten. Et Gal. 10. Meth. ad finē, loquens de hectica, de his mentionem facit, primam uocans natiuam humiditatem: alteram, nomen non habens: similiter de different. feb. Et Auic. prima quarti &

44 DE CONSEN. MEDIC.

dicatur 12. de animalibus. De his etiam uide de hectica. Quod uerò humorum genera sint quatuor, probatur ex Gal. 2. de element. dum inquit, Conabor ea explicare, unde adductus est Hippoc. ut sentiret, humores quatuor materiam esse generando homini. Et lib. finit. Med. Humores quatuor sunt, ex quibus animal consistit, sanguis, pituita, & duæ biles, flaua scilicet, & atra: & sic sunt quatuor humorum genera.

De humoribus in particulari, & primò de sanguine.

Aīua, id est sanguis, humor est calidus & humidus, ex ipsius chyli temperatiori parte progrediens: qui naturalis est & non naturalis. Naturalis, qui mediocri substantia, rubido colore, malo carens odore, sapore dulci, mitis ac benignus existit. Non naturalis, qui ab isto degenerat, & hoc bifariam, uel sui, uel alterius ratione. Ratione sui, dum mutatur propria substantia: & hoc dupliciter, uel quia nimis crassa, aut nimis tenuis: uel quia aduritur, & sic pars tenuior in flauam bilē

vertitur : crassior in atram ratione alterius,
quum alius humor illi permiscetur, & tunc
uaro modo hoc contingere potest, prout ua-
ria bilis species & pituita & melancholia
sanguini admiscuntur. Locus in quo consi-
stit, est hepar, in quo perficitur, cor, in quod
influit, uenae & arteriae.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Quod sit calidus & humidus, probatur ex
Gal. 2. de morb. cau. cap. 4. quum dicat nepe,
quod flaua bilis potestate calida est & sic-
ca, atra uero sicca & frigida: sanguis cali-
dus & humidus, pituita frigida & humida.
Et primo de naturalibus facul. cap. 9. idem
asserit. Auic. prima primi cap. de humor. Sā-
guis uero natura calidus & humidus existit,
cuius duae sunt species, naturalis & non na-
turalis, &c. Gal. lib de atra bile cap. 2, Igi-
tur magna ex parte rubeus color in hoc hu-
more exuperat, & talis exactè optimus san-
guis existit. Et paulò inferius, Sanguis maiori
ex parte dulcis apparet. Et secundo de tem-

46 DE CONSEN. MEDIC.

peram. cap. 3, Succorum optimus, & maximè proprius ac domesticus, sanguis est: igitur à temperatiori parte progreditur. Et secundo de facult. naturali cap. 8, Sanguis fit à mediocri calore, bilis ab immodico. Igitur sanguis à parte temperata oritur. Et hæc de naturali sanguine. De non naturali, dum mutatur propria substantia, ut pars tenuior in bilem, habes ex Gal. 2. de differ. feb. cap. 9. ubi inquit, Pars sanguinis subtilior ac pinguior omnino in flauam conuertitur bilem: quæ autem crassior, in atram. Itidem ait 2. de cris. cap. 12, Quod uerò sanguini alius humor misceatur, habes ex Gale. lib. de plenit. ad medium, Quum tumor, inquit, præter naturam, ad quancunque substantiam pertinere possit, siue is syncerus sanguis sit, siue biliosus, siue serosus, siue pituitosus, &c. Id est, quum bilis aut pituita sanguini miscetur. De loco sanguinis, Gale. 1. de temper. cap. ult. Sanguis ipse à corde suum accipit calorem. Et 6. de plac. Hip. & Plat. At qui in dextro sinu continetur sanguis, eandem speciem habet, quam omnis alius, & is qui in iecore

habetur, &c. Hic etiam ab ipso probatur, cor & iecur esse sedem sanguinis, ipsūque iecur uniuersam sanguinis speciem absolueret: & quod sanguis humidi temperamento, rubri colore, cuius sanè in iecore est prima generatio. Riui autem & uenæ id toti corpori traducūt distribuūtque. At sanguinis flauī, tenuis, spumosi, prima in sinistro cordis sinu est origo: uerū talem arteriæ dispensant, & in totum corpus deducunt, &c. Vide de his etiam Gal. de facul. natural. diffusius.

De pituitæ diuisione & descriptione.

Φλέγμα, id est pituita, duplex est, naturalis & non naturalis. Naturalis, est humor frigidus, humidus, substantia crudus, colore ad albedinem, sapore interdum dulci, quandoque omnis qualitatis expers. Non naturalis est qui à sui natura degenerat: & hoc bifariam efficitur, per se scilicet & per admixtionē. Per se, quū à propria substantia egreditur: nā in substantiā aquosam uel flatuosam uel admodum tenuē cōuertitur, unde pituita

48 DE CONSEN. MEDIC.

aquosa, flatuosa, & tenuis dicitur. Si uerò
crassior ac uiscosior reddatur, tunc pituita
erit crassa, uiscosa, & mucilaginosa. Quæ si
magis indurescat, gypsea & uitrea dicitur
pituita: quæ si ultra putrescat & alteretur,
fiet salsa, uirrosa, & corrosiua. Per admi-
xtionem, quum illi alius misceatur humor: nã
sanguine admixto dulcis efficitur: flaua bile,
salsa: melancholia, pontica, acida.

Loci consentientes ex ve-
ra Medicina.

Auic. prima primi cap. de humor. Phleg-
matis aliud naturale, aliud non naturale.
Naturale est, quod aptum est in aliquo tem-
pore fieri sanguis, quoniam est sanguis non
plenè concoctus. Vnde Arist. 6. Topic. in-
quit, phlegma esse primum indigestorum à ci-
bis proueniens. Gal. 2. de diff. feb. cap. 6.
Quicumque humor in corpore frigidus atque
humidus fuerit, hunc nos pituitam appella-
mus: & sic erit humor frigidus & humidus.
Et de atra bile cap. 2, Appareret pituita o-
mnis qualitatis expers, ueluti aqua. Verum

naturali qualitate mutata, non modò salsa, sed acida etiã fit, quin & non rarò dulcem qualitatem acquirit. Hunc itaque humorem, qualiscunque fuerit, pituitam appellant, si modò albus extiterit. Et 2. de diff. feb. cap. 6, Alia est pituitæ species, quam plerique cū scretu expuūt, sensibilib̃ habēs dulcedinē, &c. Auic. prima primi cap. allegato, octo species phlegmatis non naturalis enumerat, ut videre poteris.

Obiectio.

Quomodo octo enumerat, quum iuxta Gal. sententiam ad summum tres tantum sint, ut salsa, dulcis, acida?

Responsio.

Certum est Galenum non nisi tres enumerasse differentias pituitæ, ut 2. de diff. feb. cap. 6. Item 3. de loc. aff. cap. 7, Veruntamen pituitam possumus dupliciter considerare, uel in ratione saporis, uel in ratione suæ substantiæ. Si ratione saporis, tunc erunt tres differentie, ut salsa, dulcis, acida: quanquam & insipida addi posset: sed ratione substantiæ

D. i.

erunt etiam quatuor, quæ primis copulatæ,
 erunt octo. Quod Galenus etiam non nega-
 ret: nam in lib. de plenit. ad finem, humorem
 crudum inter pituitæ species esse reponendum
 ait, qui crassior ac minus flatuosus est, &c.
 Præterea 14. Meth. cap. 17. dixit euacuatio-
 nem bilis esse facilem, sed pituitæ crassioris &
 glutinosioris esse difficilem. Ergo datur pi-
 tuita crassa, quæ & mucilaginosa esse potest.
 Rursus 3. de loc. aff. cap. 7. mentionem facit
 de vitrea à porracea appellata. Item de
 aquosa, quæ nulla qualitate infecta, dici po-
 test insipida: & sic ratione substantiæ erunt
 aliæ species. Item 3. de loc. aff. cap. citato
 atram bilem differre facit, ob substantiæ va-
 rietatem. Igitur à simili pituita etiā in sub-
 stantia variabit.

Obiectio.

Quomodo concordabis Auicennā Galenū
 in ijs admixtionibus? Nam Galenus salsa
 fieri pituitam asserit, aut propter putredinem
 aut propter salsæ serosæ humiditatis miscellam:
 Auicennas uerò ex miscella bilis cum
 pituita.

Responsio.

Quòd fiat propter putredinem, ut dixit Gal. 2. de different. feb. cap. 6. etiam Auic. cōcedit, inquit, Et nos quidem dicimus putredinem ipsum phlegma salsum efficere, ideo quòd in ipso adustionem facit, &c. Nec in humiditate serosa distat à Galeno. nam ipse, Sola, inquit, aquositas non facit salsum, quod uerum est. Sed Galenus non solam, sed salsam & serosam dixit, quod Auicennas nō negasset. Quòd uerò à bilis miscella fiat phlegma salsum, uerum. Nam Arist. in lib. de sen. & sensa. & 2. Meth. salsum sapore affirmat esse eiusdem speciei cum amaro: nam terrea partes adusta, & amari saporis, si insipida humiditati aequaliter misceantur, fit salsedo: si uerò humiditatem superent, amaritudo. Quare cū bilis amara quidem natura ac sicca sit, & pituita misceatur, fieri potest, ut inde pituita salsa euadat.

De bilis definitione & diuisione.

Χολή, id est bilis, est humor calidus & sic-
D. ij.

32 DE CONSEN. MEDIC.

cus, ex tenuiori & calidiori parte chyli, vel
ex sanguine tenui & feruescente proueniens.
Hac duplex est, naturalis & non naturalis.
Naturalis, est humor calidus & siccus pote-
state, substantia tenui, flauo colore, aut rubro
ad flauitiem declinante, sapore amaro. Non
naturalis est quæ à iam dicta degenerat: &
hoc dupliciter, per se, & per admixtionem.
Per se adhuc bifariam, quum putrescit &
aduritur, & tunc dicitur adusta per pu-
tredinem. Altero modo, quum non natura-
lis, vitellina dicta, colore quodam igneo, in
hepate, aut uentriculo, aut in uenis concoqui-
tur, & tunc fit porracea, quæ & præsina di-
citur & æruginosa. Per admixtionem non na-
turalis efficitur, quum illi alius humor ad-
miscetur, & hoc multifariam. Nam si phleg-
ma tenue & aquosum admisceatur, citrinus
siue crocea efficitur: si crassum & uiscosum
vitellina: si adusta melancholia, fit bilis adusta,
& sic erunt sex species.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Quod bilis sit calida & sicca potest.

probat^{ur} ex Gal. 2. de natu. fac. cap. 9, Bilis, inquit, flaua, calida & sicca est, quantumuis sic ab aspectu humida. Quòd uerò sint sex bilis species, habes ex Gal. lib. de atra bile cap. 2. ubi inquit, Bilis enim flaua fit pallida ex serosa & tenui humiditate, quæ ubi resoluitur, λεκωτώδης, id est uitellina appellatur. Est & bilis, inquit ipse, πορροειδής, id est porracea: alia ιώδης, id est eruginea: alia ισταπώδης, id est glauca: alia rubra, sanguini tenuiori proxima: & sic erunt sex species. Auic. prima primi cap. de humor. hanc totā diuisionem habet: lege cum uberius.

De Melancholiæ definitione & diuisione.

Melancholia duplex, naturalis & non naturalis. Naturalis est boni sanguinis fæx, ac ueluti limosa quædam superfluitas, siue crassior quidam sanguis, cuius color niger est, sapor uerò acerbus uel acidus, in massa sanguinaria existens, ad alend. is partes melancholicas progenitus. Non naturalis, qui à naturali degenerat, definiturque in xniuersum,

D. iij.

quòd sit humor frigidus & siccus, ex crassiori portione chyli proueniens, cuius species sunt quatuor. Prima quum melancholicus humor, naturalis dictus, in sua propria substantia aduritur & putrescit, fitque bilis exquisitè nigra, quæ acida est, & in terram effusa uelut acerum feruet, & terram attollit. Secunda est bilis atra ex adustione aliorum humorum. Quæ enim fit ex flaua bile uehementer adusta, non aliter ac exquisitè atra terram radit ac attollit. Tertia species melancholiæ non naturalis est, quæ à lapidosa concretione oritur. Quarta species, quum alius humor ipsi melancholiæ naturali permiscetur, dumque hoc fit, dulcoratur & mitescit, modò neutra bilis adusta admisceatur: quia tunc uel acescit, uel amarescit, & erosionis fit particeps.

Loci consentientes ex
vera Medicina.

Gal. 2. de temper. cap. 3, Sanguis optimus succorum ac proprius, huius ueluti sedimentum ac fæx atra bilis est: quæ idcirco tum fri-

gidior, tum crassior sanguine est, sicuti flaua bilis longè calidior. Et 3. Prognost. comment. 29, Atra bilis generatio duplex, altera à sanguine crassiore, qui proportionè in uenis subsidenti in dolio uini facula respōdet. Altera à flaua bile uehementè assata, quæ atra bilis alioqui malefica est, ac derodit partes, in quibus abundè collecta est. Altera mitior quàm hæc est, maximè quoties nondum traxit in animali moram cum aliquo calore abundanti præter naturam. Et 3. de loc aff. cap. 7, Melancholicos, inquit, esse, in quibus siccitas & frigiditas dominatur. Et paulò inferius, Atra bilis ob substantiæ uarietatem non obscuras habet differentias: nam alia est ueluti fex sanguinis quæ admodum spissa, & facibus uini non absimilis: alia uerò, quàm superior, essentiæ est multò tenuioris, atque uomentibus causa, & olfacientibus acida uidetur: quæ etiam terram radit, autollit & fermentat. Sed ea, quam crassæ faci similem esse dixi, in terram effusa non inducit feruorem, nisi fortè in ardente febre ipsam præassari contingat. Hanc nominare consueui succi.

D. iiij.

36 DE CONSEN. MEDIC.

cum melancholicum aut sanguinem melan-
cholicum. Vide etiam de his plura iuxta Gal.
de atra bile cap. 2. & 2. de naturalib. fa-
cul. cap. 9. ad finem. Auic. prima primi cap.
de humor. Cholera nigra alia naturalis, alia
non naturalis. Naturalis est boni sanguinis
fex & turbulentia, & superfluitas in com-
paratione ad sanguinem. Melancholia non
naturalis, non est ad modum hypostasis &
fæcis, imò est ad modum adustionis & cine-
reitis: & tunc est multiplex, uel est phle-
gmatis, uel cholerae, uel sanguinis, uel melan-
choliae cinis: & sic erunt quinque species.

Obiectio.

Quomodo dici potest cinis phlegmatis,
quum Marardus dicat non posse ex pituita
tantam assationem fieri ut nigra euadat?

Responsio.

Dico, quòd pituita, si aduritur, melanco-
lia in qualitate, si non, in colore fieri potest.

Obiectio.

Quid est frigidius, pituita an atra bilis

Responsio.

Si considerentur iuxta earum essentiam,
frigidior est pituita: si uerò iuxta earum im-
pressionem, atra bilis, quia pituita est dēfior.

Authores erronei dissentientes
circa humores.

- 1 Adserere cum Aristotele, solum sangui-
nem nutrire, & ceteros humores esse su-
perfluitates.
- 2 Adserere, humorem naturalem esse malū,
quum nutrire non possit.
- 3 Adserere, sanguinem dari ab alijs humo-
ribus in aggregatione distinctum.
- 4 Adserere, uirium robur sequi ad sangui-
nis copiam, & ad eius paucitatem minui.
- 5 Adserere, non dari quartam temperiem
in succis, quæ est frigida & sicca.
- 6 Adserere, humorum generationem esse re-
ciprocam, ita ut ex sanguine fiat pituita.
- 7 Adserere, humorum cognitionem esse inu-
tilem cum Erasistrato.

Confutatio dissentientium
circa humores.

Confutat primùm Gal. 3. de temper. cap. 2. dum inquit, Omne animal conueniente sibi nutritur alimento. Conueniens cuique alimētum est, quicquid assimilari potest corpori, quod nutritur. Et primo de natur. fac. cap. 2, Nutritio est ad id quod nutritur eius quod nutrit assimilatio. Igitur melancholica membra, melancholia: pituitosa ipsa pituita in nutritione indigebunt, & sic solus sanguis nō nutrit. Auic. prima primi cap. de humor. Qui solum sanguinem dicit nutrire, mentitur: si enim solus sanguis esset humor qui membra nutrit, omnia in suis complexionibus & essentiis similia forent, &c. Igitur solus sanguis non nutrit.

Ad secundum, probatur tali ratione, Humor malus potest nutrire, ergo bonus & naturalis. Quòd malus nutrire possit, probatur, quia ad benignum potest reduci.

Ad tertium: Gal. lib. de plenit. ad finem, Nam neque fieri alioqui potest, ut adeò syn-

cerus in uenis reperiatur sanguis, quin illi aliquid aut bilis aut pituitæ aut serosi humoris permixtum sit: siquidem syncerus ab alio humore sanguis & impermixtus inueniri nusquam habetur. Et lib. de atra bile ca. 5, Quod igitur in uenis & in arterijs humores omnes una cum sanguine continentur, ostendit ipsius uarietas tum in colore, tum in consistentia, etc. Probat & ex Hippocrat. lib. de natura humana, quem citat hoc in loco Galenus. Igitur sanguis ab alijs humoribus non distinguitur.

Ad quartum: Auic. prima primi cap. de humor. Sunt quidam, inquit, qui opinantur, corporis uirtutem sequi ad sanguinis multitudinem, & ipsius debilitatem sequi eius paucitatem, sed non est ita. Quod uerò attenditur, est dispositio eius quantitatis, quæ de eo corpus ingreditur.

Ad quintum: Gal. 2. de natural. fac. cap. 9. contra Erasistratum probat autoritate medicorum & philosophorum, qui humores quatuor anni temporibus compararunt. Unde, inquit, sicut quatuor sunt anni tempora,

60 DE CONSEN. MEDIC.

ita quatuor erunt humorum temperaturæ.
Præterea sicut dantur morbi frigidi & sicci,
ita in humoribus quarta temperies, quæ est
frigida & sicca.

Ad sextum: Gal. 2. de uic. in mor. ac. com-
ment. 31, Pituita processu temporis coquitur,
& sanguis efficitur. Sed nec flava bilis, nec
atra in sanguinis substantiam redeunt: igitur
eorum generatio non erit reciproca. Vel tali
ratione: Frigidum à calido fieri non potest,
regulatis à natura humoribus: igitur nec à
sanguine fiet pituita, & sic non erit recipro-
ca generatio.

Ad septimum: Gal. 2. de nat. fac. cap. 8,
Nunquid quæso quemadmodum cibi conco-
quantur in uentre est utile sciuisse, ita non-
ne paris momenti est, uel sanguinem bonum
gigni, uel nutrimentum in uentre probè in
chylum uerti? Et paulò inferius, Nonne gene-
randa hydropis causa ex sanguificationis de-
fectu prouenit, sicuti ex ciborum coctionis de-
fectu diarrhœa? Ac si diceret, Quomodo hæc
capi possunt, nisi humorum cognitione contem-
platus fueris, &c? Et sic humorum cognitio

non erit inutilis.

De diuisione Membrorum in genere.

Membrorum alia sunt homœomera, id est similia. alia organica, id est instrumentaria. Homœomera dicuntur, quæ communicant cum suis partibus in nomine & ratione, ut os, caro. Organica uerò sunt, quorum nulla pars nec in nomine, nec in ratione cum toto communicat, quum manus, siue capitis pars, nec manus sit nec caput: quæ diuisio à naturali operatione sumitur. Naturalis enim operatio his tribus perficitur, scilicet temperie, compositione & unitate: quarum temperies simplicibus membris attribuitur, compositio instrumentarijs, & horum utrisque unitas. Compositorum igitur quædam sunt principalia, quorum unum ad speciem conseruandam, ut testiculi, reliqua ad indiuiduum seruandum attribuuntur. His seruiunt, ut cerebro nerui, cordi arteriæ, hepatis uenæ, testiculis uasæ spermatica: ab his quoque tanquam à principio dependent, stomachus, renes, intestina,

omnēsque muscoli, quæ præter proprias uirtutes sensu & uita cum uoluntario motu fruuntur.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. de consti. ar. med. cap. 4, Nimirum quum corpora, quæ similia appellatur, ex dissectione apprehenderimus, compositorum pariter membrorum, quæ instrumentaria nonnunquam nominare solemus, scientiam assequemur: & sic duplicia sunt membra, simplicia & composita. Auic. prima primi cap. de memb. Membrorum alia sunt simplicia, alia composita. simplicia sunt, quorum quancunque sensibilem partem assumpseris, in nomine & definitione erit toti communicans. Composita sunt illa, quorum quancunque partem acceperis, in nomine & definitione communicans non erit, sicut manus & facies. Gal. in lib. art. med. cap. 9, Vniuersæ partium differentie sunt quatuor, nonnullæ earum principia, aliquæ ab his originem habent, aliquæ nec aliarum gubernationi præ-

sunt, neque aliunde gubernantur, quum insitas habeant à natura potentias, à quibus reguntur : quædam sunt quæ insitas simul & aliunde emanantes habent. Principia igitur sunt cerebrum, cor, hepar, testiculi: ab his oriuntur & subministrant nerui & spinalis medulla cerebro, cordi arteriæ, hepatis uenæ, testiculis uasa seminaria. Et cap. 8. art. med. Vitiorum genera eadem sunt his, quæ uirtutem perficiunt. Temperies quidem in consimilibus, numerus, formatio, magnitudo & situs in instrumentariis, utrisque uerò communis unitas. Et de tot. morb. temp. cap. 7, Tria facultatum totum corpus gubernantium principia sunt, cor, hepar, cerebrum, ex quibus oriuntur nerui, uenæ, arteriæ. Hi & similes loci ea quæ dicta sunt probant.

De facult. naturalibus & de earum definitione.

Potentia siue facultas est cuiusvis operis & actionis causa : & hæ duplex, ενεργεία id est actu, altera potestate. Hæc potentia siue facultas etiam dicitur uirtus, & tunc

64 DE CONSEN. MEDIC.

quadrifariam describi potest. Primò, quòd uirtus sit habitus, penes quem aliquis dicitur bonus. Secundò, quòd sit quædam actiua qualitas, sicut dicimus elementa habere quatuor uirtutes, id est quatuor qualitates, scilicet calidas, frig. &c. Tertiò describitur, quòd uirtus sit quædam forma specifica, sicut dicimus Eupatorium habere uirtutem ad iecoris morbos. Quartò describitur, quòd uirtus sit animæ facultas, qua suas peragit operationes.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Arist. 2. Ethic. Virtus est dispositio quædam animæ, per quam inter duo extrema tenemus medium: & hæc spectat ad moralem philosophum. Gal. 1. de cau. pulsuum, loquens de generibus pulsuum, inquit, Quando essentia incognita nobis est, hoc nomine facultatis eam appellamus. Alicuius enim est facultas, & eius notio est relationi subiecta. Ac si diceret, eam facultatem dici de omnibus, ad quæ referri potest, & sic de habitu & de qualitate actiua dicitur. Gal. 1. de fac. simp. cap. 1, Fa-

cultas, causa quæ est effectrix, eaque partim actu, ut calefaciendi in igne: partim in futuro tempore, ut calefaciendi pyretro. uel sic in animalibus describitur: Virtus siue facultas est animæ potentia, membris essentialiter attributa, ad suas operationes peragendas.

De facultatum alia diuisione.

Facultas etiã triplex est, naturalis, uitalis & animalis: triplex inquam in ratione, non in substantia. Nam sicut in citro color, odor, & sapor inueniuntur diuersi in ratione, ydem in substantia: ita in his facultatibus, naturalis locatur in hepate, & est facultas, quæ nutriens in similitudinem nutriti trãsmutat. Hæc duo præsupponit, generationem scilicet & auctiõem: nã generatio ita alteratione & formatione, sicuti auctrix habet alteratricẽ & nutriticẽ auxiliatrices. Auctrix facultas est potentia, qua corpus in omnem dimensionem augetur, usque ad augmenti finem: uocatur ab Auicenna Crescitua. Naturalis siue nutritrix facultas similiter agglutinationem & appositionem præsupponit. As-

E.i.

similatio, quæ in nutrice reponitur, quatuor
 has facultates supponit, attractricem scilicet
 retentricem, alteratricem siue concoëtricem
 & expultricem. Facultas vitalis siue animosa
 est quæ uiuificat, & locatur in corde, à qua
 procedit uita, ad singula corporis membra ui-
 uificanda. Facultas animalis est potentia
 ipsius animæ, in cerebro locata, quæ in mo-
 tricem & sensibilem, aut in quaternas cere-
 bri facultates diuiditur, quæ sunt, sensus cō-
 munis, imaginatrix, ratiocinatrix, quam co-
 gitatiuam etiam dicunt, & memoratrix.
 Sensus communis est, qui solus omnium alio-
 rum sensuum sensata percipit. Imaginatrix,
 quam Græci φανταστικὴν uocāt, dicta est, eo
 quod inde nobis uisa proueniant. Ratiocina-
 trix est quæ reuocat species sub sensum ad
 iudicium, atque rerum imagines de potentia
 abstrahit. Memoratrix est quæ omne quocum-
 que à cæteris facultatibus elaboratum est & re-
 ceptum, ueluti nutrix conseruat & fouet.

Loci consentientes ex ve-
 ra Medicina.

Gal. 9. meth. cap. 10, Gubernant ani-

mal tres diuersi inter se generis facultates, toti corpori ex suo ueluti fonte quæque distributa (eas Plato uocat animas) Est enim earum quædam ad nutriendum animal necessaria, ac cum stirpibus communis, quæ iecur pro fonte habet : hanc appetitricem, seu naturalem, seu altricem appellare licet, sicuti & animam aut facultatem . Altera est, quæ non modò ut stirpibus aut uita præditis, sed etiam ut animalibus est anima insita: hæc in corde collocatur, ceu insiti caloris fonte . Tertia anima ratiocinatrix in cerebro domicilium habet, ea uoluntariis actionibus unà cum sensibus præsidet.

Loci de virtute nutrice.

Aristo. 2. de anima, Virtus nutritiua est potentia saluare suscipiens ipsum secundum quod est eius . Gale. 1. de naturalibus fac. cap. 12, At quòd necesse sit, nutritionem esse assimilationem nutrientis ei quod nutritur, dare liquet. Auic. prima primi cap. de uirt. Virtus nutritiua est illa, quæ nutriens in nutriti similitudinem conuertit, ideo ut per
E. ij.

ipsum restorationem eius recuperet, quod dissolutum fuit. Quod primum in naturæ operibus sit generatio, probatur ex Gale. 1. de fac. nat. cap. 5, Generatio simplex quadam actio naturæ non est, sed ex formatione alterationeque composita. Et cap. 8, Vbi animal magnitudinem perfectam adeptum est, usque ad ætatis vigorem nutritrix uirtus dominatur, cui auxiliatrices & ministræ sunt alteratrix & nutritrix. Et cap. 11, Ad hoc ut fiat nutritio siue adherentia precedat oportet: sicuti etiam ut illa fiat appositio. Exemplum habes de uirilagine, quæ nutrimenti est adherentia, sed non est assimilatio.

Locī de quatuor facultatis nutritiue ministeriis.

Auic. prima primi cap. de uirt. minist. Virtuti nutritiue ministrantes sunt quatuor uirtutes, attractiua, retentiua, digestiua & expulsiua. Quæ uerò sit unaquaque, poteris ab ipso ediscere. Gal. 3 de temper. cap. 1, Quatuor nimirum dicimus totius corporis proprias facultates esse, attractricem, alteratricem,

retentricē, & quartam quæ alieni sit segre-
gatrix, easdēque facultates effectus esse to-
tius in quouis corpore substantia, &c.

Loci de virtute auctrice.

Arist. 2. de anima, Virtus augmentatiua
est uirtus factiua quanti. Gal. 1. de fac. nat.
cap. 7, Auctio est solius naturæ opus, ut cor-
pus quod continuitatem suam & speciem,
quam prius habuit, uniuersam seruet, in o-
mnem partem extendere: quæ sine nutrimen-
to affluente adhærentēque fieri nequit. Auic.
prima primi cap. de uirt. minist. Virtus
augmentatiua est uirtus, quæ addit in dia-
metris totius corporis secundum proportio-
nalitatem, quousque corpus ad augmenti fi-
nem perducatur per illud, quod ipsum ingre-
ditur ex nutrimento. Idem ait in sexto de
naturalibus.

Loci de facultate vitali.

Gal. 5. de locis affe. cap. 1, Cor innati ca-
loris ueluti fontē esse, neq; animal mori posse,
nisi cor afficiatur, iā declaratū est. Igitur cor
E. iij.

70 DE CONSEN. MEDIC.

est membrum uiuificans. Auic. prima primi, cap. allegato, Virtus uitalis est, quæ cum recepta fuerit in membris, præparat ea ad recipiendum uirtutem sensus & motus & operationes uitæ, &c.

Loci de facultate animali.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 1, Ostensum est, sensum & motum uniuersis corporis partibus à cerebro suppeditari, &c. Et tertio de loc. aff. cap. 7, Rationi consonum uidebatur, animam in cerebri corpore sedem obtinere, atque in ipso & rationis uim & sensibiliū imaginum memoriam residere, &c. Et sic animæ facultas in motricem & sensibilem potentiam diuiditur. Arist. tertio de anima cap. 2, Sensus communis est qui solus sensata aliorum sensuum percipit. Auic. primo can. cap. de uir. animali, Phantasia, id est imaginatiua est uirtus, quæ formas perceptas à sensu communi custodit, & retinet eas post sensus absentiam. Themist. unà cum Aristotele Imaginatiuam esse potentiam animæ à sensibus ortā dicit. Arist. primo Ethic. facit

differre uirtutem ratiocinatricem ab intellectu, eo quòd causas cum effectibus conferre possit, sed intellectus causas tantum comprehendat. Gal. lib. fin. med. Sensus est affectus animæ per corpus, nuncius rei quæ mouere idonea est. Arist. lib. de memoria & reminiscen. Memoria, inquit, est habitus phantasmatis, id est, imaginis. Auer. ibi, Memoria est reuersio in præsentì intentionis iam in præterito comprehensæ. Auic. primo can. Memoria est thesaurus eius quod peruenit ad extinctionem de intentionibus perceptis à sensu extra formas perceptas à sensu. Gal. lib. fin. med. Memoria est præteriti comprehensio, cuius præsens fuit ex sensu perceptum.

Dissentientes circa facultates dictas.

- 1 Adserere, facultates naturales non esse in qualibet parte corporis.
- 2 Adserere, facultates esse remediorum indices.
- 3 Adserere, facultatem nutricem & auctricem esse idem.

E. iiij.

4 Adserere, facultates non alibi, quàm in animato corpore posse reperiri.

5 Adserere, facultatum cognitionem esse medico inutilem.

6 Adserere, facultatem uitalem non esse naturali priorem.

Confutatio dissentientium circa facultates naturales.

Ad primum: Gale. 5. de loc. aff. cap. ult. Est igitur communis sermo, quem inuenire proposui de naturalibus facultatibus, quas in qualibet parte quatuor generatim esse didicisti: primam uoco attractricem, quæ parti peculiares succos alendi ipsos gratia, & appetere & attrahere potest. Altera est, quæ alteratrix dicitur, quæ succus attractus similis euadit parti, quæ aliter Crescitrua: huic duæ aliæ ministrant, retentrix & expultrix, &c. Et sic in qualibet parte erunt facultates. Similis sententia est in lib. de plenit. circa medium.

Ad secundum: Gal. de opt. secta ad Thrasib. cap. 42, Si constans uis remedium in-

dicat, in sanis quoque quoniam constat, remedium indicabit: sed in sanis remedium non indicat, ergo nec in agris constans remediū indicabit.

Ad tertiū: Gal. primo de natural. facult. cap. 9, Quippe summa rei sic habet, generatio, auctio & nutritio prima naturæ operū, ac ueluti capita sunt. Vbi distinguit auctiōē à nutritione, igitur idem non sunt. Præterea tali ratione probatur: Quæcunque in fine & in quantitate materiæ differunt, non sunt idem: sed auctrix & nutritrix sunt huiuscemodi, igitur idem non sunt. Quod differant in fine & in quantitate materiæ, probatur ex hoc, quia nutritrix indiuiduum tantum cōseruat, auctrix uerò auget. Veruntamen dicimus unam & eandem substantiam esse, quæ duo hæc efficit.

Ad quartum: Galen. primo de natur. fac. cap. 13. probat in magnete & in succino esse uim attractoriam, sicuti & in purgantibus medicamentis, & in stirpibus, & in similibus esse alias facultates: igitur alibi quàm in animato corpore reperiuntur.

Ad quintum: Gal. 2. de naturali fac. cap. 3, Nisi enim à natura facultas quaedam naturalis unicuique instrumento statim ab initio sit tributa, durare animalia non poterūt, non modò tantum annorum, sed nec paucissimorum dierum: igitur scire has facultates non erit inutile. Præterea probat Galenus citra facultatem attractoriam de urinae secretionem, neque de alimenti distributione, aut de nutritione non medico licere loqui: igitur harum cognitio non erit inutilis. Rursus quinto de loc. aff. cap. ult. Has facultates, inquit, in qualibet affecta parte, utrum ualida sint, an infirma consideretis hortor: & sic earum cognitio non erit inutilis.

Ad sextum: Auic. prima primi cap. de uirt. uit. inquit, quòd præparat ad recipiendum alias uirtutes: igitur erit prior. Præterea id prius est, cuius instrumentum est primum: sed instrumentum uirtutis uitalis, scilicet cor, est prius factum quàm hepar, igitur erit prius.

De sanitatis ac morbi definitione.

sanitas est harmonia siue concinnitas

quatuor primorum elementorum, quæ secundum naturam in nobis sunt. Vel, Sanitas est omnium nostri corporis partium naturalis quædam constitutio, ex qua actiones naturales eduntur. Vel, est naturalium uirium actio minimè impedita. Ad sanitatē requiruntur, pulchritudo, bonus habitus, integritas. Pulchritudo erit, si proportio membrorum cum coloris probitate adsit. Bonus habitus sit, non qualis exercitatorum: nam ne salubris quippe hic habitus est, sed sicut superius à nobis descriptus. Integritas erit, si ne quid circa animum, mores, et robur ac symmetriam corporis desit. Morbus uero cum ex diametro sanitati opponatur, erit inconcinnitas, siue intemperies primorum elementorum quæ in nobis sunt. Vel erit partium præter naturam constitutio, ex qua actio uitiata prouenit. Vel erit naturalium uirium præpeditio.

Locī consentientes ex vera
Medicina.

Quòd sanitas sit harmonia, &c. probatur
ex Gale. I. de temp. cap. I, Nam indicium, in-

quit, sani hominis ac temperati est elemento-
 rum portionis equalitas. Et tertio de mor.
 diff. cap. 1, Sanitas est affectus secundum na-
 turam, ad faciendam actionem idoneus. Nec
 refert si dixeris constitutionem siue affectū,
 sicut nec actionem, nec actionis causam. Et
 primo meth. cap. 9, Sanitatem, inquit, esse
 ipsarum functionum constantiam, aut affe-
 ctum siue constitutionem partium, cuius ope
 functiones secundum naturam edimus. Et ter-
 tio meth. cap. 3, Quippe monstratum est, sa-
 nitatem in similaribus corporibus ipsarum
 quatuor qualitatū esse iustam temperiem.
 Avic. secunda primi cap. de diuisione dispo-
 sitionum corporis, Sanitas, inquit, est dispo-
 sitio, per quam corpus hominis in sui comple-
 xione & compositione tale existit, ut ex eo
 operationes eius omnes proueniant incolu-
 mes. Quod uerò pulchritudo requiratur, &c
 Gal. in art. med. cap. 8, Signa optima con-
 stitutionis sumuntur à commensuratione, pul-
 chritudine, ab optimo colore, ac præterea ab
 earum, quæ ipsis insunt, uirtute operationum
 De morbo uerò sic Gal. de constitutione ar-

med. cap. 12, Id quod excellenter sanum est, sit modò illud simile uel instrumentarium, omni ex parte moderatum existet, agrum uero immoderatum: siquidem morbus immoderatio quædam est. Et secundo de natu. hum. comment. 1, Morbus est affectio quædam in animantis corpore, quæ primùm actionem ledit. Et 3. de sympt. differ. cap. 1, Morbus est constitutio quædam præter naturam, à qua primò actio uitiatur: quin si affectum dixeris, à quo actio uitiatur, idem est, &c. Et meth. 2. cap. 1. & 3. Nam contrarium sanitati affectum, à quo ladi actionem diximus, morbum tantùm appellamus. Et similiter cap. ult. Quicunque affectus functioni officit, is est morbus.

De sex morborum generibus.

Sicuti naturalis operatio in his tribus consistit, scilicet intemperie, compositione, & unitate, ut dictum est, ita morbus erit in triplici diuisione: nempe in complexione, compositione, & unitate soluta. In complexione, ut calid⁹, frigidus, humidus, & siccus: aut ca-

lidus siccus, calidus humidus, frigidus siccus,
 frigidus humidus. In compositione quatuorpli-
 citer, in positione, magnitudine, figura & nu-
 mero. In unitate simpliciter, nempe in simi-
 laribus & instrumentarijs simul: & sic sex
 erunt in uniuersum morborum genera, unum
 quippe in similarium partium intemperan-
 tia, in organicis quatuor, in utrisque unum,
 quod est soluta continuitas. Leditur etiam
 operatio tripliciter, debilitate, uitioſe, auni-
 quia nullo modo fit operatio.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Auic. secunda primi cap. 2, Dicimus quod
 aegritudinum genera sunt tria, loquendo de
 simplicibus aegritudinibus. Primum est simi-
 larium, & est species mala complexionis. Se-
 cundum est membrorum officialium, quae sunt
 aegritudines compositionis. Tertium est aegri-
 tudinum communium, quae aegritudines acci-
 dunt membris similaribus & instrumentarijs
 &c. Gal. 1. de differ. mor. cap. ult. Nempe di-
 ctum est, quod alij sunt primorum similarium quatuor

corporum morbi, alij instrumentorum compo-
 sitorumque, alij utrorumque, ut phlegmone,
 &c. Et lib. de opt. corp. constitutione inquit,
 quod temperamentum ex calido, frigido, hu-
 mido, sicco, coagmenti mensura definitum,
 similarium membrorum est sanitas, & quod
 constructio partium ex positione, magnitudi-
 ne, & figura, & numero constituitur, &c. Si
 igitur sanitas in ijs consistit, simili modo &
 morbus in his erit, quum in eodem genere am-
 bo constituentur, teste Gal. meth. 1. cap. 7.

Quod uerò sex sint morborum genera, pro-
 batur ex Gal. 2. meth. cap. 6. dum inquit, Er-
 go sunt sex in uniuersum morborum genera,
 unum ipsorum similarium proprium, nempe
 intemperies: quatuor, ut modò dictum est, in-
 strumentorum cuiusque, & cum his sextum,
 quod tum similaribus, tum instrumentalibus
 est commune, ipsius unitatis solutio.

De causis salubribus & in- salubribus.

Causarum alie sunt conseruatrices, alie
 effectrices. Conseruatrices sunt, quae corpus

in optima constitutione præseruant. Sed quia corpus alteratur & corrumpitur, idcirco quot modis alteretur dicamus. Alteratur corpus sextupliciter, primò ex aere ambiente, secundò ex motu & quiete, tertio ex somno & uigilia, quartò ex cibo & potu, quintò ex his quæ excernuntur & retinentur, sextò ex affectibus animi. In his causæ salubres & insalubres conseruatricēsque consistunt. nā in his si modus seruetur, cōseruatrices sunt: sed ubi à modo recesserint, insalubres reddūtur. De his sex rebus non naturalibus in morbis à capite usq; ad pedes deinceps pertractabim⁹. Causæ etiam dispositionum corporis rursus alteratur ex frigore, calore, siccitate, humiditate. Causæ uerò morbi effectrices sunt tres, procatartica, & antecedentes, & coniunctæ, quæ diuiduntur per se, uel per accidens.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. in art. med. ca. 84, Quia salubriū nōnullæ sunt cōseruatrices, nōnullæ effectrices. Et paulò infra, Si corpus esset impatibile &

inalterabile, semper optima cōstitutio perduraret: sed quia corrūpitur & alteratur, idcirco eūdē prioris status tenorē nō seruat, &c. Et cap. 85. eiusdē lib. Quot igitur numero sine ea, quæ ex necessitate corpus alterāt, distinguentes, propriū in singulis eorū causarū salubriū genus inueniemus. Vnum igitur erit, ex ambientis aëris adhæsū, secundum ex motu & quiete, &c. ubi sex res non naturales enumerat. Auic. secunda primi doc. secunda, cap. 1. causæ dispositionū corporis, &c. sunt tres, antecedentes, primitiue & coniunctæ: & paulò inferius dicemus, quòd causæ quæ mutant dispositiones corporis, & quæ conseruant, aut sunt necessariae, à quibus impossibile est hominem egredi in toto tempore uitæ suæ, aut non necessariae. Necessariarum sunt sex genera, genus aeris circundantis, genus motus & quietis, &c. Gal. in art. med. cap. 80, Alteratur uerò substantia à caliditate, frigiditate, humiditate & siccitate.

De causis morborum partium
instrumentalium.

Dicūm est, quòd ad composita membra

F. i.

82 DE CONSEN. MEDIC.

quatuor spectant, positus siue situs, formatio, magnitudo & numerus. Primum situs uel est optimus, uel parum uariat, uel à modo recedit, uel agrum plurimo recessu redit. Formatio quoque tripliciter ladicur, uel in figura, quum à cursu naturali mutatur in meatu uel orificio, & hoc ratione obstructionis aut dilatationis: in membrorum superficie, quum adest asperitas & lenitas. Magnitudo dupliciter, excessu & defectu. Numerus similiter aut deficit aut superabundat, ut sextus digitus in manu. Hæ omnes causæ si modum exceßerint, insalubres dicuntur: si uerò à mediocritate non recesserint, erunt salubres. De soluta unitate, quum de chirurgia tractabimus, fusius loquemur.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Auic. secunda primi cap. 3, Compositionis aegritudines quatuor cōprehenduntur generibus, ut aegritudines creaturæ, aegritudines quantitatis, aegritudines numeri, & aegritudines situs. Aegritudines creaturæ, id est for-

mationis uel sunt in figura, uel in uis, uel in receptaculis & uentriculis, uel in superficie, &c. Gal. in art. med. ca. 87, Instrumenta uero partium causa salubres, alia sunt salubres erroribus, qui in foramine consistunt: alia his qui in magnitudine, uel numero, uel posita, &c. quae fusius uidere poteris. Lege etiam de his Gal. I. de diff. morb. cap. 7. exempla in omni morbo afferentem.

De Morborum calidorum, frigidorum, siccorum, & humidorum causis.

Causae morborum calidorum sunt quinque, putredo, uicinitas ad corpus calidum, obstructio, cibus & potus calidus, & motus uehemens. Causae frigidorum sunt quatuor, uicinitas frigidorum, cibi potusque qualitas & quantitas, obstructio & raritas, ocium & motus immodicus. Causae siccorum sunt sex, plurima transpiratio & pauca nutritio, alimenta siccantia, sollicitudo & uigiliae, aeris constitutio sicca, aquae nitrosae & sulphureae, aluminosae, & medicamenta exiccantia. Causae humidorum sunt his e contrario oppo-

F. ij.

84 DE CONSEN. MEDIC.

sita, ut alimēta humida, quies, somnus, potus plurimus, &c. ex quibus facile morborū cōpositorum causæ intelliguntur.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Gale. 2. de morb. cau. cap. 2, Corpora quæ plus satis incalescunt, ita uidentur affici, uel ob motum aliquem aucto calore, uel ob putredinē, uel ob calidioris corporis uicinitem, &c. redditque rationem de unoquoque. Et cap. 3. eiusdem lib. Frigidi morbi causæ sunt, ut frigidorū uicinitas, cibi potūsque quantitas & qualitas, constipatio & raritas, &c. reddens de singulis rationem. Et cap. 4. & 5. Similiter de sicci & humidi morbi causæ etiam rationem reddit. Auic. secunda prima doc. secunda, summa secunda cap. 2. 3. & 4. idem asserit ut Galenus, quæ longum esset recensere: uide tu, si lubeat, eum fusius. Vide etiam Galenum primo de diff. feb. cap. 3. & 2. eiusdem cap. 9.

Authores erronei dissentientes
circa sanitatem & morbu.

- 1 Adserere, sanitatis cognitionem non esse medico necessariam.
- 2 Adserere, morbos posse cognosci, non cognito affectu secundum naturam.
- 3 Adserere, morbos similariu partium non distingui ab instrumentalium morbis.
- 4 Adserere, scire morborum numerum non esse necessarium.
- 5 Adserere, morbu in numero ab eo quod est in quantitate non differre.
- 6 Adserere, causas morborum non esse semper considerandas.

Confutatio dissentientium circa
sanitatem & morbum.

Confutat primum Gale. meth. 2. cap. 3. inquit, quod sanitatis egemus omnes ob actionem quæ est secundum naturam. Nam sine sanitate actionem integram habere non possumus. Et nono meth. cap. 9, Sicut primu propositu est in methodo, morbi sublatio, ita in opere de sanitate tuenda, est sanitatis institutio.

F. iij.

Igitur erit necessaria.

Ad secundum: Gale. meth. 2. cap. 4, Necesse tibi erit, eo quod secundum naturam est prius præsumpto, ita quod est præter naturam inquirere. Nam si ipsum quod secundum naturam est, non nosti, nec quod egressum est à natura nosti. Igitur primum sanitatem cognoscas, antequam morbum cognoscas.

Ad tertium: Gale. 2. meth. cap. 6. exemplo probat, Nam quum crystallinus humor ex intemperie laborat, omnino leditur oculorum functio. Cæterum non est, ut eorum organa sint morbus. Præterea Hippocrates constituit aliud esse in corporibus similaribus morbi genus, aliud in instrumentariis: Igitur distinguuntur.

Ad quartum: Gal. meth. 1. cap. 5, Quoniam omnis morbi curationem inuenire propositum est, necesse est, morborum numerum prius sciri.

Ad quintum: Gal. de consti. art. med. cap. 12, Differt numeri morbus à quantitatis morbo, ex eo quod in hoc morbi genere particula nonnunquam integra: in illo uero portio quæpiam alicuius particulae aut amputanda est,

aut adiicienda.

Ad sextum: Gal. primo meth. cap. 8. tria rerum genera enumerans, primum genus corporum, alterum actionum, tertium inquit esse genus causarum, quæ hos affectus creant, quæ ad medendi artem incipiendam primum suæ noscenda.

De cura singulorum sex morborum in genere.

Morbus in complexione per sui contrariū auferitur. Nam si calidus sit, frigido, si frigidus, calido, si humidus, sicco, & econuerso remouebitur: si ex utroque sit compositus, utroque contrario indigebit: siquidem contraria contrarijs curantur. Morbi in formatione, in nuper nato animali ad habitum naturalem tantum reducuntur, posthac emendari non possunt. Similiter morbi in cavitare parui, quum adhuc augetur animal, per quietem & alligationem redduntur: magni uerò per partiam operationem & spiritus retentionem. Morbi in numero si ex aliqua particula deficiente fiant, eam efficere studebi-

F. iij.

mus subministrando naturæ, si ex superabundanti hanc refecabimus, hæc omnia sanare possumus. Sed quòd omnia generentur, non æquè possumus: morbis in magnitudine similiter excedentibus naturæ modum: ablatio & abolitio cōuenit: deficientibus, refectio uel generatio. Morbos in situ, si quæ particula à suo situ dimoueantur, ad suum locum reducendo, sanabimus.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. in art. med. cap. 89, Curatio unam præcipuam ac communissimam habet intentionem, ad id, quod est dispositioni contrarium auferendæ. Calido enim affectui causa frigida contraria est, frigido calida, eademque in cæteris proportionem seruata. Et cap. 93, eiusdem libri, in his igitur qui adhuc crescunt, possibile est plurium partium figuram emendare: in his autem qui iam aucti sunt, minimè. Et cap. 96, Quum morborum in numero duplex sit differentia, quibus aliqua particula deficit, his intentio alteram effi-

cere subministrādo naturā. At quibus super-
 abundat, hanc refecare oportet aut scal-
 pello, aut igne, aut medicamento quod uren-
 di uim habeat. De alijs morbis lege cap. 97.
 & 98. eiusdem libri. Gal. 8. meth. cap. 3, Illud
 esse uerissimum omnium, inquit, quòd contra-
 ria contrariorum sunt remedia. Et cap. pri-
 mo eiusdem libri, Omnis excessus per contra-
 rium excessum sanatur. Similiter lib. 7. cap.
 tertio. & lib. 4. cap. 2, Curabis, inquit, cali-
 dum refrigerando, frigidum calefaciendo,
 &c. similis sententia est aphor. 2. aphoris. 22.
 & in mille alijs locis.

Obiectio.

Obstructio ad quem horum morborum re-
 ferenda erit?

Responsio.

Obstructio est compositionis morbus in
 meatu siue in orificio, fitque ex lentis ac
 crassis humoribus, curátque per apertionem,
 qua fieri solet per abstergentia atque inci-
 dentia medicamina.

Obiectio.

Intelligisne per apertionem, uulgarem medicorum digestionem, an aliud ab hac distinctum? Nam digestio Auicennæ est tenuitatis materiae incrassatio, uel crassæ & lenta extenuatio.

Responsio.

Intelligo per apertionem, humorum ac meatuum preparationem. Nam humores oportet esse non tam fluxui paratos, quam etiam aperta esse foramina, per quæ debet purgatio fieri, ut Gal. aphorif. primo, comm. 24. Et secundo aphorismo, comment. 9. Nam tunc fluidum esse corpus pronunciat, quum tam in humoribus, quam etiam in meatibus reseratis fuerit apertum.

De Morborum indiciis in genere.

Indicia morborum uel à ratione temporis sumuntur, & sunt tria, præsentia, præterita, & futura. Nam uel morbum præsentem indicant, uel futurum esse prænunciant, aut memoria subiiciunt. hæc omnia interdum à medicis præ-

nunciatiua uocantur. Vel sumuntur à ratione suæ essentia, & sic erunt quatuor. Primum ab exeuntibus in quantitate & qualitate mutatis, & cognoscuntur à multitudine excrementorum, siue per urinam, per sudorem, per uomitum, per sputum, & per secessum, & per qualitatem mutatam, sicut est totius corporis rubor uel pallor, uenarum ac membrorum tumor, &c. Secundum ab operatione laesa, & cognoscitur à grauitate, à pigritia, à sensuum imbecillitate, à pulsu magno & pleno, ab anhelitu, à corporis extenuatione, &c. Tertium à propriis morborum accidentibus, sicut in pleuritide, à tussi, à dolore, à febre. Quartum à membrorum positu, ut à capite, à uentre, & ab aliis locis affectis. Vel sumuntur indicia à uiribus corporis, & hoc trifariam: uel à uirtute animali, & cognoscitur ex motu, ex ratione, & sensibus. Vel à uirtute uitali, & cognoscitur ex pulsu & ex spiratione: uel à uirtute naturali, & cognoscitur ex urinis & ex egestionibus. Horum quædam sunt salubria, quæ salutem, quædam insalubria, quæ mortem prædicere solent.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gale. in art. med. cap. 7, Signa sunt salubria & insalubria, quæ præsentem indicant aggritudinem, & futuram prænunciant, atque præteritam memoriæ subiiciunt. Et paulò inferius, Hæc quoque secundum tria tempora salubria & insalubria dicuntur, quorum usus maior est de indicatiuis, quàm ex his quæ memoriæ subiiciunt. Galenus in artic. med. capite 81, Quæcunque excernuntur, nonnulla quidem sunt uelut partes patientium locorum, nonnulla tanquam excrementa: quæ uerò in ipsis continentur, singula propriam faciunt iudicationem, & sic ab exeuntibus sumitur indicium. Gal. primo de loc. aff. cap. 5, Locorum notæ, ab actione læsa, & excrementis, & positu, & doloris proprietate, & à propriis accidentibus sumuntur: affectuum uerò ab excrementorum specie, à loci natura, & doloris proprietate, & propriis accidentibus. Sane actio læsa affectam partem indi-

care potest, &c. similiter 3. de Symptomatu
 diff. cap. 3. de his indicia habentur. Gal. me-
 thod. 9. cap. 13, Hæc itaque cum vires indi-
 cent, maxima harum erit dignitas. Nam vi-
 uere ipsum nobis ex harum custodia constat,
 utpote quum uitam, aut ipsas esse vires, aut
 earum actiones sit necesse, &c. Hippoc. apho-
 rism. 2. aphorism 33, In quouis morbo mente
 constare & bene se habere, ad oblata bonum,
 contra uero se habere, malum. Et Gale. in hoc
 comment. Ex his constare mente cognosces,
 quæ ad cerebrum & omnes membranas, sicuti
 ad uentrem attinent hepar & cor, ubi adest
 promptitudo ad ea quæ offeruntur, &c. Gal.
 I. de art. curat. ad glauc. Virtus uitalis, quam
 ex corde prodire ostendimus, ex pulsum de-
 bilitate cognoscitur: at quæ ex hepate oritur,
 naturalis dicta, ex sanguineis egestionibus,
 aquosis & tenuibus, & quæ ex cerebro
 originem ducit, animalis dicta, ex mor-
 tuum uoluntariorum imbecillitate deprehen-
 ditur, &c.

De alia signorum di-
uisione.

Sumuntur etiam indicia à complexione,
 ab humorum dominio, ab ætate, à tempore,
 consuetudine & uictu præterito complexio-
 nes cognoscuntur per decem genera. Primo ex
 tactu, ut si calidus, frigidus. Secundo ex adi-
 pe & carne addita: nam multa caro calidi-
 tatem, pauca cum multo adipe, frigiditatem.
 Tertiò ex celeri ac tardo capillorum ortu:
 nam celer caliditatem, tardus frigiditatem.
 Quartò ex corporis colore: nam color cro-
 ceus, rubeus, luteus ac pallidus caliditatem,
 albus, liuens, plumbeus, frigiditatem. Quinto
 ex membrorum forma: nam ampla, lata cali-
 ditatem: angusta uerò, frigiditatem. Sextò ex
 membrorum sensu: nam citò sentiens, calidi-
 tatem: tardè, frigiditatem. Septimò à cogita-
 tione hominum. Octauo ab operationibus: nã
 celeres operationes caliditatẽ, & ecõtra frigi-
 ditatẽ. Nono ex superfluitatibus corporis: nã
 siquid egrediens acutũ habeat odorẽ, calidi-
 tatẽ indicat: si minus, frigiditatẽ. Decimo ex

ccidētibz animi, ut ira, audacia, inquietu-
o, impietas, & similia caliditatē: contrā ue-
ō, frigiditatem. De ætate id dictum est, pue-
os & iuvenes esse calidos: senes & decrepi-
os, frigidos. Similiter ex tempore & con-
uetudine & uictu præterito iudicandū est.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. lib. de sectis ad eos qui introducun-
tur cap. 4. & 5, Hoc igitur modo illi ab ipso
ffectu eius quod confert, indicationem eli-
iunt: similiter ab agrotantis uiribus, ab æta-
e, ab anni tempore & regione, &c.

Auic. secunda primi cap. 3, Signorum ge-
nera, quibus complexionum dispositiones co-
noscuntur, sunt decem, & ea enumerat, exē-
pla singulorum afferens, ut dictum est suprà.

De vrinæ definitione & diuisione.

Lotium, est sanguinis aliorūque humorū
ferea quadam redundantia. Id tamen existi-

mandum est optimum lotium, in quo resides
candidum, leue, & æquale, per omne tempus:
uel id optimum est, quod urinæ sanorum est
simillimum. Tria in lotio considerantur, sub-
stantia, color & hypostasis. Substantia si
tenuis, crassa: nam si tenuis & alba sit, uel
uirtutis imbecillitatem, uel renum obstructio-
nem significat. Si tenuis & pallida, uel te-
nuis & rufa, uirtutis imbecillitatem, & quo
ad substantiam, cruditatem significat. Tenuis
uerò & flaua incoctionem, & alimenti defe-
ctum, uigilias ac animi pathemata significat.
Tenuis rubra, sanguinem incoctum: tenuis &
nigra, melancholiam, uel nimiam frigidita-
tem, aut sanguinis adustionem indicat. Cras-
sa uerò & alba, maximam crudorum humo-
rum copiam demonstrat: si crassa & rubea,
plenitudinem sanguinis: si crassa nigra, eua-
cuationem atra bilis significat. Color flauus,
rubeus, caliditatem: albus, luens, ater, frigi-
ditatem denotant. Hypostasis uerò diuiditur
secundum situm: nam si in fundo non diuul-
sa residet, sed pyramidalis, bonam indica-
tionem: si in supremo loco, diuulsa &

inaequalis, imbecillitatem uirtutis: si in medio loco, malum portendit, maximè si diuulsa sit: nam naturam defecisse in cōcoctione ob distractionem significat. Consideratur etiam urina iuxta suum colorem: nam rubea, sanguinis incocti copiam, & morbi cruditatem indicat: idcirco morbum facit diuturnum. Nigra, cui antecessit liuiditas, frigiditatem: cui uerò croceitas, calorem. Liuida frigiditatem, & uirtutis interitum: oleosa, totius corporis adipis colliquationem indicat. Rursus si sedimētum citò crassum fiat, citò morbum solutum iri significat. Si residat crassum, assistente uirium robore, longum fore morbum: si uerò imbecillitas adsit, egri morbum prænunciat.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Theoph. de urinis cap. 1, Lortiū est sanguinis aliorūque humorum aquea quedam collatura. Gal. lib. finit. med. Urina est superfluitas ex colatu sanguinis in magna uena, quæ per renes & ureteras in uesicam

G.ii.

delabitur. Hippocrat. prognost. 2. tex. 26,
 πῶδε ἔρπον ἀειδόν ὅτι εἰ λευκή ἢ ὑπόστα-
 σις καὶ λεῖν ἐὶ ὁμαλὴ ὅτι πάντα τὸν χρόνον.
 Gal. 1. de cris. cap. 12, Ex his igitur illa
 optima est, quæ urinæ sanorum est simillima:
 quæ uerò non est talis simpliciter, uel incocta
 est, uel præter hoc perniciosa. Gal. 1. de
 cris. cap. 12, Oportet urinam optimam dis-
 cedere tantum sua crassitudine ab aquosa,
 quantum colore, si bene concoqui debeat, po-
 nens differentiam in substantia et colore,
 etc. Gal. loco citato, Præua autem sufficien-
 ter est, quæ tenuis et alba est, sicuti aqua:
 nam simplex quidem dispositio est, sed ulti-
 mæ imbecillitatis est indicium. Huic proxi-
 ma est altera urina uini tenuis albi colore,
 quæ in multis apparet morbis. Post hanc
 est subpallida, etc. Hippo. 2. prognost. tex.
 30, Dum urina tenuis fuerit ac rufa, crudam
 esse significat ægritudinem. De lotij colore
 Hippo. 2. progno. tex. 31, Exitiosior urina
 est, si aquosa, fœtida, nigra, crassaque est.
 uide in hoc latius Galeni comment. Quocir-
 cas hypostasis considerandus, et eius color.

lege Hippo. 2. progno. tex. 36, Consideranda, inquit, in urina nubecula, utrum sursum fuerit an deorsum, item color quem obtinet, &c. De oleaginosa urina Hippoc. 2. progno. tex. 35, Si pingue de super nater, araneorū speciem referens, damnandū: indicat enim consumptionem. Et Gale. de cris. cap. 12, Quod si ueluti oleum mingatur, colliquationis est signum. De colore Hippoc. 2. prognost. tex. 27, Urina subrubra cum sedimento subrubro admodum salutaris, sed morbum diuturnum fore indicat. Et tex. 33. eiusdem lib. In mulieribus & uiris urina nigra, in pueris aquosa, deterrima est. lege fusius Galenum. De urinis, quæ uel turbida minguntur, & paulò post resident, uel quæ semper turbida mictæ permanent, aut quæ pura minguntur, & postea concurbantur. habes plura ex Gal. 1. de cris. cap. 12. & aphoris. 4. comment. 7. & 4. super primam epidemiam.

Authores erronei dissentientes
circa urinam.

Adserere, renum nutritionis excrementum
G. 4.

tantum esse lotium.

2 Adserere, per urinam cognosci posse morbos ex succis ortos, qui in uenis non continentur.

3 Adserere, sedimen in urina esse semper bonum indicium.

4 Adserere, ex Galeno non posse per urinarum coniecturam in sectionis uena cognitiones peruenire.

Confutatio dissentientium ex vera Medicina.

Confutat primam opinionem Gal. 1. de nat. facult. cap. ult. contra Lupum quendam dum inquit, Quod autem soli renes tantilla corpora quatuor interim totos, uel etiam plures habeant excrementi congios, id nec confessum, nec rationi consentiens.

Ad secundum: Gal. 4. de sanit. tuend. circa principium, Quoniam lassitudo uitio acrium excrementorum oritur, ante omnia considerandum, in solidisne tantum corporibus, an intra uenarum sinus, succus contineatur. De his quae intra uenas sunt, nullum

planè, nec manifestum, nec euidens signum, præter solam urinam conijcere licet: in reliquis, quoniam qui affligitur usus sit uictu examinandum, id est, per alia signa quàm per urinam coniecturandum, quum urina in hoc casu sit exiguum signum. Et quarto de uic. ratione in morb. ac. Non tutò, inquit Galen. comment. 83, morbi facilitas ex urinarum cōcoctione prænosceatur: nam etsi febris cruditates per urinas manifestè indicentur, morborum tamen musculos infestantium, non secura est per urinas significatio, &c.

Ad tertium: Gal aphorif. 4. comment. 69, Contigit aliquando uel per initia morbi, uel paulò post, urinas factas crassas propter grauitatem habere sedimen, quod bonum signum non est, sicuti in alijs quæ ab initio tenues existentes, ratione coctionis totius morbi sedimen capiunt.

Ad quartum: Gal. 2. prognost. cōment. 27, Quoties serum sanguinis pariter cum urina excernitur, colore subrubra apparet: indicat enim exuperantiam sanguinis non exquisita ratione confecti, & sic sectionem uenæ. Et
G. iij.

meth. 9. cap. 4, Mittendus est sanguis, etiam si nec in lotio, aut in ipsa caloris qualitate humorum putrescentium signum apparuerit. Interdum igitur signum in urina de mittendo sanguine apparet.

De pulsuum definitione & diuisione.

Σφυγμός, id est pulsus, est cordis arteriarumque dilatatio ac contractio. Consideratur pulsus uel ratione uirium, & tunc est triplex, uehemens, quando scilicet tangenti manus ualide repellitur: languidus, quum inualide imbecillum ictum edit: mediocris, media seruans proportionem. Vel ratione arteria, & est duplex, durus & mollis. Vel ratione diastoles, & est trinus, ut altus, longus, latus. Vel ratione plenitudinis & euacuationis, & est duplex, plenus & uacuus. Plenus, qui arteriam solidiorem undosamque in compressione ostendit: uacuus, qui inanitatem suo digito representat. Vel ratione rhythmī, in quo proportionēs temporis metiuntur, & sic est duplex, deficiens uel intercidens. Vel

ratione temperaturarum ætatum, anni, temporum, regionum, sexuum: de quibus satis loquuti sumus infra, ubi Galeni loca circavimus. Vel ratione somni & uigiliæ, uel aliarum causarum non naturalium: nam in somno languidiores minoresque sunt: quum à somno expergiscuntur, uehementes & crebriores sunt.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. 4. de diff. puls. Pulsus est distentio & contractio cordis & arteriarum. Et ibi varias pulsuum descriptiones ex antiquis recitat. Quod uerò ratione uirium cōsideretur pulsus, habetur ex Gale. 4. de præ sag. ex puls. cap. ult. Quum, inquit, pulsus per se sit languidi, infirma est facultas: ubi earum arteriarum languidus nunc pulsus sit, nunc uehemens, facultas non est per se imbecilla, sed ex copia humorū degrauiatur, &c. & ibi omnia ad uirutem spectantia per pulsum declarat. Et 3. de diff. pul. Pulsus qui cum renisu quodam pulsatur, Vehemens uocatur, cuius causa

G. iiij.

est facultatis robur. Quòd uerò ratione arteria pulsus consideretur, habes ex Gal. primo de caus. puls. Reliqua, inquit, & tertia gignendorum pulsum continens causa, ipsum est arteriarum corpus, &c. Et cap. de puls. causis ex diff. instrumentorū, Quū durius aut mollius euaserit corpus arteriæ, ipsos pulsus duros uel molles reddit. Similis sensus est primo de differ. puls. & in lib. finit. med. Gal. primo de diff. puls. Iam quia arteriæ tres dimensiones obtinet, longitudinem, latitudinem & profunditatem, non potest in singulis dimensionibus non fieri quantitas aliqua distentionis & contractionis. Galenus primo de different. pulsum cap. de reliquorum diff. generum, Plenus est pulsus, qui pleniorē arteriam ostendit. Vacuus, qui arteriæ eleuationem facit bullosam, ut digitorū impressioni gressus per uacua occurrat, & sic plenitudinis & euacuationis pulsus datur. De rhythmo genere pulsum habes Gal. i. de diff. puls. cap. de diff. quietis & rhythmi, dū plures species rhythmorū pulsum enumerat, quem fusiùs leges. Omnibus enim naturis, lo-

cis, anni temporibus, omnibꝫque alijs suum
 rhythmũ tribuit, & inter eos rhythmos alios
 pari proportionẽ, alios impari constare in-
 quit. De temperie, Gal. 3. præſag. puls. Ex in-
 temperie cordis calida fiunt pulsus imbecil-
 les: ex intemperie uerò frigida planè efficiũ-
 tur contrarij, parui, tardi & rari. De intem-
 perie sicca & humida cordis tractat eodem
 lib. cap. ult. & lib. de introductione puls. Ca-
 lidiores natura pulsum habent maiorem, ce-
 leriorẽ, ac longè frequentiorẽ, non multò
 tamen uehementiorẽ: graciliores uerò, ma-
 iorem ac longè rariorem, uerũ non multò
 uehementiorẽ. Vide de his similiter de usu
 pulsum circa finem. De pulsibus ætatum,
 Gal. in introduct. puls. cap. 9, Mutantur per
 ætates: sic puerulo nuper nato pulsus est fre-
 quentissimus, senum rarissimus: qui uerò in
 media ætate sunt inter hos, ijs pulsus ad pro-
 portionem respondent. De pulsu anni tempo-
 rum Gal. loco nuper citato, Per anni tẽpora
 pulsus mutantur: nam in medio uere maximi
 ac uehementissimi, celeritate uerò ac frequen-
 tia moderati, similiter medio autumno ha-

bentur. Progrediente uere magnitudo ac uehementia ipsius minuuntur, augentur autem celeritate ac frequentia. Autumno progrediente omnia minuuntur, magnitudo scilicet, uehementia, celeritas ac frequentia: Adueniente uerò astate, fiunt languidi & parui, celeres & frequentes: contrà uerò in hyeme, in paruitatem, languorem, tarditatem ac raritatem mutantur, etc. De regione, Gal. loco citato, Per regiones mutantur: siquidem in calidis, pulsus sunt, quales in astate media: in frigidis ualde, quales hyeme media: in medijs ad proportionem se habent, etc. Quòd pulsus uirorum à foeminarum pulsu differat, habet Gal. loco citato: Viri enim, inquit, mulieribus pulsum habent multò maiorem & uehementiorem, paulò tamen tardiorum ac longariorem. De somni pulsibus ac de expergefacto à somno, similiter de mutatione pulsui per exercitium, balnea, cibos & porus, aerenas ac accidentia animi: nam ab ira pulsus fiunt alti, magni, uehementes, celeres ac frequentes: à mœstitia parui, tardi, languidi, rari: metu celeres, turbulenti, inordinati, inæqua-

MEDIC.
IN CVR. MORB. LIB. I. 107
les, &c. habes in hoc loco citato plura ex
Galeno.

Authores erronei dissentientes
circa pulsum doctrinam.

- 1 Adserere, utilitatem pulsum esse magis
necessariam, quàm respirationis.
- 2 Adserere, certius esse indicium ab urina
sumptum, quàm à pulsu.
- 3 Adserere, cor & arterias moveri tantum
ex motu pulsu.
- 4 Adserere, pulsum genera esse, quàm decē
pauciora, cum Auerrho.
- 5 Adserere, ex repletione pulsum dilatari,
& non econverso.

Confutatio dissentientium circa
pulsum doctrinam.

Ad primum: Gal. de usu puls. Si respira-
tionem cuiuspiam adimes, illico mortem affe-
ris: at pulsu si per multas particulas priues,
non magnopere lædes, & sic maior erit re-
spirationis utilitas, quàm pulsum. Præterea
Hippocrat. totum corpus est conspirabile

atque confluxile. Quare si non per arterias, saltem certè per alia, & potissimum per uenas, &c.

Ad secundum: Haly Abbas 7. sue practices inquit, quòd pulsus est praco uerus quì multa refert. Præterea id certius est, quòd ab operatione sumitur, quàm quòd ab exētib: sed pulsus sumitur ab operatione: igitur certior. Probatur etiam ex uulgari quodā carmine sic dicto,

Vrinae fraudes aperit discretio pulsus. Gal. 1. de differenti. respirationis, cap. 18, Plus indicat pulsus, quàm ipsa respiratio. Et lib. de const. art. med. cap. 18. hoc idem affirmat, &c.

Ad tertium: Galen. 4. de diff. puls. probat de mente antiquorum, non solum cor & arterias moueri motu pulsus, sed etiam per se, sicuti etiam cerebrum. Vnde 8. de usu partium cap. de usu instrumenti odoratus, probat cerebri interiores uentriculos aerem si dilatando attrahere, & se constringendo expellere, &c.

Ad quartum: Phylar. de puls. cap. 9, Hæ

bentur genera pulsum decem, quorum primum, &c. Et Gal. I. de differ. puls. decem etiam enumerat: igitur non pauciora quam decem.

Ad quintū: Gal. de usu puls. inquit, Neque enim eā quod impletur, idcirco dilatatur: serūm ex eo quod dilatatur, impletur, contra Erasistratum.

De signis repletionem indicantibus.

Plethora est succorum aequaliter se habentium exuperantia: differtque a cacochymia, in qua haec vitiosorum humorum non referat, sicuti cacochymia. Pletthora igitur duplex est, quoad vires scilicet: altera quoad capacitatem vasorum, cuius signa sunt vasorum distentio, rubor, totiusque corporis grauitas, et in mouendis membris pigritia, cutis extensio, pulsum plenitudo, visus debilitas, &c. omnia quae grauitatem portendunt. Haec nisi sanguinis missione curetur, calorem naturalem strangulat.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. 13. meth. cap. 6, Vbi autem equaliter inter se succi adaucti sunt, id est & plethorae & plethorā Græci uocant, nos succorum plenitudinem siue redundantiam dicimus. Vbi uerò flaua bile, uel nigra, uel pituita, uel serosis humoribus refertum corpus fuerit, cacochymiam, id est succorum uitiam dicimus. Et lib. de plenit. ad finem, Plenitudo, est copia humorum in uniuerso animalis corpore. Et paulò post, quid intersit inter cacochymiam & plethoram, apertiori sermone demonstrat.

Gal. lib. de plenit. inter indicia, uenarum tumorem, ac earum tensionem, ruborem, corporisque grauitatem & in mouendis membris pigritiam memorat. Iridem meth. 9. cap. 5. obstructionem, distentionem, tumorem, ruborem, in ea, quæ ad uasa refertur, repletionem, recenset. Auic. secunda primi doct. tertia, cap. 6, Repletio secundum duos modos existit: est enim repletio secundum foramina, & est repletio secundum uirtutem. Repletio secundum

MEDIC.
CXVI.
IN CVR. MORB. LIB. I. III

foramina est, ut sine humores & spiritus in qualitate boni, sed in quantitate sui sint superflui, ita ut foramina impleant & extendant. Repletio secundum uirtutem est, ut humores sui quantitate non noceant, sed sui qualitate. De duplici hac plenitudine habes ex Gale. lib. de plenit. & meth. 9. cap. 5. & 10. eiusdem lib. cap. ult.

Hippoc. aphor. 1. aphor. 3, Habitus exercitatorum qui ad summum bonitatis attingunt, &c. Ibi in comment. Gal. Nimia repletio, inquit, calorem natium extinguit, &c.

Gal. meth. 13. cap. 6, Ergo plethora tum sanguinis missione curatur, tum frequenti balneo, exercitatione, frictione, & digerentibus medicamentis. Vide fusius 3. & 6. de sanit. tuenda.

Authores erronei dissentientes
circa plenitudinis indicia.

- 1 Adserere, plenitudinem mensurari posse tantummodo ex ipsis uiribus.
- 2 Adserere, plenitudinem tantum esse quo ad uasa, non quo ad uires.

III DE CONSEN. MEDIC.

Confutatio dissentientium circa plenitudinis indicia.

Confutat primum Gal. lib. de plenit. circa principium, dum inquit, Qui ex ipsis tantum uiribus plenitudinem metiuntur, hi uidentur nunquam utres præter modum repletos uidisse, nec se etiam plus quam par est unquam impleuisse cibo, ita ut uenter inde distenderetur, &c.

Ad secundum: Gal. loco nuper citato, Itaque, inquit, subiecimus duas esse rum notiones, rum relationes multitudinis: alteram ad robur uiræque illius qui defert, alteram ad eius qui suscipit capacitatem, &c.

De signorum notitia vniuscuiusque humoris.

Sanguinis superabundantiam indicant, repletio, grauitas capitis circa oculos, oscitatio, nausea, lassitudo absque labore, dulcedo in ore, rubor, & sanguinis à quocunque loco facilis fluxus: indicant & tēperies, uictus præcedens, ætas, consuetudo & insomnia circa res rubeas. Pituita indicia, albedo, mollities,

frigiditas, sputi copia, sitis pauca, somnus multus, otium, pigritia, pulsus tarditas, & quaecunque de victu & aetate & consuetudine indicare possunt. Bilis indicia sunt, color flauus siue citrinus, oris amaritudo, sitis copiosa, narium ac lingua siccitas, pulsus crebritas, nausea & uomitus biliosus, & quaecunque dici possunt de aetate, temperie, victus ratione. Atra bilis indicia sunt, corporis macies, uigiliae multae, crassities ac nigredo sanguinis, multa sollicitudo, corpus nigrum, fuscum, pilosum, insomnia terrorem inducētia, in tenebris timor, similiter aetas, consuetudo, ars, tempus & victus ratio praeterita de atra bile indicant.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Faciunt ad sanguinis signorum probationem quaecunque dicta sunt ex Galeno lib. de plenit. circa principium, ut uasorum distentio, rubor, grauitas uniuersi corporis, pigritia ad motum, membrorum lentitudo, lassitudo, prior uita in otio, victus ratio transacta, & sup-

H. i.

pressa euacuationes solita. Auic. secunda primi cap. 7, Sanguinis significationes cum dominantur, significationibus repletionis secundum foramina uicina existunt, &c. Nam de singulis humorum signis ibi diffusè pertractat. Dictum est etiam de his fusius de febribus, & ubi de humoribus pertractauimus, & de morbis à capite usque ad pedes: nam ibi non solum de his, sed de obstructionum, flatuum, abscessuumque signis apertè declarauimus.

De artis curatoria diuisione.

Ars curatoria trifariam diuisa est, in διατροφικὴν, id est, in uictus rationem: in φαρμακευτικὴν, id est, medicamentorum rationem: & in χειρουργικὴν, id est, in eam quæ manu medetur. Prima auxiliorum, quæ digerendi, apponendi & concoquendi facultatē habent, est administratio, confertque non solum sanis, sed etiam omnibus aegris, & maxime febricitantibus. Secunda est φαρμακεία, id est, medicatio dicta, quæ nudis medicamentis interiores affectus & exteriores, in cor-

MEDIC.
IN CVR. MORB. LIB. I. II5

porum cognitionem, & remediorum naturā
diuisa, sanat. Tertia est quæ incisionibus,
ustionibus, & ossium instauratione homines
curat.

Loci consentientes ex
vera Medicina.

Corn. Cels. lib. 1. cap. 1, Medicina in tres
partes diducta est, ut una esset quæ uictu, al-
tera quæ medicamentis, tertia quæ manu me-
detur, &c. Auic. quarta primi, Res medica-
tionis ex uno trium rerum completur regimi-
ne, potione & chirurgia. Gal. primo de uic.
in morb. ac. comment. 6. de triplici hac diui-
sione etiam ipse loquitur, scilicet de diæta,
chirurgia, quæ per sectiones, adustiones per-
ficitur: & de pharmaceutica, quæ per medi-
camenta perficitur, accusans priscos, qui ni-
hil de uictus ratione scripserint. Gal. lib. fi-
nit. med. Medicina uictus institutrix est, quæ
in sanis atque egrotis, rationi uictus instituē-
dæ studet. Gal. de art. curat. ad glauc. cap. 1,
Ars curatiua qualitate & quantitate singu-
lorum medicaminum perficitur. Et lib. de cō-
H. ij.

stitur. artis med. Hac ars in duo capita red-
acta est, in corporum nempe cognitionem,
atque ipsam remediorum naturam. Gal. 4.
meth. cap. 1, Vnum esse morborum genus ipsam
quoque continuitatis solutionem diximus, hac
in animalis ferè omnibus partibus accidit,
Etc. Vbi docet quibus curandum sit inten-
tionibus, Etc. de hac plura, quum de chirur-
gia dicemus.

De victus diuisione in genere.

Victus ratio sumitur uel à ratione morbi
tantum, uel à ratione uirium agrotantis &
materia morbi simul, uel à ratione temporis
anni, ætatum, uel à ratione suæ quantitatis
uel qualitatis, aut in uniuersali, uel in par-
ticulari.

De victus ratione in morbis.

Morbus uel peracutus est, uel acutus, uel
longus. In peracuto, qui in quatuor diebus
iudicatur, uti oportet tenuissimo victu, sicut
meliorato: ratio est, quia totus hic morbus
status est: idcirco in statu tenuissimo victu

tendum est, præcipuè si vires consentiant: in
 ongo, pleniori victu, ut ovis, alicæ, piscibus,
 id nō eodem quo in sanis modo utendum: in
 acuto uerò tenui, ut ptisanæ succo. Quare duo
 in victu extrema dantur: primum quòd sit vi-
 ctus tenuissimus: secundum quòd sit crassis-
 simus: mediat uerò inter hæc tenuis. Ratione
 igitur status morbi semper victus ratio insti-
 tuenda est.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. aphor. 1. comment. 12, Nam morbus
 vel est acutus, uel peracutus, uel longus, &
 quando maxime, &c. Hippocr. aphorism. 1.
 aphor. 4, Victus tenuis atque exquisitus, in
 morbis quidem longis semper, in acutis uerò,
 in quibus non conuenit, periculosus. Gal. in
 comment. Nunc dixisse sufficit, ut in omnibus
 morbis, quibus morbi uigor & iudicatio pri-
 mis quatuor diebus futura sit, modò natura
 sit fortior, integram inediam seruare debeat-
 mus: in quibus uerò non ultra primam septi-
 manam protrahatur, forti existente natura,
 H. iij.

solo utendum est melicrato, solus autem hic tenuissimus uictus esset, non tamen in extremo, &c. Et post hæc uictum tenuem appellat prissana hordeacea succum, & plenum uictum, qualis est qui fit per oua & alicam & pisces. Quod uero morbus peracutus totus sit status, probatur ex aphorif. 7. primi lib. ubi inquit Hippocrates, Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo uictu utendum est. Ex quo aphorismo probatur etiam, quod ratione status morbi instituenda sit uictus ratio. Si uires cōsentiant, notanter dictum est: nam Gal. aphorif. 1. comment. 9. inquit, Quod si in ipso morbi uigore aliquis casus interuenerit, naturæ robur dissoluens, nutrire cogimur: quod uero in longo morbo, pleniori uictu utendū Gal. loco nuper citato, Cum morbus cōsistit, uictu tenuissimo oportet uti: in alijs morbis, qui suum uigorem sunt posterius accepturi, nō licet asferre statim ab initio tenuissimum uictum: nam prius homo morietur, quàm morbus in uigore consistat, &c. Auic. 4. can. de cib. feb. Si uideris agritudinem chronicam,

aut propinquam chronicæ, non subtiles regimen, &c.

Obiectio.

Quum morbus non possit cognosci, an statum habere debeat in quarta, uel in septima, quomodo instituendus erit victus?

Responsio.

Vera præcognitione status morbi non cognoscitur, sed iuxta æstimationem, quæ proxima est ueritati, præcognoscitur, ex qua tunc victum ordinamus. Nam Gal. de uirium robore primo aphoris. comment. 12. idem refere esse coniecturandum.

De ratione victus à viribus & à materia morbi Hip.

Victus uel respicit uires tantum, uel materiam morbi tantum. Si solum uires, tunc victus plenus conuenit: si solam morbi materiam, tunc nullus cibus conuenit, quia cibare prohibet naturam in morbum agere. Hac ratione duo erunt victus extrema, quorum alterum solam uirutem conseruat & auget, & talis H. iij.

uictus erit sanorum: alterum solum uirium re-
 bur in materiam excitat, & talis uictus erit
 morbi peracutissimi, in quo pene nihil datur.
 Medium uerò inter hæc extrema duplex erit,
 uel maiorem uirium partem seruabit, & mi-
 norem partem in morbum excitabit, & talis
 erit uictus crassus, qui in longis morbis con-
 uenit: aut minorem uirium partem seruans,
 maiorem in morbum reijcit, & talis erit ui-
 ctus tenuis, qui in morbis peracutis institui-
 tur: aut tantum uirtuti, quantum morbo tri-
 buit, & talis uictus est mediocris, qui in mor-
 bo acuto exhibetur. Si igitur uires sint debi-
 les, & humores pauci & corrupti, parum &
 sepe cibandum: si uires debiles, & humores
 temperati, uel abundantes, parum & raro: si
 uires multæ, humores pauci non corrupti,
 multum & sepe: si uires multæ & corpus
 plethoricum, paucum & raro.

Loci consentientes ex ve- ra Medicina.

Gale. aphorismorum primo, comment. 11.
 totius morbi uictus rationem in unoquoque

morbo à duabus intentionibus iussit assume-
 re, ex futuro totius morbi uigore, & ex uiri-
 bus agrotantis, &c. Hippocrat. aphorif. 1.
 aphorif. 9, Coniectari autem oportet, an æ-
 ger cum uictu sufficiat perdurare ubi de ui-
 ctu, quoad uires, intelligit Hippocrates. Ga-
 lenus in eodem comment. Est autem hæc in-
 tentio uis ipsa agrotantis, cuius gratia nu-
 trimus: neque enim morbi causa: igitur ratio-
 ne morbi nullus cibus conuenit. Auic. prima
 quarti, cap. 8, Et scias, quòd si non esset il-
 lud quod pertinet uirtuti, esset magis neces-
 sarium, ut subtiliaretur cibus ultima subti-
 liatione, sed uirtus non suffert, &c. Gal.
 aphorismo. 1. comment. 4, In sanis corpori-
 bus semper oportet naturæ robur seruare uel
 augere alimentis, non demoliri. Est autem
 augere potens alimentum, quod plenum uo-
 catur: conseruans, quod modicum existit:
 quod uerò comminuit, tenue. Igitur dantur
 duo uictus extrema: alterum augens uires, al-
 terum in quo nihil datur. Et in eodem com-
 ment. Magna uerò ex parte properamus in
 longis quidem morbis fouere uires, in acutis

uerò parum debilitatas conseruare. Igitur
 si fouere uires uolumus, uictu crasso utemur
 & sic partem maiorem uiribus condonabi-
 mus, & minorem in morbum concitabimu-
 Et sequitur in textu, In acutis si uires si-
 parum imbecilles, conseruamus. Igitur non
 minus uiribus, quàm morbo dabimus. Auicenna
 cap. citato, Nam si aegritudo fuerit ualde a-
 cuta, & uirtus nō deficiat usque ad statum
 tunc eam incitabis super materiam, & non
 facies eam occupari in cibo spisso, immò sub-
 tilia regimē statim cū dimissione cibi omni-
 no. Igitur minus dandum est uirtuti, & ta-
 lis uictus erit tenuissimus. Gal. aphorismo. 1.
 commen. 17, Nam si sepius, aut rarò, siue o-
 mnino nutrire oporteat, ab aegritudine & ui-
 ribus primū maximè accipitur. Post hæc
 autem singula recitat, quæ à me prius enar-
 rata sunt, ut si humores corrupti & uires de-
 biles sint, parum & sepius cibandum, &c.

De ratione uictus per ætates.

Ætas puerilis minus inter alias ætates in-

ediam sustiner: deinde qui in ætate consistē-
te sunt, post hos decrepiti: senes uerò, qui
non dum ad extremam senectutem peruene-
runt, facillime in ediam tolerant. Nam pueri
ob id quòd crescunt, plurimum innati calo-
ris obtinent, idcirco plurimo indigent cibo:
senibus uerò parum caloris inest, quam ob rē
paucis egent fomitibus. Medio modo se ha-
bent qui inter has ætates consistunt.

Loci consentientes ex ve- ra Medicina.

Hippocrat. aphorif. primo, aphorismo
13, Senes facillimè ieiunium ferunt, secundo
loco qui ætatem consistentem habent: minus
adolescentes, omnium minimè pueri, præser-
tim qui inter ipsos sunt uiuidiores. Et hoc
probans inquit, Qui crescunt, plurimū habent
calidi innati: plurimo igitur egent alimen-
to, alioqui corpus absamitur, &c. Auic. quar-
ta primi cap. de cib. febr. Omnis, cuius calor
innatus fortis est ualde, aut plurimus, aut
calor innatus est debilis ualde, non potest di-
mittere cibum, &c. Gale. primo aphorif. cō-

ment. 14, Omne id eget alimento, cui plurimum ex corpore defluit: sed humidioribus & plus aeris participantibus plurimum defluit: igitur plurimo egent alimento. Quare pueri quum humidiores & aerei sint, plurimum cibum expostulant. Senes uerò & iuuenes sicci & terrestres non sic resoluantur, idcirco ieiunium facile ferunt.

De ratione victus ex temporibus anni sumpta.

Conducunt anni tempora mirum in modum ad victus rationem instituendam: nam in hyeme plus dare expedit, quàm in æstate: siquidem hyeme, calore innato ad interiora se recipiente, cibi facilius concoquuntur: contra uerò, in æstate ad exteriora se protendēte non fit tam ualida concoctio, quare minus dare conueniet. In æstate igitur sæpe & pauca exhibeantur: in hyeme, rarò & multa: in uere, rarò & pauca: in autumno similiter, sumpta à roboris uirium indicatione: si uires ualida, sæpe & multa: si uerò imbecilles, pauca & sæpius offerimus.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Hippocrat. primo aphorismorum, aphorif.
15, Ventres hyeme & vere natura calidissi-
mi sunt, & somni longissimi, quare per ea tē-
pora alimenta copiosiora sunt exhibenda.
Etenim tunc calor innatus plurimus est, un-
de & pluribus eget alimentis. Indicio sunt
ætates & athletæ. Gal. in comment. huius
aphorif. Non parum, inquit, conducunt anni
tempora ad victus rationem inveniendam:
nam hyberno tempore plus appetūt homines,
& cibum facilius concoquunt: contrā in æ-
state, &c. Hippocrat. aphorif. 1. aphorismo.
18, Aestate & autumno cibos difficillimè fe-
runt, hyeme facillimè, secundū locum uer ha-
bet, &c. Hippocra. aphorism. 1. aphorif. 17,
Et quibus semel & bis, & quibus plura, ne
cur pauciora particulatim oporteat afferre
considerandum, condonandum est aliquid
tēpori, ætati & consuetudini. Gal. in cōmen.
huius aphorismi, A tēpore & ætate, & aliis,
quæ sunt proportionalia victus, accipitur hoc
modo æstiuo tempore, quantum ad temporis

rationem attinet, saepius & pauca danda
sunt. Hyberno tempore ob uirium robur mul-
ta, sed raro, &c.

De victus ratione à ciborum qualitate sumpta.

Quaecunque prater naturam sunt, contra-
rias in victus ratione indicationes expos-
tulant: quae uero secundum naturam sunt, simi-
les. Nam morbus calidus & siccus, cibum fri-
gidum & humidum expostulat: calidus &
humidus frigidum & siccum, frigidus & siccus
calidum & humidum, & sic de reliquis. Si-
militer similia similibus conseruantur, serua-
ta tamen quantitate & qualitate eadem
inter se.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Hippocr. aphor. I. aphor. 16, victus hu-
midus omnibus febricitantibus confert, maxi-
mè uero pueris, & alijs qui tali victu uti cō-
sueuerunt. Gal. in comment. Primum qualis si-

adhibendus victus febricitantibus monstrat,
 deinde quod victuum ὑγιαίνοντων indica-
 tiones ijs quæ præter naturam sunt contra-
 rias: ijs uerò quæ sunt secundum naturam
 similes facere oporteat, &c.

Gal. 8. meth. cap. 9, Dictum sæpenumero
 est, id quod secundum naturam est, similia
 semper postulare: quod præter naturam est,
 contraria: siquidem quod naturaliter se ha-
 bet, custodire: quod præter naturam est, tolle-
 re oportet. Porro febris præter naturam est,
 deoque victus rationem frigidam & humi-
 lam exigit, &c.

De vniuersali ac particulari victus ratione.

Vniuersalis totius victus ratio est, quæ ad
 duos medendi scopos, ad morbi scilicet uigo-
 rem, & ad ægrotantis vires respicit. Sed par-
 ticularis est, quæ morborum accessiones in ci-
 cando cauere studet, ita ut nec quando ac-
 cessiones adsunt, nec quando futurae sunt,
 uicquam exhibeatur, cauendo tum ea inte-

rim quæ in ediam ferre non possunt corpora,
nam & in ipso febris principio cibanda sunt.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Gal. aphor. 1. aphor. 11. totius uictus ra-
tionem à duabus intentionibus, ex totius mor-
bi uigore, & ex uiribus agrotantis assumere
iussit. Quod autem quispiam particulatim ci-
bum afferat conuenienter, in hoc docet ser-
mone, cauere iubens morborum accessiones.
Et comment. 12, Totius uictus figuram ad
duas respiciens intentiones faciebat, quarum
altera uis agrotantis, altera constitutio mor-
bi: particulares autem oblationes ex acces-
sionibus cōiecturabatur, &c. Hippoc. aphor.
1. aphor. 11, In accessionibus abstinere ope-
ret: nam cibum dare, nocuum: & quibus per
circuitus sunt accessiones, in ipsa accessione
abstinere oportet.

Auic. quarta primi, cap. de cib. feb. Et de
corporibus sunt corpora cholericæ, quæ re-
quirunt regimen diuersum ab illo quod dixi-
mus. Ipsi enim quum non cibantur in ipso fe-

bris principio, aut in hora status, quæ est
 prauior, tunc non uacua sunt dispositiones
 eorum à duabus rebus: nam si sunt debiliū
 uirium, superuenit syncopis, & moriuntur in
 paroxysmo: si uerò fortium uirium, cadunt in
 extenuationem. Igitur hæc corpora cauenda
 sunt, quæ ferre in ediam non possunt. Galen.
 meth. 10. cap. 5, Aliquos uerò eorum cibabis,
 & quum inuasura adhuc est febris, & quum
 incipit: sint porrò hi sicco ac calido tempe-
 ramento, &c.

Authores erronei dissentientes
 circa rationem victus.

- 1 Adserere, plenum uictum in omnibus mor-
 bis conuenire.
- 2 Adserere, tenuem uictū in omnibus morbis
 esse pleno præferendum.
- 3 Adserere, uictum plenū ut crassum in diu-
 turnis morbis non esse necessarium.
- 4 Adserere, uictum tenuissimum in nullis
 morbis esse exhibendum.
- 5 Adserere, uictus scopum sumi tantū de-
 bere à uiribus, non à morbo.

6 Adserere, esse incipiendum à tenuiori victu in principio morbi, & procedendum ad pleniorē.

7 Adserere, qualitatem & non quantitatem esse tantummodo considerandam, & econuerso.

8 Adserere, in febribus carnem, præsertim delicatis, non esse præbendam.

Confutatio dissentientium circa rationem victus.

Ad primum: Hippoc. aphor. i. aphor. 7, Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu utendum. Igitur plenus victus in omnibus morbis non conuenit. Galenus præterea hoc ipsum attestatur in commento.

Ad secundum: Hippoc. aphor. i. aphor. 4, Victus tenuis atque exquisitus in morbis quidem longis semper, in acutis uerò, in quibus non conuenit, periculosus. Igitur in omnibus morbis pleno non est præferendus. Præterea Gal. in hoc comment. In sanis seruandum robur uel augendum monet, in agris rarò au-

gendum, in longis morbis conseruandum, in
acutis mediocriter debile seruandum. Quare
sicuti in acutis tenuis, ita in longis plenus
erit praefendus.

Ad tertium: Hippoc. aphor. I. aphor. 7,
Tantum cibi indulgendum est, quanto mor-
bus extremis mollior est. Galenus in comment.
praecipit tantum à uictus tenuitate declinare,
quantum morbus ab extremis recedit. Igitur
quanto tardiores ferè morbi statum indica-
bimus, tanto magis crassiori uictu utemur.

Ad quartum: Hippoc. aphor. I. aphor. 6,
Extremis morbis extrema exquisitè remedia
optima sunt. Vbi Gal. inquit, Hippocratem
praecipere, exquisitissimam curationem &
uictum pariter adhiberi tenuissimum. Igitur
uictus tenuis in his morbis erit exhibendus.

Ad quintum: Gal. I. aphor. comment. 12,
Cum igitur tres essent intentiones ad perfe-
ctam & indeficientem uictus rationem, Pri-
ma quidem sumpta ex uiribus agrotantis:
Secunda, ex morbi constitutione: Tertia ex
particularibus accessionibus, assumi debet,
&c. Igitur non tantum à uiribus, quantum à

132 DE CONSEN. MEDIC.

morbi constitutione, scopus rationis uictus assumi debet.

Ad sextum : Gal. aphor. 1. comment. 7, In morbis, qui sunt suum uigorem posterius accepturi, non licet ab initio afferre tenuissimum uictum. Nam prius homo è uita migrarit, quàm morbus in suo uigore consistat.

Ad septimum : Hippoc. aphor. 1. aphor. 9. Coniectari oportet, an ager cum uictu sufficiat perdurare, &c. Et aphor. 13, Senes facillimè ieiunium tolerant, &c. Et aphor. 15. Ventres hyeme & uere natura calidissimi &c. In omnibus his locis loquitur de quantitate uictus instituendi, quæ à uirtute, ab ætate, à tempore sumenda est. Igitur quantitas est consideranda. Et particulariter Gal. 1. de art. cur. cap. 9, Quantitas cibi tanta sit, ut bene concoqui valeat. De qualitate iam dictum est superius.

Ad octauum : Gal. 1. de art. cur. ad Glau. cap. de feb. tertiana, concedit ex piscibus saxatiles, ex uolatilibus quæ molli carne consistunt, ita & gallorum testiculos, & suum pedes & cerebra, præsertim deliciosis.

De parte Pharmaceutica.

Medicatio bifariam diuisa est, in euacuationem & in alterationem. Euacuatio fit multifariam, uel per sectionem uenæ, per clysteres, per urinas, per secessum, per sudores, per diuersionem & deriuationem, per menstrua, per hæmorrhoidas, per nares, per palatum. Alteratio uerò erit duplex, uel secundum qualitatem, uel secundum locum. Alteratio secundum qualitatem nihil aliud est, quàm mutatio eius, quæ prius fuit, qualitatis: mutatio uerò secundum locum non alteratio dicitur, sed potius latio, quæ est prioris loci mutatio: alterationis uerò species concoctio existit.

•
Loci consentientes ex vera
Medicina.

Indicatio huiusmodi est euacuatio & alteratio, inquit Gal. in art. med. cap. 89, Euacuationes uerò fiunt & per sanguinis missionem, & clysteris usum, & per urinæ uias, atque eam, quæ fit per cutem, transpirationem, ac per eam, quæ fit ad partes oppositas,
I. iij.

attractionem, & ad alius propinquas derivationem, &c. Gal. primo de naturalibus fac. cap. 1, Nec ea modò quæ in colore & sapore mutantur, alterari dicimus, sed si quid ex calidiore fit frigidius, & e contra: nam commune nomen alteratio est. At genus aliud est in corporibus quæ situm mutant, cui latio nomen est: hi duo motus sunt simplices, scilicet alteratio & latio, sed compositi: ex quibus alteratur substantia, sunt diminutio, augmentio, generatio & corruptio, &c. Vide etiam de his secundo meth. & primo de loc. aff. Quod uerò alterationis species sit concoctio, uide Galenum in art. med. cap. 89. & fusius secundo, & tertio de nat. fac.

Quomodo alteratio, concoctio,
& humorum præparatio ac
digestio inter se differant.

Quid sit alteratio iam dictum est. Concoctio uerò duplex est, altera quæ penes alimenta perficitur, & est mutatio in propriam eius quod mutatur qualitatem: altera, quæ improprie maturatio dicitur, est quedam in

concoquentis substantiam eius quod concoquitur deductio: unde Cōcocta etiam dicuntur, quaecunque à natura euicta sunt, Cruda uerò quæ nondum euicta. Digestio uerò est ueluti quædam alimenti distributio. Nam Græci ἀνάδοσις, id est, cibi distributionem per totum corpus à natino calore facti dicunt. Interdum sumitur digestio pro discussione excrementorum seu pro segregatione, quæ à facultate expulsiua & attractoria perficitur, unde à concoctione differt in particula. Differt etiam, quia concoctio ad digestionē præire solet, uel quia à diuersis facultatibus utraque fit: alteratio autem, quum sit humorum in qualitate mutatio, quomodo ab his differat, iam notum est. Solùm enim in ijs morbis alteratio conuenit, qui non amplius ab aliqua causa fouentur, sed tantum contrarijs remedijs indigent, ut hectica & diaria febris: & hæc perficiuntur absque concoctione, digestionē, & preparatione. Quid autem sit preparatio, uide de obstructione superius.

I.iiij.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. 2. de fac. nat. cap. 4, Concoctio est alteratio quaedam, ac nutrientis in propriam qualitatem eius quod nutritur, mutatio. Similiter 3. de nat. fac. cap. 4. & 7. & 8. eiusdem libri asserit. Quod uero cōcoctio significet maturationem, uideri potest aphorif. 1. comment. 12. unde Galenus, Si aliqua fuerit inflammatio cum tanta meatuum angustatione, ut nihil extra effundatur, necesse est illam esse & concoctū difficilem, & longo tempore perdurare, ubi terminos cōcoctionis paulo inferius docet. Nam crudissimus, inquit, morbus est, in quo nihil expuitur: secundus in quo sanies tenuis est: tertius in quo crassior: quartus in quo perfectam habet cōcoctionem, id est maturationem. Vide tamen etiam Galenum de hac maturatione secundo de uictu in morb. ac. comment. 45. fusius loquentem. De digestionē Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2, Igitur alimenti per corpus digestio, Græci ἀνάδοσιν uocant, inter naturalia opera numeratur, quum ex uentriculo in iecur,

atque ex hoc in uniuersum corpus alimentū
digeritur: & sic digestio sumitur pro distri-
butione. Gal. 3. prognost. comment. 23. in fine
comment. Humores tenuiores ac calidiores
ad excretionem parati sunt, crassi uerò &
crudi ad abscessum uel ad digestionem: porrò
idipsum ut per concoctionem medeatur, ex-
cretio quadam est, quæ ex urina plerunque,
raròque per aluum efficiatur. Quòd conco-
ctio precedat digestionem siue segregationē,
hoc habes ex primo aphor. comment. 22, Si-
quidem, inquit Galenus, ante concoctionem
non medicari oportet: nam post concoctionē
natura euacuationi adminiculans humores
discernit, & superfluitates expellit: quare
concoctio ad digestionem precedit. Præterea
Gal. aphor. 4. comment. 22, Quando aliquis
morbus incipit, si quid excernitur, nihil ex-
cernitur tunc naturæ ratione: quia cū a
causis morbum facientibus grauat, & cru-
ditas humorum adest, tunc aliquid bene eua-
cuari est impossibile: siquidem oportet con-
coctionem præire, subsequi uerò discretionem,
deinde euacuationem, &c. Gal. meth. 11. cap.

9, Quum dictum sit contrariorum contraria esse remedia, quid uetat omnibus febricitantibus frigidam uno ordine exhibere? Nam ostensum est, ipsius febris, prout febris est, aquā frigidam semper esse remedium: quod uerō ad alia spectat, nō semper, id est, febris prout calor est, frigido indiget, id est, alterari ad frigidum: sed ubi alia fuerit causa quā calor, non alteratione, sed & preparatione indigebit, &c.

Obiectio.

Quum quis dixerit excrementum crudum uel concoctum, de qua concoctione intelliget, praesertim si tale excrementum mutatum nutrire non ualeat.

Responsio.

De uniuersali significato intelliget: nā Gal. 2. de uic. in morb. ac. comment. 45, Generali, inquit, concoctionis significato utimur, quum uel catarrhum, uel coryzam, uel fluentes ex his humiditates, uel eas quae ex oculis manant, aut crudas aut coctas esse dicimus, quae concoctio est, quum natura humores enincit.

Authores erronei dissentientes
circa digestionis, conco-
ctionis, & humorū
præparationem.

- 1 Adserere, digestionem esse humorum alte-
rationem.
- 2 Adserere, concoctionem à frigidis fieri.
- 3 Adserere, præparationem à digestionem &
à concoctione non esse alienam.
- 4 Adserere, humores calidos ac tenues non
præparatione prius indigere, quàm eua-
cuentur.
- 5 Adserere, humores crassos cum extenuan-
tibus ac inuidentibus esse maturandos &
concoquendos.

Confutatio dissentientium circa
concoct. & digest.

Gal. lib. finit. med. Digestio est concocti ac
confecti, & in sanguinem conuersi alimenti
in corporis particulis omnes attractio, quàm
natiuus calor molitur. Igitur non humorum
est alteratio.

Obiectio.

Quum duplex sit digestio, altera alimen-
torum, altera humorum siue excrementorum,
cur exemplum tantum affers de digestionem
alimentorum?

Responsio.

Exemplum tantum adduxi de alimentis,
quoniam digestio etiam excrementorum est
ueluti segregatio, quæ non minus quam pri-
ma à calore innato perficitur: nec per alte-
rationem, ut nonnulli putarunt, conficitur,
sed per ea quæ calorem innatum roborant.

Ad secundum: Galen. 3. de ratione uic. in
morb. ac. comment. 29, Concoctioni perpetuo
calidum opitulatur, confertque: frigidum ue-
rò renititur & aduersatur.

Obiectio.

Ergo biliosi humoris concoctio non fiet à
frigidis.

Responsio.

Circa nomen deciperis: nam biliosi humo-
ris non dicitur concoctio, sed potius altera-

rio, quæ nullo pacto uel concoctio uel digestio dicitur: nam nec flua bilis, nec atra in sanguinis substantiam redire possunt, teste Galeno 2. de uict. in morb. ac. comment. 31. sed in contrarium alterari, nisi fortè pro digestionem uel concoctionem intellexeris à natura euinci, quæ euictio dici potest maturatio, siue imperfecta concoctio.

Ad tertium: Quæcunque fiunt à diuersis causis, inter se sunt aliena: sed preparatio, concoctio & digestio fiunt à diuersis causis: ergo sunt inter se aliena. Quòd uerò fiant à diuersis causis, probatur: nam concoctio & digestio fiunt à natura, preparatio autem tantum ab arte.

Ad quartum: Gal. 1. de sanit. tuend. circa finem, Quòd si uel crassitudinis, uel abundantia, uel lentoris excrementorum uitio meatus obstructi sunt, tenuatoria uictus ratio his competit.

Obiectio.

Non possum capere, quo pacto in humore tenui preparatio fieri debeat, quoniam huic hu-

mori nec incisio, nec alia preparatio com-
petat, sed ratione sui possit euacuari.

Responsio.

Preparatio quatuor in partes diuisa est,
quarum prima est crassorum humorum præ-
uisio siue extenuatio: secunda est meatuum
obstructorum reseratio: tertia est quæ hume-
tantiis ac laxantibus, utputa quiete &
alimentis, & balneis perficitur, de qua loqui-
tur Hippocrat. aphor. 4. aphor. 13, ubi iuber
ante epotum ueratrum corpus præhumectan-
dum esse cibus, balneis & quiete. Quarta est
humorum multitudinis obstruentis, ac omnia
uasa replentis apertio. Quare dicimus si nō
ratione humoris craffi, uel ratione meatuum
obstructorum, siue à crassitie, siue à copia,
saltem ob eam quam nobis monstrauit Hip-
pocrates, ut mollius corpus reddamus, præ-
parationem molimur.

Ad quintum: Quæcunque maturantur, co-
guntur ac incrassantur, teste Galeno 4. de
ratione uict. in mor. ac. ubi inquit, Necessè
est, quæcunque concoquuntur ac euincuntur,

ogi ac incrassari. Igitur non extenuari nec
ncidi debent. Præterea Gale. lib. de totius
nobi temporibus, adserit, urinam, sputum,
ippitudines, & omnes humores, qui à cere-
ro per palatum & nervos defluunt, esse ab
nitio aqueos tenuésque: quum uerò temporis
rocessu concoctionem adsumunt, crassiores
uadere & pauciores. Et sic quæcunque ma-
urantur, crassiora euadunt. Similis sententia
abetur ab ipso Hippoc. prognost. 2.

De euacuatione per sectio-
nem venæ.

Venæ sectio, est uniuersalis euacuatio, quæ
uactionem humorum super æqualitatem ue-
is exuberantium euacuat. Verum est, quòd
lenitudo non semper de sectione uenæ indi-
t: nam hæc ipsa ab humoribus crudis fieri
oret, qui sectionem uenæ haudquaquã ex-
oscunt. Indicatio sectionis uenæ sumitur à
agnitudine morbi, à uirium robore, consi-
erata tamen ætate puerili uel senili, & æ-
nos ambiente calido uel frigido. Sumitur
ue indicatio ab ipsa patientis temperie, ab

144 DE CONSEN. MEDIC.

habitu totius corporis, à loco habitationis, ab anni temporibus. Fit sectio uenæ ob duas causas: aut quia sanguis inutilis est, & suam qualitatem non seruans, nutrire non ualet: aut quia uires premit, aut uenas & arterias distendit, findit & obstruit. Tempus incisionis erit, si fieri potest, à principio morbi: si minus, dummodo morbus sectionem requirat, nullus dierum numerus erit considerandus, sed usque ad quatuor dies erit facilienda sectio. Quantitas extrahendi sanguinis erit, quousque color mutabitur, aut uirium robur sustinebit, & in uirium imbecillitate aut dimittenda est, aut partiri expediet. Venæ secandæ sunt in capitis passionibus exteriore, à collo infra interiores, à renibus infra quæ per malleolos ac popliteas decurrunt.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Auic. quarta primi, cap. de phlebot. Phlebotomia est euacuatio uniuersalis, quæ multitudinem euacuat. Multitudo est augmentum humorum super æqualitatem ipsorum in ue-

IN CVR. MORB. LIB. I. 145

nis. Gal. de cur. ratione per sang. missionē,
 Sin infesta sit degravās plenitudo, haud sem-
 per sanguinis mollienda detractio est, cuius
 rationem paulò inferius reddit. Auic. loco
 allegato itidem asserit, inquiens, Et debes sci-
 re, quòd quotienscunque fuerit plethora, non
 debes phlebotomare, quoniam repletio quan-
 doque ex humoribus crudis fieri potest: quòd
 si minueris, non maturabis eos, & timebitur
 ne aeger perdat, &c. Gal. de cur. ratione
 per sang. miss. cap. 20, Scopi in mittendo
 inguine sunt, morbus ingens, robúrque uiriū,
 excepta etate puerili, & aere nos ambiente
 calido. Et cap. 13. eiusdem lib. Mor-
 bi itaque magnitudo cum uirium robore, pri-
 mi erant mittendi sanguinis scopi. Idemque
 asserit meth. 4. cap. 6. & meth. 9. cap. 5. Iti-
 em quarto de ratione uict. in mor. ac. com-
 ment. 24. Similiter Hippoc. eodem lib. cap.
 9. attestatur. Gale. de cur. ratione per sang.
 miss. cap. 13. Deinde considerandum, quæ sit
 naturalis hominis temperies: nā quibus am-
 ple sunt uenæ, qui que modicè graciles sunt,
 candidi, nec tenera carne præditi, copio-
 K.i.

sius euacuabis, &c. Et meth. 9. cap. 17, enu-
 merat consuetudinem, etatem, locum habita-
 tionis, anni tempus, & laborantis vires. De
 tempore sectionis habetur Galeni textus de
 opt. sect. ad Thrasybu. cap. 37, Plerunque,
 inquit, remedia ut purgationem & sanguinis
 missionem adhibemus, quum morbus quidem
 non adest, sed futurus timetur. Et paulò in-
 ferius, Age enim, inquit, in decremento inun-
 ctio, cataplasma & cibus adhibetur, & isto-
 rum cuiusque est proprium tempus: sed in ini-
 tio ac morbi incremento sanguis mittitur. Et
 de cur. ratione per sang. miss. Non numero
 tantum animaduertes, quod quidam faciunt,
 sed & corporis habitui: nam sunt qui septua-
 ginta annos nati sunt, & sectionem perferunt.
 Gal. 9. meth. cap. 11, Sanguis, inquit, natura
 inutilis fieri potest bifariam, uel sui qualita-
 tem non seruans, ut amplius nutrire non pos-
 sit, aut vires premat, aut uenas & arterias
 distendat, findat & obstruat. Gal. de cur.
 ratione per sang. miss. cap. 20, Igitur uni-
 uersim hoc sciendum in sanguinis missionem
 dierum numero haud attendendum, &c. E

paulò inferius, Quocunque die mittendi san-
 guinis scopos in laborante inueneris, in eo
 auxilium illud adhibeto, etiam si is uel uige-
 simus ab initio extiterit. Et Auic. quarta pri-
 mi, cap. de phleb. Non attendas quod quidam
 dicunt, quòd non est bonum post quartum diem
 ut fiat phlebotomia, quoniam bonum est, ut
 fiat etiam si fuerit post quadraginta dies.
 Hippoc. 2. de ratione uict. in morb. ac. ca. 10,
 Eousque auferendus est sanguis, donec rubi-
 lior multò, uel pro puro rubidòque liuidus
 fluxerit. Similiter Auic. quarta primi, cap. de
 phleb. à coloris mutatione, & à lenitate &
 axitate pulsum signum ponit. Almanfor
 ib. 7. cap. de phleb. & Haly Abbas lib. 9.
 ap. de phleb. dicunt, quòd non debemus con-
 siderare mutationem sanguinis, nisi in calidis
 postematibus, ut in pleuresi, quod uerum est.
 Nam Gal. lib. de curandi ratione per sang.
 i. cap. 14. inquit, In quibus iuxta sectam
 enam phlegmone est ingens, optimum est san-
 guinis & in colore & consistentia mutatio-
 nem expectare, etc. Et paulò inferius, Non
 nper hac expectanda est, sed antequam
 K. ij.

mutatio fiat, cessare conuenit, tum ob infirmas vires, tum ob phlegmones paruitatem.

Gal. de curandi ratione per sang. miss. cap.

12, Vbi multa euacuatione est opus, & vires

sunt imbecilliores, in his euacuationem par-

tiri expedit. Et Auic. cap. de phleb. Cū phle-

botomia fuerit necessaria cum debilitate vir-

tutis, partire phlebotomiam sicuti diximus.

Gal. loco allegato cap. 16, Igitur interior

utilis est in his, quibus inferiores collo partes

patiuntur: exterior uerò in ijs, quibus quæ his

superiores sunt, ut facies & caput, &c.

Authores dissentientes circa sectionem venæ.

1 Adserere, sectionem uenæ non nisi manens
esse committendam.

2 Adserere, obstructionem & putredinem
esse causam mittendi sanguinem.

3 Adserere, sectionem uenæ non competere
morbo non assistente.

4 Adserere, in die iudicatoria sectionem
uenæ fieri debere.

5 Adserere, sanguinis detractionem uisum

hebetare.

6 Adserere, in plenitudine sectionem uenæ
semper esse perpetrandam.

7 Adserere, fluente aluo esse mittendum
sanguinem.

8 Adserere, nullum esse temporum anni dis-
crimen in secunda uenæ.

Confutatio dissentientium
circa sectionem venæ.

Ad primum: Gal. de cur. ratione per sang.
miss. cap. 12, Quamobrem nec per noctem san-
guinem mittere uerearis: siquidem ridiculum
est, quod quidam faciunt, à secunda diei ho-
ra ad quintam aut sextam solummodo san-
guinem mittentes, haud alio quouis tempo-
re, &c.

Ad secundum: Gal. 2. meth. cap. 14, Nec
obstructio, nec putredo causa est mittendi san-
guinem, sed succorum redundantia: nam nec
obstructio, nec putredo per sanguinis missio-
nem curari possunt, ut quæ alia remedia de-
iderent.

Ad tertium: Gal. de opt. sect. ad Thrasyb.
K. ij.

150 DE CONSEN. MEDIC.

cap. 37, Plerunque, inquit, remedia, ut purgationem & sanguinis missionem adhibemus, quum morbus quidem non adest, sed futurus timeatur.

Ad quartum: Auic. quarta primi, cap. de phleb. Neque phlebotomia, neque uentris solutio fieri debet in die motus aegritudinis, nec quum aegritudo est crism habitura, sed si possibile fuerit, quies est habenda. Habes etiam in hoc aphorismum uigesimi primi, ibi, Quae indicantur uel indicata sunt, &c.

Ad quintum: Gal. de cur. ratione per sanguinis missionem cap. 7, Sunt quidam imbecillioribus oculis aut scotomacis, in quibus sanguis abundare dicitur: hos omnes euacuabis, uel medicamento purgante, si alij à sanguine humore sint, aut diminutione sanguinis. Et sic sanguinis detractio conuenit, nec hebetat, sed uiuidiores reddit.

Ad sextum: Gal. 4. de uict. in morb. ac comment. 19, Plethoria non semper sanguinis missione curanda, sed & frictione, balneis multis, abstinentia: faciunt etiam quaecunque recitata sunt superius ex Galeno & Auicenna.

na ad hoc probandum.

Ad septimum: Hippoc. 4. de uict. in morb. ac. cap. 118, Si cuiquam sanguinem auferre confert, uentrem confirmare oportet, & ita auferre, &c. Et Gal. hoc in loco, Fluere aluo, inquit, sanguinem ne detrahes, ne perseuerare fluore uirtus prosternatur.

Ad octauum: Gal. ad Glauc. cap. 14, Qui minino de temporum statu nihil cogitantes sanguinem abstulerunt medici, hos omnes incremerunt. Et quarto de uict. in mor. ac. comment. 19, Si abunde aer calidus & siccus fuerit, tunc a sanguinis missione abstinemus, etiam si morbus magnus fuerit & aetas florens.

De purgatione per medicamenta soluentia.

Purgatio est humorum, qui sua qualitate molestant, euacuatio, ob idque purgans dicitur, quia sanguinem ab excrementis purgat. Iac purgatio ab ipso Hippocrate uocatur aforum inanitio, ab euentu: nam omnia uacua inaniri euenit in omni euacuatione. Interea euacuationis non solum humorem supera-

K.iiij.

bundantem respicit, sed & vires & naturam
 illius qui debet euacuari. Ad euacuationem
 quatuor requiruntur: primum, robur virium:
 secundum, quod materia non sit crassa nec
 viscosa: tertium, quod meatus non sint obstru-
 cti, sed aperti: quartum, quod nullum adsit
 apostema intrinsecum, nec illa sint extensa,
 nec materia sit in aliqua parte firmata, sed
 à natura sit euicta. Quantitatem purgantis
 medicamenti, quæ præberi debeat, ignora-
 mus. Verum tantum medicamenti erit propi-
 nandum, quantum in plurimis mediocriter
 euacuari noueris. Non fiat igitur euacuatio
 nimia, quoniam periculosa est. Qualitas vero
 medicamenti ea sit eligenda, prout natura
 redundantis succi exposcit: nam si flaua bi-
 lis, vel pituita abundet, quæ flauam bilem vel
 pituitam educat, tempus purgandi erit ab
 initio morbi, si humores turgeant: si uero in
 aliqua parte firmentur, vel crudi sint, con-
 que morandum in purgando, donec à natura
 euincantur siue concoquantur: uel eo tempo-
 re euacuandum, quo superfluitates natura
 expellere conatur: nam tunc ad id, in quo

natura deficit, supplere debet medicus. Tem-
pus uerò particulare erit, ut purgationes in
accesionibus morbi fiant per superiora, & in
remissionibus per inferiora. Si multa simul
purgantia pharmaca miscueris, fac sint con-
genera, ut simul eodem tempore soluant: uitā-
que est medicamenti insuauitas, & eius
eherentia moderanda: quanquam decem
int, quæ in purgatione sunt considerata, ut
depletio, uirtus, complexio, accidentia, figura,
tas, tempus, dispositio aeris & regionis, cō-
uetudo euacuandi, &c.

Loci consentientes ex ve-
ra Medicina.

Gal. aphor. 1. comment. 2, Euacuatio est h
orum, qui sua qualitate molestant, purga-
Et in lib. de purg. med. fac. Purgans phar-
cum ob id dicitur, quia à recrementis pu-
m sanguinem reddat. Gal. aphor. 1. com-
ment. 3, Intentio quantitatis euacuationis nō
sum humorem respicit superabundantem,
& uires hominis, qui debet euacuari. Nam
minus, alij magis perferunt euacuationes.

Idem etiam asserit aphor. 4. comment. 2. Gal. aphor. 1. comment. 24, Considerare oportet, nunquid eger idoneè se habeat ad purgationem. Nam quicumque multa cruditate laborant, uel qui tenaces ac crassos cibos assumpserunt, & quibus *ὑπερβολὴ* extenta atque inflata sunt, aut aliqua uiscerum adest inflammatio, omnes ij non sunt apti ad purgationem. Et aphor. 1. comment. 3, In omni euacuatione uires aegroti oportet attendere, & donec laborans tolerat, humorem exuberantem educere: quum uerò dissoluuntur, etiamsi remaneant superfluitates, cauere oportet eorum euacuationem. Itidem Auic. quarta primi, cap. 5. asserit. Adiungit etiam, quòd fastidium habentibus molestæ sint purgationes. Gal. de cur. ratione per sang. miss. cap. 12, Quòd laboranti præbendum sit medicamen, aut bilem tum flauam tum atram, aut pituitam, aut serosum excrementum euacuandum exactè nouimus. Caterum quantum præberidebeat, nescimus. Similiter in lib. de sect. ac eos qui introducuntur, cap. 5. asserit. Et aphor. 1. comment. 23, Quantitatis euacuationis

nullum habemus indicium, nisi ex tolerantia
 facilitate. Gal. aphor. 2. comment. 22, Eua-
 cuatio nimia morbum parit. Et Hippoc. aphor.
 aphor. 3, Sic & euacuationes, quæ ad ex-
 tremum deducunt, periculosa. Et Avic. quarta
 primi, cap. 3, Et scito, inquit, quod residuum
 materiae dimittere, quod necesse erat euacua-
 re, est minus nocuum, quam exquisitè euacua-
 re: ibi etiam omnis euacuatio superflua secun-
 dum plurimum febres generat. De qualitate
 euacuationis Hippoc. aphor. 1. aphor. 2, Si
 alia purgentur, qualia purgari oportet, con-
 fert, & leuiter ferunt. Gal. in comment. Ser-
 uo est de eorum qualitate, quæ euacuantur.
 Si igitur pituita superabundet, hanc omnino
 oportet euacuari: flaua autem bile uel atra
 festante, demissa pituita, bilem euacuandam,
 &c. Hippoc. aphor. 1. aphor. 22, Concocta
 medicari, atque mouere non cruda, modò non
 turgent, plurima uerò non turgent. Et Gal.
 comment. Tales humores euacuare conue-
 nit, qui agitantur, & de loco ad locum mo-
 uentur ac transfluunt: qui uerò in aliqua par-
 te firmati sunt, neque alio auxilio moueri

oportet, neque medicari ante concoctionem. Et paulò post, Si natura mediocrius atque imbecillius agat, id quod deficit, oportet supplere: nam natura expellente, & medicamento attrahente, humoris noxij euacuatio fiet. Et Auic. quarta primi, cap. 3, In acutis aegritudinibus maturationem expectare melius est, quàm euacuare, præcipuè si quietæ fuerint. Quòd si moueantur, ad euacuandum festina: nam impedimentũ eius motus est maius, quàm suæ euacuationis. Gal. in lib. quos purg. oportet, Purgandi occasio à temporibus morbi sumitur, utputa purgationes in accessionibus per superiores partes, in remissionibus per inferiores conueniunt. Gal. in lib. quos purg. oportet, Purgantia medicamenta, si simul misceantur, congenere esse debent, id est, eiusdem naturæ, ut eodem tempore soluant. Gal. lib. de comp. med. Per genera purgantis medicamenti insuauitas ac eius uehementia moderanda est. Auic. quarta primi, cap. 3, Decem sunt in euacuando considerata: & enumerat omnia quæ dicta sunt. Primum est repletio: nam nisi repletio supponatur, nulla

opus esset euacuatione. Robur uirtutis : nam
 ubi uirtus deficeret , inanis esset euacuatio.
 Complexio : nam ubi nimis calida uel frigida
 foret , non competeret euacuatio . Similiter
 accidentia uehementia prohibent euacuatio-
 nem : sic figura si sit rara textura , ne spiritus
 resoluantur : sic aetas nondum parata , sic ho-
 ra regioque nimis calida uel frigida , ut se-
 ptentrionalis & meridionalis , sic ars labo-
 riosa euacuationem non admittunt . Et Gal.
 lib. de sect. ad eos qui introducuntur , cap. 5.
 Euacuatio est plenitudini contraria , & con-
 traria contrariorum sunt remedia : uerum ui-
 res , aetatem , tempus anni , & regionem , & alia
 ante enumerata prius considerare oportet ,
 &c. Et de feb. ad Glau. cap. 14 , Vbi fuerint
 vigiliae uehementes , aut dolor intensus agro-
 rum infestans , cauenda sunt subita ac mala
 euacuationes , &c.

**Authores erronei dissentientes
 circa purgationem.**

Adserere , pharmaca non proprios humo-
 res attrahere.

2 Adserere, purgantia medicamenta à nutrimento non differre.

3 Adserere, nullo modo purgantia pharmaca in principio morbi esse exhibenda, nisi materia turgat.

4 Adserere, purgantium pharmacorū usum etiam non ualde indigentibus esse utilem.

5 Adserere, in die critica nullo modo pharmacum esse præbendum.

6 Adserere, pharmacum nulla habita tēporis anni ratione posse exhiberi.

7 Adserere, ob igneam caliditatē in febriū principio esse uerenda pharmaca, etiam si materia copia adsit.

8 Adserere, pharmaca purgātia equè omnes indifferenter humores purgare.

9 Adserere, euacuationem optimam esse, si copia humorum peccantium extracta sit.

Confutatio dissentientium circa purgationem.

Ad primum: Gal. de element. 2. circa finem: Exeuntia ostendunt quā proprium humorem quodlibet pharmacū attrahat. Quo-

iescunque enim quis medicamentū hauserit,
quod vim habeat bilem euacuādi, uomitu hu-
iusmodi humorē eiiciet. Et paulò infra, Ex
quibus licet manifestè inferre, unumquodque
medicamentum, cui vis purgatoria inest,
propriū attrahere humorem. Hoc idem etiā
asserit primo de fac. nat. cap. 14. & de a-
ra bile cap. 6. & 9.

Ad secundū: Gal. 3. de nat. fac. ca. 7, Porro
hoc dissidet medicamentū à nutrimento:
nam medicamentum vim corporis vincit, nu-
trimentum uerò ab hac vincitur. Et 3. de
imp. cap. 2, At quæ quidem assimilantur,
omnia nutrimenta uocantur, reliqua omnia
medicamenta: unde quatuor species medica-
mentorum enumerat. Prima, quæ non muta-
r à corpore, sed corpus mutat ac vincit. Se-
cunda, quæ initium mutationis habet à cor-
pore, deinceps putrescit, & putrescendo cor-
pus corrumpit ac putrefacit: & hæ duæ spe-
cies medicamentorum uenenosorum sunt. Ter-
tia est, quæ corpus alterari facit, sed mali-
bil infert. Quarta species eorum est, quæ
vult & patiuntur aliquid, sed per spaciū

temporis uincuntur & assimilantur: & hæc sunt tam medicamenta, quàm nutrimenta, &c.

Ad tertium: Hippoc. aphor. 2. aphor. 29, Cum morbi inchoant, si quid uidetur mouendum moue: cum uerò consistunt ac uigent, melius est quiescere. Vnde Gal. in comment. Ut melius hoc eueniat, melius est circa principium euacuare, quò minorem factam materiam natura possit facilius concoquere. Vnde hic de multitudine loquitur Galenus, quæ euacuari in principio expostulat. Verum est, quòd etiam euacuatur in principio, si humorum mala qualitas adsit, ut in pestilenti morbo uidetur. Nam Gal. 9. de meth. præcipit, in corruptela humorum cum uiribus imbecillius paulatim quod uitiosum est euacuare. Similiter quarto de sanit. tuend. Sin, inquit, uires imbecilliores dehortantur, sanguis haud mittendus est, sed deiectio mediocris adhibenda. Euacuatur quoque in principio morbi, si locus læsus urgeat, ut pleuritis, aut si in aliquo alio principe loco materia decumbat. Nam Hippoc. 2. & 4. de uict. in morbo

ac. tex. 76. Si dolor sub thorace fuerit, & ualde infestauerit, pleuretico uentrem subpurgabis. Similiter Gal. in comment. Si uehemens febris non sit, hominisque naturam noueris, ad medicamenti purgantis potum te conferes, &c. Euacuatur etiam maximè si uehemens dolor alicubi fuerit. Nam Gal. aphor. 1. comment. 23. In maximis doloribus nullum maius inueni remedium, quàm usque ad animi defectum euacuare, &c.

Ad quartum: Gal. aphor. 3. comment. 15. Euacuatio per purgantia pharmaca ualde indigentibus & ex longo interuallo uix utilis est. Nam si quis uti uoluerit bis uel semel in mense, ueritus ne superfluitatum multitudo aggregetur, præter id quod nocebit, corpora etiam in malam trahet consuetudinem (quã uam Gal. de pharmaco ualde purgatorio intelligat) sed uti solutiuis, quæ sunt ueluti liquæ Aegyptiæ, Māna, Dactyli, Indi, quos amarindos uocant, succus rosarum uiolarum, yrobalani, Rheubarbarum & similia, nõ est tã grande peccatum, maximè si morbus factus uel faciendus hoc exposceret.

L. s.

162 DE CONSEN. MEDIC.

Ad quintum: Hippoc. 4. de uict. in morb. ac. tex. 76. pharmacum exhiberi in quarta subet. Vnde, inquit, si dolor ualde infestauerit, pleuretico uentrem subpurgabis: uerum tamen purgans medicamentum quarta die ministrabis, & tribus primis diebus clysteres exhibebis. Et Gal. in comment. non tantum in prima, sed in tertia, & quarta se praeuise se pharmacum ait. Verum id nota, quod ipsi inquit, si minus dies iudicatorius expectetur, quocunque die haec tunc praebeantur, &c.

Ad sextum: Hippoc. aphor. 4. aphor. Sub cane & ante canem difficiles sunt medicationes. Vnde Gale. reddens rationem inquit, Nam purgatio praua fiet, quum calidus aeris ambientis in partem trahat extrinsecam, contrariam ei, ad quam medicina ducit humores. Ex quibus dictis Galeni collige duos motus contrarios esse in medicamentis uerendos.

Ad septimum: Gale. 9. meth cap. 5. In quolibet morbo adest humorum abundantia & calor uehemens, ibi est inter ipsa sanandi remedium discrimen, ut si abundantiam euacuare uideatur.

febrem augeas: si febrem refrigerare, abundantiam moreris: & in hanc consilij inopiā deueniunt, qui statim ab initio non euacuauerunt, &c.

Ad octauum: Gale. de atra bile cap. 6.

At si uerum esset, omnes humores qui in uasis continentur, alteratos quidem à medicamento pro illius facultate aequè euacuari, simile utique fuerit auxilium, ab aliquo horū medicamentorum purgari, & secta uena eximari. Cur igitur ὁσπύροχα hydericis exhibemus, quum liceat uena secta sanguinem euacuare? Similis quoque sententia habetur eodem in lib. cap. 9.

Ad nonum: Hippocrat. aphor. I. aphor. 23. Deiectiones non multitudine sunt exstimaenda, sed si talia deiciantur qualia conueniunt, & aegri facillè tollerant. Vnde Gal. in comment. Quare non promptam eorum quæ euacuantur quantitatem oportet attendere, sed duas, quæ dictæ sunt, significationes, qualia oportet euacuentur, & si facile tollerant.

Obiectio.

Antequam pharmacum soluat eritne dormiendum? Aut si solutionem tardauerit, eritne aliquid ultra exhibendum?

Responsio.

Auic. quarta primi, cap. 5. respondet tua obiectiōi, inquit, si medicina sit fortis, super eam dormiat, alioquin natura medicinae digeret, nec illico se mouere debet, sed cū se data fuerit anima, ambulet & moueatur.

Ad secundam, Auic. Si solutionem prolongauerit, bibat hydromel, uel supponatur clystere, cauendo tamen, ne duas medicinas uentrem soluentes in una die cōiungas: quoniam periculosum est & extra rectitudinē iudicij.



IOANNIS

BACCHANELLI
Regiensis, De cōsensu
Medicorum in curan-
dis morbis, Lib. 2.

Cephalææ descriptio.



EPHALAEA est do-
lor diuturnus, difficul-
térque solubilis, qui per
quosdam circuitus in-
tolerabilem capitis pas-
sionem affert.

Loci consentientes de Cepha-
lææ descriptione.

Gal. 3. de loc. aff. cap. 9, Est enim affectus
L. iij.

hic, dolor diuturnus difficultérque solubilis,
 qui à parua occasione uehementes habet ac-
 cessiones, ut neque strepitum, neque uocem
 neque luminis splendorem, neque motum tol-
 lerare possit infirmus, sed tranquillitatem
 obscurumque cubiculum quærat, &c. Similis
 sententia est in Gal. 2. de comp. med. per loc.
 cap. 2. Hanc passionem uocat Auic. prima
 tertij, cap. 35, Ouum & Cauthari siue Al-
 chude quod interpretatur Galea, ut in corre-
 ctione ex Andrea Belunensi, uel potius ex suis
 Auic. commentatoribus apparet. Nam huic
 illa omnia tribuit, quæ à Galeno de cepha-
 lea recitantur. Aët. ser. 6. cap. 48. ita bellè
 imitari Galenum uidetur, ut nil aliud quàm
 uera Galeni uerba exprimat, quod identidè,
 sed breuiusculè agit Paulus Aeg. lib. 3. cap. 5.
 Cornel. Cels. lib. 4. cap. 2, In capite interdum
 acutus ac pestifer morbus est, quem νεφά-
 λαιον Græci uocant, dolorque est intolera-
 bilis circa tempora uel occipitium, &c.

De loco affecto.

Cerebrum afficitur aut eius membrana
 quas Græci μνινιας uocant: interdum dolor

intra caluariam se continet, interdum extra.

Loci consentientes de loco
affecto.

Gal 3. de loc. aff. cap. 9, Quæ cephalæa à
Medicis nominatur, nemo dubitat quin cere-
bri sit morbus. Alex. lib. 1. cap. 17. Fit ab in-
flammatione in caluariae membranis ac ce-
rebri pelliculis orta. Paulus lib. 3. cap. 5, Qui-
bus intra caluariam morbus consistit, his do-
lor ad oculorum radices porrigitur: quibus
extra est, circa caluariam dolent. idem Gal.
de comp. med. per loc. cap. 2 asserit. Auic.
prima tertij, cap. 35, Fit ab ipso phlegmone
in cerebro, aut eius uelaminibus existente, &c.

De causis cephalææ.

Causæ sunt uel per se, uel per consensum. Si
per se, uel erit primitiua, à Græcis *αρχική*
dicta, uelut est ardor, frigiditas,
brietas, plaga, &c. Antecedens, à Græcis
πρὸ dicta, erit sextuplex: prima, hu-
morum multitudo: secunda, partium capitis
imbecillitas: tertia, obstructio meatuum:

L. iij.

quarta, humorum mala qualitas: quinta, in-
 temperies simplex: sexta, sensus exuberantia.
 Vel causa erit coniuncta, à Græcis συνήνορ,
 id est, concausa, cephalæam actu efficiens, &
 erit triplex: mala complexio, soluta conti-
 nuitas, uel utraque simul. Rursus mala com-
 plexio uel erit calida, uel frigida, sicca uel
 humida. Causa malæ complexionis calida,
 sunt sanguis, bilis, pituita salsa. Causa mala
 complexionis frigida, sunt humores & uapo-
 res frigidi. Causa mala complexionis sicca,
 sunt dies caniculares, motus corporei & ani-
 males. De causis humidis nulla fit mentio, ex
 eo quòd dolorem non pariunt, nisi cum ali-
 qua acrimonia, uel alia mala qualitate con-
 iuncta sint, &c. Solutæ continuitatis causæ
 sunt omnia quæ continuitatem dissoluunt,
 &c. Si uerò causa sit per consensum, tunc
 uel erit ab aliquo membro mittente, sicut à
 uètriculo uteròne, aut ab hepate, & reliquis:
 aut à præcedentibus morbis.

Loci consentientes de cau-
 sis cephalææ.

Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 1. Causa

producere sunt quinque: prima est iuxta
intemperiem simplicem, citra humorum com-
plexum: alia iuxta humorum qualitatem: alia
iuxta multitudinem tantum ipsorum humo-
rum contingit: quarta, quum multitudo hæc
transitus humorum ac vaporum obturat:
quinta, quum in quibusdam capitis partibus
ob imbecillitatem spiritus flatuosus innasci-
tur. Sexta quæ adiūximus habetur ex Gal.
3. de loc. aff. cap. 9. ibi, Neque absurdum est,
inquit, ut quosdam ob sensus exuperantiam
dolor infestet, quemadmodum in ore stoma-
chi accidit, &c. Auic. similiter prima tertij,
cap. 35. huius ægritudinis causam ponit cere-
bri imbecillitatem, & fortitudinem sensus
eius, &c.

De causa procatartica loquitur Gal. 2. de
compos. med. per loc. cap. 1. ibi, Quandoque
etiam ob causam aliquam externam proca-
tarticam laceissentem, uelut est ardor, frigi-
ditas, ebrietas, plaga capitis, dolor contingit.
Auic. prima tertij, de uniuers. ser. Causæ pri-
uatiuæ calefacientes sunt, sicut sol, ignis, ui-
num, potus & crapula, &c. De causa coniu-

Et ibi etiam loquitur Auic. loc. citato dicēs,
 quòd causa doloris immediata aut est mala
 complexio, aut solutio continui, aut utraque,
 sicut in apostemate, &c. De mala comple-
 xione loquitur Gal. 2. de compos. med. per
 loc. cap. 1. ibi, Vehementissimi dolores fiunt
 iuxta caliditatem & frigiditatem, moderati
 iuxta siccitatem, ad humiditatem nullus cō-
 sequitur dolor, &c. Gal. aphor. 4. comment.
 70, Fiunt enim dolores capitis etiam ex ca-
 lore solo, nonnunquam ex flava bile, quæ uel
 in capite uel in uentriculo continetur, ut ex
 abundantia humorum caput opprimente: uel
 propter aliquam loci obstructionem, uel à spi-
 ritu flatuoso, habente in parte ipsa genera-
 tionē. De causa per consensum loquitur Auic.
 prima tertij, cap. 35. ibi, Et multotiens con-
 tingit à morbis antecedentibus, qui substan-
 tiam cerebri, & eius uelamina tam intrinse-
 ca quàm extrinseca debilitarunt. Fit etiam
 ex uaporibus stomachi ad caput elatis, &c.
 Alexand. lib. 1. de dol. cap. Dolor, inquit, ca-
 pitis non semper primario affectu efficitur,
 sed per consensum nonnunquam alterius mē-

bri: unde si ad nimium iecinoris calorem dolores capitis oriantur, multo uehementiori cruciatu laborantem adfligunt, ob fumos eiusdem uisceris caput petentes, &c.

De signis cephalææ.

Primum si dolor fuerit à causa procacitica, cognoscitur ex affectu derelicto. Si dolor fuerit per essentiam in capite, dolor continuo agrum lader, lesionemque in aliqua cerebri parte comprehendemus, & cum reliquis cerebri operationibus manifesta lesio apparebit, sicuti in sensu uisus uel alijs sensibus. Quod si dolor capitis per consensum fieri contigerit, tunc per consentientis membri lesionem magis uel minus intensam, dolor magis ac minus crescet minuétque. Cognoscitur etiam à primordio ipsius lesionis: nam quod primum leditur, alteri lesionem infert. Et si ab intemperie fiat dolor, citra humorum complexum, tunc manifestus calor uel frigus absque ulla in capite grauitate sentietur. Quod si ab intemperie humoralis, tunc uniuscuiusque humoris aderunt particularia signa:

172 DE CONSEN. MEDIC.

nam sanguinis sunt septem, rubedo, tensio, grauitas, tactus calidus, pulsus magnus, somnus ob uaporum copiam, urina crassa, rubea. Bilis signa sunt sex, dolor acutus, mordicans, punctorius in anteriori & dextra capitis parte, uigilia, coloris flauities, parua grauitas, tactus acris, calidus, pulsus uelox, & sitis. Pituitæ signa sunt quatuor, color albus, dolor obtusus & perseuerans in occipite, somnus profundus & pigritia. Melancholiæ signa sunt, liuor, in facie nigrities, sensuum corruptio, dolor obtusus perseuerans in parte occipitis sinistra. Flatus signa sunt loci extensio, nulla adest grauitas: interdum fit cum sonitu & tinnitu, permutatur dolor de loco ad locum, & multiplicato uapore maior fit in capite pulsus: imaginatio interdum corrumpitur, & sequitur uertigo. Dolorem qui fit à soluta continuitate, ipsa solutio indicat, quæ nisi extrinsecus appareat, per puris ac sanguinis excretionem cognoscitur. Si fiat dolor ab aliquo abscessu, aderunt signa lethargi uel phrenitidis: si fiat à febre, tunc ipsa crescere dolor augebitur, & declinante minuetur.

Loci consentientes de signis cephalæ.

Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 2, Habes hac affectio interdum continuos dolores, interdum exacerbationes & interualla, siue ordinata siue inordinata: intermittunt exacerbationes ueluti in comitiali morbo correptis. Dolores igitur cum grauitate humorum multitudinem significam: cum mordacitate, aut humorum uel uaporum acredinem: cum pulsu, inflammationem: cum tensione citra grauitatem ac pulsum, tennis ac uentosi flatus multitudinem demöstrant: si uerò cum pulsu, membranosi corporis inflammationem: si uerò cum grauitate distentio fiat, humorum multitudinem intra membranas contentam. Et eodem in lib. cap. 1, Qui ex ardore caput dolent, cutis tactus aridior, oculosque rubros habent, frigidi sunt perfusionibus, cum infusionibus gaudent. Quòd si ob biliosum humorem caput doleat, accedit maior morbus, & faciei pallor, & aliquando oris amaritudo contingere solet. Porro signa dolentium caput ob frigiditatem contraria sunt eis, quæ

ex ardore oriuntur, &c. Lege de his Paulus
lib. 3. cap. 5.

Obiectio.

Ob quam rationem hac affectio dolores
per intervalla habet uelut morbus comitialis?

Responsio.

Hac ratione, quia hoc contingere potest
ex specifica proprietate in humoribus inuen-
ta: nam ex bile extra uasa mota fit dolor ter-
tianarius, & in uenis contenta mota & al-
terata prouenit dolor continuus: & hoc co-
tingit ex specificabilis proprietate, uel hoc
euenit ob quantitatem auctam aut diminutam
humorum, uel propter eorum crassitiem, re-
nuitatem, fluxibilitatem & uiscositatem. E-
hoc habetur ex Gal. 2. de diff. feb. de febre se-
tana, & ab Auic. prima quarti, tra. 4. ca. d.
feb. apostematum, &c. Auic. prima quarti d.
feb. Ephemeris causa primitiua cognoscitur
per eius praesentiam & ablationem, & a
effectu derelicto, &c. Et prima tertij, cap. 1.
signis ostendentibus, species sode, habet omnia
qua antè recitata sunt, &c. Lege etiam Aë-
ser. 6 cap. 48.

IN CVR. MORB. LIB. II. 175

De cura cephalææ ab humore calido.

Eliciantur ex Gal. quinque ad curandum intentiones: prima est uniuersalis euacuatio, quum à multitudine dolor fiat: secunda est reuulsio: tertia malæ qualitatis repulsio: quarta capitis particularis purgatio: quinta capitis roboratio, & si quid derelictum est, resolutio, &c. Vniuersalis euacuatio fit per sectionem uenæ: primò per saphenam, si in causâ sint hæmorrhoides, uel menstrua retenta: uel per uenam basilicam uel communem, si adhuc sanguis abundare uideatur: deinde per cephalicam: postremò per uenas frontis, aut alio loco applicentur naribus sanguisugæ. Reuulsio fit pluribus modis, sicut per enemas, per extremarum partium frictiones, lixuras, per sanguinis detractionem, per cucurbitulas, per hirundines ad hæmorrhoidas & ad nares applicitas, per suppositoria. Nã interdum sub reuulsione etiam deriuatio cõuenit, quæ ad uicina loca tantum fieri solet: unde per ἑρπύλα, id est, per nares euacuantia, sternutatoria, gargarismata, masticatoria,

176 DE CONSEN. MEDIC.

aurifusoria & similia fiunt. Repulsio mala-
 qualitatis fit dupliciter, per exteriora, & per
 interiora. Exteriora fiunt per repellētia epi-
 themata, inunctiones, cerata, cataplasmata,
 odoramenta, suffumigia, instillationes, lorio-
 nes, & similia: ita tamen ut repellentia sint
 adstringentia & frigefaciētia primū, dein-
 de repulsoria, quibus addendum est aliquid
 ex mitigatorijs ac concoctorijs medicamentis:
 deinceps ad discussoria paulatim acceden-
 dum, detractis omnino repellentibus. Interio-
 ra malam qualitatem remouentia sunt Syru-
 pi, Zulapia siue Iuleb, eclegmata, apozemata
 siue decocta, pulueres, &c. Syrupi sunt, aceto-
 sus simplex, uiolaceus de endiua, rosaceus de
 succo acetosae, de agresta, de granatis, de li-
 monibus, de acerositate citri, &c. Zulapia
 uaria sunt, ut uiolacea, nenupharina. Fiunt etiā
 cum ptisana & uino granatorum, cydoniorū
 malorum, uel cum Iuleb rosaceo, aqua hor-
 dei, & aqua coriandrorum preparatorum,
 &c. Electuaria sunt diarrhodon Abb. Tria-
 sandali, conserua uiolacea, rosacea, confectio
 de prunis. Manuscripti, diacoralis, &c.

Decocta sunt ex rebus frigidis ad caput spectantibus, ut sunt niola, nenuphar, rosa, salix, cucurbita, mala granata, lactuca, sandali, nyrchus, plātago, semperuina, portulaca, & similia. Capitis purgatio multifariam fieri potest, siue per simplicia medicamina, uel per composita. Simplicia sunt rheubarbarum, loes, agaricus, succus rosarum, diagridium, cyrobalani citrini, cassia, siliqua, succus iolarum, manna, succus iridis, tamarindi, succus fumi terra, & similia. Composita sunt tria, sicuti electuaria, confectiones, pilulae, ochisci, potiones, boli, pulueres. Electuaria sunt electuarium de succo rosarum Nic. electuarium ros. Mes. Diaprunis sol. Nic. Diaphi con Mes. electuariū de psyllo sol. Mes. Cassia & manna cum rheubarbaro, cum agarico, cum scamonio preparato. Confectiones sunt, cydoniata solutiva, nebula solutiva, & alie confectiones quae parari possunt, sicuti assula cum diagridio, &c. Pilulae sunt aue Nic. de hiera simplici Gal. pilulae lucis Mes. de hiera composita Nic. De Rheubarbaro Mes. Aggregatiua Mes. aleophangina Mes. M. i.

Trochisci sunt, Trochiscus de diarrhodon, de rheubarbaro, de camphora. addendo aliquid rheubarbari uel diagridij. Portiones fiunt ex electuarijs ac decoctis superscriptis: similiter boli cum electuarijs & saccharo. Pulveres sunt ex rheubarbaro, aloe, agarico, cucumere sylvestri, &c. Apis roboratio perficitur cum stypticis infrigidantibus ac constringentibus, ut oleo rosaceo, myrthino, &c. Residui resolutio fiet cum resolventibus modicè calefacientibus, sicut sunt semina Altheæ, fœnugræci, lini, meliloti cum camomilla, anetho: aut cum oleo camomilla, anethi, &c. uel cū pulmone agni uel arietis catulorum, & pullorum columbarum, &c.

Loci consentientes de cura cephalææ.

Anic. prima tertij, tra. 4. cap. 36. Si causa est sanguis, phlebotoma: & si tu in principio administraſti id quod repellit, demum utere embrocis ex aquis, in quibus resolventia sint modicè calefacientia cum repercussionem modica & stipticitate, ut flos squinantiæ, ca-

somilla, &c. Deinde euacua cum eis qua
 ueniunt: & scias, quod quum purgasti, su-
 perest ut confortes cerebrum & eius uelami-
 na, &c. Ex quibus uerbis omnes intentiones
 me iam dictae eliciuntur. Præterea Paulus
 Eg. lib. 3. cap. 5. & Aet. ser. 6. cap. 50. &
 Ies. cap. de soda, & Arcul. de cura cepha-
 lica: similiter Michael Sauonarola de cura
 da cali. Gerardus de solo, Gordonius ac
 se Marcus Catinarius omnes in has inten-
 tiones curandi concurrunt. De reuulsione
 agitur Gal. 2. de compos. med. per loc. ca.
 inquit, Reuulsio itaque fit per clysteres,
 per extremitatum ligaturas, & per plures
 externarum partium frictiones: interdum per
 sanguinis ex cubito detractionem, & ex na-
 ris, aperta uena & apophlegmatismis &
 medicamentis quæ naribus induntur, &c. Si-
 militer Hippo. 3. de morbis circa principium,
 si dolor capitis permanet, ut sternutet cura-
 lenibusque ac odoratis caput & uentrem
 perfricato, priscana succum sorbeto, uinum ne-
 perato, &c. De repulsione male qualitatis
 agitur etiam Gal. loco citato, ibi, Repellis

M. ij.

oleum rosaceum omphacinum per se, & cum
 aceto ex capitibus papaveris, &c. Et. 2. de
 compos. med. per loc. cap. 1. Quod si in capi-
 te ipsa affectio calida existat, in primis re-
 pellendum cum refrigerantibus, deinde ex
 mitigatoriis ac concoctoriis aliquid admis-
 cere ad repulsoria oportet, deinde discussoria
 adhibenda, ita ut paulatim repulsoria phar-
 maca detrahantur. De interioribus exhiben-
 dis consule neotericos autores. De purga-
 tione capitis recigit Gal. 2. de compos. med.
 per loc. cap. 2. ibi, Dabimus hieram exacu-
 tam, &c. Quomodo uero hiera exacuatur
 docuit Galen. eodem in lib. cap. de Alopecio
 dicens se ueratrum nigrum addere, si ac-
 bilis sit expurganda, aut scamonium, si ama-
 ra bilis sit euacuanda. Vnde Græcè habetur
 τὸν τὴν ἰεγγὲν ὀξύαντα δόττον. Et. 2. de
 composit. medicam. per loc. cap. 1. Euacuandus
 est biliosus humor per absinthij cremora-
 rem, aut per aloem, & per ipsam picram
 antidotum, aut modica addita scamoni-
 aut per catapotia ex aloe confecta, &
 De capitis roboratione & residui resol-

ione saps habes ex Avicen. Mes. & Almans. capite de soda calida. Gal. cap. cit. Discutit oleum dulcissimum calidum & magis inueteratum, itemque Sycionium. Nota non dici Sycionium $\Sigma\pi\omicron\sigma\upsilon\chi\iota\omicron\upsilon$ id est, à cucumere, ut nonnulli putant, sed potius à Sycionia patria ubi parabatur: nam Dioscor. 1. lib. de oleo Sycionio loquens nullam de cucumere mentionem facit, & hoc prius annotavit Cornarius in suis annotationibus. Discutiunt etiam inquit Arcul. pulmo arietis, agni, item catuli lactentes, ac pulli columbarum, &c.

Observationes de venæ sectione.

Avic. prima tertij, de cura soda calida absque materia, in sectione uenæ primùm caue, ne uenter sit stypticus: ibi tu ad curandas agritudines capitis lenificatione multū natura indiges, &c. Similiter Razes lib. diuis. cap. 3. asserit. Secundo caue ne adeò uehemens sit dolor, ut curandi ordinem permutter: & hoc uoluit Mes. & Avicē. quarta primi, cap. 3. ibi, Quūque ad diuersum tra-
M. ij.

here uolueris, dolorem illius membri prius sedare. Gal. meth. 12. cap. 1. Qui dolori neglecta curatione tantum est intentus, non id ex topicis artis ratione, sed in agri gratiam facit: at si ex dolore uires resoluantur, atque ex eo periculum impendet, & mitigari prius dolor & uires roborari debent. Similis sensus est eodem in lib. cap. 7.

Observationes de repulsione.

Gal. 2. de compos. med. per loc. cap. 1. Aptissimus locus est ad applicanda remedia iuxta capitis sinciput: siquidem ob laxitatem coarticulationis iuxta coronalem suturam, & ob ossium tenuitatem & raritatem facile, tum caliditatem cum frigiditatem omniumque adhibeatur, intro distribuit.

Auicenn. de uniuers. cur. sod. Alienanda sunt hæc frigida à posteriori cerebro, quod est origo neruorum. Gale. loco citato, A' papaueris succo & mandragoræ est abstinendum: non enim citra damnum refrigerant, uitandâque quæ cum refrigeratione manifesta adstringunt, ut solani succus, mali punici, cō-

conei, & mespili: & si quando necessitas ex-
postulat, parum ex eis admiscere oportet.

Mesues cap. de cur. sod. cal. Quum topi-
picis usus fueris, fac ne priuentur his tribus
uirtutibus: prima, quòd in gradu alterationis
competant: secunda, quòd membri uirtutem
roadunent, ne superfluitates caput recipiat:
tertia, quòd sua proprietate caput roborent,
ergo. rursus idem Mesues, Adhibenda sunt
ulcerantia frigida, praterquam in quatuor
casibus. Primò, quum soda calida sit in febrili-
bus materialibus: nam sodam multiplicat u-
sus episthematum, uapores exire non permit-
tentium, ut testatur Auic. prima tertij, cap.
ix. Secundò, quum soda sit propter uapores
acutos, qui ex totius corporis consensu, uel
partis, ad caput perueniunt, etiam caput eos
recipit: nam diuersio ad oppositum ex una
parte competit, & ex alia receptorum reso-
lutio, non autem alteratio. Tertiò, quum so-
da sit à multitudine materiae, & tunc ena-
cuatio sedat. Quartò, quum sit à multitudi-
ne uaporum, existentium in capite per con-
sensum totius uel partis: tunc resolutio &
M.iiij.

particularis euacuatio conuenit, & non
alteratio.

Gal. 2. de compos. med. per loc. cap. 1.
notat, quòd ubi frigidior & crudior fuerit
humorum multitudo, tepida applicentur: ubi
calidior & biliosior, frigida. Arcul. Præ-
sente rheumate fomentationes, sternutato-
ria, & gargarismata, & lotiones pedum &
capitis non sunt omnino, nisi post perfectam
euacuationem admittenda. Auic. prima ter-
tij, cap. de can. uniuers. cur. Cauendum est
in cerebri inflammationibus, ne maturantia
adhibeamus, &c.

Obseruationes de purga- tione capitis.

Auic. prima tertij, de euacu. cur. A' faci-
lioribus est inchoandum. Similiter Mes. cap.
de sod. cal. Auic. prima quarti, cap. de cura
putridarum in genere, Ad euacuationē præ-
cedat digestio. Et Hippoc. aphor. 1. aphor.
22. Concocta medicari atque mouere, non
cruda, modò non turgeant, &c. De his uide
de purg. sup.

De cura Cephalææ ex humore
frigido.

Curationis scopi erunt quinque: primus, modus regiminis: secundus, materia præparatio: tertius, humoris præparati euacuatio: quartus, diuersio: quintus, cerebri roboratio ac residui resolutio.

Modus regiminis, si materia sit pituitosa, frigida scilicet & humida, erit circa sex res non naturales calefaciens & exiccans. Materia præparatio fiet, si pituita fuerit crassa ac uiscosa, per incidentia ac attenuantia capiti conferentia, ut est rhodemel, oxymel simplex, compositum & scilliticum, syrupus de duabus radicibus, syrupus de quinque rad. Syrupus de stechade, de betonica, cum decoctis incidentibus, ut ex hyssopo, origano, pulegio, salvia, maiorana, betonica, ruta, peonia, iaturegia, stechade, sileri montano, ex chamedrio, chamepithi, castorio, cinnamomo, lino aloes, laudano, melliloto, calamo aromatico, uerbena, fœniculo, folijs lauri, cum mosco, umbra, nuce myristica, rosmarino, quæ omnia in opere capiti oportuna esse uidentur. Si

uerò materia fuerit tenuis & fluens, calidi
 stypticis, quæ crassiorem materiam reddant
 utemur, sicuti est mastiche, nux mosch. ligni
 aloës, &c. Posset etiam fieri materiae prepa-
 ratio cum cataplasmate ex rebus predictis
 minus calido & frigido, prout expedire ui-
 debitur. Euacuatio fiet, ut supra dictum est
 per simplicia ac composita pharmaca. Sim-
 plicia sunt, colocynthis, agaricus, aloes, uebu-
 li, sarcacola, turbit, chartamus, esula, polypo-
 dium, hermodactylus, scilla, radices ireos, ci-
 clamen, &c. Composita sunt, cōfectiones, elec-
 tuaria, pilulae & pulueres. Confectiones
 sunt diarob, diaturbit, & mille alia, quas pe-
 te cum melle & saccharo poteris componere.
 Electuaria sunt, diaphinicon Mes. electuarium
 indum Mes. diacartami magist. egetea Mes.
 electuarium elescoph Mes. diarob cum turbit
 & rheubarbaro & similia. Pilulae sunt cholo-
 chia Almans. pilula foetida Mes. de serapin-
 Mes. de rheub. Mes. de sarcacola Mes. hiera-
 logodion nic. pilula aggregatiua Mes. sin-
 quibus nic. pilula de hiera magna Gal. de
 hiera cum agarico magist. pilula aleophan-

gina Mes. pilula de agarico & de hermodactylis Mes, &c. Pulveres componi possunt ad libitum, sicut pulvis turbit, preparati rheub. agarici, carrami, &c. Diuersio & deriuatio, quæ est altera euacutio, fit per extremarum partium ligaturas, per suppositoria enemata, cucurbitulas, lotiones, frictiones. Deriuatio fit per gargarismata, sternutatoria & masticatoria, caput purgantia. Ligatures fient ualidiores quàm in calida cephala. Suppositoria parantur ex specierum hiera composita 3. ij, salis gemmei 3. i. cum melle, quibus addi potest colocynthis, agaricus, fel tauri, stercus muris, euphorbium, esula, diagridium, &c. Enemata parari possunt ex decocto saluie, stachados, mercurialis, malua, furfuris lib. i. cassia, hiera, logodionis añ 3. 5. Rhodomellis, olei communis añ 3. ij. salis 3. 5. Validiora fiunt cum colocynthis, agarico, centaurio, cartamo, &c. Cucurbitulae applicantur cum scarificatione, prout tibi uidebitur. Frictiones fiunt manibus oleis, mantili aspero uel leni, uino albo & decocto asparagorum & herbarum cali-

darum, &c. Gargarismata fiunt cum oxy-
 melle simplici & composito & scillitico, cum
 decocto origani, hyssopi, cui addi potest, ut su-
 ualidius, synapis, piretrum, cortices thuris, au-
 piper, &c. Sternutatoria cum pipere, condisi-
 helleboro albo fiunt. Caputpurgia cum nigel-
 la per. 24. horas infusa in aceto & exiccata
 & in puluerem redacta fiunt, aut ex felle ta-
 rino aut caprino cum modico castorei &
 parte una croci, cum aqua maiorana fiat co-
 liriū. Masticatoria fiunt simpliciter cum ma-
 stice, addito pipere uel piretro, uel radice ca-
 parorū, &c. Capitis roboratio fiet cū calidi-
 stypticis. Residui resolutio fieri potest per lin-
 imenta, epithemata, attractiones, sacculos, in-
 stillationes, confectiones, & suffumigia, &
 cerata. Linimenta fiunt ex oleo camomillino
 rutaceo, laurino de spica liliorum alborū, de
 cheiri nardino sansucino, de amygdalis am-
 ris, de croco: quibus addi possunt oleum rosa-
 ceum, uiolaceum & similia: uel si calidior
 desiderantur, cum oleo de castorio, de eupha-
 bio, de piperibus. Epithemata fiunt ex aqua
 maiorana, uel oleis, aut ex decocto stecha-

los, foliorum lauri, camomilla, rosarum cum
oleis ad caput spectantibus. Attractio per na-
res fiet cum aqua maiorana muscho addito
vel ambra (quanuis odorifera in mulieribus
sint vitanda, ob conuersionem uteri ad supe-
riora) uel cum alijs aquis capitalibus, addē-
do calamum aromaticum & nucem myristi-
cā. Sacculi fiunt ex camomilla, maiorana, ste-
chade, folijs lauri, pulegio, origano, cortici-
bus cedri, cinnamomo, spica, mace, gallia mus-
chata, &c. Instillationes fiunt ex laudano,
storace cal. cum oleo camomillino, rutaceo,
&c. Confectiones fiunt ex diambra, diamar-
garitone, diamuscho dul. confectiones de gē-
ris aromatico ros. moschato electuario regum
myridato theriaca, diacoro, &c. Suffumigia
fiunt ex thure, sandaraca, ligno aloes, lauda-
no, muscho, storace, calamite, caryophyllis,
&c. Cerata fiunt ex camomilla, maiorana,
stechades, rosarum ana. p. i. corticum citri,
garyophyllorum, cinnamomi, nucis muscha-
ana. p. 5 gallie muschatae, laudani parum, cū
oleo de spica & resina pini ad libitum fiat
ceratum, &c.

Loci consentientes de cura cephalææ ab humore frigido.

Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 1. Si viscosus aut crassus humor, aut flatu vaporosus in angustiis meatuum infarcitur, ita ut multo tempore opus sit ad curationem, tunc quæ sic infarcta sunt, attenuare oportet, meatûsque dilatare, per quos excernantur, habita providentia, ne quid humoris uel flatu amplius infarciatur, & ad hæc corroborandum est affectum membrum. Ex quibus uerbis curandi intentiones elici possunt. Consule tamen in iis omnes neotericos practitantes. De sex rebus non naturalibus loquitur Paulus lib. 3. cap. 4. ibi, Vinum, inquit, subtilius propinandum, corporis motio adhibenda, item balneum prodest, &c. Quod materia preparatio fiat per incidentia ac extenuantia, habes in 9. aphor. 2. libri: nam in fine commen. Gal. Erit fluidum corpus omnibus refferatis meatibus, humoribus uerò incis, absterfis atque extenuatis, siquis fuerit humor in corpore crassus ac glutinosus. Quod

erò tales syrupi iam enarrati sint ad pro-
 ositum, lege ex Mesue, uel ex Gale. 2. de
 comp. med. per loc. cap. 1. ubi acetum, mul-
 um in potu aut simplex aut Iulianicum
 appellatum ex origano hyssopo commendat.
 uicen. prima tertij, de cura sodæ frigida, Es
 dministrentur subtiliatiua uel maturatiua
 ⁊ euacuatiua determinata, &c.

De diuersione loquitur Auic. loc. cit. ubi
 am fieri in principio imperat, si humor
 eo fuerit communicans. Quod uerò hæc tor-
 odis, quot iam diximus, fiat, expressè habe-
 ir ab Arcul. Marco Catinario ⁊ ab omni-
 us practificantibus. De roborando capite le-
 Gal. loco nuper citato. Item Auic. prima
 rtij, ubi modos epithematum caputpurgio-
 um oleorum ac herbarum docet: inde enim
 nia ex me dicta intelliges. Auic. de cur.
 da frigida. Omnes qui habet sodam ex fri-
 ore post purgationem, si ea indigent, iuuant
 unctiones, caputpurgia, suctiones nariū, odo-
 ramenta, embrocæ ⁊ emplastra calefacien-
 a, &c. Habes similia ex Gal. 2. de compos.
 ed. cap. 2. de cura cephalæ ex Archigene

Et Asclepiade, et plurimis alijs, ut apophlegmatismos, sternutatoria, et amuleta, quae capiti circumponuntur: similiter irrigationes, masticatoria, pastillos, &c.

Observationes de regimine in cephalæa.

Auic. prima tertij de uniuers. regimine in soda, Tu scis quòd soda est exemplum reliquis ægritudinibus in necessitate abscissionis suae causae et oppositione ei cū contrario. Et post hæc scis, quòd ex rebus in rememoratione soda iuuantibus est paucitas comestionis, et potus propriè uini, et multitudo somni: uerum nimia paucitas comestionis in soda calida nocumentum affert, augmentum in ipsa faciens. Et in uniuersali can. Et scis, quòd qui conqueritur de ægritudine frigida in capite, nocetur à uino, et qui habet ægritudinē in uelaminibus, nocetur ab aqua frigida.

Arcul. Fercula sint facilis concoctionis et paucarum superfluitatum: item comedantur aliqua styptica post cibum, uapores reprimēsia, sicut cydoniata cum speciebus, uel pira,

vel fructus styprici . Somnus sit minor quàm
in alijs sodæ speciebus: dormiat leuato capi-
te, loco exercitiij fricationes uicem suppleant,
inimi accidentia uitentur excessus, &c.

Observationes de materiæ præparatione.

Marcus Catinarius de cura sodæ phleg-
maticæ, Ab imbecillioribus, inquit, inchoan-
um ad ualidiora procedendo . Ratio est,
uia ualde extenuantia in principio exhi-
ta magis naturam dilatat, quàm in dige-
ndo adiuuent, &c.

Observationes de euacuatione.

Mesues de sod. frig. ab humore melan-
colico, Tria considerata sunt in euacua-
tione, primum, quòd nò semel, & multam &
bitam faciamus euacuationem, sed per in-
terualla, habentem temperiem, ut natura eu-
acuationem, nò autem euacuatio naturam re-
plet: nam ex subita ac uiolenta euacuatione
natura regulariter operatur, sicut im-
pus flammæ, quæ subito agit in subtile, &

N. i.

prætergreditur crassam. Secundum est, quòd euacuatio sit còmensurata, non excedens mediocritatem, sed sit extensio eius elevationis non recedens à gradu medicinarum incolumium. Tertium est, quòd non expolientur solutius à rebus lenificatiuis & humectantibus, nam hæc operationem beatificant. Itidē asserit Auicē. prima tertiij de can. uniuers. curat. Adde tamen his tu quartum, quoniam quum phlegmagoga indifferenter ab omnibus partibus euacuant, idcirco aliquid quod membrum euacuandum respiciat, his semper addere conuenit, ut uirtus pharmaci ad id tendat, quod euacuare intendis, ut si caput, capitalia, si pectus, pectoralia, &c.

Obseruationes de topicis applicandis.

Gal. 2. de comp. med. per loca, ca. 1, In inueteratis capitis affectionibus ac doloribus uulgidis ac frigidis necessario capillos radimus aut ualde usque ad cutem resecamus. Paulus lib. 3. cap. 4, Topica mutantur singula continuè, nam uetustate fiunt inefficacia. Galen.

1. de cōpos. med. per loc. cap. 2. inquit, quòd
in principio morbi à debilioribus est auspi-
candum, quum statim efficacissima adhiberi
non conueniat, ut supra dictum est.

De Hemicrania.

Ημικρανία siue έτεροκρανία est, ubi uel
in parte sinistra uel dextra dolor capitis ac-
cidit, qui interdum intensiorem, quandoque
remissionem infert. Locus doloris interdum
extra caluariam percipitur, aliquibus ad ca-
uitis usque profunditatem penetrat, quibus-
dam uerò temporum musculos uehementer
affestat, &c.

Loci consentientes de Hemicrania.

Gal. 2. de compos. med. per loc. cap. 3, He-
micrania est affectio dolorosa, circa dimidiã
capitis partem, aliquando dextram, aliquan-
do sinistram, quæ iuxta suturã secundum eius
longitudinẽ terminatur, & ut plurimum ex-
acerbatur. Auicẽ. prima tertij, Hemicranias
dolor in una medietate capitis excita-
tur, &c. Razes, quem multi sequuntur, nul-

N. 4.

196 DE CONSEN. MEDIC.

lum agit de hemicrania caput, uolens fortasse pharmaca, quæ inueterato capitis dolori medentur, hemicranicis etiam affectionibus auxiliari: sed non mirum, quum nec Apollonius Archigenes, & Asclepiades unâ cū Critone, ut refert Galen. scripserint. De loco affecto loquitur Galen. loc. citat. ibi, Quidam circa temporum musculos dolitant, & pleraque sanè ipsorum pars hoc modo affligitur: quidam uerò dolorem longè ulterius progredientem habent, & quidam adeò uehemèter dolent, ut neque manus contactum facile ferant. Aet. ser. 6. cap. 49, Et aliquibus contingit, ut extra caluariam doloris sensum perceptent, quibusdam in capitis profunditatem penetrat, &c. Similiter Paulus lib. 3. cap. 5, Quāquam unum & idem caput de cephalæa & hemicrania ipse faciat.

De causa Hemicraniæ.

Causa est plenitudo, uel humorum aut uaporum influxus. Fit nonnunquam etiam hemicrania ab intemperie nuda, absque humorum complexu: sæpius tamen fit ex aliarum

corporis partium consensu, & denique ab his
omnibus quæ dicta sunt superius de cephalæa.

Loci consentientes de causis Hemicranîæ.

Gal. 2. de compos. med. per loc. cap. 3, Hemicrania fit ex influxu humorum, siue multorum, siue calidorum, siue frigidorum, causam doloris suggerente. Hoc idem asserit Aet. ser. 6. cap. 49. itidem Paulus. Alex. lib. 1. cap. 18, nonnunquam fieri, inquit, ex solo temperamento, sæpius ex consensu aliarum corporis partium, &c. Negat tamen Auic. posse fieri hemicraniam à malitia complexionis singularis, id est, ab intemperie nuda, sed quum nullam adducat evidentem de hac re rationem, plus tribuendum esse Alexandro authoritatis assererem in hac re, quàm Auicenna.

De Hemicranîæ indiciis.

Quamvis uberius de indicijs suprà dictum sit, quum de Cephalæa uerba fecimus, nihilominus, ut in summa referam, grauius mon-

N. ij.

lesta, plenitudinem indicat, dolores cum erosione, humorum uel uaporum acrimoniam, dolores cum pulsibus, inflammationem, dolores uerò ad radices oculorum se extendentes, intra caluariam morbum denotant: si uerò circa caluariam doleat, dolores extra sunt. De humorum qualitate sumi potest indicium à iuuantibus & nocentibus applicitis, &c.

Loci consentientes de Hemisphæriæ indicia.

Aet. ser. 6. cap. 48, Dolores cum gravitate humorum multitudinem indicant, cum mordacitate, humorum uel uaporum acredinem, cum pulsu inflammationem, &c. Et paulò inferius, Dolores quidem in superficie hærentes membranæ os caluariæ ambiens affectionem significant: quibus uerò affectio intra caluariam est, dolores usque ad radices oculorum procedunt, &c. Hoc idem asserit Galen. 2. de compos. medic. per loc. cap. 2. & Paulus Aeginet. lib. 3. cap. 5. Avicenna. prima tertiæ, cap. 37, Quum fiat hemisphæria modò à frigidis, modò à calidis, frigidos esse dices, si cum calefa-

stione quietem inueneris : calidos, si quietem cum infrigidantibus, &c. Vide etiam de his latius Gal. 3. de loc. affect. cap. 9.

De cura Hemicrania.

Tres sunt in cura hemicrania intentiones medendi, prima est euacuatio, secunda est reuulsio ac derinatio, tertia malæ qualitatis permutatio. Euacuatio fiet uel pharmaco, uel uenæ sectione, prout ager magis opus habuerit : & de his superius uberrimè dictum est in capite cephalæ. Reuulsio ac derinatio per eadem perficientur, ut suprà dictum est. Verùm ante accessionis tempus hæc perpetranda sunt : iuuat in hoc fricare partem, quæ circa temporum musculum est, tam diu, ut excalefiat, præsertim si à frigida causa dolor proueniat. Mala intemperies, siue humorū qualitas per sui contrarium permutabitur, ut calida cum frigidis, frigida cum calefacientibus : utrisque tamē semper ea addenda sunt, quæ adstringentem facultatem habent, eo tamen seruato, quòd in uehementi caliditate modicè refrigeres, in frigida mul

N.iiij.

tum excalefaciatis, dolor uerò sine humorū cō-
plexu per alterātia tantū extrinsecus ad-
hibita, curabitur.

Loci consentientes de cu- ra Hemicraniae.

Galen. 2. de comp. medic. per loc. cap. 3.
Vbi quis hemicraniam curare aggreditur,
prius quali purgatione, aut uenae sectione æ-
ger opus habeat, consideret, atque ita ad ca-
pitis auxilia progrediendo, tum per digitos
suae manus, tum per linteum dimidiam fron-
tis partem, & eam maximè quæ circa tempo-
rum musculum est confricando excalefaciat:
atque id ante accessionis tempus faciendum
est, post exacerbationem uerò pharmacis he-
micranicis utendum. Quòd si multa calidi-
tas in doloribus percipiatur, ijs quæ modicè
refrigerant: citra uerò hanc, ijs quæ multum
excalefaciunt: uerū utrisque ex his quæ fir-
mitatem ac robur addunt, misceantur quæ
adstringentem habeant facultatem, &c.

Auicē. prima tertij, cap. 38, Eius cura est
phlebotomia, & propria uenae frōtis & tem

moris, & solutio, & clysteria, & attractio, &
 totum cum eo quod conuenit ipsi, ut dictum
 est. Quum periodus adest, oportet ut purge-
 tur corpus ante ipsum, & permutetur cōple-
 tio post purgationem. Quòd si materia fue-
 rit calida, pones narcotica super tempora,
 &c. Et paulò infrà, Aegritudo, cuius tempus
 est prolongatum, est frigida secundum dispo-
 sitionem, & indiget resolutione, & quod ca-
 refaciat cum fortitudine, &c. Alex. lib. I.
 ap. 8, Si hemicrania citra materiam ab in-
 temperie fiat, solis extrinsecis utendum est
 rāsidijs. Si uerò cū materia, considerandum
 est, quisnam humorum adauctus redundet:
 quòd si sanguis modum excesserit, sectione ue-
 næ utendum, si alius humor sortito medica-
 mine statim euacuandus est, &c.

De cura cephalæ & hemicra- niæ per consensum.

Si ab uniuerso corpore caput afficiatur,
 quatuor erunt curandi intentiones. Prima,
 euacuatio aut purgatio: secunda, reuulsio &
 alia qualitatis impressæ repulsio: tertia erit

eius, si quid adsit in capite, cōcoctio: quarta
 erit partis affecta roboratio ac discussio. Si
 uerò uni alicui parti condoleat, binæ tantum
 erunt intentiones, altera scilicet ad mēbrum,
 ex quo humores uel uapores mittuntur, altera
 ad mēbrū in quo recipiuntur. Evacuatio fiet
 si multitudo humorum in uenis fuerit, per se-
 ctionē uenæ: si uerò qualitate tantum humo-
 res inualeant, purgante pharmaco utemur
 &c. Repulsio fiet in partem contrariam re-
 pellendo. Repulsio malæ qualitatis impressa
 fiet per sorbitiones aut irrigationes modera-
 tē refrigerantes. Concoctio eius quod capiti
 impactū est, fiet per attenuantia & inciden-
 tia, ut dictum est supra. Roboratio fiet etiam
 per eadem, ut supra dictum est. Quod uerò
 attenuatum est & incisum, tunc discutiendum
 erit. Si uerò una pars mander, & altera susci-
 piat, quòd altera non trāsmittat, stypticis re-
 frigerantibus procurandū, & quòd caput ne re-
 cipiat, ijs quæ firmitatē ac robur indunt, ut ex-
 dum erit. Quot modis autem aliquid per con-
 sensum fiat, lege fusius ex Auic. secunda pri-
 mi, cap. de complendis dispositionibus, &c.

Loci consentientes de cura Cephalææ & Hemicranîæ.

Gal. 2. de compos. medic. per loc. cap. 1, Si
 buniuerso corpore caput afficiatur, prospici-
 endum intemperiei & materiae prædomi-
 nanti, instando, easque urgendo: & si multi-
 tudo humorum circa uenas fuerit, uenâ se-
 cibimus, si qualitas magis inualuerit, purgan-
 pharmaco utemur: quod si uni alicui par-
 ticondoleat, existente calida intemperie, pa-
 rem ex diluto uino dabimus, exhibendo etiam
 orbitiones ex alica, & foris irrigationes mo-
 deratè refrigerantes, & firmitatē addētes, ut
 dictum est, &c. Et paulò superius dixerat, Si
 aliunde humor uel uapor deriuat, influentem
 primis repellere necessariū est, impactū
 ue cōcoquere & attenuare, idque ipsum dis-
 cutere, & circa partem affectam firmita-
 tem inducere, ut ne quid influens amplius sus-
 cipiat. De reuulsione loquitur Hippoc. apho-
 r. 5. aphor. 68. ibi, Dolenti partem capitis
 posteriorem in fronte uena incisa prodest.
 de coctione, Gal. 2. de compos. med. per loca

cap. 1. ubi inquit, Si uerò ob crassos & uisco-
 sos humores in stomacho cōtentos caput do-
 leat, hos extirpabimus, acetum mulsum exhi-
 bendo, aut simplex, aut Iulianicū appellatur
 ex hyssopo & origano portionibus, &c. Quod
 uerò membrum ne transmittat, iubet Raze-
 bucellas panis in succo granati, aut uinae a-
 cerbae, aut horum similium exhiberi: qua d-
 re frigidis stypticks opus est in his uti, &c.

De his quæ lædunt caput.

Galen. 2. de compos. medic. per loc. cap. 1.
 iuxta finem, Viticis semen, absinthij succus
 lac in potu, glandes quercinae, oliuae nigrae
 eruū: hoc enim articulos dissoluit. Offendū
 etiam caput myrrha, thus, hederæ cacumina
 Perturbant etiam mentem lentisci fructus
 crocus, peucedanū, cyclaminus sicca cū uini
 potata, styrax. Medicus potus tristitiā disci-
 tit, multus autem turbulentos somnos efficit,
 &c. Dioscor. Lædunt præter hæc, palma, a-
 butus, ferula, meu, mandragora, uinum gypsa-
 rum, &c. Auicen. præter hæc damnat lac, al-
 lium, cepas, & omnia acrimina. Et pri-

a tertij, de ser. uniuers. sod. omnia aromata
ue calida siue frigida. Item dānat carnem
coccinam, & reliquas carnes crassas, fabas,
uellanas, &c.

De prognosticis cephalæ & Hemicraniæ.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 10, Caput dolēt
circundolenti pus, uel aqua, uel sanguis
fluens per nares aut os aut aures, morbum
luit. B. Intellige, si dolor ab inflammatio-
, aut ab humorum multitudine fiat, alio-
si à flatuoso spiritu, aut ab intemperie
ntigerit, non per hos modos sanaretur, ut
al. in comment. Et aphor. 3. aphor. 13, Si
tas sicca fuerit & aquilonia, autumnus ue-
pluuiosus & australis, dolores capitis ad-
mem sunt. Hoc idem etiam adserit Auic.
ima tertij, cap. de uniuers. sermone sodæ. Et
hor. 4. aphor. 70, Quibus urinae perturba-
, quales sunt iumentorum, ijs dolor capitis
l adest uel aderit. Ba. Nota ex Galeni com-
ent. quòd quedam urinae longo tempore
anent perturbatae, quedam citò sedimen-

crassum habent, & citò morbum finiri deno-
 tant: quæ uerò non resident, si uires ad sin-
 longum fore morbum prænunciant, si imbe-
 cilles, ægri mortem prædicunt. Auic. similite-
 de his pertractat, de signis nunciatiuis sod-
 cap. 8. ibi, Urina similis asinorum urinis, si-
 gnificat, quòd soda fuit, aut fit, aut erit, &
 similiter rubedo urinæ, & subtilitas eius i-
 febris, & hora crisis significant permuta-
 tionem ad caput, &c. Hippoc. aphor. 6
 aphor. 51, Quicumque sani dolore capitis re-
 pentè capiuntur, & statim muti fiunt & ste-
 tunt, in septem diebus pereunt, nisi febris ap-
 prehēderit, &c. Et 3. prognost. cap. 7, Capi-
 tis dolor uehemens & cōtinuus cum febre, si-
 quidē ex indicijs extiterit exitiosis, lethali-
 admodum est, &c. Hoc idem etiam habet de
 coactis prænotionibus, & plura multa. Et 3
 prognost. cap. 12, Si quis per febrem nō exi-
 tiosam dixerit caput dolere, aut etiam tene-
 bricosum quid ob oculos obuersari, si uentri-
 euli dolor in eo extiterit, biliosa uomitio ade-
 rit, &c. Et post hæc tres capitis dolorum dif-
 ferentias assignat, ibi, Si quibus horum cœpi-

dolor, &c. lege fusius, & plura inuenies ad
hunc rem utilia. Arcul. Dolor capitis conti-
nuus, prolongatus, frequenter ad cerebri abs-
cessum, aut cecitatem egrum perducit. Itē,
cephalalgia in febribus continuis, quæ non
declinante febre remittitur, phrenitidem pro-
nunciat. Hippoc. 3. de morbis circa principiū,
cum grauis capitis dolor repente per exor-
ta mutum facit, præsertim cum temulentia,
hic in septē diebus perit. Habes etiam pluri-
a prognostica ex prædictione secūda ipsius
Hippocratis: quanquam esse Hippocratis li-
um falsò ascribant nonnulli, &c.

**Authores erronei dissentientes
circa dolorem capitis.**

Adserere, cephalæam à cephalalgia non
fferre.

Adserere, alterationem esse solam tan-
modo causam doloris, cum Auerrhoe.

Adserere, humidum quatenus humidum
ullo modo efficere dolorem.

Adserere, solutionem continui esse solam
modo causam doloris.

5 Adserere, quòd tenues urinæ dolores capitis significant.

6 Adserere, sectionem uenæ non in omni capitis dolore conuenire.

7 Adserere, reuulsionum modos esse sex tantum, & non plures.

Confutatio dissentientium circa dolorem capitis.

Ad primum: Gal. 3. de loc. aff. cap. 9, Constat quòd sicut in cephalalgia, ita & in cephalæa caput facillimè afficitur, arque hoc est ipsis commune: uerùm per cephalæam affectæ partes multò debiliores quàm in cephalalgia redduntur. Igitur intensè differunt.

Ad secundum: Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 1, Dictum est, ob dissolutionem continuitatis similarium partium dolorè oboriri: dissolunt enim erodentia, dissecantia, distendentia, & uehementer calefacientia & refrigerantia, &c. Si igitur dissolutio continuitatis causa est doloris, non ergo sola tantummodo alteratio, &c.

Ad tertium: Gal. in arte med. cap. 80, Al-

atur substantia à caliditate, frigiditate,
 humiditate, siccitate. Itidem adserit secundo
 Auic. in morbis ac. comment. 1, Igitur humi-
 dus alterando efficiet dolorem, quod intel-
 lendum est, si non per se, saltem hoc efficere
 per accidens.

Ad quartum: Auic. prima tertij, de uniuers.
 sod. Causa doloris aut est mala comple-
 xa, aut solutio continui, aut utraque, sicut in
 systemate. Itidem ait Gal. 12. meth. cap. 7,
 Nesse est, ut affectus, qui dolorem excitat,
 diuisio sit, uel alteratio, etc. Itidem in
 med. cap. 80, Igitur non sola solutio con-
 tinui est causa tantummodo doloris, sed etiam
 alteratio.

Ad quintum respondet Gal. aphor. 4. cō-
 m. 70. esse falsum, quod urinae tennes sint
 κεφαλικά, id est, dolorem capitis signi-
 ficates, etc.

Ad sextum: Hippoc. aphor. 5. aphor. 68,
 Denti partem capitis posteriorem in fronte
 uena incisa prodest: qua de re si non
 ratione euacuationis, ratione tamen auersionis
 si quis abscessus fiat, semper conueniet.

O. i.

Ad septimum: Gal. 5. meth. cap. 3, Reuulsio
in his quæ suprâ sunt omnibus, deorsum sem-
per agitur, sursum in ijs quæ sunt infrâ. Præ-
terea à dextris ad sinistra, sicuti ab ijs tur-
sus ad illa, similiter ex ijs quæ intus sunt ad
ea quæ foris habentur: & sic sunt sex modi.
Sed hic Gal. reticet modum de antè & retrò
quem aphor. 5. comment. 68. recitauerat, &
sic sunt octo.

De Phrenitidis descriptione.

Phrenitis duplex est, uera & notha. Vera
est inflammatio membranarum cerebri, cum
febre acuta, delirium & mentis percussione
inducens. Mendosa, quæ paraphrenitis dici-
tur, est non inflammatio cerebri uera, à con-
sensu totius uel alicuius partis dependens.
Phrenitidis tres sunt differentie, una, qua læ-
ditur cogitatio, & seruatur ratio & memo-
ria: secunda, in qua solum læditur ratio, ser-
uata imaginatione & memoria: tertia, in
qua læditur memoria, ratione & imagina-
tione seruata. Quarta etiam addi potest,
qua nihil horum seruatur. Si igitur imaginatio

o lœditur, tunc pars sincipitis læsa est: si
 memoria, pars occipitis: si ratio, medius uen-
 iculus, &c.

Loci consentientes de Phreni- tide & eius diff.

Gal. lib. finit. med. Phrenitis est mentis de-
 rium, cum febre acuta, ac floccorum colle-
 u & mentis emotione. Paulus lib. 3. cap. 6,
 φρενίτις φλεγμονὴ τῷ μυνώγιόν ἐστιν. Auic.
 ima tertij, tra. 3. cap. 1, Charabitus, id est,
 phrenitis est apostema calidum, in uelamine
 cerebri, subtili ac crasso, absque corpore cere-
 bi, licet quandoq; cerebro accidat. Vocatur
 nam ab ipso sirsen calidum. Quod uerò fiat
 in acuta febre, lege Hippoc. lib. 3. in epide-
 mis morbis, ibi, φρενίτις Græci dicunt, qui
 in febre acuta desipiunt: μαινέσθαι uerò,
 citra febrem insaniunt. Hoc idem sentit
 ul. 5. de sympt. cau. ubi inquit, delirium esse
 tantum principis facultatis deprauatum à
 quibus succis, siue à cerebri intemperie ortum
 habens: cui si febris accesserit, phrenitis uoca-
 tur, si citra febrem, mania, &c. Quod uerò
 O ij.

tres sint uel quatuor phrenitidis differentia
 innuit Gal. 4. de loc. aff. cap. 2. ubi inquit
 Tres sunt differentia, duæ quidem simplices
 ex quibus tertia componitur. Prima quacumque
 oculis offeruntur, quantum ad sensitiua
 notitiam pertinet, rectè iudicat, cogitand
 uerò à naturali iudicio aberrat. Secunda re
 ctè cogitat, sed à sensibus difformiter moue
 tur. Tertia, quæ simul & sensus & cogita
 tionis uitio laborat. De memoria amissa i
 hoc casu habes ex Galeno exemplum de quo
 dam, qui cùm matellam petiuisset, meiere ta
 men neglexerit, aut quum lotium emisisset
 matellam prode non meminert, &c. Quo
 uerò quarta species siue differentia addi po
 sit, habes ex Auicenna capite de signis cha
 rabiti. De his etiam mentionem facit Aet
 ser. 6. cap. 2. ibi, Proinde anteriore cere
 bri parte laesa, imaginatio solum perueriti
 tur, &c.

De causis phrenitidis.

Causarum aliquæ antecedentes, aliquæ
 coniunctæ. Antecedentes sunt, succi calidi, uel

ut sanguis & utraque bilis, in cerebri mem-
 branis penetrantes. Coniunctae sunt ijdem &
 succi inflammationem ad actum deducentes.
 Paraphrenitis uerò fit à uaporibus calidis
 & mordacibus, à toto uelut in febre acuta ad
 caput elatis. Interdum fit etiam à simplici &
 iusta alteratione, interdum affecto diaphra-
 gmate, uel alia quapiam corporis parte. Ve-
 rum ea quae à septo transuerso prouenit, adeò
 similis uerae phrenitidi existit, ut quis faciliè
 in hoc decipi possit, &c.

Loci consentientes de cau-
 sis phrenitidis.

Gal. 5. de sympt. cau. cap. ult. Phrenitis non
 solum ob calidos succos, uel calidiorum cere-
 bri temperaturam accidit, sed quum phle-
 monem in cerebro, uel in ipsius membranis ij
 succi pariunt, &c. Paulus lib. 3. cap. 6, Causa
 morbi est sanguis exuperans, uel biliosus hu-
 mor, interdum flaua bilis adeò perusta, ut in
 nigram degenerauerit, quae etiam grauissimam
 phrenitidem contrahit, &c. Gal. 5. de loc.
 aff. cap. 4, Atque delirare etiam solent non-
 O. ij.

nulli ob uitium, quod in ore uentriculi consistit, & febribus ardentibus, & pleuritid & peripneumonia: sed quæ ob septi transuersi accidunt deliria, non multum distant phrenitide.

De Phrenitidis indicia.

Quum tria sint phrenitidis indicia, præcedentia scilicet, demonstratiua ac rememoratua, de præcedentibus ac demonstratiua hic tantum mentionem facimus. Signa præcedentia sunt, uigilia prolixa, somnus turbulentus, obliuio agrestis, dolor capitis, promptitudo ad iram & odium, aluus adstringitur, urinae sunt tenues, biliosum humorem ad superiora petentem demonstrantes. Signa demonstratiua sunt sex, ut febris continua conclusa, magna capitis & oculorum grauitas uehemens in facie & oculis rubor, dolor capitis, horror luminis, & pulsus frequentia & duritie. Signa inter ueram & spuriam interstinguentia sunt, ut si quid ex dictis sex defecerit, non amplius sit uera, sed spuria. Præterea si ab altera corporis parte, uel à toto

in febris, fieret, tunc mendosa est: nam
 febre curata etiam ipsa curatur. Præterea
 mendosa statim fieri solet, uera autem pau-
 satim accedit. Signa causarum sunt, nam san-
 guine peccante, oculorum aderit rubor, uenæ
 inguine tumefactæ, risus, motus morbi uni-
 formis (uniformiter moueri inquam, quum nec
 de tertio in tertium, nec de quarto in quartum
 accessiōem habet) sanguis destillat ex nari-
 bus, somnus longus, imaginationes rubæ. Si-
 gna bilis sunt audacia, temeritas, oculorum
 ultusque flauities, uigilia multæ, lingua ar-
 iditas: qui uerò tam immaniter sæuiunt, ut coer-
 eri nequeant, ijs ab atra bili phrenitis pro-
 cedit. De signis quæ affectam particulam de-
 monstrant superius dictum est. Signa inflam-
 mationis in cerebro, aut in eius membranis,
 agnoscuntur ex dolorum ac oculorum affectio-
 nibus: nam maior est dolor, quum in membra-
 nis inflammatio existit, quàm in cerebro, etc.

Loci consentientes de signis
 Phrenitidis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 4. de omnibus his si-
 gnis.

gnis mentionem facit, ibi, Interdum uigiliæ præcedunt, & somnus manifestis imaginibus turbatus, ita ut clament & exilient: interdum adeo agrestis obliuio, ut ne meire, sed nec matrem cellam prodere meminerint, &c. Lege fusius & inuenies multa à me pridem recitata. Lege etiam in hoc capite differentiam inter ueram & mendosam phrenitidem.

De signis sex demonstratiuis loquitur Razes. 9. Almans. ibi, Quum aliquem febris conclusa continua inuasit, cum forti capitis & oculorum grauedine, & in facie atque in oculis uehemens fuerit rubedo, & capitis dolor, & horror luminis fuerit, & in pulsu uelocitas, & frequentia superfluitas, sunt certissima phrenitidis indicia. Quod si lingua fuerit nigra, uel citrina, & permisceatur intellectus, & multum fuerit alienatus, & multum uigilauerit, iam phrenitis perfecta est, &c. Sed Gal. 1. prorrh. comment. 4. à principio usque ad finem methodum inueniendi phrenitidis indicia docet, ubi quæ propria, quæ uel inseparabilia esse signa dicantur, facile intelliges. De paraphrenitide loquitur Pau-

lib. 3. cap. 6. ibi, Quæ consensu stomachi
 igitur, non est phrenitis, sed hoc solum pu-
 ta delirium. Facit etiam mentionem de signis
 causarum, ibi, Quibus sanguineus humor mor-
 bum facit, ij cum risu insaniunt: quibus flava
 bilis, ferociter, quibus atra, tam immaniter
 seuiunt, ut coerceri nequeant, &c.

De uera ac mendosa phrenitide loquitur
 etiam Cornel. Cels. lib. 3. cap. 18. ibi, Phrenitis
 dum demum est, quum continua dementia esse
 incipit: sed perfecta est, ubi mens imaginibus
 addicta est, &c. Idem Gal. aphor. 7. com-
 ment. 14, Desipientia agnoscitur loquentibus
 agentibusque nihil consentaneum rationi, &c.
 Rege etiam de his Hippoc. 3. de morbis circa
 principium, &c.

De cura ipsius phrenitidis.

Considerandum in primis, num facta uel
 fienda sit inflammatio: quod si non facta,
 prohibendum ne fiat, his uidelicet quinque
 modis. Primò, cum uictu tenui, ac alijs sex re-
 bus non naturalibus in contrarium ordina-
 tis. Secundò, reuulsione & deriuatione, uel si

adsit plethoria, euacuatione. Tertiò repul-
 sione. Quartò, sanguinis & aliorum humorũ
 alteratione. Quintò euacuatione. Regimen
 sex rerum non naturalium tale sit, primũ
 quiescat in aëre puro ac temperato, nec in
 thalamo sine picturæ: uictus sit in primis te-
 nuis, ad frigidum declius, abstineat à potu
 aquæ frigida, praesertim si morbus in septo
 transuerso fuerit, sed potus sit aqua hordea-
 cea cum oxymellite. Reuulsio fiet per sectionẽ
 uenæ cephalicæ. Deriuatio per hyruidines na-
 ribus applicitas, uel per sectionem uenæ in
 fronte, uel per caustica quædam, uesicatoria
 nuncupata. Euacuatio nimia existente ple-
 thoria fiet incipiendo à saphenis, deinde à
 communi & à basilica. Repulsio fiet per
 epithemata, instillationes, & cætera topica,
 prout suprâ relatum est in cura cephalæ
 calidæ. Epithemata fient cum oxyrhodino,
 quod uario modo parari solet. Nam aliqui
 aquæ rosacæ ad alia ingredientia portio-
 nem duplam immittunt, sicut R. aquæ ros. 3.
 viij. olei ros. & aceri ana 3.ij. Alij uerò uo-
 lunt, ut ex his tribus aliud sit sub duplum ad

reliquum, ut uerbi gratia, R. aquæ ros 3. viij. olei ros. 3. iiij. aceti 3. ij. Alex. uerò trac. quintam aceti partem oleo ros. adiungit. Altera- tio sanguinis uel bilis fiet per infrigidantia styptica, & hæc perficitur per cibum aut po- tum, per Iuleb aut syrupos uocatos aut confe- ctiones. Cibi sint frigidi styptici. Potus sit ui- num granatorum malorum, uel cydoniatus succus, omphacium, limones, & arantia ma- la. Iuleb sit rosaceum, uel cum aliquibus syru- pis concinnatum, miscendo unâ aquas uel de- cocta plātaginis, solatri, portulacæ, cichori. Vel sic paretur: Accipe syr. de aceto citri 3. iiij. sy. de papauere 3. ij. aquæ ros. florū nenu- pharis, cichori ana. 3. v. uini granatorū 3. i. uini cotoneorū malorum 3. v. fiat Iuleb cum sandalis rubeis aromatizatum. Syrupi sunt sy. de ribes, de limonibus, de succo acetosæ, sy. ro- saceus, uiolaceus, de papauere, de citro, de agresta, oxysachara. sy. de granatis. Confe- ctiones sunt, conserua ros. uiol. boraginacæ, diacoralis, diarhodā Abb. &c. Euacuatio fiet si morbus sit sanguineus, per sectionem uenæ, ut supra retulimus: si uerò biliosus, per phar-

macum cholagogum, quod fiet per electua-
ria, uel pilulas, uel potus, prout opus fuerit
de quibus supra in capite cephalææ fusi-
pertractauimus. Peculiaris tamē est aqua fri-
ctuum Mes. distin. 7, Antidotarij & infusu
rheubarbari, &c. At si inflammatio facta
sit, tunc duo erunt medendi scopi: alter ad ma-
teriæ fluxæ resolutionem, alter ad tollenda
symptomata. Resolutio materiæ ita fiet, pri-
mò, euacuando materiā exuperantē cū rheu-
barbaro, myrobalanis, uel pilulis iam dictis.
Secundò, resoluendo cum topicis temperata
caliditatis, sicut cum columbis, pulmone arie-
ris, & catulis scissis ac euisceratis, cum nati-
ua eorum caliditate, aut aduentitia, præser-
tim parata cum rebus anodinis, modicè ca-
lidis, ueluti sunt uiolæ, maluæ, melliloti, folijs
lauri, corticibus papaueris, camomilla, ane-
tho, folijs senæ, & stechade, &c. Remotio sym-
ptomatum fiet, si uigilia adsint, cum somnum
prouocantibus, ueluti cum syrupo de papauere,
cum lotionibus extrinsecis soporiferis, ut
cum corticibus capiti papaueris albi, cum
hiosciamo, floribus nenupharis, uiolis, ane-

ro, & cum folijs uitium, salicis, lactuca, mar-
ragora, rosarum, populi, &c. Vel cum semi-
bus papaveris albi, aut semiscrupulo pilu-
rum de cynoglossa, &c. Quod si retineatur
rina, eam provocabimus cum oleo scorpio-
um, inungendo circa uestica regionem, uel
in cataplasmate ex parietaria, &c.

Loci consentientes de cura, & primo de regimine.

Auicenn. prima tertiij, cap. de charabito lo-
quens, De regimine sex rerum naturalium in-
quit, Et fac eum quiescere in domo tempera-
ta, & in aëre puro.

Obiectio.

Aër esse debet frigidus, quum sit morbo co-
rarius, & cordis intemperiem magis euen-
iat. Quomodo igitur erit temperatus, ut
Auicenna?

Responsio.

Aër ratione morbi potestate debet esse fri-
gidus, sed non actu, quia poros ac meatus cu-
ius nimium constiparet: calidus uero nimium

caput replet, & resoluendo vires debilitaret. Quare magis temperatus esse debet quam frigidus. Hoc etiam habes ex Gal. 10. meth. & ex Alex. & Raze. 1. continentis. Mesues cap. de phrenit. & Auicen. loco citato, Dominus in qua locatur patiens, sit exuta à formis & succiditate: nam phreneticus intueri eorum magis diligit, & ex earum intuitu laeditur cerebrum.

Obiectio.

Quomodo hic luciditas prohibetur, quum Alex. cap. de phrenit. dicat, quod magis lucidus debeat esse aer, quam obscurus?

Responsio.

Si patiens ex tenebris timorem concipit, aut amoto lumine in imaginationes incurrat, aer esse debet lucidus: si uero e contra, in obscuro quiescat. Vide in hoc casu Cornel. Celsum lib. 3. ca. 18. De uictu loquitur Paul. lib. 3. cap. 6. inquiens: Cibus primum esto aqua mulsa, deinde ptisanæ cremor, & sorbitiones ex condro cum quadam dulci porione, ut rhodomellite. Panis quoque aqua lotus re-

te exhibetur, similiter intubum, lactuca cli-
 ca. Ab aqua frigida potu arcendi sunt, præ-
 fertim si septum transversum consortij lege-
 nalo dedisse originem cognoveris. Razes si-
 militer 9. alman. Nutrimentum eius sit aqua
 hordei, semel aut bis in die sumpta, secundum
 consuetudinē, quam in tempore sanitatis ha-
 buerit. Arcul. iubet ptisanam quater in die
 esse sumendam. Auicen. Incipe nutrire ipsum
 subtili nutrimento, ita ut sis contentus oxy-
 mellite: deinde permuta ipsum ad aquā hor-
 dei subtilem cum oxymellite, deinde permuta
 ad crassum, & cōsidera agritudinem & uir-
 tutem. Et loquens de potu, Aliena, inquit, eos
 ab aqua uehementis frigoris.

Obiectio.

Dogma Auicēnæ de cibandis agris omni-
 no contrariū uidetur Hipp. i. aphoris. Nam
 iubet quod à principio morbi uictus sit cras-
 sior, & uersus statum sit tenuior: hic uerò
 e contra iubet primū quod sit tenuior, &
 uersus statum crassior.

Responsio.

Modus cibādi in morbis acutis cum apo-

stemate est diuersus ab eo, qui tantum in
 morbis acutis sine apostemate fieri solet.
 Nam morbus acutus cum apostemate requi-
 rit in principio uictum tenuiorem, ut mēbra
 magis conficiant & retineant, & motus hu-
 morum ex hac retentione supprimatur: hoc-
 que habetur ex ipso Auic. fen. 16. cap. de cu-
 ra fluxus cum excoriatione, & cap. de ti-
 nesmo. Sed in alijs morbis acutis seruatur di-
 ctum Hippoc. De diuersione ac sectione uenæ
 loquitur Gal. 13. meth. cap. 21. ibi, Itaque in-
 cidenda est in talibus affectibus uena statim
 ab initio, si modò tam ualens fuerit uirtus,
 ut sine noxa missionem sanguinis toleret. Et
 paulò post, Et hoc utrique uitio cōmune est,
 & ei quod cum sopore, & ei quod cum uigi-
 lijs incidit, &c. Similiter Mes. cap. de phren.
 In primis si nihil prohibeat, phlebotometur
 cephalica, deinde phlebotoma uenas frontis,
 uel sanguisugas naribus applicato, &c. Ra-
 zes. 9. alman. A Egro igitur, antequam præ-
 dicta compleātur accidentia, est subuenien-
 dum ex sanguinis deiractione, & uentris so-
 lutione cum succo fructuū, &c. Aduerte quòd

IN CVR. MORB. LIB. II. 225

Azaravius non vult fieri sectionem uenæ in biliosa phrenitide, sed tantum hemorrhoidarum prouocationem. Auic. prima tertij, cap. de cura charab. Fiat phlebotomia ex cephalica, & egressio sanguinis aliquantula, imò multa ualde: deinde phlebotoma uenas frontis, &c. & cum phlebotomaueris, tum oportet ut ipsum clysterizes clysteri ualde leni, cum oleo scilicet rosaceo & aqua hordei, deinde trahere materiam ad interiora cum fricatione pedum, &c.

Obiectio.

In principio morbi conueniuntne frictions?

Responsio.

Dico, quòd repletionem imminente, ne materia plus agitetur quàm auertatur, non concitat, sed remota hac causa, si fuerint debiles frictions, & à longinquis partibus in præ, fortè conducent, &c. De hac sectione omnes ferè practici loquuntur. Similiter Cor. l. lib. 3. cap. 18. ibi, Quòd si uires patientis ægri, sanguis quoque mittendus. Itidem Aët. ser. 6. cap. 2. &c. De repulsione lo-

P. i.

quitur Gal. 13. meth. cap. 21. ibi, Communis
 præterea utriusq; est, ut oxyrrhodini in prin-
 cipio admoueat, &c. Similiter Aulc. prima
 tertij, cap. cit. ibi, Et pone super caput eius
 in principio oleum rosaceum cum aceto, in
 frigidatum niue, &c. & oportet ut in prin-
 cipio administres repercussiva pura, nisi si
 de genere magno, ex quo apostemantur uen-
 quæ sunt extra caput, &c. Nam in morbo
 augmento pura non conueniunt, sed cum re-
 soluentibus mixta, &c. Itidem fatetur Cor-
 Cel. loco citato, ibi, Conuenit caput ad cu-
 tem tondere, &c. De alteratione per syrupum
 & confectiones habes plura ex Mes. Arcul.
 Marc. Cat. sauonarola, &c. Similiter de ob-
 uacuatione: nam Arcul. Si cholera fuerit
 causa, euacuabis eam cum medicina lenient
 quæ etiã digesta materia erit reiterada, &c.
 De remotione accidentiũ loquitur Cor. Cel.
 lib. 3. cap. 18. ibi, Si nihilominus uigilent
 quidam somnum moliuntur, potui dando
 quam, in qua papauer aut hyosciamos d-
 cocta sit. Et paulò post, Seruanda est alu-
 quàm tenerrima, remouendi terrores, & p-

cius bona spes afferenda, quærenda delectatio ex fabulis ludisque, quibus capi maximè sanus assueuerat. Paul. lib. 3. cap. 6, Quòd si urina ipsis delirij uitio cohibeatur, calens hydrelei imbre pubem & uesticam fouebimus. Itidem ait Auic. loco citato, Inungens oleo pubem tepido.

Obseruationes de venæ sectione.

Auic. prima tertij, cap. de charab. inquit, quòd phlebotomia fieri debet ex cephalica, seruatis quatuor conditionibus. Prima, quòd nihil sit quòd prohibeat, sicut tempus anni, etas, robur uirtutis, &c. Secunda, quòd coiosa fiat, si à sanguine phrenitis dependet: pauca si ab alio humore, ibi, Cholericum indiget in sui cura educatione cholerae plurima, & phlebotomia minore, & cum cautela, &c. Tertia, quòd cauenda est syncopis, ut ne actu accidat. Quarta, quòd sit autela in ligando, ne ex magna commotione fieret hypospasma, id est uenæ ruptio. Ialy abbas unum tantum aduertit, ut ne post
P. ij.

tertium diem sui euētus fiat uena sectio. Hoc idem uidetur attestari Hippoc. in eo aphorismo, Medicari in ualde acutis, si materia surget, eadem die: tardare enim malum est. Auic. loc. cit. uidetur etiam innuere, quòd uniuersalis uenæ sectio particularem præcedere debeat, obseruatis tamen tribus conditionibus: prima, quòd uirtus sit ualida: secunda, quòd dispositio capitis hanc requiratur: tertia, quòd seua accidentia non adsint, &c.

Obseruationes de repulsione.

Auic. de cura charab. Conuenit oxýrrhodium niue infrigidatum & non calidum.

Obiectio.

Quomodo frigidum, si Aët. ser. 6. cap. 2. dicat, Caput rosaceo tepido irrigetur, nam in cerebri membrana inflammata frigiditas rosacei non est cura?

Responsio.

In phrenitide duplex esse potest medendi scopus quatenus ad topica, alter scilicet ad

inflammationem, alter ad reliqua indicantia. Si igitur ad inflammationem tantum sit tua intentio, tunc oxyrrhodium convenit aetui frigidum, si ad reliqua indicantia, tepidum, &c.

Observationes de euacuatione.

Mes. in cholericaphrenitide, Statim fiat euacuatio cum aqua fructuum, nec in mora sit medicus: nam induciae non dantur in praeparanda materia: unde uersus, inocha cum colica, phrenesis, squinantia & anthrax,

Materias crudas euacuare iubent.

It de topicis loquens, inquit: Scito quod sanguinea indiget resolutione plus, & extinctione minus, cholericam uero e contra: hoc enim ait Auicennas.

De prognosticis phrenitidis.

Hippocr. aphor. 6. aphor. 53, Desipientes, quae cum risu fiunt, securiores: quae uero in studio, periculosiores. B. Securius, id est, minus periculosa, & haec fit à sanguine: sed haec fit à flaua bile, timor est ne exusta insa-

P. iij.

niam satis furiosam generet, &c. Et aphor. 2. aphor. 2, Vbi somnus delirium sedat, bonum. B. Hoc delirium non fit patiente cerebro, sed tantum à caliditate nuda. Vnde mirum non est, si id somnus de medio tollat. Et aphor. 7. aphor. 12, A pulmonis inflammatione phrenitis malum. B. Etiam econtra malum est, si ex phrenitide inflammatio pulmonis sequatur. Verum quod tunc phrenitis mala est, quum ad cerebrum permutatur, uel si adeò excrescat, ut meningæ cerebri patiantur. Galen 3. de loc. aff. cap. 7, Phrenitis mitior est, quum à pallida bile ortum contraxit: uehementior, quum à flaua: ferina uerò, quum à flaua bile perassata. Hippo. prognost. 1. cap. 9, Qui in febre acuta, aut delirio, aut pulmonia, aut capitis dolore, manus subinde ad os fert, aut frustra uenatur muscas, aut colligit festucas, aut euellit pilos, id exitiale est. B. Lege fusius Gal. comm. de delirio. Et Hippo. aphor. 4. aphor. 72, Quibus urine albæ & perspicuæ, malæ, præsertim si in phreneticis appareant. Et Auicen. prima tertij, cap. de charab. Nullus uisus est habens apostema in partibus ce-

reberi, cuius urina fuerit aquosa, qui euaserit. Nā tunc aquosa esse dicitur urina, quū, teste Gal. perspicua simul sit & alba. Hæc enim magnam cruditatem ac flauam bilem ad caput solummodo rapi ostendit, &c. Mesu. cap. de phrenit. Cura huius egritudinis, si iam impressa, cassa est: si uerò adhuc perfecta nō est, curatur, sed non apud negligentes & stultos medicos, &c.

Authores erronei dissentientes
circa phrenitidem.

- 1 Adserere, cerebri substantiam nullo modo posse inflammari, ut Serapio.
- 2 Adserere, phrenitidem absque febre fieri posse.
- 3 Adserere, paraphrenitidem à nuda caliditate non posse effici.
- 4 Adserere, phrenitidem à sanguine exortam, non esse signum periculosum.
- 5 Adserere, aquam frigidam in phrenitide posse exhiberi, ut Razes.
- 6 Adserere, in omni phrenitide sectionem uenæ non conuenire.

P.iiij.

Confutatio dissentientium circa phrenitidem.

Confutat primum Auicen. cap. de charab. dicens: Quidam medicorum existimant, quod ipsum cerebrum non apostematur, quia quod lene est ut cerebrum, uel durum ut ossa, non extenditur, & sic non apostematur. Sed hic sermo est erroneus, quoniam lene uiscosum extenditur, & ossa etiam apostemantur, &c. Quod intelligendum est per uiam congestio- nis, non autem per uiam rheumatis: & hoc idem sentit Auer. 4. collig. & Gal. 6. aphor. comment. 53. ibi, Fiunt omnes patiente cerebro, &c.

Ad secundum: Gal. 3. de loc. aff. cap. 7, Igitur quemadmodum phreniticis febris unum quoddam accidens dispositionem cerebri cēsetur, sic econuerso in ardentium febrium demencia, multis elatis ad ipsum uaporibus. Idem sentit Hippoc. in Epid. mor. & Galen. 5. de Sympt. cau. &c.

Ad tertium: Gal. 6. aphor. comment. 53. loquens de paraphrenitide, inquit, Quaecunque enim ex sola caliditate sine humore uirioso

fiunt, similes quodammodo sunt eis, quæ ex ebrietate contingunt. Igitur quædam fiunt à vana caliditate.

Ad quartum: Gal. aphor. 2. comment. 2, Sed satis fuit ei periculosissimum morbum phrenitidem nominare. Et aphor. 6. comment. 53, Nulla, inquit, desipientia secura est. Igitur nec à sanguine exorta.

Ad quintum: Auic. prima tertij, cap. de pharab. & Alex. cap. de phrenit. Gelida autem aqua, quoniam parum frugi, omnino vitanda: nam internæ phlegmoni nocet, deliriumque auget, & omnia in deterius conuertit, materiæ quæ resolutionem prohibet, & nervis nocet: & sic nullo modo convenit.

Ad sextum: Conveniunt Alexan. Razes & alijque omnes, quod fieri debeat, si non evadendi, saltem revellendi gratia, & hoc in principio morbi, cauendo ut supra.

De Lethargi descriptione & loco affecto.

Lethargus est dormiendi inexpugnabilis quædam cupiditas, eoque λήθαργος dictus

est, quod ab accidente, id est, ab obliuione frigidum cerebri apostema sequente fiat. und
 Et aliàs. Veteranus morbus uocatur, eò quò
 qui tali egritudine laborant, eterno uel in
 sopore afficiantur. Fitque hic morbus uel i
 meatibus substantiæ cerebri, Et hoc utpluri
 mum: uel fit in pāniculis, uel in eius substan
 tia, Et hoc rarò admodum contingit, in uen
 triculis uerò cerebri nequaquam. Quòd si fie
 ri contingat, non amplius lethargi nomen
 sed potius apoplexiæ uel epilepsiæ obtine
 fitque utplurimum in occipitio, interdum i
 sincipiti, uel in medio, sed rarò admodum.

Loci consentientes de lethargo.

Gal. lib. finit. med. Letharg⁹ est delatio i
 somnum non facilè excitabilem, quæ cum co
 loris uitio Et flatuoso œdemate, nec sine ipsa
 rum quoque solidarum partium repulsif
 spiritus languore prouenit fere indebili febr
 ac maligna. Auicen. prima tertij, cap. 16, Le
 thargia dicitur apostema phlegmaticum in
 tra cranium factum, Et est sirsen pituitosum
 etc. Et hæc quidem egritudo nominatur no

ine sui accidentis, id est ab obliuione ap-
 tema cerebri sequente, &c. Cel. lib. 3. cap. 20,
 in lethargo marcor est, ac inexpugnabilis
 enè dormiendi necessitas, &c. De loco laeso
 loquitur Paul. lib. 3. ca. de leth. ibi, τὸ πον μὲν
 ἔστι τὸν τῆς φρενὸς φησὶ τὸ ἐκείφθον,
 &c. Auicen. prima tertij, cap. 16, Et pluri-
 mum quidem fit in meatibus substantiæ ce-
 rebri, & rarò in uelaminibus & substantiis
 cerebri, quia phlegma rarò penetrat panni-
 culos cerebri, propter eorum duritiẽ & pro-
 pter eius uiscositatem, &c. Galen. 3. de loc.
 ff. cap. 5, In lethargo & in omnibus so-
 rosis affectionibus ratio & memoria per-
 unt. Quare quum memoria in occipitio, &
 ratio in medio uentriculo reponatur, hoc se-
 ui necesse est, lethargum scilicet plerunque
 in his duobus locis contingere, &c.

De lethargi causis.

Quum cerebrum primario affectu laborat,
 inas tantum causas antecedentes & con-
 iunctas habere dicitur, ex quibus procata-
 ricæ intelliguntur. Antecedentes sunt uehe-

mentia frigora cum multa humiditate com-
plexa, sicut in pituita & in nimia repletio-
ne cernitur. Vel antecedentes dicuntur quae
cunque pituitosum humorem generare pos-
sunt, sicut comestio fructuum & ceparum
aut nimia potio. Causae uero coniunctae sunt
humores lethargum ad actum producetes:
uero cerebrum per consensum afficiatur, tum
uel fit ex mutatione alicuius acuti morbi, ue-
lut à phrenitide & à febre continente, uel
stupefacientibus pharmacis nimis refrigeran-
tibus cerebro adhibitis, aut fit à diaphrag-
mate, uel ab aliquo alio uiscere affecto. Ve-
rum igitur lethargus à pituita tantum fit, no-
tius uero à pituita cum bile admixta, in ca-
pite putrescente, oboritur, unde symptomata
habet etiam admixta.

Loci consentientes de causis lethargi.

Gal. 3. de loc. aff. cap. de morb. comit.
Lethargus or. um trahit à uehementi frigore.
Et 2. ap. Ebor. comment. 3, Somnus, inquit, fit
refrigerato primo sensitivo, id est, cerebro,

quæ refrigeratio si mixta fuerit humiditati,
 facit lethargicas passiones, si cum siccitate
 καταληΐσται. Et 4. de sympt. cau. cap. 8, Fit
 lethargus à frigida multaque humiditate
 trauante. Vide etiam Gal. 2. de loc. aff. cap.
 11. Nam ibi quorquot, inquit, affectus sunt
 oporosi ac somnolenti, tot omnes à frigida
 causa oriri. Idem 3. de loc. aff. cap. 5, Pau-
 lus lib. 3. cap. de leth. Ex pituita quæ frigore
 imio & humiditate cerebrum imbuerit, con-
 trahitur. Auicen. prima tertij, cap. 16, Et hæc
 gritudo generatur ab omni quo generatur
 humor phlegmaticus, & in quo sunt euapo-
 ratio & putrefactio, &c. Et plurimum, in-
 uit, generatur ex comestione ceparum, & ex
 imia repletionem stomachi, & multitudine
 ptus, & comestione fructuum intellige fri-
 dorum humidorum.

Obiectio.

Quur damnat cepas Auicen. quum ex sua
 soliditate potius proficere, quàm nocere de-
 rent?

Responsio.

Considerat in cepis duas esse partes, quas-

dā scilicet crassas, ex quibus pituita generatur, & quasdā acres, quæ euaporationē ad caput mittunt, quæ simul unitæ potius capiti nocēt, quàm prosunt. De causis per cōsensum loquitur Aēt. ser. 6. cap. 3, Fit lethargus ex mutatione alicuius acuti morbi, ut ex phrenitide, & à continente febre, & ex alijs plurimis morbis, in quibus præsertim euacuationes sequutæ sunt, &c. Galen. lib. finit. med. Lethargus euenit partim affecto principio id est, cerebro, partim abscessu. Alexan. lib. 1. cap. 20, Si pituita sola deliquerit, lethargian ueram introducit: notham uerò pituita cum bile mixta in capite putrescente, & sunt in ea symptomata permixta.

De lethargi indiciis.

Indicia lethargi sunt 13. ut dolor leui quasi extendens, febris lenta, somnus grauis, obliuio uehemēs, respiratio imbecillis & rara, crebra oscitatio, singultus ob stomachi cōsensum, albedo linguæ, pigritia in motu palpebrarum, pulsus rari & tremuli, aluus interdū humida, interdū, sed rarò, arefcit, urii

nae quales iumentorum, interdum tremores & sudores apparent, &c.

Discrimen phrenitidis & lethargi ex Auicenna.

Uterque affectus similis in hoc esse uidetur, quod patientes aliena ac uaria loquuntur. Differunt uero quadrifariam: primo, quia in lethargo somnus est grauis, in phrenitide paucus uel nullus: secundo, lethargici in suis lectis praecipitati iacent, phrenetici resurgunt: tertio, in lethargo pars posterior, in phrenitide anterior laeditur: quarto, in lethargo est febris lenta, leuiusque dolor capitis, in phrenitide uero uehementia sunt omnia, &c.

Discrimen lethargi & apoplexiae, syncopis & uteri strangulatus.

Differit lethargus ab apoplexia ex eo, quod lethargus paulatim ac pederetim fiat: apoplexia uero statim. Differit ab uteri strangulatu, quum excitatus respondeat, strangulata minimè. Differit à syncopi, quum in le-

ihargo facies sit niuida, in syncope uel
 mortua. Differit à subet & congelatione p
 febrem, quæ nec in subet uel congelatione
 accidit, intellige, præsertim si ægri tudines e
 non accidentia per se sint.

Loci consentientes de signis lethargi.

Paulus lib. 3. cap. 9, In lethargo adest fe
 bris lenta, non admodum acris, cum anim
 in somnum profunda delatione, pulsus man
 gni, turbulenti, respiratio rara & imbecilla
 & cætera omnia à me exposita. Auic. simili
 liter prima terrij, de signis leth. ibi, Soda le
 nis, febris lenta, necessaria enim est febris in
 omni apostemate facto ab humore putrefa
 cto: & propter hoc separatur à subet, &c
 Vide insuper Gal. 5. de loc. aff. cap. de sept
 transuersi affectibus, & 3. de loc. aff. cap. 5
 Itidem Aet. ser. 6. cap. 3. ibi, Proinde consi
 derare oportet speciem delationis in somnū
 &c. De signis discriminū lethargi cū phre
 nitide, apoplexia, & cæteris similibus legi
 ex Auicenna. Arcul. Sauonarola, & ab ipso
 Gordonio.

De lethargi cura.

Scopi in curando lethargum quinque enumerantur, primus euacuatio, secundus reuulsio, tertius materiae repulsio, quartus symptomatum emendatio, quintus victus ratio instituenda. Euacuatio, si adsit repletio, aut cuncta cum sanguine abundauerit, fiet per sectionem uenae cephalicae: quod si minus sanguis redundet, per phlegmagogum, per secesum, uel per uomitum educens moliri potest. Lucunt pituitam hiera simplex, hiera composita, pilula chochiae, electuarium indum, quaecunque in cephalaea ab humore frigido exarata sunt. Vomitus fiet ex decocto hyssopi cum sesquiuncia oxymellitis scillitidis. Reuulsio fiet per cucurbitulas, loriones, clysteria, quae multum in hoc casu laudantur, frictiones, ligationes, &c. Clysteria parantur ex rebus ad caput spectantibus, sicut decocto salviae, maioranae, ruta, betonicae, rhados, cui mellis rosacei tres unciae, & totum olei communis adiectae sint: uel si acris fueris, adde praedicto decocto radicem cyclaminis, colocynthidos, cartami, centaurij

Q. i.

quantum lubet, addito etiam sale gmeo, aust-
 hiera composita, electuario indo, &c. Lo-
 tiones fiant ex prædictis rebus à cubito ad
 extremam manum, & à genu usque ad plan-
 tas pedum, &c. Repulsio materiæ perficitur
 per exteriora & interiora. Per exteriora in
 principio repellentia, per interiora materia
 præparantia. Exteriora in principio repel-
 lentia sunt oxorrhodinū: in augmento repel-
 lentibus adde resoluentia, ut est aliquid ca-
 storei, & à medio statu usque ad lethargi
 declinationem resoluentibus puris utendum
 sicuti est emplastrum Mesues, quod recipi-
 piretri, sinapis, scillæ, castorei, euphorbiæ
 &c. Interiora materiam præparantia sunt
 Syrupus de stechade, oxymel scilliticum, rho-
 domel, & cætera quæ dicta sunt in capite
 phalææ ab humore frigido, cum aquis uel
 decoctis saluæ, stechados, maioranæ, hyssop-
 pi, betonicæ, &c. Emendatio symptomatum
 fiet per ea, quæ à somno profundo agrum re-
 uocant, ut est fumus humorum capillorum, in
 frictio pedum cum aceto, sale, uel farina si-
 napis, uel cum succo rutæ, aceto & sale. R.

cat etiam à somno pilorum euulsio partiū
 feriorum, clamor & tumultus: obliuio uerò
 quendi, mingendi, ac egerendi, incitando,
 sicam comprimendo, oleis que aspergendo,
 umbráque inferiora uehementer comprimē-
 , reuertitur. Victus sit tenuis, incisorijs ac
 icans, cum condimentis quibusdam para-
 , ut panis contritus in aqua cum saluia,
 tico pipere, uel cinnamomo, uel ptisana, sa-
 uel pulegio uel oxymellite parata, uel
 ua cicerum uel lupinorum: potus sit hy-
 mel. In declinatione morbi uictus sit qui
 us recolligat ac recreet: unde dandum est
 um aquosum, tenue, album, subadstringēs.
 nes sint gallinarum, columborum, mon-
 arumque auicularum, pisces petrosi, olera
 porri, asparagus, petroselinum, &c. Aër
 lucidus, splendidus, domus tepida, somnus
 permittatur nisi per mediam horā, dein-
 excitetur, ita ut de media in mediam ho-
 a dormiat & excitetur: frictiones uicem
 pleant exercitiū, &c.

Q.ij.

344 DE CONSEN. MEDIC.

Locī consentientes de cura lethargi.

De omnibus his ferè intentionibus loquitur Galen. 13. meth. cap. 21. & primū de euacuatione, ibi: Incidenda est in talibus affectibus uena statim ab initio, si uirtus ualeat, &c. De humorum preparatione, ibi: Excitare eos oportet, & crassitiem humoris incidere & excalescere, incoquemes in aceto thymum, & pulegium, & origanum, &c. De deriuatione, ibi: Mox palatū ualentibus & acribus medicamentis ungemus, deinde sternutamentis utemur. De repulsione, ibi: Tum capiti similes præsidiōrū facultates imponemus adaucta semper eorum usque ad ipsum sinapi uehementia. De reuulsione, ibi: Quinetiam cucurbitulis utemur, &c. De euacuatione loquitur Auicē. etiam prima terciū, cap. de cu leth. ibi: Si nō fuerit quod prohibeat, phlebotometur prius: & si alia fuerint tibi necessaria, da ei ad potandum hieræ picra, 3. i. & quartam unius drachmæ de pulpa colocynthidos, & tres drachmas myrobalanorum & dauidic unum mastice. Aet. ser. 6. cap. 3, Si sa

quis fuerit redundans, secetur uena, & pro ui-
 ribus euacuetur. De reuulsione loquitur Paul.
 lib. 3. ca. 9, ibi, Si minus sectio uenæ competit,
 ius loco clysterijs acribus aliu ducemus. A-
 ria enim huc spectant, quia tū febris mitis est
 & lenis, tum quia materia crassa, non apta
 luere, in ueniculo coninetur, à quo clystere
 secutum diuertit & euacuat. Similiter Auicē.
 oc. cit. Administra eis clysteria acuta, & tra-
 iatur materia ad inferiora, & fac cum uo-
 nere cum penna melle & sinapi illita, & fri-
 a extremitates eius donec rubescant & do-
 rant, &c. De repulsione & materia præpa-
 ratione loquitur Auicē. cap. cit. & in prin-
 cipio, Repelle materiam cum oleo rosaceo &
 ceto, & post duos dies à principio sui mi-
 neatur eis castorium, &c. Alex. lib. 1. ca. 20,
 inuersam curationem capiti applicare o-
 rteret, quò uapores, qui eò deferuntur, prom-
 tius supprimantur. Danda est insuper ope-
 s, ut humores ibi coacti concoquantur, inci-
 antur, & dissipentur, &c. De sympt. emen-
 atione facit mentionem Cels. lib. 3. cap. 20.
 i: Hos quidam excicare nituntur admotis

Q. iij.

his, per quæ sternutamenta euocantur, & h
 quæ odore fædo mouent, qualis est pix crudi
 lana succida, piper, ueratrum, &c. Auicenna
 loco cita. Quum in subet profundi fiunt, eu
 le capillos eorum, & pone apud nocram uen
 rosas multas cum igne & absque incision
 & quum eis acciderit obliuio urinæ & ster
 coris, embroca utraque emunctoria, & uen
 trem cum decocto camomillæ, melliloti, ui
 larum, & comprime uescicam, &c. De uictu
 ratione instituenda lege Aet. ser. 6. cap. 3. ibi.
 Cibi porro sint tenues, & incisori, ac res
 cames, & cum condimentis parati, aniso, ci
 mino, apio, pipere: sunt tamē qui anisum da
 nent, quum sit somniferum. Paul. lib. 3. ca.
 etiam de his loquitur, ibi, Alimentum sit cro
 mor ptisanæ cū oxymellite, uel salibus, uel p
 legio, & hoc in principio. Nā in declinatio
 ne uictus sit qui uires recolligat, &c. Auicenna
 loco cita. Et quum nutris, nutri eos cum ali
 quibus quæ sint sicut aqua lupinorum, cic
 ris cum hordeo fracto: deinde quum finiti
 ægritudo, administra restaurantia. Lege su
 sius hos authores, & plura, quæ hīc recita

non possunt, inuenies, &c.

Lethargum generantia.

Cepe, oximum, semina nigri & albi papaueris, poma mandragora.

De prognosticis lethargi.

Hippocr. aphor. 2. aphor. 1, In quo morbo somnus laborem facit, mortale: si uero iuuat, non mortale. B. intellige somnum, quatenus somnum, non esse mortalem, sed quatenus accidens alicuius morbi. Et aphor. 2. aphor. 3, Somnus atque uigilia si modum excefferint, malum. B. Excedit modum tripliciter: primo ex parte quantitatis, unde multus uel deficiens malus: secundo ex parte qualitatis, qualis est somnus inexpugnabilis & superfluus, cerebrum infrigidans & humectans: tertio, ex parte temporis, qualis meridianus & nocturnus. Auicenna prima tertij, cap. de signis lethargiae, Quumque fortia fuerint accidentia lethargiae, & multiplicatur sudor ualde, est tunc perimens, propterea quod sudor deicit uirtutem, & quum spiritus dilatatur & fit bonus & declinant

Q. iij.

accidentia, tunc tēdit ad salutem, & proprii
 si apparēt apostemata post aures, &c. Cels
 lib. 3. ca. 20, Lethargus est de genere acuto
 rū, & nisi succurratur, celeriter iugulat, &c.
 Authores dissentientes circa leth. &
 vertig. quare infra.

De vertigine.

Τὸ σκοτοματικὸν πάθος, id est affectus sc
 otomaticus, qui & uertiginosus dicitur, quip
 sit, ex ipsa appellatione manifestatur. Est e
 nim scotomaticus is dicendus, cui obtenebra
 tiones contingunt, ac ei uidetur caput circū
 ferri, ita ut firmari non possit, sed parua oc
 casione cadat. Differt uerò uertigo à scoto
 matico affectu, eò quòd omne scotoma uerti
 go sit, sed non econuerso. σκότμα dictum
 Latine turbo, à σκοτῶμαι, id est uertiginor
 siue à uerbo σκοτῶ, id est obtenebro, siue à
 σκοτίζω, id est obscuro: obscuratur enim pra
 caligine oculi, ut nihil uideant. Sed in uerti
 gine simpliciter dicta res uidentur tantum
 circumuolui, absque casu & tenebris. Diffe
 runt etiam in causis, ut infra uidebitur.

Loci consentientes de vertigine.

Galen. aphor. 4. comment. 17, Vertigo est quando simul videtur circūuolui quacunque conspiciamus, & sensus uisus derepente destrui-
 ur, quum uideatur tenebra circumfusa. Auic. prima tertij, tra. 5, Vertigo est, ut habens
 sam imagnetur quod res super ipsum uol-
 untur, & quod eius cerebrum & corpus
 sius reuoluantur: quare non regit se ita ut
 metur, imò cadit, &c. Ba. Intellige scoro-
 aticū affectum (& si nulla de tenebris fiat
 entio) hīc ab Auic. definiri, sub quo uertigo
 inquā minor dispositio cōtinetur. Definitur
 rō uertigo à Raze hoc modo, Razes 1. com-
 en. ca. 2, Vertigo est dispositio, in qua appa-
 ret res reuolui, & tamē homo non cadit, sed
 git se, &c. Ba. Adde, sed perseverāte morbo
 utius ex facili occasione concidit, maximē
 in circulū circūuertatur. Vnde Gal. 3. de
 c. aff. A parua occasione hebetantur, ita ut
 terdum cadant, si circūrotentur. Hoc idem
 ferit Paul. cap. proprio, &c. & Aët. ser.
 cap. de uertig.

De vertiginis causis.

Causa uertiginis primitiua sunt omnes res præter naturales, ex quibus uapores crescant si egredientes, ut cepa, uinum, cerebrum melle afficiunt. Similiter uua in sole, mala in temperies, capitis percussio, aut cranij fractura solita, excretiones retenta, cruditas ebrietates, & consideratio rerum quæ circumaguntur. Antecedentes sunt omnes humores, à quibus uapores eleuantur, qualis utraque bilis, pituita & sanguis. Coniuncti sunt uapores spiritibus admixti, existētes autem in regione uisus. Hæc affectio etiam per consensum alicuius partis uel totius fieri potest ex uaporibus ad caput elatis, aut ex ore uentriculi à malis humoribus morso, ab iisdem causis denique prodeunt uertigines, à quibus morbus comitialis, & easdemet sedes occupant, &c.

Loci consentientes de causis vertiginis.

De causis primitiuis loquitur Galen. 3. locis aff. cap. 8. ibi, Id maximè accidit, quod

uel sub sole aestuauerint, uel aliam ob causam
 calefacto fuerint capite, aut ex calido uapo-
 rosoque spiritu caput opplente, &c. Aët. ser.
 6. cap. 7, Facile capiuntur ab hac affectione,
 quibus consueta excretiones sunt oppressæ,
 sed & cruditas & ardores assidui, & ebie-
 rates affectionem hanc efficiunt. Auic. prima
 tertij, cap. de cau. uertig. Fit propter consi-
 derationem ad res quæ uoluuntur, ita ut fi-
 gatur forma illa sensata in anima. Et pau-
 lo post inquit, Interdum fit à malicia com-
 plexionis, & fit ex motore spiritus exterius,
 sicut ex percussione capitis & fractione cra-
 nii, &c. De antecedentibus causis lege Gal.
 aphor. 3. comment. 27. ibi, Quotidianæ con-
 stitutiones, &c. ubi inquit, Fit uertigo ab hu-
 more cum spiritus crassitie in capite moto,
 deoque proxima est comitialibus morbis &
 poplexijs, &c. Paul. lib. 3. cap. 12, Nasceitur
 uertigo, quum frigidus & glutinosus humor
 erebrum occupat, &c. Auic. prima tertij,
 ra. 5, Vaporis materia quandoque est cho-
 lera, quandoque phlegma, & uertigo phleg-
 matica similis est epilepsia, &c. De atra bile

Et sanguine non meminit, nisi ubi de signa
 uertiginis loquitur. De causis coniunctis lo
 quitur Gal. aphor. 3. comment. 31. ibi, Verti
 gines accidunt propter spiritum uaporosum
 qui in partibus cerebri inordinato motu ci
 tur, &c. Auic. prima tertij, cap. cit. Ex caus
 fit corporeis presentibus in uacuitatibus ci
 rebri, contentis in ipso ex uaporibus prom
 nentibus in uenis, quæ sunt in ipso & ner
 uis, &c. De causis per consensum plura ha
 bes ex Gal. aphor. 4. comment. 17. ibi, Fit a
 ore uentriculi à malis humoribus morso, &c.
 Item aphor. 3. comment. 31. ibi, Aut in uen
 triculo uitiosis superfluitatibus acernatis a
 cerebrum fertur exhalatio uaporosa. Ita
 3. de loc. affect. cap. 8, Oribasius aphorif.
 comment. 20. de hac re mentionem & ipse fa
 cit, ibi, Sicut uentus sese eleuans, & puluerem
 in sublime rapiens, &c. Auic. prima tertij
 tra. 5, Et quandoque fit ex uaporibus ascen
 dentibus ad cerebrum, &c. lege eum fusius
 nam ibi enumerat omnes partes, à quibus
 extollere potest. Gal. in lib. qui introductus
 siue medicus nuncupatur, Caligines, inquit

ulis offusae & uertigines cognatae sunt uitiis
orbo caduco, ab iisdemet causis prodeunt,
que easdem sedes occupant, &c.

De signis vertiginis.

Indicia quae distinguunt utrum primario
fectu, an per consensum efficiatur uertigo,
tria sunt: primum non praecessit alterius
umbri nocumentum: secundum est uertigo
adua, quae non excitatur ex repletione al-
ius membri, nec remouetur ad alterius
umbri euacuationem: tertium, quia omnes ferè
suum actiones laesae sunt. Si igitur alterius
umbri lesio praecesserit, ad cuius incremen-
tum uertigo augeatur, & ad eius decrementum
crescat, & ad eius ablationem auferatur,
tunc per consensum est. Vbi igitur per consen-
sum in uentriculi fieret uertigo, tunc praecedet
ma concoctio, appetitus deiectio, graui-
tas, nausea, uomitus, & anxietas quaedam
machica, dolorque erit in anteriori parte
cerebri usque ad medium, propter neruorum
uersuorum consensum, &c. Si uero prima-
rio affectu, tunc praecedunt hebetudines in-
telligibilis, aurium sonitus, auditus grauitas, do-

114 DE CONSEN. MEDIC.

lor capitis, & sic uniuscuiusque sensus oblesio aderit. Indicia humorum, precipue sanguinis sunt, uenarum inflatio, oculi rubei, capitis grauitas, somnus & pulsatio. Bilis sunt uigiliae, inflammatio sine grauitate multa, imaginationes citrinae, &c. Pituita, sunt grauitas, tumor, & multitudo somni: & sic de reliquis humoribus etiam intelliges, &c.

Loci consentientes de signis vertiginis.

Galen. 3. de loc. affect. cap. 8. loquens de signis primarij affectus & per consensum inquit, Vertigo quum per se fiat, aut per uentriculi cōsensum, sicut & Archigenes fatetur, sic signa distinguere oportet. Nam si uertigo ex primaria cerebri affectione fiat, tunc aurium soni, & capitis dolor, & grauitas, & sic olfactus & cuiuscunque sensus à capite prodeuntis oblesio aderit. Vbi uerò per consensum oris uentriculi, presentietur cordis morbis, quam Græci dicunt *καρδιασμός*, & nausea, &c. hæc eadem recitat Paul. lib. 3. cap. 12. Auic. prima tertij, tra. 5, Vertigo facta ex reuolutione hominis, aut cōsideratione ad

reuolutas, nota est per se, & similiter,
 fit à percussione & casu. In ea qua fit
 retentione materierum in cerebro, signa-
 ut, quod egritudo est assidua, non sequens
 ritudinem aliorum membrorum, nec est
 citata cum repletionem, nec sedata cum eua-
 cuatione, & antecedit ipsam dolor capitis,
 pitus & tinnitus, & grauitas est in capi-
 & inuenit tenebrositatem in uisu, & in
 sibus abbreviationem, &c. Lege eum fu-
 is: nam si omnia uellem in unum congerere,
 em longitudine longè longior. Lege etiam
 sum de signis cuiusque humoris, ibi, Et si
 rit humor, &c.

De cura vertiginis.

Primum id in cura notato, an per se, an
 compatiendi rationem morbus fiat. Si per
 an actu uertiginosus sit, an facultate. Pri-
 expedit curatio, alteri præseruatio. Præ-
 sea etiam id intueri, num in ipsa uertiginis
 essione sit patiens, an extrâ. Si in acces-
 ne, tunc frictionibus, cucurbitulis, ligatio-
 nis & medicamentis odore moueribus ager

excitandus est: si uerò extra accessionem, tunc
 primum causa diligenter considerata, curan-
 dus erit. Vnde si fuerit causa primitiua, qua-
 lis est uisus rerum circūuoluentium, aut audi-
 tus uocum ingērium, aut percussio & crapu-
 la, tunc ita remouenda erit causa, ut nec re-
 mobiles uideat, nec sonos ingentes audiat: &
 tunc motus spirituum & eorum disiunctio mo-
 deretur cum quiete animi & corporis in lo-
 co obscuro, interim remouendo si quæ mala
 fuerit intemperies in cerebro derelicta, cum
 contrarijs intrā & extrā applicatis. Si uerò
 aliquis humorum causa fuerit, tunc quintu-
 plici medio indiget, primò euacuatione, se-
 cundò reuulsione simul & deriuatione, ter-
 tiò alteratione siue humorum præparatione,
 quartiò accidentium remotione, quintò uictu
 ratione. Euacuatio fiet per sectionem uenæ,
 si sanguis superabundauerit, per remoras ue-
 nas, incipiendo à saphena, deinde à basilica,
 postremò ab ipsa cephalica & à uenis, quæ
 post aures locantur, præsertim si purgatio-
 nes menstruorum uel hæmorrhoidarum op-
 pressæ sint. Si uerò sanguis cum alijs humori-

us in qualitate redundet, prout natura humoris requirit, euacuabitur cum rheubarba, myrobalanis, cassia, &c. Reuulsio fiet cum omni reuulsionum genere, ut supra dictum est cap. cephalæ, procedendo usque ad caueria. Alteratio, siue humorum preparatio perficitur per exteriora & interiora. Exteriora parantur in principio cum his quæ resollunt ac infrigidant, quale est oleum rosaceum & acetum. In medio tempore cum resollentibus ac resoluentibus mixtis, & in fine cum puris resoluentibus, prout habuisti in capite cephalæ. Interiora per ea quæ immobiles reddunt spiritus, sicuti sunt frigida optica, qualis est Syrupus ros. de granatis, de citonys, & quæcunque apozemata ex parata, ubi materia sit calida, & spiritus in motu fuerint. Valēt etiā in hoc casu eclegma ex saccharo rosaceo, mina cydoniorum, in cotoneata à prandio statim uel ab ipsa comeſta. Remotio accidentium erit, si in apud ignem, nec in scalis, nec prope flumina patientes sint, ne interdum ex uertigine obſcra precipitentur: si uerò aliqua etiam

R. i.

tenebrae adhuc remaneant, cum his quae clarescant, statim curabuntur, &c. Victus ratio si ab humore calido fieret uertigo, erit quilibet aut sanguinis feruorem extinguat, si sunt acetosa, styptica, qualis est succus cornearum malorum & granatorum, in quo bulla cella panis immergi potest, sitque uictus non flatuosus, non caco stomachicus, sed facile coctilis. Aer sit magis obscurus, quam lucidus, ne spiritus agitentur. Potus sit modicum uini albi tenuissimi, praesertim si uertigo per coactionem patiendi rationem fieret. Somnus sit notabilis, quies non solum corpori, sed etiam animo conferat. Vitanda insuper sunt accidentia animi, sicut ira, tristitia, nimia cogitatio, &c. Veris quantum potest se abstineat, &c. Si causa fuerit per consensum, tunc triplici scopo curabitur, primo cum causa remotione, secundo cum membri mittentis & recipientis roboratione, tertio cum reuulsione uaporum, adhuc tamen regimine congruo, ut supra: quae omnia longe uberius habita sunt in cap. cephalice per consensum, &c. Quare non est ut hic inueniuntur recitentur, &c.

Loci consentientes de cura vertiginis.

Paulus lib. 3. cap. 12, Vertiginosos in accessione excitabimus cum medicamentis quæ odore mouent, item frictionibus, & id genus alijs, &c. lege etiam de hoc Marc. Cat. Auic. prima tertij, tra. 5, Vertigo facta à reuolutione hominis super ipsum, & consideratione eius ad reuolutiones, & consideratione à loco alto, cum quiete & tranquillitate curatur & somno, si non citò sedatur.

De cura à causa humorali, & primò de ipsa euacuatione loquitur Auicem. loco nuper cit. ibi: Quæ uerò facta est ex sanguine, aut ab humore contento in corpore, curat phlebotomia ex cephalica, deinde ex uena quietis, quæ est post aurem. Et Paul. loc. cit. Vbi morbus inqueuerit, sanguis discutiendi gratia exhalatur, & purgatio ex hiera præstanda. Razes 9. almā. Quòd si non appareat, & c. c. sic rubra, sanguis ex cephalica uel basilica erit minuendus. De reuulsione etiam loquitur Paul. ibi, Interpositis diebus acri clystere & cucurbitulis ad occipitiū cum scarifi-

R. ij.

ficatione, mōxque apophlegmatismis & stu-
 nutamentis uti debemus, &c. Auic. loc. cit. Et
 cauterizatur arteria, & propriè ea cuius ca-
 sa est ascētio uaporū: & uentosa cōferunt me-
 crati, &c. Si uerò fuerint humores diuersi
 sanguine, incipe ad curandum cum pilulis
 hiera & infusione aloes, uel in humorib;
 calidis cum decoctione myrobalanorū, epithi-
 mi, pilulis stomaticis, &c. De alteratione p-
 ra habes ab Aet. ser. 6. ca. 7. ibi, His uerò q-
 calidū caput habent, etiam rosaceū cum ac-
 to adhibeas, &c. Et Auic. cap. cit. Et cōfo-
 tabis caput cū oleo rosaceo & aceto & ol-
 camomillino, & post cōfirmationē cum ol-
 camomillino singulari, &c. Loquēs etiam
 interiori inquit, Et malitia cōplexionis cur-
 tur per cōtrarium, ut tēperetur cōplexio n-
 turalis, ubi Hugo Senēsis utitur syrupo de
 chade, de epithimo, oxymelle cōposito & sc-
 litico cum decocto: hasce origani, hyssopi,
 chadis, &c. De accidentium remotione
 quens etiam Auic. inquit, Et habens uerti-
 nem alienet à se considerationem ad omni-
 rem citò reuolubilem, & ab aspectu prof-

IN CVR. MORB. LIB. II. 261

litatum fouearum, & uerticū montium. Le-
ge etiam de his omnibus Arcul. Marc. Cati.
Michaellem Sauo. & Gordonium. De uictus
atione fit mentio ab Aetio ser. 6. ibi, Ci-
i sint boni succi, facile concoctiles, flatus ex-
rtes omnino stomacho ac uētri cōmodi, uri-
m cientes, uinum modicū sit, album & te-
sissimum, & non ualde uetus. De cura per
nsensum, Mes. cap. de uert. inquit, In pri-
materia absconde, deinde mēbrum man-
ns reſifica, & regimen ad aequalitatem
ministra, cerebrum & caput confortia, ne
upiat, deinde diuerte uapores & fumos
in constructione dolorosa, uentofatione,
sterijs, &c.

Observationes de sectione venæ.

Aet. ser. 6. cap. 7. monet, ne acernatim
eues, nā ex facili occasione concidūt, &c.

Vertiginem generantia ex Diosc.

Cardamomū, hyosciamus, mandragora, sa-
leum, aconitum, cicuta.

Remedia ad vertiginē ex eodem.

ulent peucedanum, galbanū, ampelos leu-
R. iij.

ce acetum scilliticum, uinum scilliticum.

De prognosticis vertiginis.

Auic. prima tertij, tra. 5, Quandoque apoplexia
uertigo & scotomia secundum semitam crisi
& uertigo frequens, & proprie in decre-
tis nunciat apoplexiam: & similiter uertigo
eueniens successione stuporis comunicatis
brum, & quandoque soluit uertiginem soda
cidens. Ille cui frequenter accidit scotomia
de seipso sollicitus sit, & humorem euacuet
crassum, ne ad epilepsiam aut apoplexiam
perueniat. Quum uertigo prologatur, signum
est quod fiat à causa frigida, &c.

Authores dissentientes circa le- thargum & vertiginem.

- 1 Adserere, lethargum non principaliter
cerebro, sed in corde fieri, ut Aristoteles,
primam uim sentiendi in corde esse dicebat,
& non in capite.
- 2 Adserere, lethargum à melancholia ge-
nerari posse, ut Razes.
- 3 Adserere, in lethargo à frigiditate &

iditate proueniente, sectionem uenæ non
impetere.

Adserere, in lethargo occipiti esse adhi-
enda repellentia.

Adserere, scotomaticum affectum non dif-
ferre à suffusionibus oculorum, quum utrobi-
usque imagines uideantur.

Adserere, uertiginem quæ fit per consen-
sum, non esse attribuendam capiti.

Adserere, omnem uertiginem per arteria-
rum sectionem esse curandam.

Confutatio dissentientium circa lethargum & uertiginem.

Impugnat primum Gal. 4. de Sympt. cau.
cap. 8. ibi, Caterum quod capitis repletio som-
num conciliet, iam Aristot. satis monstrauit:
id quomobrem oppletio capite prima sentien-
ti uis quiescat, quum ipsa (ut ille putat) in
orde resideat, nullam probabilem inuenire
potuit rationem, igitur, &c.

Ad secundum respondet Auic. prima tertij,
cap. 16. ibi, Sunt quidam Medici, qui nominant
lethargiam omne apostema frigidum in cere-
bello.

bro, siue sit melancholicū, &c. quem uideri poteris. Præterea Gal. loco citato, Lerharg, inquit, fit à frigidityte & humiditate: melācholia frigida est & sicca, igitur, &c.

Ad tertiu: Alex. lib. 1. cap 20, Si nec uim agrotantis, nec ætas, regio & tēpus obsistere uideatur, sanguinē detrahēre in principio statim expedit, &c. Auic. Si non fuerit quod prohibeat, phlebotometur: intellige saltem uulsiuā sectionē cōpetere, si non euacuatiua.

Ad quartū: Gal. 13. meth. cap. 22, Sed quæ hanc niam suturæ & præsertim coronaria, nō solum impositi medicamēti qualitates, sed et substantiam, (si tenuis est) intrō transmitti nam præter reliqua, tenuissimum est hoc locum cranium & rarissimum: ergo quotiens medicamenti cuiusque uim uehementer descendere uoles, hoc maximè loco impones, &c. igitur non occipiti, &c.

Ad quintū: Gal. in lib. qui Introductio sive ue Med. nuncupatur, respondet dicens, quæ caligines oculis offusæ & uertigines cognatæ sunt uitiis morbo caduco, sed inter se differunt quod experiētia demonstratur: nā in scoroma

ico affecta leui occasione hebetatur & cōci-
lum, sed non in suffusionibus oculorum, &c.

Ad sextū: Gal. 3. de loc. aff. cap. 8, Verūm
ut iā antea sepe numero monuimus, licet ca-
ut per alterius partis consensum afficiatur,
affectio tamen ipsi ascribenda est, &c.

Ad septimū: Galen. 3. de loc. aff. cap. cit.
Quamobrem nōnulli horum ab arteriarū se-
ctione præsidiū petierūt, arterias pone aures
icantes, sed constat non omnes huius auxiliū
beneficio fuisse curatos, &c. Nam fieri potest,
quod inaequalis cerebri intemperies huiusce-
modi spiritum producat, &c.

De morbo comitiali.

Morbus comitialis, Gracè ἐπιληψία dictus,
est totius corporis non omnimoda conuulsio,
in qua operationes, motus & sensus in mem-
bris prohibetur, per tēporum intervalla acci-
dens, sitque cum repētino casu ac exitu spumæ
oris. Talis uerò conuulsio sequi solet uel à
multitudine grauante, uel ab acri materia
cerebrum mordicante: quod quum tale mo-
stum reicere conatur, tali motu conuulsio
incutitur, &c.

Loci consentientes de morbo comitiali.

Gal. 3. de loc. aff. cap. 7, Morbus comitialis est omnium corporis partium cōuulsio non perpetua, sicut in emprosthotono, opisthotono & tetano, sed quæ ex temporum accionibus interuallis. Et lib. finit. med. Comitialis morbus est oppressio mentis sensoriorūque cōsensuum repētino casu, ac spuma oris exitu. Auic. pr. ma tertij, tra. 5, Epilepsia est ægritudo, prohibens mēbra animata ab operationibus sensus & motus in erectione non integrè: & illud est propter oppilationē cōtingentē, &

Obiectio.

Quum Gal. de sympt. diff. cap. 3. dicat, non totū corpus cōuellitur, sed principes functiones detinētur, hoc symptoma morbus comitialis appellatur: si igitur symptoma est, quomodo ab Auicē. ægritudo dicitur? Præterea cōuulsio est symptoma, sed morbus comitialis est cōuulsio: igitur symptoma & non morbus, ut Auic.

Responsio.

Morbus comitialis sumi potest primò p

structione cerebri uentriculos opplente, uel
 o mala intemperie, uel pro mala compo-
 sitione, & sic his tribus modis est ægrotudo: ac-
 cidentius pro motu conuulsiuo, est symptoma
 e accidens, &c. Quir motus conuulsiuus
 fit in cerebro, reddit rationem Galen. 3. de
 aff. cap. de mor. comit. ibi, Proinde existi-
 ui similem motum cerebro euenire, qualis sto-
 macho interdum à re quapiam molestato ac-
 cere solet, &c. Vide etiam de hac re Aet. ser.
 cap. 13. De generatione spumæ uide Gal.
 hor. 2. comment. 43. ibi, Strangulati, &c.
 Auic. ibi, Spuma uero accidens in epilepsia
 propter agitationem motus, &c.

De causis morbi comitialis.

Causæ primitiue sunt uictus deprauatus
 potus multitudo, mora in sole nimia, coi-
 tus plurimus, exercitiū super repletionem: ac-
 cidentia animi, ut tristitia, ira, timor, cunctus,
 multus, auditus uocum terribiliū, odor he-
 ttis cerui usti & gagates lapidis, bitumen &
 rnu ceruinum. Causæ antecedentes sunt, in-
 temperies mala totius corporis, cōplexio ce-
 bri frigida & humida, ex qua flatuosus

spiritus generatur, uel malus humor, ut
 tuita, atra bilis, sanguis uel materia ueno-
 sa. Causa coniuncta sunt, uapor uel flag-
 crassus, uel talis humor actu obstruens. C-
 sa uero per consensum, omnia membra, à q-
 bus uapores ad cerebrum mittuntur, sicut
 tum corpus, stomachus, lien, & cetera me-
 bra, à quibus uapores eleuari possunt.

Loci consentientes de causis morbi comitialis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 6, Iam alios uia-
 mus (loquens de causa primitiua) cōuulsio
 comitali ob oris stomachi uitium corrept-
 quū aut nō probè concoxissent, aut uini m-
 racioris plurimum potassent, aut Veneri in-
 modicè operam dedissent. Auicen. prima te-
 rti, tract. 5, Et causas mouentes epilepsia
 plerunque adiuuant causae extrinsecæ, sicut
 immoderantia cibi & potus, & satietas na-
 seatiua, & mora plurima in sole, & coit-
 plurimus, & exercitium super repletionem
 & id quod debilitat cor ex timore, &c. Ae-
 ser. 6. ca. 14, Epilepticos collabi faciunt su-

ita, bitumen, lapis gagates, cornu ceruinum,
 dor hepatis caprini assati, & ipsum hepar
 um editur. Hoc idem habet Paul. lib. 3. cap.
 3. Gal. aphor. 2. cōm. 45, Magna ex parte
 ictus deprauatus hanc passionē generat.
 Matthæus de Grado historiam de suo filio re
 tat, qui ex magno tubarum sonitu in epi
 psiam ceciderit. De causis antecedentibus
 7 coniunctis loquitur Gal. 3. de loc. aff. ca.
 . ibi, Non ab ariditate uacuationēque, sed
 crasso semper humore hanc affectionem
 aduci argumento est, quod & subito fit, &
 luitur confestim: nam subitariam meatuum
 bstructionem à crasso viscosoque humore
 eri constat. Paulus lib. 3. cap. 13, Morbus
 omitialis habet causam partim in ipso cere
 ro, partim in uniuersis uentriculis subsistē
 m, modò humorem pituitosum, modò melā
 holicum. Itidem ait Gal. 3. de loc. aff. ca. de
 lania. Auic. prima tertij, tract. 5, Tunc
 stat ut eius causa sit, aut contractio cere
 ri ad expellendam rem impediētem, quæ
 t aut uapor, aut qualitas mordicatiua, aut
 umectatiua malæ substāciæ, aut humor fa

ciens oppilationē & spasmus non integritas
 in uentriculis cerebri, & principijs origis
 neruorū, &c. B. Nota quòd hæ tres causæ
 licet uapor, humor & qualitas uel mordax
 uel substantiæ uenenosæ, mutuā adeò bene
 lentia in se agunt, ut una sine altera effici
 possit, & sic intelligitur Auic. Ipse uerò
 quens de causa materiali inquit, Fieri à
 guine plurimo dominante, aut à phlegma,
 aut à melancholia, aut à cholera, & est p
 ua ualde, &c. Hippoc. de sacro morb. Pit
 rosis fit natura non biliosis. Gal. 4. de loc
 aff. loquens de sopore, apoplexia, & morbo
 mitiali, inquit, Horū trium morborū frigidi
 us, ac crassus, aut omnino uiscid⁹ humor
 sa est. Similiter 2. aphor. comm. 45. dixit.
 causis per consensum habes plura ex Gal.
 de loc. aff. cap. de affectu oris uentriculi,
 exemplū de grammatico affert, qui quoties
 doceret, cogitaret, irasceretur, morbo com
 tiali corripiebatur. Item differentias huius
 habes ex Gal. 3. de loc. aff. cap. de morb. c
 mit. Similiter habes exemplum de puero, q
 principiū affectionis sentiebat in crure. Pro

erea quomodo ille humor ad caput ascēdat,
 habes etiā exemplū de ictu scorpionis, quāvis
 hac tertia species rarò contingere soleat,
 prout notavit Aer. ser. 6. cap. 13. Paulus lib.
 3. cap. 13, Ore uentriculi inquit affecto con-
 sorty lege oboritur, quemadmodum in colicis.
 Itē & ab alijs inquit partibus nascitur, quū
 ueluti aura quadā frigidior ad cerebrū ascē-
 dat, aliās à crure, aliās à man⁹ digitis, aliās
 ab utero mulieris grauida, &c. Auic. prima
 tertij, tra. 5. Membra ex quibus uapores ele-
 uantur ad cerebrum, epilepsiā facientes, sunt
 aut totum corpus, aut splen, aut stomachus,
 aut myrach, & contingit etiam illud in re-
 liquis membris, &c.

De signis morbi comitialis.

Signa cōmuniter pracedētia, sunt mutatio
 corporis à complexione sua, grauitas capitis,
 tristitia, & eorū quæ iuxta sunt, oblinio, ima-
 gines insomniorum turbulenta, pallor faciei,
 inordinatus linguae motus & ira. Signa mor-
 bū demōstrātia, sunt spuma oris, repētinus ca-
 sus, oris ac faciei distractio, cernicis ac totius

tremor, dentium constrictio, stercoris ac urinae ac etiam spermatis inuoluntaria emissio. In uehementi morbo si spuma ab ore abstrahatur, denuo resurgit, in debili uero non amplius reuertitur, uel in debili citò resoluuntur in uehemēti nequaquam. Signa pituitae sunt si spuma sit crassa ac multa, si urina uita liquefacto sit similis. Cognoscitur etiam uomitu, ab aetate, à regione, à regimine praeterito, à colore faciei, & ab alijs ut dictū in primo lib. Signa demonstrantia morbum esse in capite uel in alijs membris sunt, quae si in capite, praecesserunt sensus & motus lesiones, aut obliuio, aut amentia, &c. Si in stomacho, cognoscitur ex nausea, uomitu, eructatione, & sic de reliquis morbis, &c.

Loci de signis morbi comitialis.

De signis praecedentibus Auic. ibi loquitur & plurimū antecedit mutatio corporis à complexionem suam, &c. Paulus lib. 3. cap. 13, Praecedunt quaedam, animi tristitia, eorum quae iuxta sunt, obliuio, turbulenta insomnia, gines, dolor capitis, eiusque repletio cōtinua.

ob iracundiam faciei pallor, inordinatus
 ague motus, &c. De signis morbum demō-
 strantibus loquitur Razes 9. alman. cap. de
 lep. Quum aliquis cadit in terram, & tor-
 tatur, & commouetur, & intellectum amit-
 tit, dicimus esse epilepticū: quod si spuma exit
 ex os, aut se commingit, aut sperma egredi-
 tur, aut egestio, passio tunc est grauior ac ue-
 hementior, &c. Paul. cap. cit. Quamprimum
 morbus inuadit, concidunt aegri, uoxque in-
 terripitur: peculiaris morbi nota est oris spu-
 ma. non desunt quibus urina & stercus prae-
 voluntatem excernitur, &c. B. Hæc signa
 deheamenti epilepsia intelliguntur: nam in
 deli non omnia adsunt. Vide de ijs tamen
 Arcul. Sauonarolam, Gordonium & cæ-
 teros practitantes.

De signis humorum lege Auic. prima tertij,
 5. ibi, Et signa eius cuius causa est phle-
 gma, &c. uide eum fusius: nam omnia anno-
 ta longum ac præter rem foret.

De signis per consensum loquitur ibi, Qui
 ex propria cerebri affectione, sed per cō-
 sensum comitiali morbo laborant, ij citra
 S. i.

perpetuā conuulsionē, ueluti saliēdo per interualla cōcuti uidentur. Manardus in ep. 6. lib. 3, Quando per consensum patitur, accidunt uehemētes & assidue cōuulsion, sed per interualla breuibus quibusdā salu- sis motibus patiens concutitur. Gal. 5. de l. aff. cap. de oris uētriculi affectione. & Pa. lib. 3. cap. 13. Similiter Alex. ca. de sacro neruo, Si per consensum stomachi eueniat, gnoscur ex nimia uentriculi repletionē, ex inedia, aut syncopi, ex nausea, uomitu, sione, &c.

De cura morbi comitialis.

Id in primis prauidendum est, an in is morbi exacerbatione ager actu sit an ext. Si in exacerbatione, tunc unica tantū curio intērio erit, scilicet ab exacerbatione liberio, quæ fieri potest cū reuulsione uaporū alia loca per cucurbitulas, frictions, cly- res, suppositoria, aut per odores sensum in- zantes, cū castoreo, succo, cirenaico, id est, sa foetida, succo rutæ, &c. Si uerò pario fuerit extra exacerbationem, tunc consi-

nū inceperit, uel incipienda sit aegritudo:
 ea si non inceperit, sed incipienda timea-
 tur, tūc una tantū erit curandi intētio, prae-
 cauere scilicet ne patiens dispositus in hanc
 aegritudinē incurrat, quod fiet si superuaca-
 nas humiditates abstulerimus cū electuario
 saccharo & amygdalino oleo aut sisami-
 ni: parato, aut si ea quae à proprietate comi-
 talē morbum expellūt, dederimus, sicut peo-
 nia, &c. aut infantes ab omni strepitu & ti-
 more custodierimus: aut si nutrix à coitu, à
 epula, & ab his quae lac malum generare
 possunt, sese abstinuerit, &c. Si uerò morbus
 in dudū inceperit, causam tūc primū in-
 uirito, quae si fuerit pituita tanquā maiori
 parte cōtingens, uide num per primariam
 affectionē, aut per consensum efficiat: si affe-
 ctio primaria sit in cerebro uel in uentricu-
 lo eius, tunc quinque erunt medendi inten-
 tiones. Prima, uictus ratio. Secunda, humoris
 reparatio. Tertia, euacuatio. Quarta, reuul-
 sio. Quinta, cerebri roboratio, ac residui reso-
 lutio: quāquā si ad Galeni dogma accesseri-
 mus, unic⁹ tantū erit curādi scop⁹, qui est ob-
 s. ij.

structionis remotio. Viçlus ratio sit incidendi
ac extenuans, qualis est capparis usus, si ita
laudabilis chymi, nõ superfluè humectās. Ca
uenda est insuper repletio, & mala digestio
semel in die reficiatur æger si tolerat. Ca
etiam ne uentriculo pleno superueniat ex
acerbatio, caueant etiā à crassis carnibus m
ta superfluitatis, & à leguminibus uinõq; c
piofiori: nam paucitas uini dilatat animam
inquit Auic. & excusat à multitudine. Ita
à uenereis liberalioribus, à balneis ante pu
gationem, à sinapi, eo quòd cerebrũ sua ac
monia percutit. Caueant insuper à calore
frigore superfluo, à uentis, si possibile sit r
gionẽ permutantes. Quies & tranquillitas
laudatur, & exercitiũ post euacuationẽ. Si
nus super repletionem uitandus, & uigilia
perflua: nam spiritum resoluũt ac debilitan
Preparatio humoris perficitur per ea, qu
incidendi ac extenuandi uires habent, qu
est oxymel simplex & compositũ & scillit
cum, syrupus de absinthio, apozema ex hissop
po & origano, syrup. de stechade de hissopo
rhodomel, &c. cum decoctis saluie, hissopi, r

e, maiorana, radicū iridis, scillæ, uisci quer-
 ni, peoniæ, florū rosmarini, stachados, gly-
 yrrhizæ, acori, passularum, nucis moschatæ,
 innamomi, betonica, &c.

Euacuatio erit, si repletio uniuersalis exi-
 lat cū pituita, & nihil aliud prohibeat, per
 inguinis à cubito missionē: si minus, fiet cum
 arbito agarico, cum hiera Ruffi, cum pilulis
 hochijs fœtidis, polypodio. Si uerò fuerit af-
 fectio atrabilaris, cum helleboro, pilulis in-
 lis, de lapide lazuli, cum myrobalanis & si-
 milibus, &c. Vel euacuatio fiet cū electua-
 rijs dissolutis in aliquo decocto, sicut cū dia-
 himicone, electuario indo, &c. ut supra rela-
 tum est in capite cephalæ. Reuulsio, id est,
 id inferiora materiæ deductio, perficitur cū
 ucurbitulis dorso & præcordijs etiam cute
 incisa affixis, aut enemate ex cœtaurio, colo-
 ynthide, additis quibusdā electuarijs ad hoc
 propositū facientibus, ut hiera diacolocyn-
 thidos, hiera simplici, & oleis, & rhodomel-
 le, deinde frictionibus, lotionibus circa crura,
 quib⁹ annecte deriuationes quæ fiūt per ster-
 nutatoria, masticatoria, gargarismata, &c.

S. ij.

Roboratio ac residui resolutio fieri possunt per exteriora & interiora, remouenda malam intemperiem derelictam, ne ipsa renouetur, noua materia denuò aggregetur. Interiora sunt diacorus, diamusculus dul. confectio, ris, arcotico Nic. theriaca, mitridatium, accessus conditus, & quacunque à proprietate occurrere conferre dicuntur, de quibus plura à nobis dicta sunt in fine capituli, & sunt, peonia, rutum, corium frontis asini, &c. Exteriora sunt fascioli, commissura coronali & sagittali appliciti ex maiorana, stechade, ruta, peonia, cecymoschata: uel fiat eodem in loco sinapium, aut cauterium aliquod potentiale & actuale usque ad ossis superficiem, & nuper aliquot dies apertum conseruetur. Atque per alicuius partis consensum morbus corticalis acciderit, procurandum, ut membrum quo malus uapor ad caput reptat, mala dispositio remoueatur, uel ascensus prohibeatur cum ligatione arcta, uel cucurbitulis, uel ligamentatione, prout magis expediet: deinceps rebrum, ne uapores suscipiat, roborandum, quod susceptum est, resoluendum, &c.

Loci consentientes de cura
morbi comitialis.

Aet. ser. 6. ca. 13, Cura tempore exacerbationis erit, partes obtortas deligare, inūgere, dirigere odoribus, sensum irritare & perterante exacerbatione castorium aut succum cyrenaicum ori cum aceto mulso infundere, &c. B. Intellige de his qui post annos seriles in morbum concidunt. Arcul. de cura epilepsiae, Quaedam administranda in tempore paroxysmi diuertendo cum fricationibus, ligaturis, & suffumigium ex assa citò reuocet paroxysmum, &c. Vide in hoc ceteros practi- cantes, sicut Gord. Marc. Cat. Sanna. itidem habes Auicē. ibi, Et finis actionis causae eius est, alleuatio à prauitate paroxysmi, &c.

De praeservatione lege Mesuen, ibi: Praeserunt quaecunque à proprietate retardant paroxysmum, aut prohibent aduentum eius omnino, aut occultant, sicuti dicemus, &c. Auicē. prima tertij, tra. 5, Epilepsia in infan- bus curetur ita, ut nutrimentū lactantis re-
S. iij.

Etificetur, unde lactās alienet à se omne qd
generat lac aquosum, aut corruptū, aut g
sum, & prohibeat sibi coitum & pregnat
nem, & alienetur infans ab omni re, in q
est timor, & uoces magni sensus, ut uox ro
rrui, fulguris, &c.

Razes primo comment. cap. de epilep. j
bit plures medicinis morbum prohibemes
les facientes scilicet & exiccantes, quas eti
habet Auicen. loc. cit. & sunt peonia, qui
Gal. 6. de fac. simp. tantopere laudat, susti
sa uel in potu data, & quacunque infra
mente Dioscor. recitabuntur, &c. Quòd p
mum in omni morbo inquirenda sit cau
has ultra Auicen. & Galeni textum, etia
duos Ausonij uersus, in quibus omnes ferè i
rentiones curandi habentur, & sunt,
Quis morbus, quæ causa facit, qui casus
illo

Nascamur, quæ cura modo, quis deniq; fini

Mesu in cura epilep. Sunt quinque inter
tiones: Prima regimen in uita ponit, secun
da æquat & coaptat materiam, tertia ab
scindit eā, &c. in hoc consule nō solum Gr

omnes, sed etiam cæteros Arabes: nam fu-
 us de his pertractant. De victus ratione lo-
 quitur Paulus lib. 3. cap. 13. ibi: Victus ratio
 utilis est, quæ incidit & extenuat, idcirco
 apparis esus & salsamentum prodest. Auic.
 prima terciy, tract. 5, Commune est omnibus
 epilepticis, ut utamur cibis laudabilibus, qui-
 us inest humectatio laudabilis, nō superflua,
 ueant à repletionē, & custodiant se à ma-
 tia digestionis. Qui uerò non tolerant ut
 mel reficiantur, diuidant cibū suum in tres
 partes, & sumant duas tertias in prandio, &
 tertiam in cœna, &c. B. Hic Auicenna locus
 fecit, ut discrimen illud inter neotericos na-
 eretur, utrum cœna maior prandio esse de-
 at: sed quum utrinque robustæ ac ualida
 tiones afferantur, tu tamē aduerte, ne ad-
 niente exacerbatione siue uesperis, siue ma-
 e, quòd uentriculus sit ualde plenus. Vnde
 uicen. Et oportet ut occurrat paroxysmus
 in mundatione stomachi, &c.

Paul. lib. & cap. cit. Fugere, inquit, oportet
 carnes, legumina, uinum copiosius, Vene-
 m liberaliorem, balnea, sinapim, &c. Aui-

cē.loc.cit. Oportet ut alienent omnes fructus
humidos & grossos, nisi stypticos super ci-
quia roborant stomachū, & repletio uini il-
tum nocet, sed parum ex ipso sumptū dilata-
animā, & confortat spiritum &c. Mes. 1.
dromel est potus elegantior, quā uinum.
uicē. Et oportet ut alienent à se omne acro-
uaporosum, & uitent cibos graues, ut sunt
phanus, caules bauciæ, id est pastinacæ, &c.
lege hunc locum fusius, & plurima à me-
&ta inuenies. Celsus lib. 3. cap. 25, Cauere
sunt cruditates, locique præcipitis cōspecti,
omnia terrentia, uomitus, lassitudo, solliciti-
nes & negocia omnia, &c. De humorū p-
paratione loquitur Auicen.loc.cit.ibi, Et
syrupis est oxymel squilliticum, & similiter
rupus de absinthio, & apozema hissopi &
origano, &c. Itidem Mes. ibi, Adaptant
reriam, ut eius facilis fiat expulsio, quæ
sunt squilla & acetum eius & oxymel, &
Et Paulus, Auxiliatur his oxymel scillitica
quotidie potum, &c. De euacuatione loqr-
tur Aet.ser. 6. cap. 14, Si nihil dicens prob-
beat, uenā secare oportet, & intermissis quæ

or aut quinque diebus corpus reficere, ac
 infra euacuare, maximè per ueratrum ni-
 u aut colocynthidè, &c. Itidè adserit Pau-
 l & Auic. ibi, Melius quò purgetur il-
 l, cuius causa est phlegma, est hiera & pul-
 i colocynthidos, & hiera hermetis. Quòd
 cum phlegmate est repletio uniuersalis,
 inc phlebotomia, secundum quod narra-
 mus, est ei iuuatiua, &c. De reuulsione
 & deriuatione uerba facit Mes. cap. de epi-
 psia, ibi, Competunt gargarismata & ster-
 natoria, & propriè uomitus, & mastica-
 toria, & fricationes, & ligaturæ in extremi-
 tatibus, & uentosationes in eis, & emplastra
 ubificantia super membrum mandans, &c.
 Itidem Auic. & Paulus ibi, Synapismus ca-
 iti inducatur, &c. Et Auic. ibi, Ex eis uerò
 uæ materiam ad inferiora trahunt, &c.

De roboratione cerebri ac residui resolu-
 tione habes plura ex Auic. prima terrij, trac.
 ibi, Et post illud permuta complexionem ce-
 rebri cum confortatiuis, calefacientibus, ex
 emplastris & sinapi, &c. Paul. lib. 3. cap. 13.
 ubi ad hoc caput esse tondendum, & ex

peucedani liquore, cui spondylium sit in-
 ctum cum aceto diluto, perungendum, &c.
 Mes. Et in omnibus his rectificatio cerebri
 bet esse intentio prima, &c. Arcul. Vnust
 ut fiat attractio materierum de profunda
 pitus ad cutim, ad quod ualet hoc emplastr.
 R. ammoniaci dissoluti cum pinguedine
 ris uel milui uncias duas, fermenti unci-
 unam, sinapis unciam semis, cantaridan-
 3.5. peonie 3.ij. fiat emplastrum, quo remo-
 inungatur cum pinguedine milui, & iten
 apponatur & auferatur, donec crusta ap-
 ruerint, &c.

Quæ excitare possunt mor- bum comitiale.

Excitant epilepsiam apium, & in hoc
 seminat Plinius lib. 20. Auicen. Serapio,
 Mes. Item allium, asphaltū, nidor, cornu
 præ, uel hirci, uel cerui. Item ostracorum,
 sulphuris suffumigium, lacque omne nocet
 cundum Serapionem.

Morbum comitiale curantia.

Cardamomum, balsamum, populus nig,

sis, iuncus odoratus, lepus terrestris, muste-
 læcur, & unguis asini, lichen equi, iecur
 bi, hirundines, lac humanum, coagulum,
 flanguis, finum, plantago, eryngion, ruta,
 sei, libanoris, spondylium, peucedanum, la-
 scitium, galbanum, segapenum, ammoniac,
 trifolium, coniza, anihyllis, symphyton,
 cron, penaphylon, uiola purpurea, helle-
 bam nigrum, ampelos leuce, oxymel, ace-
 ra scillite, lapis selenites, lapis aëtites, &c.
 Confectiones ad hunc morbum idoneæ sunt,
 amaticum moschatum, confectio Nic. confe-
 ctio de moscho, diacastoreum Nic. portio san-
 cti Pauli, plura arcoticon Nic. pilula inda, pi-
 lula Alex. de sex rebus, pilula ex artemisia,
 & si quis scire uoluerit, quo pacto applica-
 ri debeant simplicia legat de singulis, Diosc.

Quæ curant à proprietate.

Iugo, Curatia à tota specie sunt, hepar lu-
 pæ, hepar mului, pellis frontis asini portata su-
 per carne nuda, cingulum ex pelle caudæ lu-
 pæ, frontis eius, uesica apri cum urina pul-
 uerata, omnia coagula & propriè leporis,

pyretrum conditum, peonia, uiscus quercini
caput cuculi, oua corui, far, smaragdus po-
tatus, lapis spongia, phylipendula in cibis,
hominis, &c.

De prognosticis morbi comitiali

Hippoc. aphor. 2. aphor. 45, Quicunque
uenes morbo comitiali laborat, mutatione
tatis, temporum & locorum, & uictuum qu-
que liberatur. B. id est, Quaecunque possu-
patientis temperaturam permutare, ea à mor-
ipsum liberant. Et aphor. 5. apho. 7, Quib-
cunque morbi comitiales fiunt, ante pubert-
tem, mutationem accipiunt: quibus autem u-
gesimo quinto, commoriuntur. B. Nota quod
pubertas durat à 14. usque ad 25. annu-
Gal. 3. de loc. aff. ca. de morb. comit. Porro
his omnibus affectibus, in quorum numero
epilepsia, periculi magnitudinem ex anhel-
tus nocumento conijcere oportet. Paul. lib.
ca. 13, Si acutissimus fuerit affectus, tum
crebras accessiones, tum ob symptomatum u-
hementiam statim iugulat. Itidem Aet. e-
Avicen. ibi, Et quando cecidimus parò

in epilepsia, interficit, &c. Paul. lib. de di-
 gnitate, Si quis lunaticus spumat, & oculos
 contrahit, & fremit, & mugit, & cadit, &
 umbra contraxerit, & colorem similem cro-
 ceo abuerit, moriturus est. Razes i. cōment.
 auctoritate Hippoc. Multi pueri moriuntur
 pro, quia eorū uenæ arctæ sunt, & phlegma
 primum recipere non possunt. Auic. prima
 cōf. tract. 5, Et quando apostemata appa-
 rent in ea, fortasse resoluunt eā, & minuunt
 materiam eius, & multotiens mutatur epile-
 psia ad melancholiam, & multotiens resol-
 utur propter febres, quæ sunt longæ, & epi-
 psia melancholica est deterior, quàm phle-
 gmatica, &c. Michael Sauonarolus inquit,
 quod si infans est genitus tēpore menstruorū,
 præsentē epileptico, quod incurrit in epi-
 psiam incurabilem, sed quid ita sit, diuina-
 tionem non possum, & fortè pace sua diexerim,
 & somniauit. Hippocr. de mor. sac. Quum
 diutius ueterauerit, amplius medicabilis non est,
 quoniam cerebrum pituita consumitur & li-
 quefit, quo liquefacto, crebrius corripimur
 &c.

Authores dissentientes circa mor-
bum comitiale.

- 1 Adserere, in epilepsia sensum & motum
omnino integrè auferri.
- 2 Adserere cū Auerrhoe, causam immedia-
tam epilepsiae esse uaporem absque materia
fouente.
- 3 Adserere, epilepsiae causam & locum af-
fectum non idem esse cum apoplexia.
- 4 Adserere, epilepsiam per consensum post
pubertatem non posse curari.
- 5 Adserere, omnem mutationem ad cali-
dam complexionem & siccam curare epilep-
siam.

Confutatio dissentientium circa
morbum comitiale.

Ad primum respondet Genilis & Auer. 3.
collig. ca. ult. quòd in epilepsia in relationem
ad apoplexiam, non aufertur sensus & mo-
tus omnino integrè, quia cuiuslibet epilepsia
obstructio non est integra, seu omnimoda, ut
in apoplexia, ut idem Galenus & Auicen. ut
suprà.

Ad secundum, Auic. prima tertij, tra. 5. im-
pugnatur ipsum Auerrhoim, probans quod pu-
rqualitas sine materia fouente hoc per se ef-
ficere non possit. Vide tu eius rationes. Hoc
ait Gal. 3. de loc. aff. ca. 7. ibi, Planè cõ-
sistit hanc in cerebro affectionem cõsistere impe-
dite humore animale spiritum, quo minus
possit exire, &c. Ex quibus uerbis nõ puram
qualitatem, sed potius humorem causam esse
concedere possumus, &c.

Ad tertium, Gal. aphor. 2. com. 45, Mor-
bi comitialis, inquit, est proximus quodam-
modo apoplexie, quum idem locus in utroque
patiatur, & idem humor in causa sit, &c.

Ad quartum, Gal. 5. de loc. aff. ca. 6. exem-
plum affert de quodam grammatico, qui ex
resectu oris uentriculi morbo comitiali corri-
piatur, cui probam concoctionem procurans,
robustum uentericulum efficiens, simulque
vivans cum hiera, uiginti annis, quibus post-
ea perstes fuit, integra ualitudine uitam ex-
egit. Quæ si uera sunt, sequitur, quod ea quæ
consensum fit, saltem si non quæ per essen-
tiam curari possit.

T. i.

Ad quintum, Gal. 2. aphor. commē. 45. spondet, quòd non qualibet mutatio morbum soluit comitiale, sed ea tantum, quæ calidiorē & sicciorē corporis habitū efficit, & Igitur non qualibet mutatio, sed quæ corpus tantum ad has qualitates peruertit, &c.

De apoplexiæ descriptione.

Apoplexia, est quædam uentriculorum repleti, obstructio, per quam membra motu & sensu priuantur. uel ἀποπληξία, quæ Latine dici potest Syderatio, est priuatio motus & sensus totius corporis, unā cum lesione principalium actionum derepente incidens, in qua non tantum motus & sensus, sed etiam interdum ipsa spiratio uehementer impeditur, hæc acutissima est apoplexia.

Loci consentientes de descriptione apoplexiæ.

Auic. prima tertij, tract. 5, Apoplexiæ causa est otiositas membrorum, à sensu & motu propter oppilationē contingentem in uentriculis cerebri, & in cursibus spiritus sensibilis motui, &c. Paul. lib. fini. med. Apoplexiæ

cētio mentis cum priuatione sensuū & corporis resolutione, &c. Cels. lib. 3. ca. 27. mentē facit de apoplexia simul & paralyti. Iul. lib. 3. ca. 18. & Aet. ser. 6. ca. 27. describit etiam apoplexiā, ibi, Est affectio cerebri, priuatio motus & sensus totius corporis, &c. Similiter Gal. aphor. 2. commēt. 42. ibi, Vbi in apoplexia totū corpus sensu & motu priuatur, solus restat anhelitus. Qui si etiā ipse prohibeatur, maxima est & acutissima hæc apoplexia, &c. Auer. 3. collig. ca. ult. Apoplexia est, quum homo cadit in terram, & cessat ei uox, & priuantur omnes operationes motus totius corporis, &c.

De causis apoplexiæ.

Quū apoplexiæ causa sit obstructio, ut dicitur in est, duplex erit obstructionis causa, uel casio, uel repletio. Clauditur cerebrum, uel ex causa uirtutem stimulante, unde fugit & extrahitur: uel ex causa dolorem inferente: uel ex mala qualitate, frigida, styptica, uentriculorum cerebri opprimente. Repletur cerebrū uel ex apostemate calido uel frigido, uel ex materia

T. 4.

ria pituitosa uel melancholica uel sanguinea
rarò fit à pallida bile: fit etiam à percussio-
ne, aut casu, aut per consensum, &c.

Loci cōsentientes de causis apoplexiæ.

Anic. prima terij, tra. 5, Hæc quidem op-
pilatio fit aut propter clausionem, aut pro-
pter repletionem. clausio fit, quum id ad ce-
brum perueniat, quod dolorem facit, aut im-
pediat, & moueatur motu contractionis, at-
que qualitas perueniens ad ipsum stypticum, fac-
iens, &c. Repletio aut est apostemans, aut n-
&c. lege fusius, & cætera habebis. Gal. aph-
or. 2. cōment. 42, Omnes autē apoplexiæ fiunt
in animali non potēte ad partes infra caput
existentes defluere, aut propter aliquam di-
positionem inflāmatiōni similem, quæ sit in
ipso cerebro constituto, aut uentriculis ipsius
humore pituitoso oppletis, &c. Paul. lib.
cap. 18, Origo uitij est ex frigidiorē pituita
quæ principalissimo cerebri uentriculos un-
uice & cumulatim replet, &c. Gal. aphor. 6
com. 56, Apoplexiæ & cōuulsiones fiunt pro

per humorem pituitosum aut melancholicū,
 quoniam cōmunis utrisque est crassitudo. B.
 hac ratione motus Hippoc. in aphor. 57. eius-
 dem dixit apoplexias fieri à quadagesimo
 usque ad sexagesimum, quoniam in his maxi-
 me temporibus abundat uterque humor, &c.
 in reliquis lege Aet. ser. 6. ca. 27. in princi-
 pio: item Galen. 4. de uict. in morb. acut. com-
 ment. 27. & 3. de loc. aff. ca. 7. Item Alex. &
 Arcul. & Gord. &c.

De signis apoplexiæ.

Signa precedentia sunt, dolor capitis, uer-
 tiginēs & scotomiæ, uenarū circa guttur in-
 flatio, totius corporis tremor, & stridor den-
 tum in somno, grauitas ac pigritia, frigus ex-
 tremarum partium, motus difficilis, urina æ-
 uuginosa, atra, & modica. Signa actualis a-
 poplexiæ sunt, quia subito infirmus cadit, &
 sicuti attonitus iacet, uox amittitur cum to-
 tius corporis sensu & motu citra febrem, in
 somno sterit, uocatus non respondet, nec di-
 uulsis pilis uel stimulo punctus non sentit.

Signa apostematis sunt, febris superueniens

T. iiij.

dolor, &c. Signa loci affecti sunt, qui fuerit in uentriculis prioribus, aut in mediis qui ἰσχυρότεροι dicuntur, tunc resoluerunt faciei partes, aut odoratus uitiatur si in uentriculis posterioribus, tunc resolutio erit in spina principio. Signa humorum non est ut totiens repetamur, quum à nobis aliquid satis superque relata sint. Signa quibus apoplexia à suber, syncopi, epilepsia, uteri singulatu, & à defuncto corpore differat, intelliges ex locis allegandis infra. Signa eius quod fit à percussione, aut à casu, cognoscetis à narratione infirmi, &c.

Loci consentientes de signis apoplexiæ.

Paul. lib. 3. ca. 18. loquens de signis præcedentibus, inquit: Præcedunt capitis turbatio, acutus dolor, & iugularium uenarum suffusio, tenebræ oculis offusæ, extremarum partium sine ratione algores, totius corporis titillatio, motus difficilis, & dentium in dormiendo stridor, urina æruginosa, atra, mœca, &c. Et Auic. prima tertij, tra. 5. ibi, Præcedunt seditio & inflatio guidex, &c. q.

ibet Paulus, sed rudioribus uerbis expressa.
 de signis presentibus habes locum in Raze,
 alman. ibi, Quum aliquis quasi dormiens
 acer, & sine somno stertit, & quum pungi-
 ur, nō sentit, tunc iam patitur apoplexiam:
 uanitas agritudinis est secundum quod for-
 ter aut debiliter stertit. Oribasius 2 aphor.
 comment. 47, Cognoscimus esse apoplexiam,
 cum spumam edit, & extēsiōem molitur &
 ppressionem, &c. Itidem Paul. ibi, Procum-
 unt, id est, attoniti iacent, uox intercipitur,
 &c. Gal. 1. meth. ca. 9. ibi, Si quis tribus ho-
 is, siue quatuor, siue horae dimidio, toto cor-
 pore sit uehementer arreptus, ut neque sen-
 iat, nec moueatur, hunc apoplecton siue at-
 onitum esse dicimus. Signa apostematis ha-
 bes etiam ex Auicenna prima tertij, tract. 5.
 ibi, Quae autem est ex apostemate, non eua-
 nuatur à febre, &c. B. Idcirco febris fit,
 quia dum pus conficitur, dolores & febres
 accidunt, teste Hippocrate aphor. 2. aphor.
 47. Signa humorum peccantium similiter ab
 eodem et Auicenna recitantur ibidem, & il-
 la quae fit ex sanguine, significant signa san-
 T. iiij.

guinis prædicta multis uicibus, & est facies rubea, &c. Illa uerò quæ fit ex phlegmate, significat color & forma oculi, &c. de his Alex. Arcul. & Gord. De signis quibus apoplexia differt à subet, &c. loquitur primus Auic. ibi, Differētia inter apoplexiā & subet est, quòd apoplecticus clamat, &c. Arcul. Differt à syncopi, quia facies ueluti mortui & pulsus debilis ualde & summersus: in apoplexia uerò facies & pulsus cōsuetus. Differt à epilepsia, quia hæc cū periodicis, & cū morbo cōuulsio citò soluitur, & ad paralesim non terminatur ut apoplexia. Differt à uulnere strangulatu, quia præfocata sentit, audit, & habet omnes interiorū sensuū operationes, non autem apoplexia. Differt à mortuo per quatuor signa ab ipso recitata, sicuti per coturnaculum subtilissime carminatū ori admotum, aut per speculū lucidū ac tersum naribus appositū &c. Vide Marc. Catin. Auic. loc. cit. Et tardetur sepultura ambigui ex mortuis, donec obperpēdatur eius dispositio, & nec sit minus 72. horis, &c. Quur insepultus tāto tempore remanere debeat, in hoc consule conciliato.

mibi uidetur potissima ratio, quia in hoc
 p̄issimum tempore fœtor apparet, qui mor-
 tum hominem proclamat, &c.

De cura apoplexiæ sanguineæ.

In apoplexia primùm coniectari oportet,
 patiens mortuus sit, an adhuc supersit cū
 idem signis nuper à me recitatis. Deinde si
 causa fuerit sanguis, tunc triplex erit cu-
 randi scopus: primus reuulsio, secundus eua-
 cuatio, tertius malæ complexionis derelictæ
 morio. Reuulsio statim fiet per sectionem
 na saphenæ aut basilicæ, præsertim si cor-
 p̄ fuerit pletoricum, aut solitæ purgationes
 creberræ sint: si minus, fiet sectio uenæ cepha-
 le, aut uenæ frontis, & sufficiet etiam pro
 euacuatione. Remotio malæ complexionis de-
 rictæ fiet cum epithemate ex aceto & oleo
 rîceo, & hoc in fine, ne in principio mor-
 bificta magis obstruat.

De cura apoplexiæ pituitosæ.

Cura apoplexiæ pituitosæ requirit qua-
 tuor intentiones, scilicet euacuationē, reuul-

sionem & deriuationem, residui resolutionem, & sex rerum non naturalium regim.

Euacuatio fit per sectionem uenae, si cum ruita signa sanguinis adfuerint. si minus, item per pharmacum, absque ulla humorum preparatione. Nam tardare in acutis male est. Aut fiat per enemata, suppositoria, uirgulae, aut per pilulas chochias, foetidas de phorbio cum syro. de stechade aut aquis capivi dicatis dissolutas. Clysteres parari possunt cum decoctis salviae, maioranae, roris maritimi, origani, calamenti, centaurii, abrotani, peoniae, pulpa colocynthidos, additis hierogodionis, cassiae extra. sacchari partibus opportunis, & cum oleo camomillino, rutae laurino, addito sale conficiantur, &c. Suppositoria parentur cum ueratri uel colocynthidos puluere, uel cum speciebus hierae picrae le gêmeo, &c. Vomitoria fiant cum penna oleo liliaceo intincta, ac gutturi immissa, &c. Reuulsio & deriuatio fiet cum cucurbitulis, occipitio cum scarificatione affixis, mox uires permittant. Item cum ligaturis saepe iteratis, & cum apophlegmatismis, cum ac

ex origano & thymo decoctis. Item cum
 frutatorijs, cum helleboro & pipere, aut
 frictionibus pedum, cum oleo quopiam
 dido, aut cum suffumigijs ex castorio, op-
 panace, galbano, &c. aut cum synapismo,
 vesicatorio capiti admoto, &c. Resolu-
 residui perfici poterit, tum per exterio-
 rum, tum per interiora. Exteriora fiant cum
 cataplasmatibus calidis, quæ parantur ex re-
 bus capitalibus, item cum linimentis, inun-
 guendo cum oleo de costo, de euphorbio, de
 storeo, cum emplastris, in quorum nume-
 ro laudatur emplastrum de sinapi Mes. aut
 candenti ferro capiti admoto. Interiora
 perficiuntur per confectiones, electua-
 ria, pulveres, masticatoria, gargarismata:
 tum ad resolutionem simul ac diversionem
 faciunt. Confectiones sunt diacori, con-
 fectio anacardina, item quæcunque cali-
 da sunt & sicca febrem euocantia, &c.
 electus ratio sit calida & abstersoria, in
 principio tenuis atque exquisita, capiatur
 autem hydromel uel aqua hordeacea, modò
 si sanguinea sit apoplexia, procedatur deinde

à tenuissima ad crassiusculam, ita ut solea-
ne patiens uescatur, quousque morbus iam
remittere incæperit: deinde cibus mollis
succulenter, cōcoctus facilis dādus: simile
num aqua dilutum & carnes exhibeant.
Exercitium ante cibum commendatur, ue-
co eius fricationes. Somnus modò concedi,
modò damnatur, si fuerit multus, aut scilicet
sumpto statim cibo quis dormiat: concedi
uerò ex eo, quod concoctionem adiuvat,
cerebrum roborat, & uaporum resolutionem
perficit, &c. Conferunt etiam quandoque
animi accidentia, sicuti est irasci, &c.

Loci consentientes de cura apoplexiæ sanguineæ.

Auic. Aliquando accidit, ut homo in
lepsiā incurrat, & non sit differentia
ter ipsum & mortuum, idcirco in primis
ager uiuat uel mortuus sit. Mes. cap. de a-
plexia, Conaberis à principio materiam
trahere, in quantum possibilitas exigit: &
sanguineā uideris, utriusque partis illico ph-
botoma cephalicā simul cum emissionem

sanguinis, & cōsequēter crura & pedes uen-
 tori facias, &c. Paul. iridē habet lib. 3. cap.
 ibi, Qui curationem admittunt, ijs statim
 sanguis ex uena detrahendus est eadem die.
 Ille adserit Gal. in introduc. ibi, Sanguis sta-
 tim mittendus, &c. Auic. similiter prima ter-
 tia. 5. ibi, Regimen illius quæ fit ex san-
 guine, est phlebotomia in hora illa, & missio
 sanguinis multi: sanat enim in dispositione,
 iest, citò, & post phlebotomiam clysteriza,
 cu eo quod sciisti de clysteribus, ut depo-
 nantur materia à capite, &c. De remouenda
 mala cōplexione loquitur Paul. loc. cit. ibi,
 Cur inungatur oleo camomillino uel ane-
 tho, in quo spondilium decoctum sit uic. Et
 si ipsum olfacere, quod confortet cerebrum,
 & non calescit cum eo quod docui te, id
 est in cap. soda, &c. similiter omnes practici
 hanc concurrunt opinionem.

Loci consentientes de cura
 apopl. pituitosæ.

Auic. prima tertij, tra. 5, Si uerò cum ea
 facta est ex phlegmate inueniuntur signa

sanguinis, phlebotometur, deinde clysteri-
 tur cum clysteribus fortibus, & supponantur
 collyria fortia, in quibus ponuntur gumma
 fel bouinum, postea bibat quod soluit, &
 Cels. lib. 3. cap. 27, Proderit malo corpori
 uel sanguis missus uel aluius ducta, &c. &
 ser. 6. cap. 27, Qui uero ad uenae sectionem
 inepti sunt, primum ad uomitum comoue-
 tur, & sedes ipsorum illinatur ijs quae flatus
 educunt, &c. Paul. lib. 3. cap. 18, Oportet
 ori per uim aperto digitum uel pennam
 madefactam inserere, ut ea quae insunt eij-
 tur. Auic. loc. cit. Et si possibile est, fac
 uomere cum penna immissa gutturi, illita
 oleo liliaceo, & propriè quum existimat
 quod in stomacho, aut in eius ore repletio, &

Obiectio.

Celsus uidetur esse huic opinioni contrarius,
 cum dicat, Non oportet in hoc casu uo-
 mere, neque urinam medicamentis mouere.

Responsio.

Intellexit Celsus, si neruorum dolor aut tri-

ur, qui aliquando accidere solet, in præsens-
 trum adesset, quia tremor nervorum ex uo-
 mu magis intēderetur, alioqui uomitum &
 iē à cœna utilem non proposuisset, &c. De
 aulsione & deriuatione loquitur Aet. ser.
 cap. 27. ibi, Post purgationem cucurbitæ
 pectorijs aut capiti affigantur cum scari-
 ficatione. Similiter Auic. prima tertij, tra. 5.
 Et non est malum post euacuationē ipsius
 en chysteribus & similibus, ut naribus ali-
 id approximetur, & propriē conditi &
 purgaria fortia, &c. Itidem Paul. loc.
 e. ibi, Si vires permittant, cucurbitulæ occi-
 pio cum scarificatione defigā:ur, & si fie-
 potest, etiam præcordijs. Valetudini etiam
 giunt quæ sternutamenta excitant, & apo-
 plegmatismi ex thymi & origani decoctis
 prati, &c. De resolutione residui habes plu-
 ex Auic. loc. cit. ibi, Et fiāt pōst super ca-
 t eius uaporationes calefacientes, sicut ex
 metho, amaraco, folijs citri, calamento, ori-
 no, &c. Vel fiant inūctiones ex oleis cale-
 ciētibus & confortatiuis, & ignitū ferrum
 ponatur capiti, uel aliquod emplastrū ex

resolutiuis quæ sciuiſti, &c. Et hæc de exte-
 rioribus, nã de interioribus poſtea medicam-
 tis loquẽs dixit, Et cùm uideris alleuationem
 fac gargarisma, ſternutationes, & pone uer-
 roſas ſuper collum, &c. De regimine uictus
 Aer. ſer. 6. cap. 27. inquit, Curadũ eſt ut ac-
 cipiant cibos quotidie quidẽ, uerũ paucos,
 leues & calidos, & exteſoria ui præditos
 plerũque cum melle edulcatos, intellige in pi-
 tuitoſa apoplexia. Auic. prima tertij, tr. 1. 5.
 Et ſubtilia regimen ipſius, & ſis contentus in
 eo Iuleb, & aqua hordei ſubtili & aqua ca-
 ſei. Intellige in prima die, & in ſanguinea
 apoplexia: nam de pituitoſa poſtea loquens
 dixit, Et potus eorũ ſit aqua mellis, & panis
 cum ficibus ſiccis eſt bonus eis. Quidam uerò
 dicũt ex eis eſſe bonũ origanũ cum lenibus,
 & uua paſſæ, & amygdala & ficus ſunt ex
 fructibus cõueniẽtibus eis, &c. Paul. lib. 3. ca.
 18, Vbi morbus ſe remiſerit, cibus mollis, diſ-
 tribui facilis & ſucculentus aſſumetur. Et
 paulò infrã, Vinum tenerũ, calente aqua tem-
 peratum potui exhibebitur, &c. Auenzoar,
 ſint carnes ſylueſtres, nõ in domibus pingues

et, unde passeret & omnia minutarum a-
 um genera in declinatione morbi cōueniūt.
 hic loquens de uino inquit, Non nouum sit,
 eius superfluitatem: non antiquum, ob ue-
 cem eius penetrationem, sed inter utrunque
 rum magis erit cōueniens: intellige inclina-
 morbo, nam in principio nusquam conue-
 nit. Cels. lib. 3. cap. 27, Potus sit sine uino a-
 ta calida, id est, in principio. Auēroar, Nec
 tent aquam frigidam, nec aquā per se, sed
 quam tepidam cum syrupo corticū citonio-
 m cum melle. si uerò dederis uinū, da solū
 ciam unam in fine pro cōfortatione mem-
 orum, &c.

De motu loquitur Auic. ibi, Quum autem
 luntas adest ut cōueniat, non est malum, si
 te pramittatur exercitiū leue, & moueant
 membra laxata motu aliquo, &c. Paul. Ge-
 nantur aegri curru aut lectica aut lecto pen-
 &c. De somno & uigilia Auicem. dixit,
 um aliquid assumunt, non dormiant super
 um uelociter, sed expectent aliquantulum,
 nec descēdat & digeratur digestionē ali-
 a, nec etiam plurimum uigilent: illud enim

V. i.

iuuat cerebrum, & resoluit ex cibis uapore
non digestum prohibentem digestionem, &
B. Hinc pende quorundam errores, qui nulli
pacto apoplecticum dormire permittunt. Ca
ueat tamen etiam medicus, ne ex hac Au
licentia agrum in somno postea perdat: un
apprehenso manibus pulsu, si nimis senti
calorem profundari, statim infirmum exci
tet, ne amplius dormiat, &c.

Obseruationes de sectione venæ

Aet. ser. 6. cap. 27, Copia sanguinis q
detrahitur, diuidatur: commouere enim ra
tū oportet, non vires exoluere, & calorem
extinguere, &c. Marcus Catinarius, Ne
ces uenas guidez, id est, iugulares, sicuti pr
cipit Razes, nam difficillimè consolidātur:
recitat historiā de quodā scholari in his
uis uulnerato qui mortuus est. Paul. 4. de u
in morb. ac. cōment. 27, Primū ante sectiō
nule per omnes corporis particulas frictio
fieri, ut sāguis extenuatus facilius exeat, &c.

Obseruationes de topicis.

Auic. prima tertij, cap. de apople. Et opo

et ut incipias à debiliore unctione, si cōferat:
et si non, adde, et permuta ad id quod est
fortius.

Obiectio.

Auic. primo can. sen. quarta, cap. 1, In for-
morbo debemus, inquit, à fortiori medica-
mento incipere, quomodo hic adserit cōtrariū?

Responsio.

Tuæ obiectiōni responderet Concil. differen-
tia 154. inquiens esse hanc curam Auicennæ
tentatiuam, etc. Vide eum fusius si lubeat.

Observationes de potu.

Auic. loc. cit. Et potus super cibum est ex
bus magis nocitiuis, ac si diceret, à prandio
l. à cœna nullo modo bibant, etc.

Apoplexiam excitantia.

Excitant apoplexiam fungi, mandragora,
pomorum nimius usus et odoramentum.

Apoplexiam curantia.

Cōferūt apoplexiæ absinthiū, anacardus,
orvus, betonica, colocynthis, galliæ odoramē-

V. 4.

sum, euphorbium, piceetrum, confectio anacardina, theriaca, diatefferon, theriaca magna, hieralogodium, & quaecunque dicta sunt capite epilepsiae, huc referantur. Vide insuper aggregatorem cap. de apop. Item Guiljelmum Varignanā, capite proprio. Item consilia Bertholamei Motagnani, praesertim ubi de epilepsia loquitur, &c.

De prognost. apoplexiæ.

Hippoc. aphor. 2. aphor. 42, Soluere morbum, quem apoplexiam uocāt fortem, impossibile, debilem uerò non facile. B. Fortis apoplexia magna ex parte curationem non admittit, ob respirationis læsionem, aut uirum imbecillitatem: debilis uerò non facile, quia terminatur in paralesim. Vnde Auic. Pars 1. Aet. Razes, Ut plurimum in paralytidem terminatur, &c. Et aphor. 6. aphor. 51, Quicumque sani à dolore capitis derepente capiuntur, & incurrunt apoplexiam, ij in septidiebus pereunt, nisi febris apprehenderit. B. Intellige si dolor fiat à spiritu fl. tuoso, & apoplexia à materia pituitosa, quia tunc

is superueniens dispositionem soluit cale-
 sciendo, extenuādo ac resoluēdo spiritū fla-
 osum, & humorem pituitosum. Pereunt in
 primo, inquit Galenus, quia pars principa-
 non diu tolerat fortes simul & diuturnas
 siones. Auic. prima terti, tra. 5, Et quum
 ciderit febris, tunc spes sit, ut cum ea re-
 uatur superfluitas, &c. Aet. ser. 6. cap. 27,
 hibet spem salutis ipsa calamitas febris.
 ul. lib. 3. cap. 18, Apoplexie morbus ne-
 aquam aut raro curatur, ut qui minetur
 ortem in propinquo. Si uerò etiam remedia
 mittat, plurimum cum partis cuiusdā con-
 ris resolutione discedit, &c. Razes 9. al-
 si. Si spuma ab ore exeat, non est medica-
 n. Adijcit his Arcul. Quod si admotis ua-
 lter sternutationē mouentibus, & non ster-
 a, neque impressionem sentiat, quod est mor-
 le, &c. Cels. lib. 3. cap. 27, Post sanguinis
 sionem, si non redit motus & mēs, nihil
 si superest. Gal. lib. de dinamidijs, Apople-
 cus quum ex multis rebus desiderat sibi
 eum afferri & potum, & statim hac abo-
 natur, mortem sibi imminere significat.

V. ij.

B. In hoc tamen tu considera robur uirium
 & æquum indica, &c. Auic. loc. cit. Et scia
 quòd plurimùm accidit apoplexia habenti
 bus ætates, & corpora, & regimina humi
 da, & propriè quum adest cum humiditate
 frigus. Si autem accidit cum caliditate com
 plexionis & siccitate, tunc est res praua: ægri
 tudo enim contraria complexionis non acci
 dit, nisi propter magnam causam, &c. Cui
 seni etiam accidit uertigo comitans iterata
 tunc illud nunciat apoplexiam, &c. Mesu
 cap. de apoplex. inquit, Illico administretur
 omnis cura: nam dilatio ducit ad mortem fe
 stinam, quum morbus per se parum curam
 recipiat. Idcirco cum protestatione mortis me
 dicus se ad curam intromittat.

Authores dissentientes circa apoplexiam.

- 1 Adserere, apoplexiæ species esse tantum
tres, ut Auicennas.
- 2 Adserere, apoplexiam à frigido tantum
humore fieri, & non à calido.
- 3 Adserere, in apoplexia musculos pectoris

necessitatem respirationis moueri.

Adserere, apoplexiam à nudo & simili frigore posse fieri, cum Auicenna.

Adserere, in acutissima apoplexia omni-
deficere spirationem.

Adserere, apoplexiam fortem nunquam
esse curari.

Confutatio dissentientium circa apoplexiam.

Ad primum, Quaecunque sunt quatuor, nō
sunt tres tantum, sed species apoplexiæ sunt
quatuor per Gal. aphor. 2. comment. 42. igitur
non tres tantum. Quod sint quatuor, ibi
narrat Gal. dicens, quod prima est, quā an-
helitus prohibetur: secunda est, quum respira-
tio fit cum magna ui: tertia est, quæ nec in-
tensum nec uiolentum, sed inæquale ac exor-
dinatum, ac præterea intermittentem habet
anhelitum: quarta est, in qua anhelitus aliquē
tempus durat ordinē, & est debiliore & citò curatur.

Ad secundū respōdet Auic. 3. can. q. causa
apoplexiæ potest esse sanguis & pituita. Quæ
nō solū à frigido, sed etiā à calido humore

V. iij.

fiet. Item Gal. lib. de sang. miss. cap. 6, Apoplexiae proueniunt multo nimirum sanguinis in principium animantis confertim incumbente. Iridem ait 4. de uic. in mor. ac. comment. 27. & in lib. introd. siue medico appellato, & sic etiam à calido fiet.

Ad tertium : Gal. aphor. 2. comment. 42. Verū in apoplexijs non ob id quod sit adacta necessitas respirationis, sed quia uis est inbecillis, idcirco musculi pectoris coguntur operari, &c.

Ad quartum responder Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, Apoplexia quod subito eueniat aut frigidum, aut crassum, aut uiscidū quidpiam, quod principes cerebri uentriculos affatim implet, non autem totius substantia intemperiem, causam esse manifestum est. Idem confirmat Aet. ser. 6. cap. 27.

Ad quintum : Galen. 6. de loc. aff. cap. 4, Quippe in confesso est, & spirationem à uita, & uitam à spiratione seperari non posse, adeò ut uiuentem non spirare, & spirantem non uiuere, sit impossibile. Igitur spiratio omnino non deficit, nisi uellemus apoplexiam

mo appellare : uerum, ut ipse inquit Gal.
ad potest esse exigua ista respiratio, ut sen
summino effugiat. Itidem ait 4. de loc.
af. ap. 7. &c.

Id sextum: Gal. 2 aphor. comment. 42. ui-
der innuere, quod interdum possit curari,
sed quod dixit, magna ex parte curatione
non admittit. Præterea regula medicorum
non semper, sed ut in pluribus intelliguntur:
igitur interdum curabitur. Præterea Hippoc.
6. aphor. 51. aphor. inquit, apoplexiam for-
te in septem diebus ægrum perdere, nisi fe-
bris apprehenderit, igitur febre superueniente
curatur. Quod uero de forti apoplexia intel-
ligit, lege Gal. in comment. ibi, Mutos solet
hoc nominare, &c. Item Aëtic. prima
te, tra. 5. cap. de apople. Accidit, inquit,
ut homo epilepsiam incurrat, & non sit dis-
cretus inter ipsum & mortuum, & non ap-
pareat anhelitus, deinde reuiuiscit & sana-
tur, & tamen intelligit de forti apoplexia,
igitur, &c.

De paralytidis descriptione.
Quum paralyti binas habeat descriptio-

314 DE CONSEN. MEDIC
nes, propriam scilicet & cōmunem, ista
propria, Paralysis est mollificatio totius
diētatis corporis cū priuatione sensus &
tus : communis est ista, Paralysis est ablatio
uel diminutio in sensu & motu uoluntatis,
aut mixto in aliqua corporis parte, nō in
to. Motus ubi deperditur, & si sensus in
ger remaneat, semper paralytūdem efficitur.
Quur autem interdum remanente sensu, sensus
amittatur motus, & econtra, triplices ag
gnantur causæ. Prima, quia ex paucitate
ritus, motus potius quā sensus deperditur.
Secunda, quia aliqua materia est in nervis
motus, & non sensus. Tertia, quia remper
pro uno magis quā pro alio corrūpitur:
si corrumpatur ab humido, motus deper
tur: si uerò à sicco, sensus, &c. In hoc mor
interdum cerebrum, interdum nervi muscu
ad motionem deputati afficiuntur. Quòd
materia obstruens in ambobus cerebri uer
triculis foret, tunc apoplexia diceretur: si u
rò in uno tantū latere, hemiplexia: si i
parte nuchæ, omnes corporis partes præ
faciem resoluuntur: si in parte spinæ su

siue sinistra fiat obstructio, tunc in
parte erit resolutio, &c.

Loci consentientes de descri- ptione paralytidis.

quòd binæ sint paralytis descriptiones,
Avic. secunda tertij, cap. de paraly. ibi,
paralytis quandoque dicitur sermone abso-
luto, quandoque sermone proprio, &c. Gal.
de diff. med. Paralytis est affectio uolunta-
tis motuum offendens in partibus, uel par-
tibusdam cōtingens. Item Prorrh. 3. cōm.
Paraplegia talis est affectio unius partis
corporis, qualis paraplexia totius, &c. Et
Orto de sympt. cau. cap. 5, Si nerui à prin-
cipio fiant stupidi, deinde omnino sensum
comum amittant, paralytis, id est, ner-
uorum resolutio dicitur. B. Pende ex hoc lo-
quòd paralytis à stupore non differt, nisi
in magnitudine. Avic. secunda tertij, cap.
Et multotiēs remanet cum ea sensus, quo-
materia est in neruis motus & sensus,
una est causa, quare motus deperditur, &c.

Vide de his latius Auic. loc. cit. & Arcul.
 loco affecto loquitur Gal. 3. de loc. aff. ca.
 ult. Igitur quemadmodum ubi uniuersae co-
 poris partes quae sub facie constitutae sunt,
 soluantur, faciei partibus illaesis, affectione
 in spinae initio esse certum est: quod si haec
 quae afficiantur, cerebro noxam iam illata
 esse ostenditur. Aet. ser. 6. cap. 27. plura ha-
 bet de his, ibi, Si omnes nervi sensum & mu-
 rum amittant, &c. Item Paul. lib. 3. ca. 1.
 adserit. Lege etiam Galen. 4. de sympt. ca.
 cap. 5. fusius: item 4. de loc. aff. cap. de lin-
 guae aff. ibi, Quum utraque cerebri pars, &
 Item Auic. loc. cit. ibi, Si materia aut laesi-
 fuerit, &c.

De causis paralytidis.

Causae sunt tres, primitivae, antecedentes
 & coniunctae. Primitivae sunt regimen fri-
 gidum & humidum in sex rebus non natu-
 ralibus, incisio nervorum, dislocatio spondi-
 lium, ligaturae comprimentes, percussio in
 partibus nervosis, & accidentia animi, vi-
 timor, ira. Item agriiudines praecedentes sicut

plexia, epilepsia, cholica, uteri strangu-
 tu, etc. Cause antecedentes sunt quatuor
 humores, inter quos plerunque in causa est
 corrupta, interdum sanguis, raro melancholia,
 sumè omnium bilis, nisi alijs humoribus
 adisceatur. Cause coniunctæ sunt repletio
 inanitio, uel apostema in principio nu-
 ch uel in una parte actus cõtenta obstruẽs:
 re immoderata temperies frigida & hu-
 cum materia & sine materia, licet etiã
 immoderata temperies calida & sicca sen-
 & motum ex sua immoderantia debi-
 , etc.

Loci consentientes de causis
 paralytidis primitiuis.

uic. secunda tertij, tra. i. cap. de cau. pa-
 de causis primitiuis loquitur, ibi, For-
 um contractio quandoque accidit pro-
 ligaturam, aut quandoque fit ex com-
 positione uehementi sicut accidit apud per-
 chionem aut casum: aut accidit quum de-
 vant spondyli & rumpuntur, etc. Item
 osio quæ est in latitudine prohibet sensum

et motum in membris, et cui accidit percus-
 sio et ictus, aut motus subito ex timore,
 uore, ira, delicijs, angustia amittitur, et
 Gal. iridem ait 4. de sympt. cau. cap. 5.
 Idque uel ob luxatam quandam uertebra-
 uel alio quouis modo. Si quidem ingens fu-
 affectus, partes inferiores subito et sensus
 et mouendi facultate priuantur, etc. De
 su et percussione habes ex Gal. 3. de loc.
 cap. ult. exemplum de Pausania Syro, qui
 casu in initio dorsi latus duos sinistrae
 manus digitos amiserat, etc. Similiter habes
 hoc capite Galen. plura de incisione spi-
 Gal. 5. de sympt. cau. cap. 2, Corripiuntur,
 uehementer fuerunt refrigerati, et qui se
 raco uino ingurgitarunt, et qui diu in o-
 uixerunt, et qui intempestiue multam aq-
 frigidam biberunt, etc. De causis antecede-
 ribus habes Aet. ser. 6. cap. 28. ibi, Conflat
 hac affectio humoribus multis, uiscosis ac cr-
 sis, neruos obturantibus, per quos motus uo-
 tarij perficiuntur. Auic. loc. cit. Et scitum e-
 quod destructio motus et sensus fit, quonia
 spiritus sensibilis aut motus retinetur a p-

in inactione ad mēbra, &c. Gal. 3. de loc. aff.
 7, Vbi uerò deperdito sensu quis concie-
 dit, non accidente moru, quo uel cōuelli uel
 uideatur, id à uehementi frigore ortum
 esse sentio, &c. Et aphor. 5. comment. 17,
 modicum frigidum hæc facit, cōuulsiones,
 insensationes ob neruorum refrigerationem,
 &c. De causis coniunctis loquitur Auic. se-
 cunda tertij, cap. cit. ibi, Et paralysis faciens
 insensationem spiritus à membris, aut est reple-
 tiua apostema, aut solutio singularitatis,
 &c. Gal. aphor. 2. comm. 20. loquens de im-
 modica intemperie inquit, Quoniam omnis
 immodica intemperies, imbecillem reddit aut
 imminuit operationem propriæ uirtutis. Et in
 introduct. siue med. Hemiplexia fit ex humo-
 rum crassorum copia, qui capitis uasa, unde
 sibi sentiendi mouēdi que facultas adue-
 nit, obstruunt. Itidē adserit 3. aphor. cōm. 23,
 in fine cōmēti, loquēs de apoplexia. Paul. lib.
 1. 18, Si partes resolute cōuellantur uel re-
 soluantur, id ab inanitione uel repletionē pro-
 ducit, &c. Huc etiā spectant quæcunque de
 causis apoplexia nuper recitata sunt, &c.

De signis paralytidis.

Quum quis sensum & motum in una parte, uel in pluribus corporis partibus amiserit, tunc paralytidem pati dicimus. Signa, siue a primitiuis causis, habentur partim ex relatione infirmi, partim ex quadam coniu-
ra. Signa ex causis antecedentibus, si si-
mores, cognoscuntur, quia si sanguis, est
inflatio uenarum, totius repletio, oculorum
rubedo, &c. Si pituita, adest albedo, mi-
tues, urina alba, pulsus debilis, tardus, &c.
Signa ex causis coniunctis, si adsit aposte-
ma, cognoscitur ex febre, dolore, tumore &
ritie in loco percepta. Si immodica inten-
sitas cum materia replens, cognoscitur ex
ctu, uel ex his quæ iuuat & nocent, i. e. ex
bitudine, uictu præcedente & similibus, &

Loci consentientes de signis
paralytidis.

Razes 9. alman. Quum aliquis se mouere
non ualet, aut unum, aut plura membra
suis, & sensum illius membri siue membrorum
amiserit, incurrisse paralytim pronunciamus.

lic. secunda tertij, tra. i. cap. de sig. paraly.
 le quæ est à tortuositate, aut à casu &
 percussione aut sectione, cognoscitur ex præ-
 senti causa. Et primo lib. fen. secunda, cap.
 signis domini humorum, & loco citato,
 et omnia signa humorum, præsertim ibi,
 si materia est cum sanguine, significat eā
 glex, & uenæ, & oculus, & repletio, &c.
 si fusius in hoc loco, & intelliges cætera à
 iudicta: lege etiam Arcul. & Gord. & Sa-
 na. & Auic. ibi, Si fieret ab apostemate ca-
 lo, tunc extensio & febris, &c.

De cura paralytidis.

ad curationem quinque expediunt, uideli-
 cet: victus ratio, humoris præparatio, euacua-
 tio, reuulsio & deriuatio, residui resolutio,
 membrorum roboratio. Victus ratio sit
 anuatoria, sicca, non uiscosa, non uirosa,
 siuentri accommoda, urinam ciens, in quã-
 tate modica: utatur his, quæ roborandi ner-
 uorum facultatem habent: toleranda est fames
 sitis, in potu exhibeatur hydromel potius
 quam uinum: nam materias ad nervos uinum

penetrare facit, & procul sit acetum: nā al-
 de nocet in morbi recessu: vinū antiquū pa-
 cum exhiberi debet, eò quòd calefaciens
 exiccans, agritudinibus nervorū cōfert. Si-
 liter & frictio & gestatio in lectica au-
 hiculo, & balnea cōmendātur. Humorū
 paratio fiet cum calefaciētibz & exicu-
 tibus, ut puta cū hydromelle, syrupo de stō-
 de, rhodomelle cū aquis saluæ, betonica, s-
 marini: huc etiam spectat oxymel simple-
 ratione aceti cum syrupo mellino rectifi-
 dum est. Euacuatio fiet per ea quæ reduc-
 tem humorem euacuāt, ut cum hiera sim-
 ci & composita, hiera hermetis, hiera lo-
 dione: nec ab re existimarem, si à uense-
 ctione inciperemus, moderatāmq; detrac-
 tionem moliremur, ut ne agri nimis perfri-
 tur, fiatq; detractio per antithesim à sco-
 ribus partibus, nisi quid aliud impediāt
 uulsio & deriuatio, si ea quæ à cerebrad-
 nucham confluunt, ad alias regiones tra-
 mus cū cucurbitulis affectis, partibus ap-
 enematibus, masticatorijs, crinis siue st-
 tatorijs frictionibus, & his similibus. Relu-

o residui paratur per exteriora & interio-
 ra. Exteriora sunt linimentis, ceratis, empla-
 ris & balneis. Linimenta parantur cum oleo ca-
 omillino de spica, de costo, de terebinto, uul-
 no, de castoreo, &c. Cerata similiter fiunt
 pulvere lumbricorum, galanga, piretro, ca-
 storeo, additis oleis, cera & pice. Emplastrum
 osunt, quale est emplastrum de sinapi Mes.
 el fiat cum herbis capitalibus, additis oleis
 & aliquali farina. Balnea conferunt etiam natu-
 lia, sicut sulphurea, quam etiam arte para-
 ra. Interiora sunt electuaria, confectiones, pul-
 ueres, & similia. Electuaria sunt diamusculus
 ulcis, theriaca, & omnia denique quae cale-
 ciunt, siccant & resoluunt. Confectiones
 nt acorus codicus, pulueres, chamæpitheos,
 echados, &c.

Loci consentientes de cura paralytidis.

Aet. ser. 6. cap. 28. loquens de dieta inquit,
 t attenuatoria uentri comoda, nihil viscosi
 ut uirosi habes, &c. Paul. lib. 3. ca. 18, Cibi
 ueniunt ad coctionem expediti, nec recre-
 entit. Et paulo infra, Victus siccior utilis

X. ij.

est, potio modica & frictio, &c. Mesu. ca. de paralyti, Utantur cibis, qui proprietate habeant confortandi nervos, qualia sunt g. na pini, leporis cerebrum, origanū, hisopū, piper, gingiber, sansucus, salvia, &c. hoc intellige in causa frigida, & in processu morbi. Auic. secunda tertij, Stude ut facias pa. famem, & ciba cum cibis siccis, & fac tol. rare sitim: & in secūda mensa iuuat uti m. dulla nucleorū pini, & scias quod aqua m. lior est eis quā uinū: nam materiā in nervis penetrare facit, & ut plurimum acescit: at. tum uerò est ex rebus quæ sunt nervis nocib. liores, &c. Conciliator diff. 144, Non cōp. tit uinum, si materia cruda & in fluxu sit. si uerò digesta, & facta sint euacuatione. paucū uinū antiquum cōfert: nam materiā. resoluat & exiccat. B. Nota paucum dixi. ex eo quod Mes. dicebat, sciro uinū esse ne. vis inimicum & oculis per se: ipsius enim al. sus causa est morbi per se. Itidē Auic. loc. ci. Paul. Vomitus à cœna cōuenit, itē gestatione curru, lectica aut uehiculo, &c. De prepar. tione humorū meminit Auic. secunda tert.

ando dixit, Et in hac hora sis contentus
 bus subtilibus ex his quæ leuiter digerūt &
 luunt: unde dixerat, quòd quādoque exhi-
 tur oxymel cum sua dispositione, & oppo-
 inacum cum syrupo de melle, &c. Aet. ser.
 cap. 28, Utendum est etiam portionibus re-
 tis ad morbum comitialē. Quòd uerò per po-
 ones intelligat syrnpos, & ea quæ incidēdi-
 m habent, manifestū est ex his, quæ ab ipso
 præ relata sunt, &c. Mesu. Adæquatio fit
 ateriei, cum administratione rerum morbi
 ateriam carminantium & maturantium,
 &c. Vide de hac præparatione humorū plu-
 iuxta neotericos practicātes, &c. De eua-
 cuatione facit mētionem Aet. ser. 6. cap. 28.
 i, Manifestum igitur est, quòd redundantē
 umorem euacuare oportet, nec aptius prin-
 cipium in his reperire datur, quā à uenæ se-
 ctione, si permiserit ætas, habitus, tempus,
 progressus uictus, &c. oportet autem mode-
 ratam detractiōē facere, ne uenæ perfrige-
 entur. Quapropter minuenda est materia
 aululum, detractio uerò fiat à sanioribus
 artibus, &c. Anic. In illa autem, in qua est
 X. iij.

spes, oportet incipere à phlebotomia, &
 Paul.loc.cit. Quoniã partes resolutæ uel ci-
 uelluntur uel relaxantur, idque à repletione
 uel inanitione, attendendũ rursus est parti
 sanguinem detrahi debere, partim non, &
 Mesu.cap.proprio, Euacuatio fiet cũ adm-
 nistratiõne priorũ euacuantium, sicut
 hiera diacolocynthidos, pilulis færidis, hiera
 hermetis, &c. Similiter Aet.loc.cit. Interpe-
 sitis diebus aluus subducatur, primũ clysteri-
 ribus, deinde per aloës & polypodij & col-
 cynthidis cremorem, conuenit etiã hiera An-
 chigenis, &c. De reuulsione loquitur Aui-
 uen. lib. 1. cap. 1. ibi, Oportet ut clysterizetur enematibus for-
 tibus, & colyria fortia supponantur, ut incli-
 nentur eorũ materie ad inferiora: cõfert et
 positio uentosarum super capita lacertorum
 absque incisione, sed post euacuationẽ, &
 Similiter Aet.ser. 6. cap. cit. Post purgationem
 cucurbitule affectis partibus adhibeantur:
 uerò hæ ineptæ sint, uicinis affigantur, &c. E-
 paulò post, Detracta materia etiam sternu-
 tatorijs, & pituita per os ducentibus, utendi
 est, &c. Itidẽ Paul.lib. 3. ca. 18. asserit. Me-

et de par. Diuersio cōplectur cū gargaris-
 mibus, masticationibus, caputpurgys &
 snuatorijs, &c. Quomodo autē hæc fiant,
 libes suprà de cephalæa à causa frigida,
 &c. De resolutione residui Auic. secūda ter-
 rap. cit. Cūmq; membrū redit ad se, oportet
 ut ipsum excites, post id & constringas
 iūm, ut ad integrā redeat sanitatē, &c. Et
 pulò infrā, Oportet ut resolutio fiat cū ali-
 quibus, quæ sint ut anisum, sigia, id est, storax
 quida & castoreū. Et suprà dixerat, quòd
 emplastrū de sinapi est ex eis quæ ipsis cō-
 runt, & fricatio cū oleo & nitro, & aqua
 sulphurea, & administratio acori, & quòd
 nihil est ita conferens ut theriaca & mirri-
 itū, & assa fatida est uehemētis iuuamēti-
 bita uel linita, &c. Mesu. Vltimā rem cō-
 lēt unctiones, emplastra, fricationes & bal-
 eū, &c. Aet. loc. cit. laudat ad resolutionem
 residui unctiones quatuor fieri, unā circa ca-
 titatē occipitis, tres in uertice, ex quibus, in-
 uir, nō despero perfectā restitutionem, &c.
 Paul. li. 3. ca. 18, Cucurbitula resolutis parti-
 bus agglutinētur: si pauca fuerint distinctim,
 X. iij.

post cucurbitulas delinantur medicamēta
pice, resina, &c. Vide etiā Auic. ibi, Quā
que iuuantur à febre & à balneo sicco, &

Obseruationes de humorum præparatione.

Marcus Catinarius cap. de par. Cauendū est, inquit, ne nimis præparemus cum frigidis digestiuis nimium calefacientibus, usque ad quartam diem, sed gradatim procedendo à debilioribus ad fortiora, eo quòd magis materiam dilatant, quàm præparent.

Obseruationes de euacuatione.

Auic. secunda tertij, Et non properes in usu medicinarum fortium in principio reuolue-
imò tarda usque ad quartum & septimum
quòd si fuerit ægritudo fortis, usque ad decimum quartum.

Obiectio.

Quur Auic. & Mes. incipiunt à debilioribus, quum Razes dicat, Cuius curam incipimus cum pilulis foetidis, quæ inter uehementia pharmaca reputantur?

Responsio.

Intellige ad utriusque concordiam, quòd
 coactè, illi magis regulariter procedunt.
 ul. incipit à semidrachma hieræ, & inter-
 sitis diebus exhibet integram drachmam,
 hinc unā & semis, postea duas atque tres.
 Notādum est etiam ex Pauli & Aetij tex-
 quòd in hoc morbo interpolatim medici-
 is exhibeamus, ne natura medicinis assue-
 sit & laxetur. Idcirco diebus interpositis,
 adò uno, modò altero medicamine uti præ-
 ciūt, & interim vires resumēdas iubēt, &c.

Observationes de resolutione.

Auic. cap. de cur. par. Et ubi necesse est,
 solvere oportet, & non sint resoluētia cū
 nificatione pura, sed cum aliquantula sty-
 pticitate, quia laxantia substantiam mem-
 debilitant, & resoluētia spiritū resoluūt,
 circo cum stypticitate fienda, &c.

Observationes de topicis.

Galenī est placitum 3. de loc. aff. cap. ult.
 consideretur locus originis nervorum, unde

exemplum refert de Pausania Syro. Auic. lo-
cit. Positio medicinarum super locum par-
alyticatum est ex eis, quæ non afferunt iuu-
mentum, de quo sit curandum, sed oportet
gnosceret originem nervorum, &c. & o-
portet cum resoluventibus procedere à debilibus
ad fortiora, & cum medicatur cum cal-
idis, augmentatur agritudo, quoniam ma-
teria subtilis dilatatur per ea plurimum: idcirco
oportet miscere cum infrigidantibus
temperatis, ut succo liquiritiæ: & de empl-
stris loquens dixit, Quumque sensus est debi-
lis, fortasse emplastrum forte nocet, & n-
sentit id, & ducit ad læsionem & ulcerati-
onem fortem: oportet igitur ut omni custod-
ab illo caueatur, & ut consideretur disposi-
tio impressionis emplastri, &c. Paul. lib.
cap. 18, In relaxatis quidem mēbris adstri-
gentia ijs quæ laxant miscere, & frictione
intensam moliri conuenit: in conuulsis ue-
laxantibus duntaxat utendum est, & fr-
ictione molli, &c.

Paralytidem generantia.

Generant paralytidem uapor argenti

siurnes porcinae, & tubera.

Paralytidem curantia.

acium ad paralytidem, & à proprietate
 re occulta, quàm manifesta ualent, abroto-
 mameoris, betonica, salvia, aristologia,
 amisia, costus, maiorana, matersylua, co-
 lenthis, laurus, rosmarinum, acorus, cala-
 natum, origanum, hisopus, melliophyllon,
 rna, sauiua, mel, cinnamomum, anacardus,
 a, helleborus, pyrethrum, peucedanum, di-
 pnus, cyclamen, ceratũ alexandrinũ, aqua
 schurea, aluminosa, unguentum de bdellio
 Ns. unguentum basilicon Mes. unguentum
 mciaron Nic. oleũ de piperibus, de cinna-
 mo, de citro, oleum laterinum, uulpinum,
 crosto, de terebinthina, de sinapi, de pyre-
 ro Nic. pinguedo gliris, blãcha Nic. confe-
 ti pyrethri Mes. ca. de epileps. cõfectio ana-
 edina Mes. ca. de aegritud. neruorũ, diam-
 b. Auic. in 5. tra. diacalamentũ, diacasto-
 Ni. sy. de stechade, theriaca, hiera Ruffi,
 bra Hermetis, hiera logodion, hiera picra,
 ectio de musco, diapliris arcot. Nic. pilula
 fida, de euphorbio, &c. Roborant nervos

nuclei pinearū conditi, castoreū, nux indi,
 paonia, &c. Vide Varigna. in lib. de secre,
 ca. de paral. Item Barth. Montagnanā cō.
 48. Item Arcul. & Sauon. ca. de cur. pai.
 Vide etiam Gord. & alios practīcantes.

De prognosticis paralytidis.

Paulus loco suprā citato, Quæ à nerui
 uisione oritur particularum resolutio,
 sanabilis est: quæ uerò à temperie uel
 humore, commune ex facultatibus prædis
 præsidium recipit. Auicennas secunda ter,
 cap. cita. Urina infantis si sit uiridis, ni
 ciat paralysim siue spasmus, & paralys
 eueniens à remotione spondilium mortif
 est secundum plurimum. B. Ratio est, qu
 spondiles eos neruos, qui à se exeunt, fac
 comprimunt: qui nisi ad suum locum reduc
 tur, insperata est salus. Celsus lib 3. cap.
 Morbus qui fit in partibus, nunquam a
 tus, sæpe longus, & ferè sanabilis est. Ras
 cap. de paral. Quòd si paralysis ex perc
 sione aut casu euenerit, & accidit subito,
 quòd nerui aliquantulum contundantur, ta

rpermanebit , nec unquam sanabitur. B.
 Iellige, nisi sit in etate, in qua membra sper
 mica restaurari possint. Hippocrat. 3. pror
 r. Paraplecticis parotides uitiosae. B. Pa
 rides sunt abscessus post aures , uitiosique
 sit , quia ad inferas partes non deuoluun
 ti, sicuti ceteri abscessus boni. Auicen. loco
 cEt quodcunque membrum mollificatorum
 eparaleticorum secundum colorem reliqui
 eporis existens , non minoratur nec exte
 natur, est de quo maior habenda est fidu
 c, quam illud quod est diuersum ab hoc:
 in quum minoratur aut extenuatur, si
 gum est quod non nutritur, &c. At si ni
 l horum acciderit , bene sperandum. Item
 fris superueniens soluit paralysem. B. Intel
 le, si ab humiditate & frigiditate fiat. Ar
 c. Tremor & dolor in paralyse superue
 ans, bonū: si uerò paralyse annū pertrans
 iut plurimum non recipit curam. B. Intel
 le tremorem & dolorem idcirco esse bonum
 ilicium , quia ubi tremor & dolor , ibi est
 sus & motus, &c.

Authores dissentientes cir-
ca paralytidem.

- 1 Adserere, tunc resolutionem uocari, quum
sensus deperditur, & non motus.
- 2 Adserere, impressionem sensus in membris
à calore impediti.
- 3 Adserere, frequētem usum calidorum mi-
rum in modum prodesse nervis.
- 4 Adserere, uehementia pharmaca in prin-
cipio curæ paralytidis conuenire.
- 5 Adserere, tunc paralytim uocari, quum
uis sentiendi & mouendi omnium neruorum
amittatur.

Confutatio dissentientium cir-
ca paralytidem.

Ad primum respondet Gal. 3. de loc. aff.
cap. penul. dicens, Quòd neruorum tunc uera
erit resolutio, ubi motus deperditur: ubi uerò
aliquarum partium sensus perit, eam partem
sensus expertem uel stupidam potius dicimus
quàm resolutam.

Ad secundum dicit Auic. secūda tertij, tra.
1, Quòd membra sensus non recipiunt impres-

sionem propter complexionis corruptionem: complexio uerò corrumpitur à calido, aut frigido, aut humido, aut sicco: sed calidum, inquit, non prohibet impressionem sensus, &c.

Ad tertium, Hippocr. aphor. 5. aphor. 16, Calidum, inquit, ubi eo sepius utatur, hæc mala affert, carniū effæminationem, neruorum incontinentiam, &c. ubi Gal. in comment. intelligit neruorum imbecillitatem fieri, eorum substantia à calore dissoluta, & sic calidi frequens usus neruis nocet, substantiam neruorū dissoluens.

Ad quartum, Communis est opinio, ut regulariter procedendo non euacuemus cum uehementi pharmaco, maximè quum paralysis de materia pituitosa non sit morbus acutus, sed ubi subitanæ mortem minetur, coactè cum uehementi pharmaco purgabimus.

Ad quintum, Galen. 3. de loc. affec. ca. 10, Quum omnes igitur nerui quum sentiendi tum mouendi uim amiserint, apoplexia huiusmodi affectio appellatur, igitur non paralysis, &c.

De conuulsionis descriptione.

Conuulsio, est neruorū ac musculorum affectio, per quam interdum totum corpus, interdum pars, citra uoluntatem ad suam originem contrahuntur. Huius species sunt tres, scilicet τέτανος, id est, tētio æqualis: ἐμπροσθενός, id est, tentio ad anteriora: ὑποπρόσθενός, id est, tētio ad posteriora: locus uerò affectus cognoscitur, quia uniuerso corpore conuulso infra faciē, tunc prima spinalis medulla pars affecta est: si uerò cū uniuerso corpore etiam facies conuellatur, tunc cerebrum affectum esse dicimus: si autem quæpiam corporis pars conuellatur, tunc eorum neruorū originem esse affectam iudicamus, &c.

Loci consentientes circa conuulsionis descriptionem.

Gal. lib. finit. med. Conuulsio, est affectus qui neruis ac musculis accidit, quum modò corpus totū, modò pars eius citra uoluntatem trahitur. Oribas. aphor. 2. comment. 30, Spasmus est, inquit, motus inuoluntarius, uoluntaria obtinens loca. Auicenna. secunda tertij, cap.

de spas. Spasmus, est aegritudo nervosa, qua
mouemur lacerti ad principia sua, & inobe-
dientes sunt in dilatarione: nã alij remanent
secundum suam dispositionem, & non dila-
rantur: alij facile redeunt ad dilatarionem
suam, sicut in oscitatione & singultu, &c.

Obiectio.

Quomodo est aegritudo, si Gal. 5. de sympt.
cau. referat esse accidens?

Responsio.

Tria considerantur in conuulsione, malus
motus, & sic est accidens: uel mala membri fi-
gura, & sic est morbus officialis: uel causa cu-
ius fiat hoc accidens, & sic est intemperies
sicca, idcirco aegritudo dicitur, &c. Galen.
aphor. 6. com. 39, Conuulsio est passio inuo-
luntaria ad simile uenientibus nervosis par-
tibus dispositionem, quam etiam in motibus
factis secundum appetitum assumebant. Ici-
dem ait in lib. de trem. & palpit. in fine. Et
aphoris. 4. com. 57, Tres sunt numero conuul-
siones, opisthotonos, emprosthotonos, & teta-
nos. Itidem ait in lib. de trem. & palp. Simi-

Y. i.

338 DE CONSEN. MEDIC.

liter Auicen. ibi, Sic mollificatio diuersificatur in membris. Et ibi, Quum corpus declinat ad anteriora. De loco affecto loquitur Gal. 3. de loc. affec. cap. 6. ibi, Conuulso enim uniuerso corpore infra faciem, omnium infra faciem neruorum originem affectam esse putandum est, quæ sunt prima spinalis medullæ partes: si uerò cum uniuerso corpore facies etiam cōuulsa sit, non solum eam partem, quæ ex spina procedit, uerum etiam ipsum cerebrum curamus, &c. Itidem. 4. de sympt. cau. cap. ult. adserit.

De causis conuulsionum.

Quum duplex sit spasmus, alter ad materiam proportionatus, alter non proportionatus, causa non proportionati duplex, intrinseca & extrinseca. Intrinseca sunt accidentia animi sicut timor, mæstitia, dolor, uel mala qualitas à materia uermium, uel mala qualitas per cōsensum aliorum membrorum, ad neruos, ut uentriculi, uteri, &c. Extrinseca est mala qualitas frigida, styptica, membrum comprimens, ut frigiditas aëris, uel fri-

gus nerui uulnerati. similiter punctura caca,
 casus, percussio, incisio, uel mala qualitas ue-
 nenosa, qualis est morsus uenenosorum anima-
 lium, uel præcipitatio, & quicquid cerebrum
 imbecille reddit, mordicat ac dolorem infert,
 ex quo nerui fugiant ac contrahantur, &c.
 Proportionalis uero ad materiã duplex, al-
 ter de repletionem, alter de inanitione. Cau-
 sa primitiua de repletionem sunt, crapula, ebie-
 tas, consuetæ euacuationes retentæ, balneum,
 & exercitiũ in corpore plethorico, &c. Cau-
 sa antecedentes sunt ut plurimum pituita &
 sanguis, raro melancholia, rarissimè omnium
 bilis. Causæ cõiunctæ sunt ipsi humores in ner-
 uis existentes, neruos iuxta lōgitudinem dila-
 tantes, interdum abscessus, uel flatuosus spi-
 ritus, crassus, qui ubi fuerit particularis, uulgò
 dicitur granfo. Causæ conuulsionis de inani-
 tione sunt quæcunque strenuè exiccant, quales
 sunt febres ardentissimæ, ieiunia, uigiliæ, alui
 profluuium, nimius concubitus, euacuationes
 persoluentia pharmaca, nimius labor, &
 quæcunque possunt humiditates in neruis na-
 turaliter existentes dissipare ac extenua-

Y.ij.

re, & omnino exiccare, &c.

Loci consentientes de causis
convulsionum.

Auic. secunda tertij, ca. de spas. Et quandoque fit spasmus qui ad materiam non proportionatur eueniens causa rei impediētis, à qua nervi fugiunt & congregantur ad expellendū ipsum: & causa illa aut est dolor, & multotiens ex uapore calido mordicatio, aut à qualitate uenenosa perueniente ad cerebrum, aut propter qualitatem nō uenenosam, sicut quum spasmus accidit ab infrigidatione uehementi, congregante neruum & lacertum, & contrahitur ad caput suum, &c. Paul. lib. 3. cap. 20, Porro facit affectum, quanuis raro lassitudo, humi dormitio, ponderis eleuatio, casus, uulnus, ardor, ictus, & alia quæ eandē neruis offensam inferre possunt, &c. Vide de his latius Auicen. loc. cit. Quod uerò spasmus proportionatus sit duplex, lege Galen. apho. 4. comment. 57, Omnes convulsionem fiunt aut à repletionem, aut ab euacuationem partium, uel delictet neruosarum. Itidem adserit aphor. 6.

com. 39. & 5. de sympt. cau. cap. 2. ibi, Atque omnes, Hippoc. authore, in duo capita reducuntur, plenitudinē & inanitionē. Et Hipp. aphor. 6. apho. 39, Cōuulsio, inquit, fit uel ex repletionē & inanitionē, &c. De causis huius cōuulsionis proportionatē primitiuis loquitur 3. de loc. aff. ca. 6, Si temulento cuiuspiam ac omnino pleno homini, qui in otio degit, id euenire conspexeris, ex repletionē iudicabis. Et aphor. 5. com. 5, Solet etiam uinum neruos replere, quibus repletis fit conuulsio, &c. lege fusius de hac re Arcul. cap. de spas. Gord. Ant. guaine. De causis antecedentibus & coniunctis loquitur Auicennas secunda tertij, cap. de spas. ibi, Causa spasmi aut est cum materia, aut sine materia, sicut caliditas & siccitas: & materia spasmi secundum plurimum est phlegmatica, aut melancholica, aut sanguinea, &c. Et paulò post, Causa essentialis spasmi ex repletionē est, aut humiditas & frigiditas adiuvans secundum cōgelationem & grossitiem, aut caliditas & siccitas, &c. Hippoc. aphor. 5. aphor. 17, Frigidum conuulsiones, distensiones, lino-

X. iij.

342 DE CONSEN. MEDIC.

res, rigores febriles facit, &c. B. Quia omne
 nimium siue calidum siue frigidum nervus no-
 cere solet: nam ex immodico calore eorum sub-
 stantia dissoluitur, & ex immodico frigore
 cogitur ac cohibetur. Gal. 2. de sympt. cau.
 cap. 2, Causam huius rei quippe demonstra-
 uimus, dum neruum aut stupore aut resolu-
 tione infestari dicebamus si frigus illum con-
 stringat, aut crassi lenique humores ob-
 struant, aut aliqua causa externa ipsum suo
 pondere comprimat, &c. Itidem ait in lib. de
 tre. & palpitatione cap. ult. ibi, Itaque ner-
 uos, tendinesque in animalium corporibus ex
 humore superfluo tenses, &c. Quod fiat etiam
 à flatuoso spiritu, habes ex Auic. loc. cit.
 ibi, Et non est longum, quin sit spasmus eue-
 niens à uentositate inflatua, spissa. Ipse enim
 est ex eis quæ plurimum accidunt, & remoue-
 tur in hora, intelligens de eo quod dicitur
 granfo. Itidem ait Paul. lib. 3 cap. 20. ubi
 tribuit originem musculus repletis spiritu &
 aëre crasso nebulosoque, &c. De causis con-
 uulsionum ex inanitione plurima refert Auic.
 secunda tertij, cap. cit. ibi, Spasmus autem sic-

us, alius quidem qui fit successione febrium
 idurentium, & propriè in febribus sirsen, &
 successione motuum laboriosorum corpora-
 lium, & animalium sicut angustia, uigilia,
 timor, & ille est ex eis, à quibus fit euasio.

Obiectio.

Quomodo fit euasio, si ab Hippocrate &
 Galeno lib. de tre. & palp. in fine existima-
 tur incurabilis?

Responsio.

Duplex est spasmus, alter quidem confir-
 matus, in quo omnes substantiales membro-
 rum humiditates consumptæ sunt, & hic di-
 citur incurabilis, quia humiditates illæ deper-
 ditæ haudquaquā restaurari possunt. Alter
 non cōfirmatus, in quo primæ tantum humidi-
 tates cōsumptæ sunt, sed spei aliquid superest
 ut restaureretur, & sic interdū ab his fit eua-
 sio. Gal. 3. de loc. aff. cap. 6, Quippe cū con-
 uulsio fit uel à labore, uel uigilijs, uel fame,
 uel solitudine, uel arida æstuatēque febre,
 qualē in phreneticis uidere est, causa eius esse

X. iij.

ariditatem uacuationemque rectè putaueris. Et 5. de sympt. causis, Phlegmone plenitudinem parit, ardentissimæ ac aridissimæ febres inanitionem, &c. lege etiam aphorismum, Ex superflua purgatione cōuulsio, &c. lege etiam Gal. 5. de sympt. cau. cap. 2. & in lib. de tre. & palp. & aphoris. 6. cōment. 39. ubi affert exemplum modò de chordis, quæ ob nimiam humiditatem rumpuntur: aut de loris, quæ ad ignem longius calefacta contrahuntur. Itidem Auic. Sic dispositiones chordarū, quæ elōgantur in hyeme propter humiditatem, & abbreviantur in æstate propter exiccationem.

De signis conuulsionum.

Signa precedentia sunt angusta ac luctuosa respiratio, pulsus rarus, durus, exiguus, risus sardonicus, tremor manus agri occultus: aluus siccescit, urina aquæ similis uel cruenta esse uidetur: tument oculi, & facies rubescit, precedunt tremores & singultus, dolor capitis, lumborum ac clauiculorum accidit, dentes strident, oculi peruertuntur. Signa præsentia sunt membrorum contractio ad suam

riginem, diuersitas in pulsu, ita ut in prin-
 cipio sui motus sit humilis, in medio sui mo-
 tus ascendat, & in fine cadit, arteria alijs
 membris est calidior, &c. Signa conuulsio-
 nis erunt, si in sanis repentina conuulsio ad-
 ueniat ac permaneat. Signa conuulsionis de
 inanitione sunt, conuulsiones post multos su-
 dores, uomitus, alui profluvia, sanguinis flu-
 cum, uigilias, fames, aut febres ardentissi-
 mas accidentes, &c. Signa conuulsionis non
 proportionata ad materiam sunt cause eius
 antedictæ. Signa humorum cognoscuntur ex
 coloribus & reliquis sæpius antedictis. Si-
 gna apostematum sunt dolor, febris, pulsatio,
 &c. Signa conuulsionis per consensum ali-
 cuius membri sunt, quia præcedit læsio illius
 membri, &c.

Loci consentientes de signis conuulsionum.

Paul. lib. 3 cap. 20. de signis præcedentibus
 uerba facit, ibi, Notæ horum sunt angustæ
 respiratio, pulsus rarus & exiguus, nonnun-
 quam & risus sardonius oboritur, rubet fa-

cies, oculi intumescunt, & id reliquum quod à me nuper relatum est. Auic. quasi de uerbo ad uerbum eadem recitat. Galen. prognost. 3. comment. 34, Potissimū conuulsiones futurae cognoscuntur, si partes in uultu peruertantur, aut dentes strident, aut oculi crebrò mouentur ac peruertuntur: sed in pueris sufficit, si tantummodo uigilent, si admodum metuant, si mente lugeant, ac alius non deiciat, &c. Memento etiam aphor. 54. lib. 6. uidelicet, In acutis passionibus, quae cum febre sunt, luctuosa suspiria malum. uide de pulsu duro & de alijs huc spectantibus, Gal. in cōment. De signis praesentibus lege Razen, 9. alman. cap. de spas. ibi, Quum aliquod mēbrum alicuius contrahitur, & ad suam redit originem, aut plura membra sic disponuntur, spasmatata esse pronunciamus. Auic. secunda tertij, cap. de sig. spas. Pulsus spasmatorum est extensus & diuersus in situ, ascendens & dimittens, sicut sagittae euadentes de arcu sagittarij, &c. De signis spasmi, de inanitione & repletionem Gal. prorrh. 3. cōment. 69. inquit, Conuulsiones ex euacuatione post su-

rores multos, uel uomitus, uel deiectiones, uel
 sanguinis eruptiones, uel inedia, uel uigi-
 las, uel motiones tum multas, tum uehementes
 iunt, &c. Itidem Paul. lib. 3. cap. 19. Act.
 ix. 6. cap. 38, Si statim ab initio morbi con-
 uulsiones fiant & permanserint, tunc à ple-
 nitudine ortum habent: si uerò à multis su-
 doribus, uomitibus, &c. tunc ex inanitione
 oriuntur. Itidem Auic. loc. cit. ibi, Si spas-
 mus à repletionem fiat, signa sunt, quòd subi-
 tò prouenit, & non discedit uelociter: si à
 siccitate fit paulatim & successione agri-
 tudinum euacuantium, &c. Idem sentit Gal.
 aphor. 2. comment. 26, Signa humorum tan-
 git Gal. prognost. 3. cōment. 34. ibi, Colores
 præter naturā habentur indicantes humorum
 prauitatē, ex quibus cōuelli assolent. Pallidus
 enim aut liuidus prauū qualitate significat
 humorem, rubidus uerò sanguinis copiam,
 &c. De signis spasmi ex apostemate loqui-
 tur Auic. secunda tertij, cap. de sig. spas ibi, Et
 quandoque cum spasmo sunt pulsatio & sal-
 tus, & est signū malum. Pulsatio unam dua-
 rum rerum significat, aut apostema in uisce-

ribus, &c. Similiter loquens de signis per consensum alicuius partis inquit, Cum nocumentum est ex stomacho, comunicat ei cerebrum, deinde nervi, & fit spasmus successione nominatus, qui est sicut succus porri, aut arugæ aris, &c.

De cura conuulsionum.

Ad curam spectant quatuor interiones: prima, est victus ratio: secunda, euacuatio, sub qua reuulsio comprehenditur: tertia, resolutio ac membrorum roboratio: quarta, est symptomatum remotio. Victus in conuulsione de repletionem existente materia pituitosa sit calidus, tenuis & siccus in principio & in uirium robore: si uero imbecillitas uirium adsit, etiam in statu cogimur ei succurrere, cum carnibus qualitate siccis, uinum non bibatur usque ad morbi remissionem, nam tunc ad resolutionem antiquum facit. In conuulsione de inanitione victus sit frigidus, humectans, pinguis, tenuis, quum male transglutiant, & uia sint stricta: magis tamen humectet, quam infrigidet, qualis est aqua carnis cum quatuor semini-

us frigidis alterata, lac recenter mulctum,
 orbitiones ex chondro & alica, cremor pti-
 nae. Potus sit aqua hordei, aqua cucurbitae
 & mellonis indi cū Iuleb, si adfuerit febris: si
 minus, his addatur parū vini tenuis & aquo-
 , facit enim ad penetrationē, &c. Euacua-
 o fiet primū per uenae sectionem, si san-
 guis uel humorum copia in causa fuerit: si mi-
 nus, iuxta humorum exigentiam euacuato, de
 quibus in capite de paralyti satis dictum est.
 Sed ubi morbus inducias dederit, tunc primū
 materia erit preparāda cum rhodomelle, sy-
 nopo de stechade, cum aquis ac decoctis ca-
 piti spectantibus. Conueniunt insuper clyste-
 ria cū rebus capiti dicatis, frictiones ad par-
 tes subiectas, item masticatoria, sternutato-
 ria, cucurbitulae affectis partibus cum scarifi-
 catione, multa existēte materia, uel sine sca-
 rificatione, pauca existēte. Resolutio ac mem-
 brorum roboratio perficitur cum emollienti-
 bus ac resoluentibus, cū materia sit crassior
 quā in paralytide, & haec per exteriora
 & interiora. Exteriora sunt linimēta ex oleo
 liliorum alborum, lumbricorum, oleo uulpino,

costino, &c. unguenta ex bdellio, balnea
 tam naturalia quàm artificialia. Naturalia,
 sulphurea, salsa, aluminosa. Artificialia sicut
 in oleo communi, uel in balneo, in quo deco-
 cta sint uulpes catuli cum herbis capitali-
 bus, scilicet camomilla, anetho, maiorana
 saluia, rosmarino, stechade, & similibus. In-
 teriora sunt electuaria resoluentia, ut dia-
 muscus, diacorus, mitridatum, confectio ana-
 cardina, & quaecunque febrem prouocari
 possunt. Remotio symptomatum fiet, si dolor
 qui interdum uehementissimè molestare so-
 let, auferatur, & hoc perficitur cum anodi-
 nis, cum balneo 53. ex oleo communi, in quo
 decocta sit lumbricorum quaedam quantitas,
 uel cum oleo camomillino de semine lini, uel
 balneo arte parato, & membra contracta
 ad suum locum reducantur, & inordinato
 motui resistatur. Cura conuulsionis de ina-
 nitione tantummodo consistit in humectan-
 do & restaurando, modò cum balneis ex la-
 cte, modò artificialibus, cum folijs salicis,
 hordeo, uiolis & seminibus frigidis, &c. Post
 balneum statim membra ex oleo rosaceo li-

niantur, ne humiditas impressa exhalet, sed
 sua stypticitate cohibeatur. Clysteria fiant
 ex rebus similibus, additis quibusdam im-
 pinguatibus. Somnus insuper accersendus est.
 Evacuatio nulla fiat nisi naturalis, & nu-
 triatur ut dictum est. Cura conuulsionis non
 proportionata ad materiam sic fiet, Primum
 si fuerit à percussione, cum laxantibus bal-
 neis, ex hordeo, camomilla & malua, scenu-
 græco, &c. Si fuerit ex uulnere, in primis do-
 lorem remoue, & sanies inducatur, cum em-
 plastro altheæ, uel cum uitello oui, & te-
 rebinthina, & tota spina liniatur cum hu-
 mectantibus temperatis, sicut oleo amygda-
 lino dulci, &c. Si fuerit à uentositate, re-
 soluatur cum frictione & oleis calidis. Si
 fuerit à punctura uenenosa, extrahatur il-
 la humiditas uenenosa, uel cum cucurbitula
 apposita, uel cum emplastro ex scabiosa &
 uitello oui. Si fuerit punctura ex ferro, tunc
 aperiatur locus, ita ut uirus quoquo modo
 trāspiret, cum unguento exiccante & cor-
 rodente, quale est unguentum apostolorum
 ægyptiacum, sed prius sedetur dolor cum

terebinthina & oleo rosaceo, aut cum balneo
ex oleo lumbricorum, aut cum pane in lacte
infuso, aut cum aliquo quod locum stupidum
reddat, qualia sunt opiata, &c. Si fuerit a
apostemate, curetur eodem tramite, quo fo-
lentes abscessus curari. Si fuerit per con-
sensum uentriculi, curetur uomitu uel eua-
cuatione per secessum, roborando cerebrum
& spinam, ne amplius quidpiam suscipiant.
& sic intelligito de alijs particulis, &c.

Loci consentientes de cura conuulsionum.

Habes de uictu primum Auic. secunda ter-
cij, ibi, Et si habes spasmus humidum debilis
sit uirtutis, non abscindantur ab eo carnes
sicca, sicuti carnes minutarum auium, & cu-
begi, & cheruberi, id est, perdici & alaudæ:
& si uirtus non fuerit debilis, sint tibi eius
panis cum melle, & aqua cicere cum anetho
& sinapi, &c. & sic calidum ac tenuem ui-
ctum imperat. Paul. lib. 3. cap. 20, Porro ui-
ctus erit tenuis, qui expeditè distribuatur, &
recrementis omnino uacet, &c. Et loquens de

ictu convulsionis, de inanitione, dixit, Qui
 ex inanitione conuelluntur, nutriendi sunt
 ex chondro & alica, uinóque tenui & aquo-
 so, quod facile per omnia corporis membra
 distribuitur, nisi febris adsuerit, tunc ptisa-
 ra cremor utilis est. Et Auic. loc. cit. Et in-
 firmo detur in potu lac recensiter mulctum, se-
 cundum mensuram convenientem, si non fue-
 rit febris, & aqua hordei, & aqua cucurbi-
 ta & aqua melonis indi cum Iuleb, & si cō-
 misceatur cum aliquo horum parum uini al-
 bi, ut penetrare faciat, erit conueniens. Et
 paulò post, Cibus habētium spasmus siccum,
 sit totum quod humectat & lenit, & omnes
 sorbitiones pingues, lenes, factæ ex aqua
 hordei, assumpta ex carnibus agnorum &
 hœdorum, & quandoque ponitur ex oleri-
 bus humectatiuis, frangentibus nocumentum
 carnis, si illic fuerit caliditas, &c. De eua-
 cuatione lege Paul. loc. cit. ibi, Quibus cer-
 uix recta intēditur, ab initio sanguis detra-
 hendus est, & partes lanis oleo sycionio im-
 butis & castoreo contegantur, & cucurbitu-
 la sic admouenda, ut cutis exasperetur: le-

nes enim noxam inferunt, &c. Auicē secundu
da tertij, cap. de cur. spasmi, Si spasmus e
humidus, oportet ut curetur cum euacuantib
bus & purgantibus, &c. & cū uideris san
guinis signa dominantia, tum phlebotomand
&c. Act. ser. 6. cap. 39, Post uenæ sectionem
utendum unguentis lancinantibus, & cucur
bitulæ cum scarificatione locis omnibus affe
ctis affigantur: in potu conueniunt apo
melli & radicis silphij decoctum, & ipsa tri
ta, & hyssopi decoctum, &c. B. Intellige non
tantum ratione potus, quantum preparati
onis materie. Itidē Paul. & Auic. loc. cit.
asserūt. De resolutione postea loquens Ac
loc. cit. inquit, Deinde cataplasmata loc
affectis adhibeantur, quæ laxare ac discutere
possunt, simulque lenire. horum autem mat
ria sit fœnugræcum, semen lini, farina hor
deacea ac loliacea, &c. Paul. lib 3 cap. 20.
Quod si tetanus ad uetustatem inciderit,
oleum bis quotidie descendere oportet, n
diutius immorari, quum maxime uires con
uellat. B. Nota quod tetanus non differt
conuulsione, nisi ut genus & species, uel

cut compositum à simplici. Sunt enim in
 tetano binæ conuulsiones diuersorum mu-
 sculorum & neruorum, ad oppositas partes
 sese trahentium. Auicennas secunda tertij,
 cap. de cur. spasma. Et cessio in pelli uul-
 pium & luporum inuat, & inunctio cum
 adipibus luporum, & oleo de lilio, si non
 fuerit febris: & decoctum catulorum, aut
 sessio in aquis, in quibus decoctæ sint medici-
 næ subtiles, sicut abrotanū, aut folia radicis
 iunci, & calamus aromaticus, & folia lau-
 ri, &c. lege eū fusius, & plura ad balneā &
 inunctiones spectantia ab ipso intelliges, &c.
 De remotione accidentium habes ferè omnes
 practicanes, sed præcipuè Paulum lib. 3.
 cap. 19. ibi, Primum partes quæ contra-
 huntur, ualenter continendæ sunt, & in-
 ordinatis resistendum motibus: oleo perfri-
 care oportet rutaceo aut sycionio, &c. Iti-
 dem Auic. ibi, Et applanetur quod spasmatū
 est leniter, &c. Et antea dixerat, Et si fuerit
 dolor, seda dolorem, postquam cōsideraueris
 quid sit, & abscinde causā eius. Lege de his
 Arculanū. De cura spasmī ex inanitione lo-
 Z. ij.

quutus est etiam Auic. ibi, dicēs, Conueniētiōr
 cura est tina, & inunctio in oleo humido
 post ipsam, & eius iteratio multotiens. Si
 autem possibile est, tina fiat ex lacte: si non,
 ex aquis, in quibus cocta sint folia salicis,
 hordeum, uiola nymphaea, cucurbita, & ci-
 truli: aut sit totum illud ex aqua rosacea,
 in qua decoct sint aliqua horum: & si fe-
 ceris, clysteria fiant ex istis expressionibus
 & oleis aliquibus dissolutis, humectantibus
 & impinguantibus, &c. Itidem Paul. loc.
 cit. adserit, ibi, Eos qui ex inanitione con-
 uelluntur, oleo uel hydreleo calido fouere
 competit, &c. De cura per consensum ha-
 bes plura apud neotericos omnes, quos recen-
 sere esset præter longitudinem satis graue.
 Vide tu Arcul. Marc. Catin. Gord. &c. Le-
 ge insuper Auic. ibi, In eo qui factus est à
 percussione, oportet ut administrentur em-
 brocæ quæ laxant, factæ ex hordeo, camo-
 milla, &c. Si fuerit à dolore, seda dolorem,
 &c. Et si est propter pūcturam, curetur, &c.
 Et si fuerit à nocumento, propter alicuius
 rei uenenoſæ potum, curetur cum eo quod

gognoscitur in cap. de uenenis, &c.

Obseruationes de sectione ne venæ.

Act. ser. 6. cap. 39, Primum si à repletionem
fiat, secunda est uena. Auic. de cur. spas. lo-
quens, de sectione uenæ inquit, Non extra-
has totum, quod necessarium est ex sanguine:
imò retine ex eo aliquid, ut resistat spasmo,
& resoluatur resolutione motuum spasmi: &
hec obseruatio etiam habetur à Raze I. con.
in cap. de spas. &c.

Obseruationes de balneis.

Auic. loc. cit. Et scias quòd longitudo spa-
tij moræ in tina est ex eis quæ nocent pro-
pter mollificationem uirtutis, tu autem pone
multitudinẽ numeri in loco longitudinis spa-
cij, & fac sedere ipsum bis in die, &c. hoc
idem annotauit etiam Paul. lib. 3. cap. 20.

Obseruationes in ponendis cucurbitulis.

Auic. Et ille qui uritur uentosis, oportet
Z. ij.

ut utatur sine scarificatione, si res est levis:
 Et si non ita est, scarificatio fiat, et loca
 uentosarum custodiantur et conseruentur,
 ne corpus infrigidetur, &c. Vide de hoc la-
 tius Paul. Aeginet.

Observationes de aqua frigida.

Paul. lib. 3. cap. 20, Frigidae superfusio-
 nem, quum sit (quemadmodum ait Hippo.)
 periculosissima, eoque posteris credo uitupe-
 rata, et nos damus deuitamusque. B. Hac
 dicta sint in Marcum Catinariam, qui per
 immersionem aquae frigidae curam fieri iu-
 bet. Similiter de febre prouocanda: nam non
 solum Auic. ut supra, sed etiam Paul. in hoc
 loco optimum esse inquit praesidium febrem,
 quae per initia non fuerit, superuenientem:
 et hoc contra Michaëlem Sauonarolam qui
 nullo modo prouocanda ait esse, quum postea
 nostri non sit arbitrij eam expellere.

Conuulsionem excitantia.

Excitant, ei que nocent coturnix, hellebo-
 rus, albus, tribulus marinus. Prohibens a pro-

rietate spasmus iuxta Auicen. & Plin-
ium, Fel adipis, cinis mustelæ, spoliū ser-
pentis, storax bibita, &c.

Conuulsionem curantia.

Curant spasmus ex repletionē, acorus, as-
sa, aristologia, bdellium, calamentum, cha-
medrys, castoreum, centum capita, colocyn-
this, epitimum, euphorbium, galbanum, peu-
cedanum, pyrethrum, satirion, scenoanthos,
absinthium, oleum amygdalarū dul. de been,
de piperibus, de costo, de croco, de alchechē-
figi, de semine lini, syrupus de stechade, de be-
tonica, rhodomel, pilulæ fœtidæ, de serapi-
no, de sex rebus Alex. chochiæ, unguentum
aragon, balsamum, confectio anacardina,
diamusculus, diābra. lege etiam remedia, inun-
ctiones, &c. iuxta Varig. cap. 10. de dispos.
capitis. Item Bartho. Montagnanam conf.
244. in fine: uide etiam Aggregatorem, Ar-
cul. Sauona. Gord. Aet. &c.

De prognosticis conuulsionum.

Hippocr. aphor. 2. aphor. 26, Febrem con-
uulsionem superuenire, melius est quàm febri
Z. iij.

conuulsionem. B. Nam si febris superueniat
 humorem calefaciens, extenuat & dissoluit:
 si uero post febrem conuulsio accidat, statim
 ob sui acutiem vires dissoluens, exitium af-
 fert, nisi ab initio quis huic opportunis reme-
 dijs resistat. Et aphor. 4. aphor. 5, Ex purga-
 tione superflua, conuulsio aut singultus su-
 perueniens, malum. Et aphor. 4. aphor. 49,
 In febre non intermittere si labrum, uel ocu-
 lus, uel nasus, uel supercilium peruertatur, uel
 non uideat, aut iam debili existente corpo-
 re, quodcunque horum fiat, iam propè est
 mors. Et aphor. 4. aphor. 57, Qui à conuul-
 sione uel distentione neruorum tenetur, fe-
 bre superueniente liberatur. Et aphor. 4.
 aphor. 66, In acutis febribus conuulsiones &
 circa uiscera dolores fortes, malū. Et aphor.
 4. aphor. 67, In febribus ex somnis timores
 uel conuulsiones, malū. Et aphor. 4. aphor.
 68, In febribus spiritus offendens, malum,
 conuulsionem enim significat. Et aphor. 5.
 aphor. 1, Conuulsio ex helleboro lethalis.
 B. Non eam intelligit Hippoc. quæ per con-
 sensum oris, stomachi, neque eam quæ per ni-

etiam euacuationem accidit, sed fortè eam,
 quæ ab impulsâ hellebori uirtute, uiolentiùs
 neruorum substantiam exiccat, alioqui fru-
 strâ legeretur alter aphor. Ex superflua pur-
 gatione, &c. Et aphor. 5. aphor. 2, Conuul-
 sio ex uulnere lethalis. B. Quia ad uulnera
 quæ solet inflammatio, quæ ubi neruos atti-
 gerit, conuulsiones accidunt quandoque uni-
 uersales, ex quibus mors. Etiam aphor. 5. a-
 phor. 3, Vbi sanguis plurimus fluxerit, sin-
 gultus aut conuulsio superueniēs, malum. Et
 aphor. 5. aphor. 5, Si ebrius quispiam repente
 obmutuerit conuulsus moritur, nisi febre cor-
 ripiatur, aut ad horam peruenerit, qua sol-
 uuntur crapula, uocem recuperet. Et aphor.
 5. aphor. 6, Quicūque à distensione corripitū-
 tur, in quatuor diebus pereunt: si uerò hos ef-
 fugerint, sani fiunt. B. Morbus hic in primo
 dierū indicatoriorū circuitu finitur, non to-
 lerante diu natura laborem. Et aphor. 5. a-
 phor. 18, Frigidum inimicum ossibus, dētibus,
 neruis, cerebro, spinali medullæ, calidum ue-
 rò utile. Et aphor. 5. aphor. 57, In fluxu mu-
 liebri, si cōuulsio & animi defectus aduene-

rit, malum. Et aphor. 5. aph. 70, A quartanis capti, non admodum à conuulsione capiuntur: si uerò prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur. Et aphor. 7. aphor. 9, A profluuio sanguinis desipientia & conuulsio, malum. B. Dictum est conuulsionem ex euacuatione esse malam, sed quanto magis, si ambarum fuerit conuentus? Et aphor. 7. aphor. 10, Ab illo uomitus, singulus, desipientia uel conuulsio, malum. Et aphor. 7. aphor. 13, Ab aestibus fortibus conuulsio aut distentio, malum. B. Intellige pro aestibus siue febrem, siue aerem ambientem, uel feruorem, uel cauteria, uel escaram: nam ob neruorum siccitatem hæc proueniunt conuulsiones, quæ difficillimè curantur. Et aphor. 7. aphor. 18, In uigilia conuulsio uel desipientia, malum, &c. Et aphor. 7. aphor. 25, Ex medicamenti portione conuulsio. Et aphor. 7. aphor. 27, Mulieri uterum gerenti si tentio superuenerit, facit abortum. Razes 9. alman. Spasmus qui non repente, sed suauiter accidit post febrem, aut post multam uentris solutionem, aut multum uomitum, aut

sanguinis fluxū, malus est, & uix curabilis.
 eadem habet Paul. loc. cit. Et Aet. & Auic.
 Mes. Cur sit hic deterior, quā distentio est,
 quia iuxta omnes dimēiones cōtrahit. Gal.
 lib. de tre. & palp. in fine, Conuulsiones,
 quarum siccitas causa est, minimē medicabe-
 ris: nam sic affecti citissimē intereunt, nec
 medicamēta sibi ipsis uilia excogitare per-
 mittunt: at quæ ex humorum copia, aut ab
 inflammatione eueniunt, humorum euacuan-
 do repletionem & inflammationem pro-
 prijs remedijs medendo ipsas curare poteris,
 &c. Similiter aphor. 5. comment. 7, Conuul-
 sio, quæ fit ab euacuatione, acutissima est &
 perniciosissima: quæ uerò à repletionem ner-
 uosarum parrium, neque acutissima, neque
 similiter periculosa.

Authores dissentientes cir- ca conuulsionem.

- 1 Adserere cum Aristotele, nervos oriri à corde.
- 2 Adserere, conuulsionū species esse plures

quàm tres, quum corpus etiam ad dextram
et sinistram curuari possit.

3 Adserere, conuulsiones de inanitione non
esse semper mortales. Nā pueri, inquit Auic.
liberantur à spasmō sicco uelociter.

4 Adserere, omnem conuulsionem de reple
tione posse semper à febre curari.

5 Adserere, conuulsionis motum à naturali
motu non differre.

Confutatio dissentientium circa conuulsionem.

Confutat primum Gal. 3. de loc. aff. cap.
6. probans duobus medijs non oriri à corde.
Primū per exercitatissimos medicos, qui non
cordi in hoc morbo, sed cerebro, uel circa spi
nam, remedia adaptant. Alterū ex arte ana
tomica, in qua euidentissimè cernitur, neruos
oriri à cerebro, et non à corde.

Ad secundum respondet Gal. lib. de tre. et
palp. cap. ult. enumerans tantū tres species,
inquit, Huiusce passionis modos hūc quidem
emprothotonum, illam uerò opisthotonum,
tertium autem tetanum (ut omnes fatentur)

appellari cognosces, reliquos modos laterales
tanquam impossibiles propter situm neruo-
rum & corporis imbecillitatem, tacens, quos
si cognouisset utiles, non utique sicco pede
pertransiisset.

Ad tertium inquit Gal. aphor. 2. comment.
26, Si uerò ex ardentibus febribus totum cor-
pus exicceretur & neruis: deinde ex siccitate
conuulsio accidat, hoc maximum est malum,
& penè insanabile, cuius ratio ab ipso red-
ditur, &c. Quod uerò dicit Auic. ita intelli-
gèdū est, quòd pueri liberantur à spasmò sic-
co uelociter: id est, pueri immunes sunt, ne de
facili in conuulsionem de inanitione incidant
ob eorum edacitatem, &c.

Obiectio.

Gal. 3. prognost. inquit, Quòd cōuulsio ac-
cidens pueris cum acuta febre, facile curatur,
& tamen sequitur febris: igitur non omnes
moriuntur.

Responsio.

Duplex est febris. Altera totum corpus &
neruosam compaginem desiccans, & hæc est
incurabilis & lethalis. Altera est dissoluens

humores pituitosos, frigidus, qua facile curatur pueri, & sic intelligit Gal. ibi.

Ad quartum respondet Gal. in lib. de tre. & palp. non curari conuulsiones ex repletionem, tantum ex febre, sed quacunque tantummodo ex frigidorum humorum copia proueniunt, repletionem tamen euacuando: sed quæ ab inflammatione eueniunt, minimè per febres curantur, sed inflammationem proprijs auxilijs: igitur conuulsio de repletionem non semper à febre curabitur.

Ad quintum inquit Gal. 3. de loc. aff. cap. 6, Conuulsionem in conuulsis partibus factam hac sola ratione à motu naturali differre, quod præter uoluntatem fit. Naturalis uero motus uoluntarius est. Et sic differt à motu materiali qui inuoluntariè semper fit.

De Melancholiæ descriptione.

Melancholia est quedam sine febre mentis alienatio ex humore melancholico dependens. Hæc duplici specie insigni constat: altera quam Græci μελαγχολίαν, id est, æram bilem: altera μανίαν, id est, insaniam uocant. Melancholia ratione locorum affectorum duplex est:

prima, quā cerebrū primario affectu afficitur: altera, quā per consensum uel totius, uel partiuū præcordijs scilicet affectis molestat, unde præcordialis siue hypochondriaca melācholia uocatur. Cōplures uerò & harū existūt differētiæ, quas enarrare lōgū foret. Nā quidā semper ridet, nonnulli plorāt, alij mori expetunt: alij mori timēt, alij futura uaticinātur, quos ὁρᾶσθαι Græci uocāt, &c.

Loci consentientes de Melancholiæ descriptione.

Gal. lib. finit. med. Melācholia, est quidā sine febre affectus mentē lādēs, nō sine graui molestia animi, atq; auersione à rebus charissimis. Ibi etiā describitur Insania, dū inquit, est alienatio mētis, mutatiōq; à cōmuni hominū ritu ac sanorum moribus, sine febre.

Auic. Melācholia, est mutatio existimationū & cogitationū à cursu naturali ad corruptionē, & ad timorē, & ad malitiā, propter complexionē melancholicam, facientem spiritum cerebri syluestrem interius, & faciētem ipsum timidum propter tenebras, &c.

368 DE CONSEN. MEDIC.

Oribasius aphor. 7. comment. 10, Atra bilis est affectio cerebri, & ex melancholica fir materia, &c. Gal. 3. de loc. aff. cap. 7, Vbi atra bilis in corpore abundat, eam insania specie, quā Græci μελαγχολίαν uocant, efficit. Quemadmodū alter atræ bilis succus, qui præassata flaua bile nascitur, ferina deliramenta inducit, modò cū febre, modò sine febre. Alexand. Tra. cap. 22, Sed ex loco etiam affecto aliā atque aliā sortitur speciei nomenclaturā: afficitur enim interdum cerebrū primario affectu, nōnunquā per consensum singularū corporis partiū, interdū uētre & præcordijs adflictis, quā specie hypochondriacā nominant. Gal. 5. de sympt. cau. in fine, Melancholica demētia uariæ sunt species, prout in ipsis particularim dolosæ suspectæ que apparent. In omnibus commune unum habetur, quòd omnes præter rationem mæsti sunt, nec quamobrem tristentur, rationem possunt reddere, ac non pauci eorum mortem, & alia non timenda timere uidentur, &c. Vide fusius infra de signis melancholiæ, &c.

De causis Melancholiæ.

Causæ uel sunt in cerebro, uel extra cerebrũ. Si per se in cerebro sum, & non ab alijs dependeant partibus corporis, tunc uel sunt iniciatrices siue primitiua, uel antecedentes, uel coniunctæ. Causæ primitiua sunt aër frigidus & siccus, turbulentus, aut calidus siccus adurens, sicut aër æstatis & autumnus, cibi potusque atrabilarij, qualis est caro bubula, caprina, lentes, uinũ crassum, exercitiũ exiccans, ac balneũ, immoderata uigilia, timores, tristitiæque, uehemens studiũ, lōgi carceres, menstrua ac hæmorrhoides oppressæ, &c. Causæ antecedentes sunt mala intemperies, frigida & sicca sine materia, quæ tũ cerebri, tum spiritus animalis complexionem ac substantiam tenebrosam efficit. Itidem facit mala intemperies calida & sicca, nam adurendo eorum substantiã obtenebrat. Itẽ mala temperatura frigida & sicca cum materia melancholica naturali uel non naturali, ut ex adustione sanguinis. Mania similiter ex bile præassata generatur. Causæ coniunctæ sunt, uel ipsa intemperies cerebri frigida &

Aa.i.

*sicca, naturalis & non naturalis, melancholia
 ad actum producens, uel ipsa melancholia in ce-
 rebro contenta. Causae uero per consensum à
 toto corpore sunt, uel febres quartanae prae-
 cedentes, uel aliae aggritudines in melanco-
 liam desinentes. Causae per consensum à par-
 tibus erunt plures: nam si proueniat malum
 à splene, tunc causa erit uel eius imbecillitas,
 segregare ac expurgare atram bilem non ua-
 lens, aut obstructio, aut apostema, aut mala
 intemperies. Et similiter intelligito de hepa-
 te, stomacho, praecordijs, ex quibus humor
 aut uapor tenebrosus tandem ad cerebrum
 eleuatur.*

**Loci consentientes de causis
 Melancholiae.**

*Auic. loc. cit. Et melancholia causa autem
 est in ipso cerebro, aut extra cerebrum. Aet.
 ser. 6. & Paul. lib. 3. cap. 14. & Gal. 3. de
 loc. aff. ca. 5, Interdum sine febre uitiū est, uel
 in mania & melancholia, id quod modò per
 consensum, modò primaria affectione, cerebro
 laborante accidit. Itidē ait cap. 7. B. Ex ho-*

Galeni loco cognoscitur, quotienscunque ali-
 quid per se & per consensum afficiatur, &
 hoc exactè discernitur per propria acciden-
 tia perpe. De causis primitiuis melancholiæ
 loquitur Gal. aphor. 3. comment. 20. ibi, Fu-
 rores enim & atra bilis, & morbi comitia-
 les, & anginae sunt morbi autumnales. Simi-
 liter & comment. 22. eiusdem est sententiæ,
 &c. Auic. prima tertij, tra. 5, Et quandoque
 causa generationis eius est aër exterior, &
 quandoque fiunt in generatione eius cibi ge-
 nerati cholerae nigrae, & ex causis fortibus
 in generatione melancholiæ est superfluitas
 tristitiæ & timoris. Gal. 3. de loc. aff. cap. 7,
 Facile in temperiæ melancholicam incidunt,
 qui & uigilijs & multis laboribus, & solici-
 tudine, & tenui uictu fuerint educari. Ad hæc
 accedunt, si hemorrhoids aliqua restricta sit,
 aut alia quædã consueta sanguinis euacua-
 tio, aut mulierum menstrua: insuper si quis usus
 sit cibis qui suapte natura sanguinem melā-
 cholicum efficiunt, ut caprina bubuláque ca-
 ro, magisque hircinæ & taurinæ, asinorum
 ac camelorum carnes. Item uulpinæ, caninæ,
 Aa. ij.

atque magnam uim in huiusmodi generatione ex lepore cibus est, sed multò magis, ac frequenter limaces comestæ, omnesque terronarum animalium carnes sale cõditæ. Ex aquirilibus thynni, balenæ, uituli marini, delphini, canis atque cetaceorum omnium. Ex oleribus brâssica sola ferè: inter legumina lentes, mox panis furfuraceus, & qui ex uitiatis seminibus conficitur. Præterea uina crassa nigrâque aptissima sunt, ut ex ipsis melancholicus humor efficiatur: uetus denique caseus, &c. Vide de his etiâ Gal. de atra bile cap. 4. & 6. &c. De causis antecedentibus loquitur Gal. 1. quòd fiat sine materia, aphor. 6. comment. 53. Et Auic. prima terty, tra. 5, Causa est malitia complexionis frigida & sicca, sine materia permutate substantiâ cerebri, & complexionem spiritus luminosi ad tenebras: aut est cum materia, & illa aut est in uenis, ueniens ad eas ex loco alio, & conuertitur ad cholera nigram per adustionem, aut est materia imbibita in corpore cerebri, &c. Et paulò infrâ inquit, Et oportet ut scias, quòd cholera nigra facies melancholiâ, quâdoque est

cholera nigra naturalis, aut phlegma, quādo
 conuertitur in cholera nigram ob spissitudi-
 nem, aut ob aliquā adustionē, quanuis hoc sit
 rarum & parum, &c. B. Nota ex Manardo
 in secunda epistola noni libri, pituitam adeo
 assari non posse in corpore humano, ut ni-
 gra in totum euadat. Et Gal. 3. de loc. aff.
 cap. 7, Igitur ea quam atra bilis constituit,
 in melancholiam transit: quæ uerò à pituita
 parta est, in aliam affectionem permutatur,
 melancholiam haudquaquam efficiens, &c.
 Gal. 5. de sympt. cau. in fine, Sola autem me-
 lancholica demētia à frigidiori succo, ut cau-
 sa, euenire solet, &c. Et 3. de loc. aff. cap. 7,
 Prouenit huiusmodi humor in quibusdam
 plurimus, uel à tēperie ab initio comparata,
 uel à cibis in hunc humore cōuersis. Et paulò
 antè, Melancholici sunt, in quibus siccitas
 & frigiditas dominatur, &c. Vide etiam
 caput sextum de atra bile. Aet. ser. 6. cap. 9,
 Generatur autem caliditate multa indige-
 na, aut flauam bilem, aut crassiores sangui-
 nem adassante, &c. Vide etiam Galenum
 3. de locis affect. & 2. artu curatiua, &c.

Aa. iij.

Causæ coniunctæ recitantur ab Auicena. loc. cit. ibi, Et unaquæque specierum cholera nigra, quum in cerebro est, modo prædicto facit melancholiam. Gal. 5. de Sympt. cau. in fine libri, Porro omne delirium deprauatus est principis facultatis motus, à prauis succis, aut cerebri intemperie ortum habens. Et in fine cap. Quod nobis extrinsecus accidit, quum ambiens nos aër uastissimis tenebris fuerit obscuratus, id melancholicis ab intimo corpore erumpere uidetur, occupante cerebrum, uel ipsamet attrabile, uel uapore quopiam melancholico, &c. De causis etiam per consensum loquitur Galen. 3. de loc. affec. cap. 7. ibi, Interdum cerebro accidit, ut nonnunquam uniuerso in uenis sanguine melancholico effecto, ob commune uitium ipsum quoque lædatur: nonnunquam uerò reliqui corporis sanguine prorsus innocuo, solus qui in cerebro continetur, uel aliunde in ipsum deriuans, aut in ipso met humor melancholicus genitus est, &c. Et paulò post, Sunt etiam nonnulli, qui per febiles morbos melancholicum humorem contraxerunt, &c. Auicena. prima tertij, tract. 5.

cap. de melancho. Cui causa est extra cere-
 brum, communicat res aliqua ex qua humor
 aut uapor tenebrosus eleuatur ad cerebrum,
 & res illa aut est in toto corpore, quā ei do-
 minatur complexio melancholica: aut præ-
 cesserunt ægritudines, quibus succedit melan-
 cholia, ut febres temporales & permixtæ:
 aut quum fit permutatio ex epilepsia: aut est
 in splene, quum in ipso retinetur melancho-
 lia, & non potest ipsam purgare, uel trahere
 nigram ex sanguine: aut quia in ipso perue-
 nit apostema uel oppilatio, &c. Lege fusius
 eum, & inuenies etiam caliditatē hepatis es-
 se causam, &c. Aet ser. 6. cap. 9, Perducit e-
 tiam ad cōsensum cor ipsum ob uicinitatem.
 Et ibi, Plerunque partes circa præcordia pri-
 mario affectæ caput ad cōsensum perdu-
 cunt, & delirium efficiunt, &c. Galen. 3. de
 loc. affec. cap. 7, Videtur quidem in ipso uen-
 triculo inflammatio esse: sanguis enim in par-
 te inflammata contentus crassior & atra bi-
 li magis conformis: & sicut ex uentricu-
 lo halitus fumosus ad oculos eleuatus suffu-
 sorum accidentia efficit, pari ratione subla-

Aa. iiij.

ea ad cerebrum ab atra bile euaporatio, melancholica accidentia excitat, &c.

De signis Melancholiæ.

Signa principij melancholiæ, sunt timor & mœstitia sine causa, solitudinis dilectio, iudicium corruptum, ira uelocitas. Signa cōfirmatæ melancholiæ sunt, si quæ cogitare cœpit, ore promat, & permisceat actus & uerba, ut si dicat timere casum cœli, uel putet se esse regem, & sic adest timor & existimatio mala, & sermonis alienatio, sollicitudo & angustia, & non timenda timeret, &c. Signa melancholiæ in cerebro sunt superflua cogitatio, & assidua sollicitudo melancholica, firmusque aspectus ad terram, uel ad aliã rem. Item capitis, faciei, & oculorum color niger, capilli crassi & nigri, præceduntq; malæ cogitationes ac insomnia, uel aliqua cerebri ægritudines, ut epilepsia: nec adsunt indicia per consensum afficientia. Signa, quum à toto per cōsensum fiat, sunt gracilis corporis habitus, qualis est niger, hirsutus, & ex toto melancholicus per naturam uel per acquisitio-

nem, sicuti per solitudines, uigilias, malorum ciborum esus, uel per menstruorum uel hemorrhoidarum oppressionē: adest insuper multitudo pilorum uehementer nigrorum atque crassorum, &c. Signa hypochondriacæ melancholiæ, quam Auicenna Myrachiam uocat, sunt inflationes, rugitus, ructus acidi, ardor, & hypochondriorum grauitas, aluus restringitur, uomitus, dolor uentriculi, & propriè à cibo, quousque digestum sit. Accidunt etiam ex acceptione cibi multa accidentia, quæ facta digestionem minuuntur, iuuanturque à uomitu, ructu, flatibus, & excretionem alui, ac à concoctione. Signa humorum, si fuerit atra bilis sanguinea, primùm insaniunt cum risu uero uel ficto, nec ulla adest mœstitia: si melancholia fuerit pura, tunc mœrent, plorant, mortem expetunt: si bilis perassata, tunc uehementer insaniunt, effrænes ad modum ferarum euadunt, & uiolenter homineserberant, &c.

Loci consentientes de signis
Melancholiæ.

Hippoc. aphor. 6. aphoris 23, Si timor atque

mœstitia longo tempore perseuerent, ex eo a-
 tra bilis significatur. Auic. prima tertij, tra.
 5. ca. de sig. melāch. Signa principij melācho-
 liae sunt, existimatio mala & timor sine cau-
 sa, & uelocitas iræ, & dilectio solitudinis,
 & tremor, & uertigo, & sonitus, & tinnitus
 & propriè in myrach, &c. Razes 9. alman.
 Quum alicui malæ cogitationes sine causa
 acciderint, & timor, & mœstitia in eo præ-
 ualuerint, est principium melancholiae. Ga-
 len. 3. de loc. affect. cap. 7, Differunt inter se
 melancholici: nam omnes timent, mœrent, ui-
 tam damnant, odio habent homines, sed non
 omnes mori cupiunt. De signis cōfirmatæ me-
 lācholiae loquitur Auic. loc. cit. ibi, Quum au-
 tem confirmata est, tunc adest timor & ma-
 litia existimationis, & angustia, & sollicitu-
 do, & alienatio sermonis, & fastidium pro-
 pter multitudinem uentositatis, & species ti-
 moris ex eis quæ non sunt aut sunt, penè infi-
 nitæ. Nam quidam timent casum cœli supra
 se, alij quòd terra eos absorbeat, alij timet la-
 trones, & quandoque imaginantur se factos
 reges, &c. Razes loc. cit. At si quæ cogitare

aperit, ore promat, uerba sua actusque per-
 usceat, iam perfecta est melancholia. Faciunt
 quoque ad hunc locum quaecunque ex Gal. in
 de sympt. cau. & 3. de loc. affe. ca. 7. supra
 recitata sunt. Itidem habet Paul. lib. 3. ca. 14.
 & Aet. ser. 6. ca. 9. ibi, In summa melācholia
 multiformia deliria sunt ob particulares cor-
 ruptas imaginationes, non pauci mortem ti-
 ment, &c. De signis melācholiae in cerebro le-
 ge Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, Quum autem
 propria melācholiae accidentia auctiora ui-
 dentur, circa uētriculum uerò nulla, aut pau-
 ca admodum sunt, haud ab re existimaueris
 primitiuam in cerebro affectionem consiste-
 re, ob atram bilem in ipso congestam, &c.
 Aet. ser. 6. cap. 9, Cognitio an totum corpus
 melancholicum sanguinem habeat, an iuxta
 solum cerebrum talis sit, nigriores & hirsuti,
 & qui uenas amplas habent, aptissimi sunt ad
 atrae bilis generationem: interdū homines ru-
 bicundi in melancholicam temperiem trans-
 eunt, similiter & flauī, praesertim ubi uigi-
 lys, laboribus pluribus & curis, & tenui ui-
 ctu, aut melancholicis edulys usi fuerint, &c.

Vide etiam quacunque supra ex Galeno de
 causis primitiuis uerba fecimus. Iridem adso-
 rit Auicen. loc. cit. ibi, Signa eius quæ in cere-
 bro est, sunt propriè superfluitates cogitatio-
 nis, & assiduatio solitudinis melācholica,
 &c. De signis per consensum totius corporis
 loquitur Paul. lib. 3. cap. 14. ibi, Peculiares
 melancholia notæ sunt, gracilis corporis habi-
 tus, niger, hirsutus, & ex toto melancholicus
 uel natura, uel acquisitione per solitudi-
 nes, uigilias, &c. Auicen. loc. cit. Eius quæ fa-
 cta est communitate totius corporis est nigre-
 do corporis, & arefactio, & retentio eius
 quod euacuatur ex splene & stomacho, &
 quod euacuatur cū periodis, ex ano, & men-
 struis, &c. lege Gale. 3 de loc. aff. cap. 7. Fa-
 cit etiam mentionem de signis melancholiæ
 hypochondriacæ, 3. de loc. affect. cap. 7. ibi,
 Quūque circa uentriculum prima incæpe-
 rint accidentia, ipsiisque auctis melancholi-
 ca sequatur affectio, deinde alui deiectione,
 & uomitu, & proba cōcoctione, ructibusque
 leuetur is qui laborat, hypochondriacum fla-
 tuosūque morbū ipsum nominabimus, &c.

Avicenna loc. cit. Signa myrachia sunt, graui-
 tas in myrach, & attractio ad superiora, &
 pusca inseparabilis, & malitia anima, &
 corruptio digestionis, & eructuatio acetosa,
 & sputum humidum, & rugitus, & exitus ven-
 eritatis, &c. Lege eum fusius. lege etiam Pau-
 lum lib. 3. cap. 14. ibi, Qui hypochondriaca la-
 borant, habent cruditates, acidos ructus, ar-
 dorem, & ipsorum grauitatem, praecordia sur-
 sum conuelluntur, &c. Razes 9 alman. Quod
 cum melancholia fuerit dolor ventris, &
 inflatio, & malus color, & digestionis cor-
 ruptio, & vomitus acetosus, &c. De signis hu-
 morum loquitur fusius Avicenna loc. cit. ibi, Et
 cholera nigra faciens melancholiam, quan-
 do est cum sanguine, est cum gaudio & risu,
 & non comitatur ipsam tristitiam uehementem,
 & si est cum cholera, tunc est cum agitatio-
 ne & lesione & demonio, & est similis ma-
 niac: & si fuerit cholera nigra, pura, tunc ad-
 erit cogitatio plurima, & audacia minus,
 nisi moueatur & rixetur, & habeat odium
 cuius non obliuiscitur, &c. Lege etiam Paul.
 lib. 3. cap. 14. ibi, Si quando flaua bilis supra

modum exusta in nigram fiat mutatio, &c.

De cura Melancholiæ sine materia

Quum dictum sit suprâ, cerebrum uel primario affectu uel per consensum laborare, & quod primarius affectus uel ab intemperie nascitur, sine humorum cōplexu, uel cū humoribus complexa perficiatur, idcirco primū de cura eius qui sine materia fit, agamus. Hæc igitur mala temperies triplici scopo remouenda erit: primū alteratione, cum ijs præsertim quæ cerebrum & cor roborant: secundò, cum euacuatione & diuersione: nam si quispiam humor fuerit in fluxu, euacuari debet ac diuertitur: tertio cum sympt. remotione. Alteratur fiet cum humectantibus calidis uel frigidis prout in discrasia expediet, roborantibus men spiritus, cor & cerebrum. Spiritus simpliciter roborant oua, uinum, aqua carnis: spiritus & sanguinem purificant margarita, & pillus ueneris, fumus terræ, &c. lapsus temperamentum cordis emendant, si sit frigidus muschus, ambra, melissophyllon, borago: si calidus, camphora, rosa, sandali, acetosa, uicia

imphæ, coriadrum, coralli. Euacuatio fiet
 per simplicia uel per composita: simplicia
 sunt helleborus niger, aloes, agaricus, colo-
 mynthus, epithymum, sena, myrobalani, chebu-
 i, lapis lazuli, lapis armenius, serum lactis,
 &c. Composita sunt, diasene, confectio ha-
 mech, hiera Hermetis, hiera Iusti, pilulæ de
 lapide lazuli, pilulæ indæ, decoctum senæ ep-
 thimi, &c. Remotio sympt. uersatur circa ui-
 giliarum remotionem, cum somniferis tã in-
 trinsecus quàm extrinsecus adhibitis. Caveat
 sibi ab imminentibus periculis, ne alta peten-
 tes, interdum se precipitent, uel ne arrepro
 ferro, alios percutiant, uel semetipsos in-
 terimant, &c.

De cura Melancholiæ cum materia.

Cura malæ cõplexionis cum materia in ce-
 rebro per scopos quinque absoluitur: primò,
 per sex rerũ nõ naturalium institutionẽ: secun-
 dò, per materiæ præparationẽ: tertio, per eua-
 cuationem: quartò, per reuulsionẽ ac deriua-
 tionẽ, tum à cerebro, tũ à corde, ad alia mem-
 bra minus principalia: quintò, per resolutio-

nem residui cerebri, ac cordis roboratio-
 nem. Viçlus ratio in melancholia sit calida
 & humida, magis tamẽ humectans quàm ca-
 lefaciens, sitque probi succi, concoctu facilis:
 nitentur quacũque atrem bilem generant, de
 quibus supra in causis primitiuis satis copio-
 se à Galeno dictum est. Commendantur uo-
 lucres montanae nõ pingues, oua gallinarum
 mollia, pisces petrosi, carnes hœdinae, & la-
 ctentium animalium: uitetur animalia in sta-
 gnis degentia. Potus sit uinum tenue, album,
 non uetus: abstineant à copia potus, ne cibi
 ex uentre flurent, acetum à cibo commenda-
 tur: somnus non prohibeatur, imò cum reme-
 dys sæpe arcessendus est, uicem motus leues fri-
 ctiones suppleant, coitus uitetur, & sudor co-
 piosus: in accidentibus animo caueant macro-
 rem & tristitiam, sed sonoribus cantinellis
 ac modulationibus letificentur, uitentque co-
 gitationes, &c. Preparatio materiae fiet per
 syrupos & per decocta. Syrupi sint de pomis,
 de epithimo, de fumo terræ, de lupulis, de uio-
 lis, de succo boraginis, de cortice citri, &c.
 Decocta sunt ex epithimo, sena, polypodio lu

pulorum, thymo, fumo terra, boraginis, mentha, calamo aromatico, mellissophyllo, macis, rosmarino, xyloaloe, &c. Euacuatio, si materia in capite contineatur, non fiat per uena sectionem, nisi uel copia sanguinis adsit, uel praeservationis gratia id fiat, sed potius per atram bilem subducentia eam moliemur, prout supra dictum est. Reuulsio & derivatio fient per enemata, frictiones, cucurbitulas, de quibus alijs satis copiose uerba fecimus. Resolutio residui per intrinseca & extrinseca perficietur. Extrinseca erunt balnea, sacculi & epichemata, balnea uel naturalia, sponte scaturientia, uel artificialia, cum herbis praedictis parata. Sacculi quoque parantur ex floribus buglossae, boraginis, mellissophylli, rosarum, & cum been albo & rubro, sandalis, garyophyllis, &c. Similiter epichemata cum debitis aquis & pulueribus cordi dicatis componantur. Intrinseca sunt saccharum buglossatum, boraginaceum, rosaceum, uiolaceum, addendo ijs aliquid diamusci dulcis & electuarij de gemmis, &c.

Bb.s.

De cura Melancholiæ per
consensum.

Cura melācholiæ per consensum binis in-
tensionibus præseruatiuis potius, quàm cu-
ratiuis perficitur, quarum altera cauet, ne
hic humor abundet: altera cerebrum robo-
rādo, efficit ne quid in se recipiat: & si quid
receperit, id expurgando à se expellat. Hu-
mor non abundabit, si per sectionem uenæ,
(præsertim atra bile uniuersum corpus occu-
pante) uel per purgantia pharmaca superius
habita patiens euacuetur, præparando ta-
men interim ac alterando, prout in discra-
sia expedit: rursusque repurgando, deinde
reuellendo ac diuertendo cum cucurbitulis,
lotionibus, aut menstruorum uel hæmorrhoi-
darū euocatione, & in fine resoluedo siquid
superfit, &c. Roboratur cerebrum cum hume-
tationibus calidis uel frigidis, prout morbus
requirit, tam intrinsecus, quàm extrinsecus
applicitis, sicuti fieret epithema cum rosis,
nenuphare, folijs salicis, uiolearum, boraginis,
mellissophylli, stechadis, & hædino capi-
te, &c.

Loci consentientes de cura Melancholiæ sine materia.

Auic. prima tertij, tra. 4. ca. de cur. mel. Si melancholia fuerit ex malitia complexionis singularis, frigida aut sicca, sufficiet ut administres calefactionem cordis cum latificantibus, è medicinis de musco & theriaca, & metridato, & similibus, & cura caput cum eis quæ dicta sunt in cap. de stoliditate, &c. Gal. etiam 3. de loc. aff. ca. 7. de cura melancholiæ sine materia loquitur, ibi, Interim monendi sunt amici, qui me curantem uiderunt, frequentibus balneis, uictûque humido, bonique succi, nulloque adhibito præsidio huiusmodi morbum me curasse, ubi nondum ob longum temporis tractum nocuus humor euacuationi resisteret, &c. Arcul. in 9. alman. nouem modos roborandi ac alterandi spiritus & cor docet, quem tu fusius uidere poteris. De cura in cerebro cum materia loquitur ibi Auicē. prima tertij, tra. 4. Si est ex materia melancholica in cerebro confirmata, tunc thesaurus curæ est tres res: prima euacuatio materiei: secunda, ut administres

Bb. ij.

cum euacuatione humectationem assiduam
 cum embrocis & oleis calidis: tertia, ut admi-
 nistres confortationem cordis in complexio-
 ne frigida cum calidis latificantibus, &c. De
 victus ratione lege Aet. ser. 6 ca. 10. ibi, Post
 balnea cibos damus concoctu faciles, flatu
 exortes: plerunque conueniunt panes in cliba
 no cocti probè parati, uolucres non pingues,
 non uirosæ, montanæ, oua gallinarum mol-
 lia, pisces petrosi, & molles carne, uitetur in
 stagnis degentia & in paludibus. Ex carni-
 bus conueniunt hœdina & lactentiũ anima-
 lium, & magis extremae partes probè conco-
 ctæ. Vinum sit tenue & album, & non ualde
 uetus. Nec acervatim detur inter cibum, nec
 magna copia exhibeatur, ne cibi in uentre
 fluitent, &c. Paul. lib. 3. cap. 14. etiam de ui-
 ctu facit mentionem, ibi, Victus omnibus me-
 lancholicis confert probi succi & mediocri-
 ter humidus: uitanda sunt, caro bubula, &
 quæcũque atram bilem generant, &c. Itidem
 Auic. ibi, Sumat cibos laudabilis chymi, hu-
 mectatiuos ualde, & fiat augmentum in hoc,
 ut corpus eius tenerescat cum cibis cõuenien-

ribus, &c. Lege eum fusius. Razes in Diuis.
 Poterit unū album, subtile, clarum cum aqua
 plurima. Aqua sit boraginea, inquit Guai.
 De preparatione materiae habes Aet. ser. 6.
 cap. 10. ibi, Optimum est pulegij decoctum saepe
 bibere, & ante purgatoria, & post. Mesu.
 cap. de Melanch. Fac ut cadat digestio æ-
 qualiter in materiam, quoniam est cura ue-
 ra, &c. Hippoc. in lib. de atra bile, Primū
 quidē bona digestio curæ sit, deinde purga-
 tio. Et Auic. loc. cit. Incipe à digestionem. Et
 paulò infrā laudat Syrupū, in quo semina fla-
 tus discutientia decoquantur. De euacuatio-
 ne melancholice loquitur Gal. 3. de loc. aff.
 cap. 7. ibi, Nam ubi uniuersum corpus sangui-
 nem melancholicum continet, curationem à
 sectione uenæ incipere oportet: ubi uerò so-
 lum cerebrū sanguinis detractione ager non
 indiget, quanuis ob aliam fortè causam mit-
 ti possit, &c. Itidem adserit Aet. adiungens,
 Ni præservationis gratia detractionem fa-
 ciamus. Auic. prima tertij, cap. de cur. mel.
 Amplius euacua in principio rei, cum medi-
 cinis lenibus, in quibus recipiuntur epithi-

Bb. ij.

mū, pulpa colocynthidos, & scamonea parū.
 deinde cum decoctione, in qua sit epithimum
 & agaricū: & postea si non cōfert, admini-
 stra hieras magnas, deinde helleborū, sed cū
 timore & cautela: quæ si non cōferunt, rursus
 reitera, & in omni hebdomada euacua uice
 una, &c. B. Nota melācholicos ob gravitatē
 humoris per inferiora purgari debere, unde
 Hipp. apho. 4. aph. 9, Melācholicos plenius
 inferiores eadē ratione contraria apponen-
 tes, unde dixit ἀδύπολεπός pro σποδύπός, id
 est plenius, pro fortius, quū humor de sui na-
 tura ad exitū sit ineptus. Paul. lib. 3. ca. 14,
 Purgentur per initia epithimo uel aloe. Aer.
 ser. 6. ca. 10, In quibus uitiati humores ma-
 gis redūdāt, agrum purgabis per hierā Ruffi
 aut Archigenis aut Iusti. Cōducit etiā sero la-
 ctis aluū subducere, quod à lacte per cocturā
 separatur. B. Modus segregādi lac à sero ha-
 betur non solūm hīc ab Aer. sed etiā à Dio-
 sco. ca. de lacte, ubi etiam modū bibendi de-
 monstrat. De reuulsione & resolutione loqui-
 tur Auic. ibi, Quūmq; purgaueris, attēde ad
 cor, cum his quæ multociens diximus, & ad-

ministra masticationes, gargarismata, et odoramenta bona, muscum, et ambram, et alfeniati, et xyloaloen, &c. B. Alfeniati sunt species aromaticae, ut gariophyllū, et similia. Mesu. Secundum regimen est faciens resolutionem cum mediocritate. uide Arcul. et ceteros practi- cantes de resolutione, &c. De cura per consensum lege primū illud Paul. Morbum qui ex totius corporis consortio trahit originem uiribus ualentibus, à sanguinis missione curare incipies, et interposito tempore uiribus relictis inferius purgare conuenit, et si hemorrhoidibus aut mensibus suppressis morbus proueniat, horū purgationem molimur. Itidem ait Aet. ser. 6. cap. 9. ibi, Quum igitur totum corpus melancholicum sanguinem habuerit, &c. Itidem Auicenn. loc. citat. ibi, Nam si uides uenas plenas, qualitercunque sit cholera, nigra est sanguinea: phlebotometur igitur ex nigra, &c. Lege etiam Gal. 3. de loc. aff. ca. 7. De alijs interioribus habes plura iuxta modernos auctores, pro resolutione utitur triphera. 3. iij. epithimi. 3. i. hiera. 3. 5. Aet. theriaca praesertim hye-

Bb. iij.

me & uere. De roboratione cerebri lege Auicē . ibi, Succurres illi cum eis quæ caput infri-
gidant, & humectant ipsum ac confor-
tant, ut non recipiat quod peruenit ad ipsum
ab alijs, &c.

Observationes in cura.

Auicē. prima tertij, tract. cit. Oportet ut
cura eius fieri incipiat, antequam confirme-
tur, quoniam facilis est in principio, & pra-
ua & difficilis cum est cōfirmata: sitque stu-
dium tuum in humectando, magisque in cale-
faciendo. Itidem ait Aet. ser. 6. cap. 10. ibi,
Incipientem affectionē curare oportet, &c.

Observationes de cibo.

Auicē. loc. cit. Et prohibe ne comedant
post cibum illum alium, & ab intermissione
cibi super cibum iam corruptum, & alienent
ē se fabas, carnes salitas, lentes & caules, &
uinum crassum & nouum, & omne sal, & o-
mne salsum, & acre, & acutum, & quod est
uehementis acetositatis: sed sumat pingue, &
dulce, & cibos generatuios sanguinis lauda-
biles, &c.

Observationes de euacuatione.

Mesu. cap. de melancho. Tria in euacuatione annotanda proponit. Primum, ut non semel laboriosam & subitaneam euacuationem faciamus, sed pro temporis interstitio: nā subitanea ac uiolenta euacuatio uix à natura regulatur. Secundū, quòd solutiū sit cōmensuratū, non excedens mediocritatē. Tertium, non spolietur à rebus lenientibus & humectantibus. Hoc idem sentit Auic. ibi, Euacuato in rei principio cum medicinis lenibus, &c. B. Adde tu quòd pharmacū in se habeat aliquid ex medicinis membra principalia & spiritus roborantibus, &c.

Observationes de sectione venæ.

Gal. 3. de loc. aff. ca. 7, Quū speraueris in uniuerſi corporis uenis, melancholicum sanguinem contineri, quo certiore habeas notitiam, mediam cubiti uenam seca, quæ cōmunis est: quòd si fluens sanguis nō uideatur melancholicus, statim supprimatur: si uerò talis appareat, euacua, quantum pro laborantis corporis habitu satis esse conieceris, &c. Ita-

394 DE CONSEN. MEDIC.

dem Aer.ca.9.adserit. Auic.loc.cir. Amplius
si phlebotomas, et inuenis sanguinē subtile,
non retineas sanguinē propter hoc, quoniam
multotiens in ipsa precedit subtilis. Et simi-
liter oportet ut amplifies phlebotomiam, ut
nō effluat quod subtile est, et retineatur cras-
sum. Mesu. Si sanguis exuberat in toto, et ue-
na plena sunt, euacua ex uena nigra, et post
ipsam ex basilica, et hoc in melancholia: in
mania uerō fac econtra: incipe à basilica,
deinde ex uena nigra, et post has phleboto-
ma ex saphenis, et c.

Observationes de alteratione.

Arcul. et Marc. Catin. Fac quòd altera-
tio non uirtute solū, sed etiam numero eua-
cuationi correspondeat, ita ut nō fiat statim,
sed successiue, ut dictum est.

Observationes de resolutione.

Auic. loc. cir. Non administrentur pura
resolutiua, ut non incrassetur humor propter
resolutionē purā, et c. Et paulò post, Quū-
que administras embrocas, nō est uia ad mi-
nistrandum in frigidantia pura super caput,

Ecce. Intellige in mania, &c. Michael Sauo. Diuretica in hoc casu sunt suspecta, ex eo quod tenue educunt, & crassum aptum in melancholiam conueriti relinquunt, &c.

Melancholiam incitantia.

Inducunt melancholiam & maniam carnes uaccinae, nimius anacardi usus, allium, hyosciamus, lentes, solatrum fluuiiale, uitis alba, & quaecunque sanguine crassum efficiunt.

Melancholiam curantia.

Curant melancholiam, absinthium, epithimum, fumus terrae, borago, buglossa, lupuli, anacardi, aurum, margarita, calamus aromaticus, sena, helleborus niger, eupatorium, mellissophyllō, matricaria, scylla, stechas, thymus, myrobalani chebuli & nigri, oximum fluuiatile, diasene, confectio hamec, confectio esdra Nic. ius galli decrepiti, serum lactis, pliris, arcoricon Nic. rosata magna Nic. dianacardinum, serapio. 8. antido. mitridatum, lapis armenius, lapis lazulus, pilulae indae, pilule de lap. lazuli, sal indū, saccharū buglo-

saceum, boraginaceum, rosaceum, muscus, letificans almans. electuarius de gēnis, & mille alia quæ arte parari possunt. Vide de hac re Varignanam cap. 8. tra. 2. plura composita afferentem uide etiam Montag. conf. 47. de aegritudinibus cap. Vide insuper Arcul. Michaël. Sauo. & Gord.

De prognosticis melancholiæ.

Hippocr. lib. de atra bile, Morbus hic quā nondum ferè incēpit, curari debet: nam inueteratus, difficulter curatur ac tractatur. Cognosces esse confirmatum ex signis supra positis. Et aphor. 6. aphor. 53, Desipientiæ quæ cum risu fiunt, securiores: quæ uerò cum studio, periculosiores.

Obiectio.

Quomodo esse potest risus in melancholia, quum dictum sit, mœrorem & tristitiam esse eius accidentia?

Responsio.

Duplex est risus, fictus & uerus, sed de hoc lege Gentilem & Arcul. qui de hac re fusius sermocinantur, intelligēque securiores pro

minus periculosas. Et aphorif. 6. aphor. 21,
 In insanientibus si uarices uel hæmorrhoi-
 des superuenerint, insaniæ solutio. B. Fit so-
 lutio, natura ad ignobiliores partes humo-
 rem melancholicum transmittente. Auic. cap.
 de Malan. Si accidat casus appetitus, tunc
 ægritudo est mala: & si accidant in corpo-
 ribus eorum ulcera, tunc mors est propinqua.
 Si uerò cholera nigra appareat in egestio-
 ne, uomitu, urina, in coloris cutis lentiginibus
 & panno & ulceribus, scabie, uaricibus, ele-
 phantia & cursu, quod ex ano profluit, est
 signum bonitatis: quia hæc signa omnimo-
 dam à sanguine discretionem ostendūt, &c.
 Et aphor. 6. aphor. 56, In morbis melācholi-
 cis ad hæc periculosi decubitus stuporē cor-
 poris uel conuulsionem uel furorem uel cæ-
 citatē significat. Et aphor. 6. aphor. 2, Atra-
 bile uexatis & renum passionibus hæmor-
 rhoides superuenientes bonum. Auic. prima
 terti, tra. 5, Preparati ad hoc sunt trauli,
 & syllabam multotiens repetētes, antequam
 dictionem proferant, &c. & hæc ægritudo
 plus accidit uiris, sed in mulieribus est dere-

rior, & multiplicatur in iuuenibus & senibus. Et plurimum melancholiam habens est spleneticus, & aegritudines, quibus succedit melancholia, sunt sicut febres temporales & mixtæ, & melancholia accidens successione alterius aegritudinis calidæ, facilis est curæ, ita ut embrocationibus remoueatur, &c.

B. Trauli dicuntur qui proferre non possunt & s, ob humiditatem linguam mollificantem. Dixit accidere plus uiris quàm mulieribus, quia calidiores sunt uiri fœminis. De successione huius morbi per alias aegritudines lege 3. prognost. tex. 29. in comment. Gal. &c. Hippocr. de morb. uulg. Melancholici magna ex parte morbo comitiali laborant, & econtra. B. Quia habent communem causam, idcirco facile alter in alterum mutatur, &c.

Authores dissentientes circa Melancholiam.

- 1 Adserere, in hoc morbo idem esse affectum & causam.
- 2 Adserere, in omni specie melācholiæ sectionem uenæ congruere.

3 Adserere, pituitam adeò assari posse, ut melancholia efficiatur.

4 Adserere, Melancholiam cōfirmatam sine controuersia posse sanari.

5 Adserere, humorem melancholicū, qui est fax sanguinis, non differre à melancholia.

Ad primum: Gal. lib. 2. artis cur. Melancholiae nomen à causa ipsum faciente prouenit, & humor, qui ipsius est causa, melancholia ab omnibus dicitur. Igitur sicuti differt causa ab effectu, ita hic affectus à sua causa, & sic idem non erunt.

Ad secundū: Gal. 3. de loc. aff. ca. de melan. Vbi uniuersum corpus sanguinē melancholicū continet, curationē à uenae sectione incipere oportet: ubi uerò solum cerebrū, infirmus sanguinis detractione non indiget, in omni igitur specie sectio uenae non congruit.

Ad tertiu: Gal. 3. de loc. aff. cap. 7, Igitur ea quā atra bilis constituit, in melācholiā transit: quae uerò à pituita parua est, in aliā affectionem permutatur, melancholiā haudquaquam efficiens.

Ad quartū: Alex. cap. de melanch. Si con-

firmatur hic morbus, cerebrum ad sui naturam mutat, & æger ad assumptionem medicinarum fit inobediens, &c. Hippocr. lib. de atra bile, Non curatur confirmatus, quia in insaniam sæpe conueriti solet. Idem etiã Aet. & Auic. adserunt.

Ad quintum: Gal. lib. de atra bile & de plenit. circa finem, Porro dum ea ueluti fæx sanguinis permanet, neque adhuc acida facta est, satius forsã sit, humorem melancholicum illam appellare, nondum melancholiam: sed melâcholicum potius humorem solemus appellare, quando propè accessit, ut in melancholiam uertatur. Melancholia uerò dicitur, quæ iam atra bilis est, & sic per hæc uerba inter se differunt.

De Ophthalmia.

Lippitudo, Græcè ὀφθαλμία dicta, est annata tunica inflammatio rubore caloreque plurimo, ac punctionibus eueniẽs. In hoc genere continetur etiam perturbatio siue uacillatio, à Græcis τῆ ἐγξις dicta, quæ nihil aliud est, quàm oculi humiditas cum calore & rubore naturæ alieno, ob extrinsecã cau-

ſam forinſecus adueniēte. Sequitur etiā ter-
tia ſpecies ophthalmiæ, à Græcis dicta χύ-
μωσις, Arabicè alguardenegi, & fit quoties-
cūque ab inflammatione uehementi utraque
palpebræ ita inuertūtur, ut uix oculi ab ipsis
contegantur.

Loci consentientes de
ophthalmia.

Gal. 1. de diff. mor. cap. 13, Lippitudo est
membrana, quæ ceratoidi tunicæ adheret,
phlegmone. Itidem de part. art. med. cap. 3.
ait, & in lib. finit. med. Est, inquit, phlegmo-
ne circa oculos cum rubore & plurimo calo-
re, & motu difficili, ac punctiōibus nata.
Auic. tertia tertij tra. 1, Ophthalmia alia
est uera, & alia ei similis, quæ nominatur cō-
turbatio & uacillatio. Ophthalmia uera est
apostema in cōiunctiua: & alia quidem est,
quæ est apostema simplex, non pertransiens
terminū: & alia est quæ magis est pertrās-
iens termini in magnitudine, in qua superabūdat
albugo super pupillā, & tegit eam, & prohi-
bet clausiōem, & nominatur chimosis, &
apud nos alguardenegi, &c. B. Ex his intel-

Cc. i.

lige tres esse ophthalmia species: prima est
 τῆ ἐξίς, quæ levis est: nā remota eius causa,
 remouetur: secūda ophthalmia, quæ est apo-
 stema simplex, non pertrāsien terminū, &
 in ea est uenarū exuberatio, fluxus & dolor:
 tertia χύμωσις, quæ est ophthalmia magna,
 pertransiens terminū in magnitudine, in qua
 superabūdat albugo super pupillā, &c. Am-
 plius scito omnes oculorū morbos esse in tri-
 plici differētia, scilicet ex phlegmone, fluxu,
 & ulcerationibus. Quid sit phlegmone iam
 declaratū est. Fluxus uerò est tenuium dela-
 rio humorum citra uolūtatem quæ cohiberē
 non potest. Ulceratio uerò est ceratoidis ru-
 prio ab ictu uel à ualida inflāmatione oriēs.
 de his uide Galen. lib. fin. med. Habet etiam
 unaquæque oculi tunica morbos à quibus af-
 ficitur, quæ separatim à Paulo & in uno
 capite ab Aetio declarantur. De his uide
 etiam Manardū epist. 2. lib. 7. Loquitur in-
 super Gal. de his primo de diff. mor. cap. 13.
 & 4 de sympt. cau. circa principium. Paul.
 lib. 3. cap. 22. τῆ ἐξίς est oculi humiditas cū
 calore & rubore naturæ alieno, nō ex corpo

re, sed à foris adueniente causa. Gal. lib. fin. med. Chemosis est ambientis oculum mēbra-
na, quod album quoque appellatur, extube-
ratio, albæ carnis persimilis, &c. Vide etiam
Paul. loc. cit. ibi, Chemosim uocant, &c.

De causis ophthalmiæ.

Causæ initiatrices sunt puluis, fumus, sol,
aër, uel quæcūque ex sex rebus non natura-
libus, & sibi annexis oriūtur. Causæ antece-
dētes sunt sex, sanguis, bilis, pituita, atra bilis,
materia aquosa & flatuosa. Causæ coniun-
ctæ sunt, hi humores ophthalmiam ad actum
producētes, aut inflāmatio, aut alius quispia
tumor. Causæ generationis ophthalmiæ binæ
sunt, prima fit cum materia ex superfluitate
alimēti annata tunica paulatim cōgeritur,
aut ipsum alimentum non probè concoctum
in ea permanet, & apostema efficit. Secun-
da est, cū materia per modum fluxus à
capite per uenas & arterias, musculos ac
nervos opticos siue intrinsecè siue extrinsecè
ad annatā oculi tunicam se cōfert, aut quum
ab alijs corporis partibus materia trāsmitti-
tur ad oculū iam debile ob eius tēperaturam,

Cc.ij.

404 DE CONSEN. MEDIC.

uel à generatione existentem. Cause doloris oculorum in inflammatione sunt aut ex acrim humorum influxu, aut à distentione tunicarum repletarum, aut à crassis humoribus & à flatuosis spiritibus, &c.

Lociconsentientes de causis ophthalmiæ.

Galen. in lib. de ocu. cap. 8, Ophthalmia quæ visum turbat triplex est, cuius causa uel est exterior, ut sol, fumus, puluis: uel interior, sicut humores ad coniunctiuam fluētes. Paul. lib. 3. cap. 22, Perturbatio oculi fit à foris adueniēte causa, ut à sole, fumo, puluere, oleo, &c. Auic. tertia tertij, tra. 1, itidem ait, ibi, Fit à causis extrinsecis facientibus in ipso botor, & rubificantibus oculum, sicut à soda adustina, à sole, puluere & fumo & frigore, & propter constrictionem ipsius, &c. De causis antecedentibus loquitur etiam Auic. loc. cit. ibi, Quum ophthalmia sit apostema, & omne apostema fiat à sanguine, uel à phlegmate, uel à melancholia, aut à cholera, aut à uērositate, tunc similiter ophthal-

miæ causa non euacuatur ab una istarum
 causarum, &c. Alex. lib. i. cap. 23. idem
 ait, ibi, Considerandum cuiuscemodi sit
 πλεόνωμα, id est superfluum, utrum ex hu-
 more atrabiliari, sanguineo, bilioso, pituitoso-
 ne ortū sit, &c. Lege etiā omnes ferè practi-
 cates, de hac re loquētes. Quod autē humores
 ophthalmiam ad actum producētes sint cau-
 sa coniuncta, pater ex Auicen. dum dicat,
 Sed aduentus eius plurimū est propter cur-
 sum materierū, & multitudinē uaporū, &c.
 De causis generationis ophthalmiæ lege etiā
 Auicen. ibi, Et quandoque humor apostemās
 generatur in ipso, & quandoque est adue-
 niens ei à cerebro, secundum semitam ca-
 tarrhi, per uiam uelaminis intrinseci, &c.
 lege hunc locum uberius, & plura ad rem
 facientia inuenies. Lege etiam Alexan. lib. i.
 cap. 23 ibi, Diligenter prospiciendū est, unde
 nam quod redūdat in oculos, ex solōne capi-
 te, an ex uniuerso corpore manet: mox per
 arteriāsne an per uenas, siue per utrasque
 in eū sese locū recipiat, &c. De causis dolo-
 ris ophthalmiæ loquitur Auic. ibi, Violentia
 Cc. ij.

406 DE CONSEN. MEDIC.

doloris ophtalmiae aut est propter humorē mordicātem & corrodentē tunicas, aut propter humorem plurimum extensiuū, aut propter uaporem grossum, &c. Gal. 12. meth. doloris causas in genere longo sermone inuestigat, quæ breuiter ita se habent: Omnis dolor aut ob uehementem & aceruatim irruentem alterationem fit, aut ob cōtinuitatis solutionem. Continuitas soluitur ruptione, contusione ac corrosione. Hæc uerò uel ob distensionem, aut grauitatem, aut mordacem qualitatem producuntur. Si igitur nil extrinsecus sit, quod distendat, grauet & corrodat, tunc distētio ab interno humore multo, aut à flatu concluso, aut à plurima siccitate oritur: grauitas à dura aliqua magna aut graui mole corpori extra illapsa contingit, aut ab interno aliquo magno ac graui tumore, mordax qualitas ex humoribus acribus ac mordacibus prouenit: alteratio autem per uehementem fit caliditatem aut frigiditatem, siue spirituum siue humorum siue partium solidarum: quæ omnia in omni dolore consideranda sunt, uide illum in uberius.

De signis ophthalmiæ.

Signa communia ophthalmiæ sunt, tumor, grauitas, dolor & rubor. Signa ueræ ophthalmiæ sunt, quam album oculorum in ruborem mutatur cum fluxu lachrymarum, & lippitudinæ in angulis oculorum lachrymalibus collecta. Signa temporum ophthalmiæ sunt, si materia ab humore oculi proueniens, aquea & tenuis fuerit, tunc est morbi principium: si uerò crassescat, & ad album tendat, erit morbi incrementum: si palpebras, quas Græci βλεφαράς dicunt, adglutinat, erit morbi consistētia, præsertim si lachrymarum copia præcesserit: si uerò hæc omnia minuantur, erit morbi finis. Signa humorum sunt, & primò sanguinis, oculi rubor & tumor, & uenarum plenitudo, temporum pulsatio, dolor potius extendens quàm pungens, grama & glutinationes apud somnum fiunt. In biliosa adest punctura uehemens dolorque adurens & uehemens, rubor oculi paucus, lachrymæ tenues & acutæ, quandoque exulcerantes & per somnum non agglutinantur, tumorque paruus uisitur. In pituitosa adsunt tumor,

Cc. iij.

parua caliditas, rubor ad albedinem decli-
nis, cum paucio dolore & multa grauitate,
glutinationes iuxta somnum fiunt, & color
faciei est albus. In melancholica, dolor debi-
lis, grauitas cum offuscatione, exiccatio cum
perseuerantia, paucitas glutinationis, & mi-
nuta sunt gramæ & pauca lachrymæ. Signa
flatuosa ophthalmiæ sunt, extensio sine gra-
uitate, ruboris paucitas sine lachrymarum
fluxu. Signa perturbationis sunt, leuitas curæ,
& causæ præcedentes, & quantitas aposte-
maris primitiui. Signa, quando fit non per cō-
sensum, sed per essentiam, in capite sunt, do-
lor capitis præcedens & grauitas, &c. Si a
consensu uentriculi præcessit uomitus, nau-
sea, &c. Signa fluxus humoris per partes ex-
teriores sunt, frons extenta, uenæ exteriores
plenæ, &c. Si per intrinsecas, tunc præcedit
frequens sternutatio, dolorq; ab intima parte
oculi, antequam ophthalmia appareat, &c.

Loci consentientes de si-
gnis ophthalmiæ.

Signa communia tetigit Gal. 2. de loc. aff.

cap. 7. ibi, Inflammatis partibus accidit ut
 rubescant, tendantur, renitantur, intumescant,
 & doleant. uide de his Arcul. in 9. alm. De
 signis ueræ ophthalmiæ meminit Razes 9.
 alm. ibi, Cùm ea, quæ in oculis alba sunt, &
 in rubedinem mutata fuerint, fluxerintque
 lachrymæ, & in angulis oculorû lachrymali-
 bus lippitudo collecta fuerit, dicimus tunc
 ægrum pati ophthalmiam: & quanto plus
 symptomotum uehementia aut ipsorum ad-
 fuerit minoratio, tâto magis erit ophthal-
 miæ fortitudo uel debilitas. Signa temporum
 ophthalmiæ habentur ex Auic. tertia tertij,
 cap. de sig. opht. ibi, Cùmque palpebræ con-
 glutinari incipiunt, tunc iam maturationis
 adest propinquitas: dum uerò perseuerat flu-
 xus aquosus, est initium adhuc, &c. Vide in
 hoc latius Arcul. & Sauo. De signis humorû
 loquitur Alex. lib. I. cap. 23. ibi, Sanguis co-
 gnosceatur, quum sanguineo colore omnia tin-
 cta sint, uultûsque cum rubore suffunditur,
 receptacula sanguinis plena uisuntur, graui-
 tas sentitur, functiones solitæ segnius perfici-
 untur, lachrymæ nec mordaces nec acres

410 DE CONSEN. MEDIC.

erunt, &c. Nota bilis sunt biliosa complexio, lachrymæ mordaces, non solum hirquos qui à Græcis καυτοὶ dicuntur, exurentes sedant genas, & quasunque partes attingunt, &c. Auic. loc. cit. Sanguineam ophthalmiam significant color oculi, exuberatio uenarum, & pulsatio temporum, &c. Vide fusius etiam de alijs humoribus: & nota quod Arabes per lippitudines superfluitatem quartæ concoctionis in oculo intelligunt, & quandoque accipitur pro illa humoris parte, quæ oculum infestat ut Razes, & quas uocat Aet. glutinationes & granas. Arabes dicunt lippam, &c. De signis perturbationis meminit Auic. ibi, Post dicamus, quod conturbatio cognoscitur leuitate sui, & causa sui, & quantitate apostematis, &c. Similiter de signis per consensum & per essentiam, ibi, Ophthalmiam in capite significat sola grauitas capitis, & si est cum communitate stomachi, associatur ei nausea & conturbatio, &c. Signa fluxionum per partes exteriores habet Paul. ibi, Fluxiones extra caluariam notant uasa in fronte & temporibus distenta, & caput ue-

luti reuinctū, tum quòd ex agglutinentis
 sicca præsidio sunt. Si hæc desint, & floris
 impetus prorogetur, & sternutamenta non-
 nunquam molestè elidantur, humorem sub
 calua contineri censendum est. Itidem ait
 Auic. Si uia fluxus à cerebro ad oculum non
 est nisi per uelamen extrinsecū, tunc frōs est
 extensa, & uenæ exteriores sunt plenæ, &c.

De cura perturbationis.

Perturbatio per eius causæ ablationem co-
 ratur, & si quid doloris remanet, per altera-
 tionem in cōtrarium reuocatur. Nam impres-
 sio calidi per frigida, frigidi per calida fa-
 cilè remouetur, &c.

De cura veræ ophthalmiæ.

Quinque in cura occurrunt scopi, uideli-
 cet uictus ratio, reuulsio & deriuatio, humo-
 rum preparatio, euacuatio, & symptomatis
 ablatio. Victus sit in principio parcus, boni
 succi, facilè cōcoctilis, uidentur acerosa, salsa,
 coit⁹, mot⁹, pot⁹ uini, præsertim in principio:
 laudatur somnus, aër obscurus, alui excretio

assidua. Reuulsio & deriuatio fient per sectionem uenae saphenae communis & cephalica ab eodem latere, praesertim si plethorica fuerit dispositio. Fiet etiam per frictiones a supernis partibus ad infimas descendentes, uel per cucurbitulas uel per clysteria & pilulas soluentes, ut Razes. Preparatio humorum fiet in calido humore cum frigidis tenuem humorem incrassantibus, ut cum syrup. de papauere rosaceo, iuiubino, de granatis, &c. In frigido, cum calidis ut rhodomelle, oxymellite simplici, &c. Euacuatio perficitur rursus uel per sectionem cephalicae eiusdem lateris, uel per soluentia pharmaca: solunt humorem calidum pilula aurea aggregatiua, electuariū de succo ros. Decoctum myrobalanorum, citrinorum castia, mana, rheub. Soluunt frigidū pilula chochia, diaturbit, diaphinicon, electuarium indum, confectio hamech, &c. Ablatio symptomatum completur doloris causam auferendo, & cum anodinis mitigando, & ad leuia stupefacientia usque perueniendo, &c.

De cura locali ophthalmiæ.

Cura localis triplex est: prima repellit materias ad oculum fluentes cum frigidis stypticis, ut oculus non recipiat in principio morbi. Secunda est repulsio admixta resolutioni conueniens augmento & statui. Tertia est pura resolutio conueniens postrema status parti & declinationi. Exempli gratia, primò ophthalmiæ calidæ apponatur albumen oui cum aqua rosacea: in secunda parte principij sies, album sine sarcacolla: in augmento sies, album cum sarcacolla: & tandē addatur aliquid aque fœniculi uel decoctionis fœnugræci, melliloti s. citoniorum, &c. Commendantur etiam in resolutione balneum & merum, &c.

Loci consentientes de perturbatione & vera ophthalmia.

Aet. ser. 7. cap. 3, Perturbationes oculorū facillimè curantur, si ager à causa lædente discedat, ut à sole, fumo, & alio simili, &c. Anic. in cura conturbationis & ophthalmiæ

leuis quæ cursu eius procedit. Sufficit quandoque causæ abscissio, ut si fuerit à repletionē sanguinis, aut alterius humoris cū euacuatione, &c. Lege hūc locū fusiū. Paul. loc. cit. Facilmè discutitur, si obseruentur omnia quæ foris accidētia lumē perturbare possunt, item parciore cibo & aluo de facili respondere, &c. De uictus ratione in uera ophthalmia loquitur Aet. ser. 7. cap. 8. ibi, Alimenta danda sunt leuia, concoctu facilia, & ad digerendum uentri cōmoda, urinā cientia, nihil acre & salsum habentia, aut crassi humoris, &c. Itidem ait Auic. tertia tertiū, Causa est communis in regimine ophthalmia, materialis est minoratio cibi, & ipsius exiccatio, & electio eius quod generat humorem laudabilem, & alienatio rei quæ est malæ digestionis, & alienatio coitus, & motus, & potus uini, & cōestionis acetosi & salsi. &c. Similiter & Paul. lib. 3. cap. 22. adserit. ibi, Per initia cōuenit nihil assumere, &c. De reuulsione & deriuatione locū habes in Auic. ibi, tertia tertiū, cap. 10, Quod si materia fuerit sanguinea, adhibebis uentosas post phlebotomiam.

iniā, & assiduabis fricationē extremitatum,
 &c. Et cap. 9, Interdum administrentur ca-
 putpurgia, & quæ per nares materiei partē
 extrahunt, &c. Paul. lib. 3. ubi πρὸς ὅτι φο-
 ρὰν ράματα agit, Post generales, inquit,
 corporis euacuationes, medicamentorū us⁹ est,
 quæ per nares atque os pituitā eliciūt: caput
 etiā attōdetur, & incisa cute exasperabitur.
 huc etiam spectāt quas in capite χερουργίας
 administramus αἰσθητολογίαν φημί καὶ ἄρτι-
 ειοπμίαν ὑποπατισμόν τ' καὶ ὠλεσκυφι-
 σμόν, καὶ καὶ σιν κατ' τῆς κορυφῆς ἕως ὀστέων,
 καὶ σικύαι κατ' τὰ τὸ ἰνίς κατ' ἐγκαρὰ ἕως.
 reuellere scilicet possunt impetū fluoris, &c.
 De humorū præparatione loquitur Mes. ca.
 de ophth. ibi, Quinta res est alteratio & di-
 gestio eius quod est trāsmissum, & intelligen-
 tur tā de extrinseca, q̄ de intrinseca altera-
 tione. uide in hoc casu Arcul. Carin. Gord.
 &c. De euacuatione, quā eradicatiuā uocāt,
 meminit Aet. ser. 7. ca. 8. ibi, Vbi oculorū di-
 stētio fuerit, & multus rubor, & ad cōtactū
 resultus, & ardor, & lachryma multa & ca-
 lida, tūc sectio uenæ adhibēda erit, humera-

lis appellata, ita ut animi deliquiū succedat, quo dolor eximatur, & feruor inflammationis extinguatur, &c. Aet. cap. 9, Si uerò uniuersum corpus humoribus uitiatis fuerit repletum, tunc iuxta redundantem & affligentem humorem euacuandum. Nam si pituita magis aquosa redundauerit, exhibe pharmacum ex euphorbio, & sic de reliquis. Auic. tertia terti, cap. 9, Et oportet, si fuerit ophthalmia uehemens, ut fiat phlebotomia, usquequò timeatur liporhymia. Et paulò post, Si ægritudo sit chronica, tunc facienda est phlebotomia ex lachrymalibus, & phlebotomandæ sunt ambæ arteriæ quæ sunt post aures, &c. Et si materia fuerit cholericæ, euacuabis post phlebotomiam cum eo quod educit cholera, &c. Et cap. 2, In ophthalmia frigida oportet ut euacuetur humor frigidus, & quandoque necessarium est reiterare, &c. De ablatione symptomatum habes Paul. cap. 22, Interdum semen papaueris ad leniendum dolorem miscetur, si magna necessitas doloris est, etiam opij pauxillum adhibetur. Auic. loc. cit. Et quandoque doloris uehementia facit neces-

sariam stupefacientium adhibitionem, sicuti succi pomorū, mandragora, lactuca, papaue-
ris, & aqua sumach, &c. Similiter & Mes-
cap. de ophthalmia inquit, ibi, Sextam rē cō-
plent administrationes medicinarū dolores
sedatiuarū, &c. Hip. aphor. 6. aphor. 31, Do-
lores oculorum meri potio aut balneū, aut ue-
na sectio, aut medicamentum epotū soluit. B.
Intellige quòd ad remouendū dolorē oculo-
rū alij pharmaco soluēte indigem, alij sectio-
ne uenae, alij fomēto, alij potu uini, prout eo-
rum exigit dispositio: nō enim omnia hae au-
xilia eidē homini adhiberi iubet. Cōperit ui-
ni potus, quū ut crassos humores attenuet, &
interdū transmutet & euacuet, tū quia facit
ut somnus cōcilietur, & sic per accidens do-
lores sedat. Balneū competit, etiā si dolor tu-
more molli & laxo, uel à fluxu calido minus
fieret: balneū enim partim dolorē remouet,
partim signū est rei demonstratiuum. Quòd
uerò sectio uenae dolorē sedet & purgatoriū
pharmacum, iā manifestum: nam remouendo
causam, dolor ipse etiā remouetur, idcirco in
ophthalmia unicus tātū erit medēdi scopus,

Dd.i.

ut scilicet inflammatio remoueat, quæ ne
 amoueri poterit, nisi causa à qua dependet
 & ipsa auferatur: hoc autem fiet per uentri
 solutionem ac uenæ sectionem, &c. De curis
 locali loquitur nō solū Mesu. sed & Gal. &
 Paul. Mes. cap. de ophth. In principio morbi
 repercussius utendū, in quibus sit facilitas
 deinde resolutiuis, ita ut perueniatur grada
 tim, & cum successione paulatim ab eo quo
 est repercussium usque ad resolutium. Gal.
 4 de compos. med. per loc. cap. 2, Adhibenda
 sunt pharmaca repulsoria non exasperantia
 id est, non uehementem sortita adstrictionē
 sed quæ tū propria sua substantia sunt mod
 ratoria, tū lenitiui liquoris, &c. Auic. tertius
 tertij, ca. 10, Quūque repuleris materiā per
 euacuationem & attractionem & apocru
 stica, tunc gradatim tendas ad maturatiua,
 & sint in primis mixta apocrusticis. Est er
 go conueniens in primis eorum commistio cū
 aqua rosacea, & aqua fœnigraci est bona
 murationi, sedatiua doloris, & est matu
 ratiuo dignior, & non est in ipsa attractio.
 Postea transi ab his ad decoctionem melli-

loti, in qua sit dissoluta sarcacolla alba, nutrita in lacte mulieris & asinae: quumque descēdere incēperis, adde in administratione resoluētium, quod sit fortius, sicuti sarcacolla in aqua fœniculi uel fœnigræci, & administra balneum, si sciueris cerebrum esse mundum, & da in potu post cibum per aliquas horas aliquid uini antiqui puri in parua quantitate &c.

Obseruationes in ophthalmia.

Gal. 4. de compos. med. per loc. cap. 2, Manifestum est omnia pharmaca huiusmodi affectionem curantia sub communem omnium inflammatorum curationem cadere, assumereque necessariò quidpiam pro partis ipsius natura, quæ excellētem mollitiem, & ad hoc ut ledatur aptitudinem, super omnem totius corporis cutem nacta est, propter sensus subtilitatem & substantiæ raritatem, &c. Aui-
cen. loc. cit. cap. 9, Et penitus oportet, ut nō sit in medicina administrata in oculo & propriè in ophthalmia asperitas, nec qualitas saporis acetosi aut acuti. Et paulo infra,
Dd. ij.

Et oportet ut patiens ophthalmiā uel rheu-
matismos ad oculos, deuitet inūctionē capi-
tis & destillationē alicuius olei in aurē, &c.

Obseruationes de repercussio- ne in ophthalmia.

Aet. ser. 7. cap. 4, Quicumque oculi secun-
dum naturam uenas amplas habent & san-
guine plenas, itē qui glauci sunt, omnino non
ferunt collyriorum adstrictionem, quoniam re-
pellentia oportet ut sint frigida & styptica.
Vnde fac repercussiuā, ne nimia infrigida-
tione infrigidet, quia oculū congelascunt, &
uisum auferunt. Secundò fac ut oculum robo-
rent. Auic. loc. cit. Et oportet in quantum pos-
sibile est, ut retardetur collyriorum admini-
stratio usque ad tres dies, & sufficiat regimē
prædictum ex euacuationibus & attractio-
nibus materierum ad extrema, &c. Et paulò
infra, Oportet ut in principio non admini-
strentur inspissatiua fortia, & quæ sunt uehe-
menter styptica, quoniam inspissant tunicas,
& prohibent resolutionem, & magnificant
dolorem, & propriè cū dolor fuerit fortis,

&c. Hoc idem confirmat Aet. ser. 7. cap. 9.
 ibi, Repulsoria collyria quā sint ferè uiribus
 frigidiora, obstructionem & corporum con-
 densationem faciunt: & dum humorum ma-
 terias concludunt, maximas inflammationes
 & graues dolores inducunt, &c. B. Intellige
 obstructionem fieri, si materia in oculo con-
 tenta fuerit frigida: nam in calida & tenui
 corrodeute maior audacia erit in admini-
 stratione stypticorum, inquit Auic. Imò non
 est malum apud me, inquit, uti opio: ipsum
 enim sanat celeriter. uel intellige repulsoria
 esse mala, quotienscunque materia ex uela-
 minibus intrinsecis ad oculum fluxerit, unde
 Auic. Quum initium est ex uelaminibus in-
 trinsecis, cura est difficilis. lege Paul. & Mes.
 de hac re plura loquentes, &c.

Obseruationes de lacte adhi-
 bendo in dolore
 ophthalmico.

Aet. ser. 7. cap. 10, Qui lac pro ouo infun-
 dunt uolentes dolorem obtundere, decipiun-
 tur. Nam lac à caliditate in oculo præter

Dd. iij.

naturam facile alteratur, & acrius euadit, unde perparuo solatio dixerunt affectionem propinant, &c. Auic. loc. cit. Non est conueniens, ut dimittatur destillatio lactis in oculo tempore longo, imò oportet ut remoueat & renouetur omni hora, &c.

Obseruatio de resolutiuis.

Auic. Resolutiua in principio ophthalmiae uehementer deuita, & oportet ut intendis ante omnia ad mundificationem lippitudinis cum facilitate, & non noceas oculo, &c.

Ophthalmiae nocentia & visum debilitantia.

Nocent oculis acetum, amyllum, fumus argenti uiui, semen canabis, folia castanearum, caules, coriandrum, crocus, lac, lactuca, oliua, opium, oximum, pisces, portulaca, & quaecunque his uersibus ioci gratia annotauimus:

*Hæc oculis multū, sol, puluis, fumus & æstus,
Ventus cum fletu, uina, uenūsque nocent.
Acrida ne mades, nec quæ sint plena uaporū,*

Nec cepas, lentes, allia, porra, fabas.

Roar primo, thesir tra. 8. cap. 21. inquit capita gallinarum à proprietate causare cecitatē. Item damnat carnes siccas, salsas, pinguedinē crassam & uiscosam, & propriē porcinam, superfluumque animi & corporis laborem, &c.

Ophthalmiæ curantia & visum roborantia.

Valent ad ophthalmiam, absinthium, aloes, flomos, uerbena, camphora, album oui, psyllium, opium, rosa, sarcacolla, mellilotum, fœnugræcum, semperuiua sumach, portulaca, sief album Mes. puluis albus Haly. 21. anti. emplastrum ex pomis coctis, zucchero, & aqua rosacea, addendo aliquid camphoræ. uide Montagn. cōf. 63. Vide etiam Varig. tra. 3. cap. 8. Item Gord. Saon. & Arcul. &c.

De prognosticis ophthalmiæ.

Hip. aphor. 6. aphor. 17, Lippientem alui profluuium corripere bonum. B. Quia humorum abundātia euacuatur simul, & ad inferiora
Dd. iij.

retrahitur, dans nobis exemplum, ut in lippitudinibus alium nos quoque subducamus. Auic. Et ophthalmia est uelocioris status, in qua lachrymae magis currunt, & quae acutior habet mordicationem, & tardioris, quae est magis sicca. B. Cognoscitur an longo uel breui tempore sit lippitudo duratura, aut à multitudine materiae ad oculum fluente, aut ab oculi imbecillitate, aut à uiarum latitudine, quasi longo durauerit tempore, ulcerationem uel oculi interitum pronunciat. Hip. aphor. 3. aphor. 12, Si hyems australis & pluuiosa fuerit, &c. Et in fine, Lippitudines siccae fiunt, &c. Lege insuper aphor. 13. & 16. & 21. eiusdem lib. 3. Auic. loc. cit. Si initium ophthalmiae erit ex uelaminibus intrinsecis, cura est difficilis, & omnis aegritudo, quae fit per communitatem uelaminum exteriorum est magis salua, &c.

Authores dissentientes circa morbos oculorum.

- I Adserere, uisionem fieri extra mittendo, & non intus suspiciendo cum Platone.

- 2 Adserere, sectionem uenæ non conuenire in omnibus ophthalmiæ speciebus.
- 3 Adserere, in doloribus oculorum stupeficientia esse ualde utilia.
- 4 Adserere, balneum in ophthalmia minimè prodesse.
- 5 Adserere, oculos esse complexionis igneæ, quum maximè luceant.

Confutatio dissentientium circa morbos oculorum.

Ad primum respōdet Arist. in lib de sens. & sensa. quòd impossibile sit, fieri extra mittendo probat. Præterea Auer. 3. collig. Si uisio, inquit, fieret extra mittendo, sequeretur quòd in obscuro uideretur, sicut in luce, neq; lux ut medium, neque rethe, nec tunicæ opus essent in uidendo, neque destructo aliquo istorum uisus destrueretur. De his uide Arist. loc. cit. interrogantem Empedoclem, quomodo uisus extēderetur usque ad astra, si quid corporeum foret, quod ab oculis emittitur. lege de his fusius Conciliatorem different. 64. &c.

Ad secundum: Auic. tertia tertij, cap. 9, Et

phlebotomia ex cephalica est conueniens omnibus speciebus eius. Item Razes 9. alman. cap. de oph. In principio curationis minuenda est semper cephalica: & quanto fortior fuerit ophthalmia, tanto plus est minuendum de sanguine. Itidem ait Mes. Et sic in omni specie conueniet, si non ratione euacuationis, saltem ratione diuersionis, &c.

Ad tertium: Gal. aphor. 6. commen. 31, Si ocalia sint debilia, tunc fluxiones non reprimunt uehementes: si uero sint ualde stupeficientia, ut ex eis maximam oculi inflammationem non sentiant, tunc necessarium est, simul uim uisoriae offendi, adeo quod cessante inflammatione uel debiliter uel nihil omnino uideant: simul autem & quandam praeduram dispositionem, quae difficulter sanari possit, in oculorum tunicis derelinqui, & sic per Galenum nullo modo sunt utilia.

Ad quartum: Gale. eodem commen. Securißimum est fomentum, & omnino aliquam afferens utilitatem, uel tanquam signum ad cognitionem, uel tanquam causa sanitatis. Nam si nihil influit omnino in oculos fomen-

rum, contentam in ipsis superfluitatem dissolvens, sanitatem restituit: si uerò adhuc influit, suo calore affert aliquod leuamen, & paulò post dolorem auget, & tunc fit signum dignoscituum, & sic utroque modo summo-
pere confert, ut Gal.

Ad quintum respondet Arist. de Sen. & sensa. & quinto de generatione animalium, dicens, Quòd oculus est complexionis aqueæ, quia aqua est impressionum susceptibilis, nec potest esse ignea, quum ignis nimium agitur, & de facili resoluatur, nihil penè retinens. Igitur non complexionis ignea: uerum oculus, quoad eius spiritus naturam ignis obtinet, sed in ipso simpliciter dominatur aqua. Nam constat, quòd tactus & gustus terræ attribuitur, oculus aquæ, auditus acri, olfactus igni: ex fumali enim uaporatione perficitur, quæ ignea esse perhibetur, &c. Lege tamen de hac re Concil.

De oculorum suffusione.

Affectus, qui à Latinis Suffusio, à Græcis *ὑπόχρημα*, ab Auic. aqua, à uulgo cataracta dicitur, est inter crystalloidem & corneam

circa pupillam humoris aquei concretio, quæ ubi perfecta fuerit, uisum impedit. Hanc aliqui cum glaucomate idem putarunt sese decipiētes: nam hypochyma sicuti est aquosi humoris cōcretio, ita glaucoma est naturalium humorum in casium colorem mutatio. Præterea in glaucomate nil prorsus, in suffusione aliquantulum cernitur.

Loci de suffusionis descriptione.

Gal. lib. finit. med. Suffusio est humoris aquosi inter crystalloiden & corneam concretio. Aet. ser. 7. cap. 51, Suffusio est prætersusio humorum circa pupillam congelatorum, ut ubi perfecta fuerit, uisum impediat, &c. Paul. lib. 3, Hypochymata humorum dicimus effusionem, qui inter tunicam ceratoidem & crystalloidem concrecentes impediunt. Auic. tertia terti, ca. 18, Descensus aque est agritudo oppilatiua, & est humiditas extranea, stans in foramine uuæ inter humorem albiginum, & syphac, & corneam. Quare prohibet penetrare formas ad uisum. B. Aduerte quod una & eadem infirmitas est catara-

Et, suffusio, aqua, gutta, & imaginatio apud Arabes. In hoc tamen differunt, quia imaginatio est tanquam suffusionis principium, in quo id uideri imaginamur, quod uerè nō est: Aqua uerò & gutta est, quum in modum aque uel guttæ suffusio uideatur. Nam dum currit, & in compressione digiti dispergitur, aqua dicitur: dum uerò firmari incipit, gutta: at quum iam dudum firmata est, uocatur cataracta. Aet. loc. cit. Glaucedo est crystallini humoris in cæsum colorem mutatio. Itidem ait Paul. loco nuper cit.

De causis suffusionis & eius speciebus.

Causæ uel fiūt primario affectu in oculo, ex nutrimento huius partis non bene conuerso, aut superfluitate nutrimenti non resoluta: uel fiunt per consensum capitis humiditatem hanc ad oculum transmittentis, uel ex uaporibus oris uentriculi ad oculos eleuatis: deinde à frigidityte oculorum in humiditatem conuersis. Species suffusionū uariantur in quantitate & qualitate & loco. In quantitate, quia interdum tantæ molis est, ut integram in

oculo obstructionē pariat: interdum tam parua, ut non totum lumen occupet, sed per partem res uideantur: interdum etiam ita crassa est, ut nihil in lumine cōprehendatur, interdum adeo subtilis ac tenuis, ut res quidē, sed ueluti sub nube cernantur. Ambae hae curam non admittunt cum acu, sed tantum quae inter has species media quodāmodo fuerit. Species in qualitate sunt multiformes ratione coloris. Nam quaedam aëri, quaedam uitro sunt similes: aliae sunt albae, aliae uirides, aliae flauae siue citrinae, &c. Differunt loco, quia aliae fiūt in tunicis, aliae in humoribus. In tunicis, quū aliquod uestigium siue occultum siue manifestū ab ophthalmia uel ab alio morbo relinquitur, uel quum adeo crassescunt, ut uisio impediatur. In humoribus, quum uel eorum substantia fiat humiditas aquosa, uel eorum complexio colorem inalteret, & nutrimentum transmutet, &c.

Loci consentientes de causis &
speciebus suffusionis.

Gal. 4. de loc. aff. ca. 2, sunt & alij oculo-

rum affectus, quibus ei per consensum adueniunt, unde subdit: Igitur accidētia suffusorū uisis similia uidentur, oculis nulla propria affectione molestatis, sed aut oris uētriculi, aut cerebri cognatione id accidere solet, etc. Et 1. de loc. affe. ca. 2, Accidit nonnunquam, ut efficiens causa pertransiens non firmum in particulā faciat effectum, ueluti quum suffusioni similia quādā oculi imaginantur, collecto in ore uentriculi tenui excremento, unde uapores quidam subleuati, deinde circunuenti à uisifica facultate similes imagines mouent, quales per suffusiones apparere consueuerunt: idq; maximè solet euenire ijs, quibus oculorum humor exquisitè purus est, aut uisifica facultas quam facillimè sentit. Et 3. de loc. aff. ca. 1, Itaque affecto stomacho oculi similibus infestantur casibus, quales in suffusionibus apparere solēt: dicendum est, illos pati, elato ad cerebrū ab humoribus in uētriculo contentis, fumoso quopiam uapore, etc. De his lege etiam in fine cap. 7. eiusdem lib. et quomodo consensus fiat, intelliges. Gal. 4. de sympt. cau. cap. 2, Facult. uisifica offen-

43. DE CONSEN. MEDIC.

ditur uel neruo ad oculum descendente affecto uel cerebro, &c. lege fusius totum hoc caput. De speciebus suffusionum loquitur Gal. 4. de sympt. cau. cap. 2. ibi, Haud aliter accipienda sunt ea, quæ de aquosi humoris quantitate, substantia & colore diximus, &c. Auicenn. tertia tertij, cap. 18, Et ipsa quidem diuersificatur in quantitate & in qualitate. In quantitate quandoque est plurima, & oppilat totum foramen, & non uidet oculus aliquid: & quandoque est pauca, quia oppilat partem eius, & dimittit partem detectam, &c. Gal. in lib. de ocul. cap. 12, Huius color aquæ est diuersus: quedam enim acris aëri, quæ uitro assimilatur, alia est quasi alba, &c. Iridem ait Aet. ser. 7. cap. 51. Auicenn. loc. cit. Diuersitas in qualitate quandoque est in essentia, quoniam alia est subtilis & clara, & alia est crassa ualde: & quandoque est in colore, quoniam alia est aërei coloris: alia alba, & est margaritalis, &c. Gal. 4. de sympt. cau. ca. 2. quod alia per locum affectum fiat diuisio, demonstrat, dicēs: Unus affectus ad tunicam ipsam rhagoiden spectat, alter ad humorem tenuem

effusum, qui inter crystalloiden & rhagoiden medius existit. Quod etiā intelligendum est de ceratoide: unde paulò infrā adserit, quòd si ceratoidis tunica crassior densiorque fuerit, hebetem efficit aciem: si uerò humidior ac densior, non hebetem solū obtusūque reddit uisum, uerū etiam efficit, ut qui sic affectus est, putet se per tenebras, aut nebulā, aut per fumum res ipsas intueri, &c. Itidem ait Auic. ibi, cap. 9, Nam aut existit in tunicis, aut in humoribus. Quæ existit in tunicis, est, ut sit super tunicam corneam uestigium occultum ualde, quod remāsit à uariolis aut ophthalmia, &c.

De signis suffusionis.

Signa præcedentia sunt, ut qui sic affectus est, ueluti quædam caliginosa, uel paruos culices, uel fumosa, & nebulosa uidere uideatur, aut circa lucernas circulos uel duplex lumen se intueri arbitretur: quæ imaginationes uariantur in quantitate, quia parua uel magnæ: in essentia, ut crassæ, tenues, occultæ: in situ, ut raræ, densæ, nebulosæ: in figuris, ut

Ee. i.

sunt granosa, muscosa & capillares, &c. Signa absoluta suffusionis cognoscuntur ab ar-
 tis perito, & per longitudinem tēporis: rarò
 enim pētransit sex menses, similiter signa co-
 lorum per se manifesta inspicienti apparent.
 Signa ipsius obstructionis cognoscuntur in
 compressione oculi: nam si statim aperto ocu-
 lo uideatur diuidi, ac in partes separari,
 tunc est suffusio subtilis ualde: si uerò nullo
 modo moueatur, sed in se remaneat, erit cras-
 sa ac densa, nec per acum ambæ admitti po-
 terunt: si uerò dilatari, sed non in partes di-
 uidi uideatur, ea est quæ per acum curam re-
 cipit. Signa loci obstructionis cognoscuntur,
 si clauso altero oculo pupilla alterius aperti
 dilatetur uel constringatur, indicat non esse
 obstructionem in uijs spiritualibus, per quas
 ab uno in alterum fit transitus, & hoc præ-
 sertim, quum maxima ac crassissima non fue-
 rit suffusio. Cognoscitur etiam esse inter pu-
 pillam & ceratoiden, si pupillæ uisio impe-
 diatur. Signa quando fit per consensum sunt,
 quia si à toto, adsunt febres, ad quarum aug-
 mentum suffusiones augētur, & ad earū re-

cessum declinant: si a stomacho, aucta stomachi mala dispositione crescunt, & remota remouentur: uel si in utroque aequaliter oculo apparitio fuerit, tunc cataracta erit ex consensu stomachi: si uerò fuerit in uno tantum oculo, uel in utroque, sed diuersimodè, erit ex cerebro, &c.

Loci consentientes de signis suffusionis.

Aet. ser. 7. cap. 51, Præcedentia signa sunt ueluti culices parui, caliginosa quædam oculis sæpe obuersari uidentur, quidam piliformia uident, alij ut lanarum flamenta, aut aranearum texturas, aut circa lucernas circulos: dum uerò augetur affectio, augentur & ipsa accidētia, &c. Auicē. tertia tertij, cap. 19, Signa portendentia aquam sunt imaginationes prædictæ, & quòd accidit cum eis conturbatio sensibilis, & quòd imaginantur res luminosæ, sicut candelæ duplices. Et capite 9, Imaginationes diuersificantur in quæritate, & sunt parua uel magna: uel in sua essentia, & sunt grossæ, subtiles, &c. De signis ob-
Ec. ij.

436 DE CONSEN. MEDIC.

structionis an sit curabilis, loquitur Alex. ca. de aqua, ibi, Quando passio fuerit confirmata, & fuerit curabilis, signū erit, quòd dum aspiciuntur oculus, uel pupilla uidetur clara, & cedit dilatationi, cū premitur digito aut instrumento, deinde redit ad ipsum & non frangitur, &c. Auic. tertia tertij, cap. 18, Et illa quæ magis susceptibilis curæ ex parte essetia est, subtilis: quæ cū eam conspexeris, & super ipsam digitis tuis compressionem feceris, separabitur uelociter, deinde redibit & aggregabitur. Paul. lib. de oculo. ca. 12, Quando cataracta sit curabilis, sic dignoscitur: Si uno oculo clauso pupilla alteri dilatetur, possibile est sanari: sin autem, minimè. Causa, quia neruus concauus, quo uisibilis spiritus ad pupillā ducitur, oppilatus est: & sic signa habes loci obstructionis. Hoc idē habes ex Auic. loc. cit. ibi, Inter aquā & oppilationē intrinsecam distat, &c. De signis per consensum loquitur Gal. 4. de loc. aff. cap. 2. ibi, Distinguendum utrū à cerebro, an à uentriculo hæc affectio proueniat: primū ex eo, quòd alter oculus, uel uterque similiter uisis occupetur:

nam si utrique oculo hoc accidat, affectus erit ex uentriculo. Distinguendum etiam est ex tempore: nam si per plures dies uel menses suffusionis accidentia apparuerint, & nihil tenebrosum in pupilla uideatur, tunc ab ore uentriculi affectus procedit: sed si perpetuò hæc apparitio perseuerauerit, nec aliqua suspicio sit ex uentriculo, tunc per essentiã morbum intelliges, maximè si una pupilla altera sit turbidior, idq; magis, ubi sumpto ex aloe medicamento nihil uarianerint, &c.

De cura suffusionum.

In cura suffusionis diuersæ sunt intentiones, quarum prima est, quòd si à uentriculi imbecillitate proueniat, roboratione indigemus, si multitudine pituitæ in eo contenta, præparatione & euacuatione, deinde oculi roboratione, ut ne quid suscipiat, & susceptum resoluator ac exiccetur. At si suffusio à cerebro uel uitio oculi prouenerit, confirmata nõ nisi per manualet operationem curã admittit, non confirmata adhuc pullulans quinque medijs auferetur, scilicet regimine
Ee.iiij.

sex rerum non naturalium, humoris præparatione, euacuatione, reuulsione ac deriuatione, exiccatione & resolutione. Victus ratio erit, donec morbus trāserit, attenuatoria: nā pisces & cibi craſsi nutrimenti, & quæcunque flatuosos uapores parium, & humectant ac replent, fugienda sunt, uinum pariter, & coitus, & balneum, & aër humidus uitetur. Pro potu hydromel cōuenit. Humoris præparatio quoniam plerunque ortum habet à pituita, idcirco cū oxymellite simplici & cōposito, cum syrupo de ſtechade, rhodomelle, & cum decoctis ſaniculi, ruta, euphragia, betonica, ſtechados, roſmarini, & ſimilium perficietur. Euacuatio primū per ſectionem uenæ, ſi corpus fuerit plethoricū, ſi minus, cum phlegmagogis, ut pilulis chochys, ſine quibus lucis Aſatareth, ꝓ. de agarico, cum electuarijs & ſimplicibus, ut pluries repetitum eſt. Reuulſio & deriuatio fient cum clyſteribus naſcalibus, maſticatorijs, narifuſorijs, cū cauterijs, cucurbitulis, extremarum partium frictionibus, aut balneis extremis partibus adhibitis, &c. Resolutio ſuffuſionis & ua-

porum tam per intrinseca, quàm per extrinseca paratur. Intrinseca erunt electuaria, inter quæ laudatur confectio humani à Mes. Item triphera, myrobalani conditi, & alia multa, quæ à cæna comeduntur. Extrinseca multa sunt abstersoria, quæ suffusioni quadrant, qualis est aqua mellis stillata more chymico, aqua fœniculi, rutæ, euphrasiæ, serapinum in uino granatorum dissolutum, pulvis hirundinum, urina infantis, & collyrium de fellibus Raxis, & alia multa quæ infra annotabuntur.

Locī consentientes de cura suffusionum.

De cura per consensum uentriculi lege Arcul. Marc. Catin. Gord. & cæteros practi-
cantes. Habes insuper Galeni auctoritatem de dolore capitis per consensum, quæ ad hunc locum reduci potest. De operatione manuali, quoniã quid agendum foret nõ expressimus, nunc auctoritas Auic. tertia terti, cap. 20. satisfaciet, quæ talis est, Quum uoluntas adest ut fiat cura cum instrumẽto, permittitur habenti aquam, ut nutriatur piscibus recenti-

Ee.iiij.

bus & cibis humectatiuis, & administretur
 ex eis aliquid, quod resistat nocumēto aquæ,
 & precipiatur infirmo aspicere ad lachry-
 male domesticū, & ad nasum, & conseruetur
 iuxta illam figuram: nec sit iuxta fenestram
 uel in loco uehementis luminis, & perforet
 artifex cū acu, & uadat inter duas tunicas,
 usquequo sit corā foramine, & deponat ca-
 taractam, nec deponere cesset, usquequo ocu-
 lus clarificetur. Cūque curam cum instru-
 mento operatus fuerit, pone super oculū ui-
 tellū oui conquassatum cum oleo uiolaceo, &
 dormiat super collum tribus diebus in tene-
 bris, &c. Vide eum. in fusius. Et nota quòd
 triplex est cura iuxta chirurgos: prima fit
 cum acu ferrea uel plumbea incuruata: se-
 cunda cum acu acuminata incuruata: quæ
 dum suffusioni superponitur, eam in uacuum
 extrahit: tertia cum cauterijs circa frontem
 super oculū laesum, ita quòd abscindatur flu-
 xus & exiccetur suffusio. De his uberius le-
 gere poteris Placentinū Arnaldum & Gui-
 donem. lege etiam Paul. lib. 6. cap. 21. ubi de
 hac manuali operatione pertractat uberri-

mè. uide etiam alios practi-
 cantes, &c. De
 nictus ratione loquitur Auicen. tertia terti,
 cap. II, Et oportet ut uitet pisces & cibos
 ingrossantes & uaporatiuos & potum plu-
 rimum aquæ & uini, & frequentiam phle-
 botomiæ & uentosarum, &c. Et cap. 19, Et
 caueat habens eam repletionē uinum & coi-
 rum, & sit contentus comedere semel in me-
 ridie, & fugiat pisces, & fructus, & carnes
 grossas, &c. Aet. ser. 7. cap. 51, Dieta omnis
 sit attenuatoria, à uino abstinendum est per
 totam curationem, & ab omnibus replenti-
 bus caput, &c. Razes 9. alman. itidem ha-
 bet, ibi, Non comedat pisces, nec omnia quæ
 humectare possunt, sed ager ex calefactiuis
 & exiccatiuis nutriendus est, hydromel pro-
 pterea in potu exhibendum est, &c. De hu-
 morū præparatione loca non adducā, quum
 iuxta Arcul. Gord. Sauona. & Marcum Ca-
 tin. ualde pateant. De euacuatione, Aet. ser.
 7. cap. 51. inquit, Curādi sunt qui suffusione
 tentantur in principio sanguinis detractio-
 ne ex cubito, &c. Paul. lib. 3. cap. de glan.
 Suffusione tentatis succurremus sanguinis ex

442 DE CONSEN. MEDIC.

cubito detractiōe & purgatione, euacuationibus acrioribus. Auicē. loc. cit. Oportet ut incipias & mundifices corpus, & propriè stomachum: deinde deuenias ad mundificandum caput, & scias quòd hiera picra est mirabilis iuuamēti in eis, & similiter pilulæ aureæ, & medicamenta, in quibus ponuntur centaurea, & cucumer amarus, &c. Razes similiter ait 9. alman. tribuens pilulas chochias, &c. Mesu. cap. de aqua, Quando est in principio, & non est confirmata, succurritur ei cū medicinis, & cū mundificatione sæpius reiterata, & propriè cum chochys, hiera picra, & hiera colocynthidos, &c. De reuulsione & deriuatione plura habes ex Aet. ser. 7. cap. 51. ibi, Et si nihil impedit, etiam clysteribus acrioribus & purgatione utemur: deinde cucurbitula occipitio affigenda est cum scarificatione, & pituitam per os trahentibus narifusorijs, &c. Auicē. tertia tertij, cap. 2, Deinde mundificandum est caput cum gargarismis, & caput purgij, & masticationibus, & dicitur quòd appositio sanguisugarum super tēpora confert in

initio sui, & phlebotomia arteriarum post
 aurem, &c. De resolutione loquitur Mesu.
 cap. cit. ibi, Et succurritur cum administra-
 tione medicinarum resolventium, sicuti est
 aqua ruta cum serapino, aut aliquo ex felli-
 bus animalium, cum melle & succo fœniculi,
 &c. Auic. itidē adserit, ibi, Quæ sunt ex sic-
 citate, cōferunt quandoque humectatiua no-
 ta, sed si sunt ab humiditate, conferunt eis
 omnia aleophol, id est, collyria quæ abster-
 gunt. Vide Arcul. Gordo, & Marcum Cati-
 narium & ceteros practiçantes, &c.

Observationes in manua-
 li cura.

Auic. tertia tertiũ, cap. 20, In regimine cu-
 ra, quæ fit cum instrumento, oportet ut ante
 ipsam præcedat mūdificatio corporis & ca-
 pitis propriè, & fiat phlebotomia, si necessa-
 ria fuerit, & obseruetur, ne ille qui cum in-
 strumēto curādus est, habeat in oculo rupru-
 ram, & timeatur ut accidat in tunicis apo-
 stema, aut sit assuetus pati tussim, aut sit ue-
 hemētis rixæ, uelocis iræ: nam hæc mouent ad
 profundum uel reditum. Arcul. Ne primum

444 DE CONSEN. MEDIC.

*te ad curandum intromittas, ni prius magi-
strum pluries operari uideris.*

Obseruationes de euacuatione.

*Paul. lib. 3. cap. de glau. Si ueluti culices
oculis obuersari uideantur ex quadam hu-
morum prauitate, uel biliosioribus uapori-
bus sursum distributis, medicamentum dia-
loes amarum exhibeatur. B. id est, quū sciue-
rit esse morbum ex bile, utere picra: si minus,
alys compositis: nam picra stomachū & ca-
put una simul uice expurgat ac euacuat, &c.
Auicen. loc. cit. Vomitus quantumuis conse-
rat ex parte mundificationis, tamen est no-
citiuus in proprietate aquæ.*

Obseruationes de resolutione.

*Aet. ser. 7. cap. 51, Medicamentis utendum
est primū simplicibus, uelut melle, succo fœ-
niculi, deinde cōpositis, liquidis, siccis colly-
rijs, quæ paulò pōst describentur. Auic. tertius
tertij, cap. 2, Et oportet ut incipias primo à
medicinis lenitiuis, sicut fœniculū cum melle:
deinde gradatim perueniatur ad medicinas*

compositas ex serapino, &c. Et hac non nisi post mundificationem corporis, &c.

Suffusiones curantia ac
perseuerantia.

Curant suffusiones adeps piscis & uiperae recens, oleum antiquum cum melle, fel aquilae cum melle, asa, asphaltum, berbena, ciclamini succus cum melle, euphorbium, sarcacolla, segapinum, myrrha, lac ficus, gumi oliuae, oleum benedictum Nic. mirabile, sief de fellibus Haly, sief rubeum Serapionis, fel canis, caprae, auium rapacium, scorpionis marini, gallinae, tauri, testudinis, hyenae, uulturis, aquilae, succus foeniculi, semen raphani, oximum, rosmarinus, & sal. Prohibent suffusiones fieri pilulae, sine quibus pilulae optomerae Auic. hiera Archigenis, hiera magna, hiera andromachi Mes. in cur. sod. frig. caput purgii Alex. eodem in loco. lege insuper Varignana cap. 12. tra. 3. ubi tractat de descensu aquae ad oculum. Vide etiam Razem cap. de cataracta. Item Placentinum, qui puluerem describit, multum ab ipso commendatum, &c. Vide fa-

sius Montagnanam cons. 66. cap. 4. de remedijs conuenientibus diminutioni & corruptioni uisus, &c.

De prognosticis suffusionum.

Paul. loc. cit. Verum omnia glaucomata curationem non recipiunt, hypochymata uero curantur, sed non omnia. B. Intellige glaucomata non curari, quae ex praegressa suffusione fiunt, humore iuxta pupillam uehementissime congelato ac resiccato. Vnde Auic. de obstructione uisus, inquit, Ex siccitate fit, ut oculus in seipsum colligatur & corrugetur, & nominatur haec aegritudo glaucoma: fit enim oculus propter eam uariis multorum generum, & non est ei medicamen. & Aet. Quae glaucescunt, incurabiles sunt, &c. Auic. tertia tertij, cap. 18, Et illa quae est magis susceptibilis cura, ex parte coloris est aerea & alba margaritalis, & quae ad uiriditatem praeruper declinat. Genus autem gypseum, & uiride, & nigrum, & plumbeum uehementis nigredinis, & citrinum non recipiunt curam, quae fit cum acu, &c. Galen. 14. meth. cap.

ult. Hypochyma iam incipiens digeritur, ubi diu constitit, non potest.

Arcul. 9. almans. Cataractæ quæ totum oculum occupât, sunt incurabiles. Item nimium crassæ, quæ non per cõpressionem moventur, neque acu, neque medicamētis curantur. Item cataractæ ex integra obstructione nerui operificæ curationem non admittūt, & quæcunque siue à percussione, aut post ægritudinem cerebri fiant, difficulter sanantur.

Authores dissentientes circa suffusiones.

- 1 Adserere, locum affectum in suffusione esse ambiguum.
- 2 Adserere, suffusiones ferè omnes per chirurgiam posse curari.
- 3 Adserere, parorasim, id est, hallucinationem esse suffusionis speciem.

Confutatio dissentientium circa suffusiones.

Ad primum: Haly Abb. 9. theoricæ cap. 13. renet, quòd locus suffusionis sit inter crystalloidem & corneam: pro quæ habes etiam

rationes in descriptione superius ex diuersis
authoribus recitatas.

Ad secundum: Paul. lib. 3. cap. de glau. &
Auic. ut supra dictū est in prognosticis, mul-
ta suffusionum genera, quibus non est dare
remedium, proculdubio recitauerunt. Ex qui-
bus concludi potest, non omnia ferè, sed ual-
de pauca posse curari, sicuti etiam nobis ex-
perientia demonstrat, &c.

Ad tertium responderetur, quòd si parorasis
esset species suffusionis, sequeretur quòd hy-
posphagmatici & icterici suffusiones pati
dicerentur, quòd à ratione alienum est: nam
isti parorasi laborant, ut testatur Galen. 4.
de sympt. cau. ibi. Si uerò humores non multi-
tudo, sed colore peccauerint secundum eius-
dem coloris naturam parorasis, id est, hallu-
cinatio suborietur: nam qui ictero laborant,
omnia quæ uident, pallere arbitrantur. Qui
uerò hyposthagmate, omnia quæ aspiciunt,
rubra putant, &c. sed hoc falsum, igitur, &c.

De aurium doloris descri-
ptione.

Dolor aurium, Græcè *ὠταλγία* dictus, est

eristis ac molesta auris sensatio à contraria
re derepente ac uiolenter simul & uehemen-
ter imprimente facta. Cuius species enume-
rantur quinque, ut dolor punctorius, stimu-
lans, tensiuus, grauis, & pulsatilis, &c.

Loci consentientes de dolo- ris aurium descriptione.

Plato in Timæo, Pathos præter naturam
uiolenter ac affatim incidens dolorem exci-
tat. Gal. 4. de sympt. cau. cap. 6, Hoc Plato
uolebat, quum diceret molesta sensationem in
corporibus sensu præditis fieri, si compositum
ipsi pathema ex uiolento simul & conferto
acciderit, &c. De speciebus dolorum lege Gal.
2. de loc. aff. & 3. cap. 7. ubi mentionem fa-
cit de torpido, ulceroso, stringente, lacerante,
&c. de quibus, cum de doloribus agemus, in
genere loquemur: lege etiam Auicenn. & Ar-
cul. 9. almans.

De causis doloris aurium.

Omnis dolor aut per consensum, aut pri-
mario affectu fieri solet, cuius causa est, aut

Ff. i.

mala intēperies, aut soluta continuitas. Mala intēperies aut fit à frigiditate, aut à caliditate, aut ab utraque, & hæc cum materia uel sine materia esse potest. Soluta uerò continuitas fit aut à flatu extēdente, aut ab humore corrorente, siue putrefaciente, aut ab aliquo tumore, abscessu uel inflammatione. Quæ uerò per cōsensum fiunt, aut à toto, aut à parte oriuntur. À toto, sicuti per crīsim, per febres. À parte, ut à stomacho, à matrice. Qui uerò per se ueniunt, id est, à parte læsa, uel erunt in auris cartilagine, aut in meatu, aut in auditorio neruo, &c.

Loci consentientes de causis dolorum auris.

Gal. 12. meth. cap. 7, Doloris causa aut est diuīsiō uel alteratio, &c. de omnium dolorum causa in genere loquens, &c. ut supra dictum est. Gal. lib. 3. de compo. med. per loc. cap. 1, Dolores auriū aliqui ex frigiditate à uentis inducta fiunt, aliqui ex balneis frigidis medicatisque, aliqui ex inflammatione: interdum circa meatum cutis: interdū in profundū progressa, ubi auditorius neruus ad

*inflāmatam affectionem peruenit: aliqui ex flatu uentoso transitum non habente, aliqui ex humoribus saniosis & mordacibus dolorem excitātibz oriūtur. Auicē. quarta terrij, cap. 6, Dolor auris aut fit à malitia complexionis, aut fit causa apostematis aut bo-
rhor, aut causa solutionis continuitatis, &c. uberi⁹ hunc locum legito, & plura ad rem faciētia inuenies: lege insuper Alexan. lib. I. cap. 24. ubi diffusius rem pertractat: uide & Arcul. Sauo. & Gord.*

De signis dolorum auris.

Indicia omnino communia ab ætate, temperie, anni tempore, arte & uictu præcedente sumuntur, item ex laborantis relatione. Signa si fiant à mala intemperie, siue calida, siue frigida, cognoscūtur per ea, quæ in contrarium adhibētur. Signa particularia sunt: nam si à flatu fiant, tunc dolor erit tensius, non grauians, & sonus clarus auditur, non confusus: si à caliditate, præcesserunt calefaciētia, & à frigidis iuuātur: si à frigiditate, grauitas & tumor una sentientur, & audi-

Ff. ij.

tus impediatur, si à soluta cōtinuitate, ex eo cognoscitur, quòd aliquid sanguinis uel puris effluit: si ab inflammatione, tunc dolor erit cōtinuus, grauitas cum tumore & febre continua aderit: quòd si intensiora hæc symptomata fuerint, quàm quòd liceat, cum alienatione & frigidityte extremorum, tunc erit inflammatio in intrinseca auris parte. Cognoscitur apostema esse sanguineū uel biliosum, quum intensius se habeat dolor in bile & sanguine, mitius in pituita & melancholia, &c.

Loci consentientes de signis
dolorum auris.

Paul. lib. 3. cap. 23, Auriū dolor qui à frigidityte fit, ex anni tēpore, ex uictu præcedēte, & ex laborātis tēperie cognoscitur: at qui ex calida intemperie prouenit, ob id cognoscitur, quòd feruoris cuiusdam sine grauitate seu tensione sensus aderit: qui uerò ex glutinosi crassiſque succis fit, ex capitis auditusque grauitate & uictus præcedēis ratione deprehēditur, &c. Auic. quarta terci, cap. de taraxen. Si fuerit apostema calidū in

ipso neruo, significat febres cū quibus est horripilatio, & tremor, & cōcomitatur ipsum permixtio, intellectus alienatio, &c. Si uerò non sit in neruo, tunc aderūt extēsiō, dolor, grauitas, & pulsus: si causa erit uentositas, significāt ipsam sonitus & tinnitus, nec adert grauitas: si ulcus & bothor, significat pruritus cum dolore & sanie: si ab humore frigido leditur, à frigidis, & sit fortior in frigidioribus partibus diei: si est à calido, est à cōtrario, &c. Vide de his Arcul. longè alijs melius rem pertractantem: uide etiam Auic. quarta terti, tract. i. cap. 25. de signis apostematum in radice auris.

De cura doloris aurium.

Omnis curatio per eius causæ ablationē perficitur, & si quid malæ cōplexionis impressum fuerit ac derelictū, cum suis cōtrarijs tam intrinsecis quàm extrinsecis remouebitur: uerū si humorum fluxus ad aurem timeatur, cum reuellentibus & euacuantibus auferendus erit, accidentia remouenda, & uictus ratio instituenda erit, &c.

Dolor uerò ex inflāmatione uel erit cres-

Ff. iij.

454 DE CONSEN. MEDIC.

cus, uel non creticus. Creticus duabus intentionibus curabitur: prima crīsim adiuuando, secunda symptomata remouendo, & uictum ordinando. Crīsis quadrisariam adiuuatur: Primo, multitudinem humorū euacuando, ut uirtus in reliquum potētius exonerata agere conetur. Secūdo, uirtutē roborādo cum his quæ sanguinem & spiritū cumulant, & hoc fiat ante crīsim, ne in crīsi natura impediatur. Tertio, meatus preparādo, & superfluitates auris abstergendo ante crīsim. Quarto, uirtutē stimulādo, si natura ad crīsim tarda uerit, uel si morā natura in crīsi cōtraxerit in expellēdo. Remotio symptomatū fit, quotiens dolor, modū excedēs non frigidus & repellētibus, sed rebus molliētibus & anodinis demulceatur: nā frigidus & repellētibus interdum crīsis impeditur. Dolor ex inflāmatione non creticus septem exigit intentiones quæ sunt euacuatio, reuulsio, percussio per se, & resolutioni mixta, resolutio pura, ablatio symptomatū, & sex rerum non naturalium institutio. Euacuatio fiet per sectionē uenæ, si sanguis peccauerit, uel per cholagoga, si

bilis, ut cum rheubarbaro cassia, manna, electuario de succo rosarum, diapruni solu. cū pilulis aureis, &c. Vel per phlegmagoga, si pituita, uel cū pilulis chochys, turbit, agarico, &c. uel cum pilulis indis, de lapide lazuli, confectione Hamech, si fuerit atra bilis. Reuulsio fiet cucurbitulis, frictionibus, &c. Repercussio in materia calida perficitur cum oleo ros. & quarta parte aceti per decoctionem resoluti, uel in materia frigida cum oleo amygdalarum amararum uel camomillino, &c. Repercussio resolutioni mixta fiet, si subscriptis addatur mucilago, semen citoniorū, semen lini, fœnugraci, &c. Resolutio fiet per resoluentia & mollientia, quale est diachilon minus, uel emplastrum ex farina hordei cocta cum oleo camomillino. Resoluit etiā ac maturat apostemata auris emplastrū ex farina fabarum, cum oleo liliorum alborū, & est expertū. Victus ratio sit tenuis in frigidās in causa calida, uel ecōtrario in frigida. Vinū carnes & oua uitētur, quāquam uinum in causa frigida absente apostemate cōueniat. Aēr sit calidus potius q̄ frigidus,

Ff. iij.

nam frigidū inimicū neruosis partibus est. Symptomata remouētur, si fuerint uigiliae, per ea quæ somnum cōciliant, si syncopis uel surditas, per ea quæ de syncopi ac surditate dicentur, dolor interim cum anodinis uel narcoticis, de quibus plura ex Auicen. & Aer. & iuxta neotericos practicanes habentur.

Loci consentientes de cura doloris aurium.

Quòd omnis cura per eius causæ ablationem fiat, habetur non solum ex Paulo, sed ex Gal. 3. de cōpo. med. per loc. cap. 1. ibi, Dolores à frigiditate oborti, calefaciētibus quàm celerrimè curantur, & dolor ab aqua medicata circa meatum auditorium contēta, oleo assiduè infuso curatur, &c. Paul. lib. 3. cap. 23, Dolor aurium à frigiditate calefacientibus curabitur præsidys, ut oleo rutaceo, laurino: at ex calida conceptum in iēperie contraria discutiunt, ut oui albumen in aurem demissum, lac muliebre, oleum rosaceū, oleum lumbricorum & asellorum, quos Græci ὀνὸς καὶ ἄσπερος uocāt. Quòd si à crassis ac glu-

rinosi succis fiat, uel à flatu exitum non ha-
 bente, cum medicamentis curabitur, quæ ape-
 riunt, incidunt, ut aphronitrum cum aceto &
 melle, uel fel ouillum cum oleo amygdalino,
 &c. Aet. ser. 6. à cap. 73, usque ad caput
 76. inclusiue de his uberrime pertractat, ubi
 habes, quòd omnia amara citra mordacita-
 tem ac molestiam meatus auris purgant &
 extergent, ac crassos humores impactos secant,
 &c. Auic. quarta tertij, cap. 8, Si autem est
 causa, caliditas superflua, oportet ut infrigi-
 des cerebrum cum extinguentibus cognitis, &
 destilles in aurem oleum rosaceum, tepidum,
 aut albumen oui: & si est dolor uehemens,
 permisce cum eo camphoram, &c. lege eum
 fusius, lege insuper Mesu. ibi, summa sexta
 cap. de cur. aurium, Si dolor fiat à com-
 plexione siue materia, solùm alteratio-
 ne indiget, ut si calida, iuuatur ex infusione
 albuminis oui recentis, aut mucillagine psy-
 ly: si fiat à complexione frigida, conferunt
 infusiones calidæ, &c. De dolore ex inflam-
 matione cretico & non cretico loquitur Ni-
 colaus, ibi, Accidunt hæc apostemata ui sym-

promatis stimulata natura, & quandoque accidunt uincente natura, & fit saepe secundum semitam crisis, & maximè in febris & apostematibus cerebri. Vide Razen 3. cōment. autoritate Gal. de hac re loquētem. Vide etiam in hoc Arcul. 9. almans, qui & si quinque modos in adiuuanda crisi declareret, nihilominus ad quatuor reducūtur, ut dictum est. Lege etiam aphor. 20. primi lib. ibi, Quæ iudicantur & iudicata sunt integrè, neque mouere, &c. amplius Galen. in cōment. dicētem, Vbi deficit natura, adiuuandū, ne recidius materia relicta faciat, &c.

De dolore ex inflammatione non cretico uerba faciunt omnes moderni, ex quibus primum elicere poteris omnes à me dictas curandi intentiones, quas etiam breuiter habet Auicen. quarta tertij, cap. 8. ibi, Et si causa fuerit apostema calidum, profundum, quod est timorosum propter propinquitatem sui ad cerebrum, usquequo ad collectionem perueniat & suppurationē, tunc post phlebotomiam & euacuationem oportet ut administres lenitina in primis & infrigidācia,

Et propriè lac mulieris uice postuicem, us-
 que ad diem tertium, Et similiter oleum ro-
 saceum, decoctum cum aceto, deinde mucila-
 ginem fœnugræci semine lini in aqua lactis,
 Et c. Paulus loco citato, Si ex inflamma-
 tione auris laborauerit, statim sanguis mit-
 tendus est, deinde focus ex oleo dulci Et
 calente per specillum in lana inuolutum ad-
 hibeatur, extrinsecus etiam quæ dolorem le-
 niunt, materiâque impactam cōcoquunt su-
 peraccommodare, Et c. Lege Galenum 3. de
 compositione medicamentorū per loca, cap.
 1. ibi, Dolor uerò ab inflammatione ortus,
 Et c. Pro resolutione abscessus, Galenus 12.
 meth. cap. 8. ad dolorem aurium ex humo-
 re frigido uel flatu, medicamento utitur,
 quod ex castoreo Et papaueris succo con-
 ficitur, Et c. Mesu. Expertum est diachylon
 in oleo anethino dissolutum, Et ex eis quæ
 sunt ultimi iuuamenti est atypi cerotum.
 Docet etiam cataplasma confici ad hoc
 idoneum ex farina fabarum, camomilla,
 uiolis, Et c. De uictus ratione Et de sex
 rebus non naturalibus legantur Arcul. Et

Matthæus de Grado fusius. Auic. loc. cit. Et habes dolorem frigidū, poterit uinum purum, forte & dormiat: & cū excitatur, non habet lesionem aliquam, &c. Quod aer frigidus sit neruis inimicus, habes aph. 18. tertiū lib. ibi, Frigidū inimicum ossibus, dēribus, neruis.

De symptomatum ablatione legatur Auic. i. i, Et quandoque necessarium est in curationibus dolorum uehementium in aure administrare narcotica, sicut aliquid ex philonio cū lacte, uel opium & castoreum, & crocum cum lacte mulieris, &c. Aet. ser. 6. ca. 80, Vbi uerò magnus est dolor, necesse est stupefacientibus sensum uti, ita ut ad lac muliebre & oui cādidum modicum opij admisceamus. Admiscendum est & castoreum ad uehementiores dolores pari mensura, ad leuiores dupla proportione, &c.

Obseruatio de diuersione.

Hic ad memoriam reuocandum quod in quarta primi dixerat Auic. Quod si ad diuersum trahere uolueris materiam, primū dolorē mitigabis ac demulcebis, quo sedato, ad curam te conseras, &c.

Observationes de percussione.

Arcul. 9. almans. Antequam fiat percussio, obseruentur hæc: non sit materia cretice expulsa, non sit uenenosa, non sit furiosa, nō plurima, non immediatē à cerebro expulsa, non ualde tenax & crassa, non paulatim cō gesta, nō fluxam ad partem extrinsecā auris.

Observationes de topicis.

Tusignanus septem condiciones obseruandus esse inquit in his quæ in aurem proiciuntur: prima, quod inicitur, nō sit calidum nec frigidum, sed tepidum, & hoc etiā innuit Auenicē. cap. 8. Secūda, quod sit in parua quantitate, & hoc habetur ex Auenzoar primo lib. Theisr. tra. 41. ca. 1. Tertia, quod stet in aure pauco tempore. Quarta, quod antequā aliud proijciatur, primū sit expulsum. Quinta, quod cū aliquid inicitur in aurem, patienti iaceat super latere sano. Sexta, quod locus sit cum auriscalpio mundificatus propter tortuositatem auris. Septima, quod non administrētur percussiva in apostematibus auris, &c. Gal. 5. meth. cap. 10. cōtra Thesali sectatores dixit, aurem esse particulam

siccissimā, idcirco quæ ualentissimè exiccet
opus esse, ut castoreum. Verum hîc in dolore
anodinus, illic in ulcere siccantibus fortius
uti persuadet: uide tu illum fusiùs.

Observationes in narcoticis.

Auic. quarta tertij, ca. 8, Oportet ut post-
ponantur narcotica, usque quo timeatur syn-
copus, & propriè cùm fuerint humores frigi-
di: nocent enim eis ualde, & post eorum usum
administra castoreum.

Auditui nocentia.

Fumus argenti uiui, semen arundinis, la-
nugo & flos Typhæ, folia castaneæ, puluis
platani, & puluis inuentus super eius folijs.

Dolorem ac pulsationem au- rium curantia.

Dolorem ac pulsationem aurium iuuat ua-
por decoctionis absinthij, aqua decoctionis
acerosæ, succus acori cum rosa, oleum in ra-
dice aphodilli coctum, allium cum adipe an-
seris, succus cucumeris asinini, succus cucur-
bitæ cū oleo rosaceo, in calido dolore, crocus
cum oleo rosaceo, succus dracunculi, hederæ,

cānabis, gallia cū oleo de been uel de cheiri,
galbanum cum oleo liliorū, grana granatorū
cum melle, succus hyosciami, lactucae asini,
laudanū cum oleo ros. succus maioranae, mel
liloti, mentae, paritoriae, peucedani, polygoni,
foliorum populi, porri, plantaginis, praeſij, ro
sarum, rubi, rutae, salicis, serpentariae, solatri,
adeps anseris, leonis, uulpis, fel arietis, apri, bu
bali, tauri, suis, oleum liliorum, amygdalarū
amararum, scorpionum, de uitellis ouorum, de
semine cannabīs, oleum benedictum Nic. de
cherua, sisaminum, de nucleis persicorum, lau
rinū, de semine raphani, de anetho, de chry
somyliis, de been, yrinū, nardinum, urina apri,
bubali, tauri, caprae, oleum de cinnamomo, pe
trolem in frigido & antiquo, pilulae sine
quibus, hieralogodion, esdra, cōfectio Nicol.
opium cum myrrha, croco, & oleo ros.

De prognosticis dolorum aurium.

Hippocr. prognost. 3. text. 15, Aurium do
lor acutus cum febre continua ac uehementi
difficilis est, periculum enim delirij abolitio
nisque imminet. Quia igitur fallax hic locus

464 DE CONSEN. MEDIC.

est, citò etiam aduertere omnia alia indicia à primo die necesse est, &c. Auic. quarta tertij, cap. 6, Et peruersior dolor auris est ille, qui est ex apostemate calido, profundo, & propriè cum perducit ad commixtionem intellectus: ubi uerò dolor est in cartilaginibus extrinsecis, non est illic uehemens dolor, nec uehemens timor, sed primus interdum subito interficit, ueluti apoplexia: interficit tamen magis adolescentes quàm senes, sed ratio est, quia in senibus ignauior sensus, nec humores sunt ad alienationem prompti, sicuti in iuuenibus.

Authores dissentientes circa dolores aurium.

- 1 Adserere, in omni dolore auris esse in primis reperiendum.
- 2 Adserere, dolorem auris non esse periculosum.
- 3 Adserere, in dolore auris non esse secundam uenam.

Confutatio dissentientium circa dolores aurium.

Ad primum: Auic. quarta tertij, cap. 25,

Si apostema fiat per uiam crisis, oportet ut non intendas ad curam quatenus exigitur, ad curam apostematum, adhibendo styptica & apocrustica, id est, repercussiva in principio. Item repercussio fit ad membrum principale, igitur in omni dolore non est perpetranda.

Ad secundum: Gal. 3. prognost. comm. 15, Quod si dolor fuerit in cartilaginibus, aut in summa auris parte, non est periculum mortis. At si in profundo ex auditorio meatu doloris sensus affligat, ut etiam nervus auditorius afficiatur, periculum imminet, ne in consensum perducto cerebro, mors repente sequatur.

Ad tertium respondent Auicen. & Mes. quod in omni dolore à sanguine fieri debeat sectio uenæ. In alijs doloribus reuulsuam imperant neoterici.

Descriptio vlceris aurium.

Vlcus, Græcis ἔλκος dictum, nihil aliud est quàm continuitatis solutio cum sanie,
Gg. i.

quod interdū extrinsece, interdum intrinsece accidit. Si intrinsece, uel erit in meatu, uel in neruo auditorio, aut circa os, petrosū uocatum. Præterea uel erit ulcus mundum, sortidum, uirulentum uel corrodens cum dolore, cum mala intemperie & cum inflammatione uel alio tumore, &c.

Locī consentientes de descriptione ulceris aurium.

Gal. 2. meth. cap. 1, Vnitatis nanque solutio in osse fractura dicitur, in carnosa parte ulcus. Auic. quarta tertij, cap. 12, Amplius nō possunt esse ulcera, quin sint apparentia sensui, aut sint profunda, & non profunda propinqui temporis uel chronica, &c. Lege Arcul. & plures ulcerum differentias intelliges. Gal. 3. meth. cap. 4. memorat ulcus cauum & aquabile, recens & inueteratum, sordidū, purum, liberum phlegmone, & phlegmone impeditum. Similiter de intemperie intelligendum. Lege de hac re Placentinum. De ueris ulcerum differentiis lege Gal. 2. meth. cap. 1.

De causis ulcerum auris.

Causæ ulcerum sunt uel humores corrode-

res, uel aliquis abscessus, uel casus, percussio,
 & res quæ putrefacere uel corrodere possunt.

Loci consentientes de causis
 vlcerum auris.

Arcul. 9. almans. Causæ ulcerum sunt apo-
 stemata uel bothor cùm rumpuntur, nec non
 humores acuti, item cerumen aurium & uer-
 mes, aut res ibidem nata corroderes ac pu-
 trefaciētes, similiter casus & percussio. Gal.
 4. met. cap. 1. Est enim horum duplex ortus,
 aliis ab excisione, sæpe ab erosione. Quo pa-
 cto fiat excisio, patet: erosio uerò si intrinse-
 cus ab ipso animali prouenit, uitiosi succi so-
 boles est: si extrinsecus, aut à ualētibus me-
 dicamentis, aut ab igne.

De signis vlcerum auris.

Signa ulcerum auris manifesta sunt, si pus
 ex aure defluat, nulla in cerebro præterita læ-
 sione. Si fiat ab apostemate, statim ex uomi-
 ca multa puris copia exiet, deinde paulatim
 & in pauca quantitate. E contra uerò, si ab
 humoribus corrodentibus paulatim in primis
 egredietur, deinde magis abundabit. Si-
 gna ulcerum mundorum ab optima & con-
 Gg. 4.

cocta sanie cognoscuntur. Sordidorū ex crassitie ac multitudine exeuntis saniei. Virulenta ulcera ex furore & putrida sanie subtili exeunte nobis innotescunt. Corrodentia si post sanie sanguis effluxerit. Fistulosa, si longo tempore contracta, si virulenta sanie, si ex callosa ac indurata carne consistant, &c.

Loci consentientes de signis ulcerum auris.

Razes 9. almans. hoc tantum signum posuit, scilicet quum pus ab aure egreditur. De his signis fusius pertractat Arcul. & Auic. Similiter ceteri practificantes.

De cura ulcerum aurium.

In omni ulcerum cura quinque opus sunt medicamina, abstergentia scilicet, corrodentia, carnem generantia, consolidantia, ac ad cicatricem inducentia. Abstergentia idcirco opus sunt, ut sanies crassa glutinosaque membro adherens amoveatur, qualia sunt tenuia ac calida circa secundum gradum, sicut mel, &c. Corrodentia, ut supercrescentia carnis

minuantur, & sunt calida & sicca in quarto, ut flos æris, alumen, &c. Carnem generantia, ut sanguis ulceri superueniens in carnem transmutetur: quod fieri nequit, nisi complexio temperetur, & sanguis coaguletur, & sunt sicca in primo, & temperata in actiuo, stypticitatis & abstersionis pauca, ut thus. Nec opus esset medicamenti in gignenda carne, quum ad naturam tantum pertineat, ni in generatione carnis excrementum tenuius ac crassius interdum efficeretur, ad quod id tandem opus est, quod redundantiam absumat, & sanguinem coagulet, quale est medicamen siccans & abstergens. Consolidantia, ut humilitas inter utrasque ulceris superficies propinquas contenta ita conglutinetur, ut altera superficierum ulceris alteri adhaereat, & sunt sicca in secundo, cum proportionem actiuorum ad membrum ut aloes, sanguis draconis, &c. Cicatricem inducentia sunt, quæ absque mordacitate tantum superficiem exiccant, ut cortex pini, &c. Sed de his uberius dicemus in libro de chirurgia. Cura simplicis ulceris in corpore

Gg. iiij.

purgato indiget tantum abstersione & consolidatione. Si uero ulcus fuerit compositum, puta cum inflammatione, uel mala temperie, aut dolore uehementi, tunc primum erit inflammationi ac reliquis uacandum, non neglecto interim ipso ulcere, &c. Cura ulcerum auris malignorum praesertim corrodentium quinque medijs perficitur, praecedat tamen euacuatio ac reuulsio ad haec quae dicenda sunt. Primò, si quid est putridum, uel corrosus, uel induratum, auferatur. Secundò, quod remanet, optimè mundificetur. Tertiò, substantia iam deperdita regeneretur. Quartò, regenerata substantia ad cicatricem inducatur. Quintò, accidentia corrigantur, & ratio uictus instituatur, &c. Primò putridū auferemus cum unguento Aegyptiaco, cum modico aceti uel uini dissoluto, uel si pars ueluti sensus expers sit, accipiantur uiridis aeris, saluminis, & mellis partes aequales, & cum modico aceti fiat collyrium. Secundò, mundificatio fiet cum hydromelle uel rhodomelle, aut anomelle, aut oxymelle simplici uel scillitico, si materia

egrediens fuerit ualde tenax. Tertiò, substantia regeneratur cum his quæ mediocrem cum pauca mordacitate exiccationem, qualis est aloes, myrrha, sarcocolla, sandaraca cum melle & uino dissoluta. Quartò, ad cicatricem perducunt, olibanum, si esmemite, sarcocolla, etc. Quintò, accidentia corriguntur, ut si sit dolor, cum prædictis in capite præcedenti, si surditas, cum his quæ de surditate dicuntur. Tiborum quantitas sit modica in principio, donec ad substantiam regenerandam deuenimus, tunc sit locupletior, sed boni succi & facilis concoctionis, etc.

**Loci consentientes de cura
ulcerum aurium.**

Galen. 3. meth. cap. 8, Fieri non potest, ut in ulcere, uel carnis productio, uel sinus impletio, uel agglutinatio, uel cicatricis inductio rectè unquã cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat: uerùm purgari sordida, minui que supercrescentia etiã carne statum non seruante possunt, etc. Ex quibus uer
Gg. iiij.

bis quinque dicta à me medicamenta ad ul-
 cus sanandum opus esse cognosces. De abster-
 gentibus quæ Græcis *πυλινὰ* appellantur,
 loquitur Galen. 5. de fac. simpl. cap. 2. ubi in-
 quit, Omnia nitrosa & amara ad expurgan-
 dos meatus intro ualere, at cutis & ulcerū sor-
 des nō hæc tantū, sed & uiribus minora au-
 ferre possunt, qualia sunt dulcia, quæ tenuium
 sunt partium, ut mel, & ex cerealibus eruum,
 faba, lupini, hordeum, &c. Et cap. 14. de cau-
 sticis seu urentibus loquens, uehementer esse
 calida & carnis colliquantia, ut arsenicum,
 auri pigmentum, sandaraca, & crysocolla,
 &c. Et cap. 15. eiusdē lib. loquens de his quæ
 nim *ἐπουλωπικὴν* habent, id est, cicatricē in-
 ducendi, esse desiccantia absque mordacita-
 te dixit, &c. De generantibus carnem lege
 Galen. 3. meth. cap. 3. ubi ad unguem, quæ à
 me dicta sunt recitātur, & plura ad hoc mu-
 nus idonea etiam enumerātur. De glutinato-
 rijs etiam uerba facit cap. 5. eiusdem, & quo
 pacto ab ijs, quæ cicatricem inducunt, disse-
 rant, aperte declarat: uide illum fusius. De cu-
 ra simplicis ulceris lege Galen. 3. meth. cap.

4. De ulcere composito lege etiam similiter Gal. 4. meth. cap. 5. ibi, Verum ulceris quod cum alio affectu coniunctum est, &c. lege tu hunc locum uberius, & inuenies quod sanari non possit ulcus, nisi locus in quo consistit, prius sit sanatus, &c.

Breuis Galeni vlcerum curatio quæ 5. meth. cap. 1. continetur.

Omne ulcus siccantia medicamina requirit, ulcus sinum habens, nō solum modicè siccantia, sed abstersoria expostulat: quod uerò coniungi labra perit, ueluti cruentum, magis siccantia, tum quæ sine abstersione leuiter adstringunt, desiderat: quod uerò ad cicatricem perducī debet, non solum magis adhuc siccantibus, sed strenuè adstringentibus remedijs indiget. At si caro præter naturæ modum intumuerit, acria & demolictia quæ calida & sicca sunt, adhibeantur: si uerò ulceri aliquod symptoma adiunctum sit, primò id remoueatur, deinde ulcus sanetur: si sordes innascantur, tollendæ sunt ijs, quæ maiorem adstringendi uim habeant, quàm quæ carne

implent: si copiosa humiditas adsit, siccantibus medicamentis, quæ propriam speciem non egrediantur, curandum. Agglutinatoria, sine igitur medicamenta siccantia & adstringentia, carnem generantia, siccantia & abstergentia, & sic de reliquis. Si uero subiecta caro intemperata sit, primum eius intemperantia succurrendum, utique quæ siccior iusto est, humectantibus: quæ humidior, siccantibus: quæ calidior, refrigerantibus: quæ frigidior, calefacientibus: quæ geminata qualitate intemperata per geminam qualitatem contrariam curetur. Considera insuper intemperantia causas, num à toto uel à parte per consensum membrum ulceratum infestent. Primum enim causæ, quæ adhuc intemperantiam fouet medendum, post hanc ipsi quæ facta est intemperantia. Sumitur etiam indicatio à particula læsa, quæ si siccior fuerit, ea magis siccari expostulat: quæ minus talis est, ea minus siccanda. Simile etiam erit de calefaciendo refrigerandoque præceptum. Sumitur etiam à præcellentia membri aut à contrario statu. Itemque ex sensu acri

hebetēue , quum hæc diuersum medendi modum petant, & reliqua.

De mundificantibus ac abstergentibus vlcera aurium.

Mundificant ac abstergunt vlcera aurium succus absinthij cum melle aphodilli , etiam cum melle & thure, succus omphacij cum melle, arugo ferri cum aceto decocta, fel tauri cum lacte caprae , licium antiquis ulceribus, mel cum sale gmeo tepidum, myrthi decoctum, myrrha cum memite, castoreo & opio , succus foliorum nucum, & succus oliuæ agrestis, uirga pastoris, urina pueri cum cortice granatorum , oleum amygdalarum amararum, rhodomel cum matrisylua & betonica, oleum myrthinum, terebinthina, &c.

De sonitu aurium.

Sonitus aurium nil aliud est , si describatur, quàm auditus corruptio , in qua uidetur homini audire id quod certè non audit , hos Græci uocant ἤχος ἐν οὐροῖς.

Loci consentientes de sonitu aurium.

Auicē. quarta terij, tract. 1, Hęc dispositio est uox, quam homo incessanter audit exterius. Et eius comparatio ad auditum, est imaginationum & tenebrarum, quas uidet homo, comparatio, &c. B. Id est, uocem quandā homo audit, ac si exterius audiret: & talem habet comparationem sonitus ad aures, qualē imaginatio ad oculos, &c. Vide etiā hanc eandem sententiam in Auic. cap. de nocumentis auditus.

De causis sonitus ac tinnitus aurium.

Omnis causa sonitus & tinnitus uel est occulta uel manifesta. Occulta aut fiet à sensus audiendi imbecillitate, aut ab eius subtilitate: imbecillitas fiet à mala quapiam complexione. Manifesta nouem modis fiet. Primò ex aëre extrinseco intrinsecum mouente. Secundò, ex sanie sonitum in aure efficiente. Tertio, ex motu ebullitione humorum excitato, ut in febribus. Quarto, repletionē superflua. Quinto, humorum agitatione & uapo-

re. Sextò, casu uel percussione. Septimò, ex humorum magna inundatione. Octauò, ex fame humores commouente & aerem. Nonò, ex medicinis soluentibus quæ mouent & non educunt, &c.

Loci consentientes de causis sonitus ac tinnitus aurium.

Galen. 3. de compos. medic. per loc. cap. 1, Sonitus quidam ex flatuoso spiritu generantur, quidam ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem, quorum neutrius affectionis certa cognitio in principio haberi potest.

Auic. quarta tertij, cap. 9, Et inundatio aeris quæ est causa uocis, aut est occulta, aut est maior illa. Occulta, quum interdum sonitus auditur, interdum uerò minimè, & tunc, id est, aut propter acuitatem sensus, aut propter debilitatem, &c. lege usque ad illum locum inclusiue. Et quandoque accidit sonitus post medicinas, quarum proprietas est ut retineant humores & uentositates in partibus cerebri, &c.

De signis sonitus ac tinnitus
aurium.

Dabis operam ut in primis cognoscas qui fiant per se & qui per consensum. Per se enim fiunt quicunque sunt continui & assidui: per consensum uerò, qui sunt intermittentes, qui dispositione crescente augentur & desinente minuuntur. Signa ab acuitate sensus sunt, quia à mediocribus sonis laeditur, nec excellentes tolerare potest, nullusque adest flatuosus spiritus, nec uapor crassus, nec repletio. Signa ab humore cum flatu, grauitas in aure percipitur, imbecillisque adest auditus: si uerò ex flatu tantum, sonitus est clarior, nec ulla adest in aure grauitas: si ab humoribus crassis fiant, paulatim crescunt: si à siccitate, fiunt post euacuationes & febres. Signa apostematis suppurati sunt, quia dolor præcessit, sonitusque confusus & sanies apparet. Signa debilitatis sunt superfluitates, si à complexione calida fit statim cum inflatione: si à frigida, econuerso. Cognoscuntur etiam ex prægressa diæta, à uomitu & à progressu pharmaco, &c.

Loci cōsentientes de signis sonitus
& tinnitus aurium.

Auicen. quarta tertij, cap. 10, In illo qui est continuus & assiduus, causa est aliquid stans in ipso cerebro: si autem quiescit, deinde excitatur post euacuationem aut uacuitatem, aut quum calor fit uel frigus, fit fortis, tunc est per communitatem. Illum qui est per acuitatem sensus significat defectus causarum uentositatis & repletionis, & mundificationis auditus, & excitatio eius apud ieiunium & uacuitatem. Paul. lib. 3. cap. 23, Sonitus qui fiunt à crassis glutinosisque humoribus cognoscuntur, quòd non uniuersim, sed paulatim increscunt ac nascuntur. Gale. 3. de comp. med. per loc. ca. 1, In cognitionem peruenimus non tantum ex procatarecticis causis, sed ex temperie, ex diata praegressa, ut à longo uini potu, à uiolento & multo uomitu, aut à praegressa plaga, aut ex auricularium pharmacorum usu, & similibus. Quinetiam si sonitus aut per interualla redit, aut perpetuo permanet, aut ex eo quod paulatim,

480 DE CONSEN. MEDIC.

aut aceruatim fit sonitus . uerum exacta & certa cognitio habetur , ut si quis ex flatuoso spiritu exitum non habere, sonitum fieri putet, & siccantia uel attenuantia adhibuerit, ad motisque apophlegmatismis nihil profecerit, tunc certo cognosces ex auditus subtilitate sonitum fieri, praesertim si acuto audiendi sensu egre praeditus appareat. Auicen. loc. cita. Factus à siccitate est post euacuationes & febres, & factum à debilitate scies per superfluitates : & quandoque est à complexione calida, fit subito & cum inflatione, & frigida est e contrario, &c. Vide de his latius Ar. enl. & reliquos practi- cantes, & inuenies quaecunque à me dicta sunt.

De cura sonitus & tinnitus aurium.

Quum curatio fiat per causae efficientis morbum ablationem, tunc si à percussione, uento, ebrietate, & à ceteris procatarteticis causis fiat . Causa primitiua per sua contraria remoueantur, & roboretur auris & cerebrum. Si morbus hic generetur ex quadam crisi uel

febre, primū discutienda erit febris, & cri-
 sis non prohibeatur, præsertim si ex se natu-
 ra præualeat: si minus, iuuetur: si uerò ab a-
 liquo particulari membro per consensum ori-
 retur, primū id quod transmittit membrum
 euacuabitur, & ad aliam regionem materia
 diuertetur, & eius membri lapsa tēperies per
 contraria permutabitur: deinde mēbrum reci-
 piens roborabitur, ut puta cerebrum cum oleo
 myrtheo, & auris cū oleo amygdalino ama-
 ro, &c. In cura uerò per se ex repletionē ca-
 pitis ab humoribus crassis quatuor curandi
 erunt intēiones, scilicet euacuatio, reuulsio ac
 deriuatio, humorū præparatio, ac eorū extir-
 patio, cerebri & auris roboratio, & regiminis
 institutio. Euacuatio fiet per ea quæ humorē
 superfluum euacuant, qualis est hiera colo-
 cynthidos, pilulæ fœtidæ chochiæ, &c. Re-
 uulsio similiter fiet cum clysterijs, frictioni-
 bus, & hæmorrhoidarum ac menstruum e-
 uocatione. Deriuatio post omnimodam e-
 uacuationem cum caputpurgijs, masticato-
 rijs, gargarismatibus, &c. Præparatio hu-
 morū præsertim pituitosorum fiet cum Syr-
 Hb.i.

po de stechade, de calamento, oxymelle simp.
 & cōposito, & cum reliquis quæ suprà me-
 morata sunt, & cum decoctis saluie rosmari-
 ni, uiolarum, betonica, maiorana, ruta, origa-
 ni, &c. Humorum extirpatio perficitur cum
 pharmacis in euacuatione nuper relatis, &c.

Roboratio cerebri & auris fiet remouen-
 do eorum discrasiam, cum sacculis ex milio,
 sale, & fursure, asperso potenti uino, torre-
 factis, aut cum fomentis ex camomilla, me-
 liloto, calamento, origano, stechade, absin-
 thio, aut cum pulueribus capiti adhibitis, ut
 puta cum speciebus pleris arcoticon Nic. &
 diamusci dul. aut cum his quæ in aurē infun-
 duntur, quale est oleum amygdalarum ama-
 rarum cum musco & nuce moscata, aut oleū
 de uitellis ouorū, aut castoreum in oleo rosa-
 ceo dissolutū. Victus ratio sit calida & sic-
 ca, pluuia, uenti, ebrietates & satietas nau-
 seatiua & uomitus uitanda sunt. Item mora
 sub radijs lunæ & solis, &c.

**Loci consentientes de cura soni-
 tus & tinnitus aurium.**

Auicē. quarta tertij, cap. 2, Sonitus creti-

cus non oportet ut moveatur, quoniam remouetur cum remotione febris. In eo uerò qui fit ob cōmunitatem, oportet ut intentio sit membri facientis ipsum, & propriè stomachi, quare mundificetur & intendatur cerebro, & confortentur auris & cerebrum cum oleo myrthino, auris uerò cum oleo amygdalino, &c. Itidem ait Mesu. cap. de sonitu. Paul. lib. 3. cap. $\omega\epsilon\lambda\iota\eta\chi\omega\nu$, Si in febris aut harum crisis sonitus aurium euenerint, nullum eis negotium facessere oportet, quippe magna ex parte statim finiuntur: si autem post morbum perseuerauerint, absinthij decocto foveri aures debent, & acetum rosaceum infundi, &c. De cura per se ex repletionem, quod tot sint intentiones, quot diximus, lege Arcul. & alios hac de re loquentes. Auicen. loca cita. Et similiter factum à repletionem, oportet ut mundificetur corpus & caput cum eo quod scis, & subtilietur regimen, &c. Mesu. cap. de sonitu, Quando fit per abundantiam & repletionem in capite, cura eius est solutio & euacuatio cum hiera diacoloquinthidos, & chochyis, & similibus, cū reiteratione & rei-

Hh. ij.

iteratione, &c. B. Intelligitur de materia minoratione ac eradicatione per hoc uerbum reiteratione duplicatum. De preparatione humorum & aliis intentionibus loquitur ibi Aet. ser. 6, Si adhuc remanet ampliori tempore, omnibus amaris & acerbis & attenuatoriis ac discussoriis utere, quæ paulò antea descripta sunt, &c. lege eum fusius. lege insuper Arcul. Sauo. & Gord. & Mesibi, Quando fit à uentositate grossa, conferunt caputpurgia, sternutationes post modificationem, &c. intelligens de deriuatione & de aliis, prout in ipso reperies, &c.

Observationes in cura.

Anic. quarta tertij, ca. 11, Oportet ut omnes isti uitent balneum, solem, & uomitum & clamorem & repletionem, & ut leniant naturas, id est, uentres.

Curantia sonitum & tinnitum aurium.

Curant sonitum & tinnitum aurium, uapor aceti, absinthium cum felle bouino, sel capræ cū succo porri tepido, colocynthis de-

coctum in aceto, succus foliorum ebuli, fel
tauri cum succo porri, acetum decoctionis
hellebore, decoctio caricarum cum sinapi,
succus rutæ in cortice granati tepesactus, va-
por decoctionis hyssopi cum ficibus, oleum de
been, cum adipe anatis, oleum liliorum albo-
rum, oleum violaceum, amygdalarum amara-
rum, decoctum lauri cum uino antiquo & o-
leo rosaceo, &c.

De prognosticis sonitus.

Galen. 3. de compos. med. per loc. cap. 1, Si
in febribus sonitus fiant, minimè curandi
sunt, ut plurimum enim statim sedatur. Hipp.
aphoris. 4. aphoris. 60, Quibus in febribus
aures obsurduerunt, sanguis ex naribus flu-
ens, aut aluus turbata soluit morbum. B. In-
tellige de fluxu cretico, qui facile adueniens
sonitum soluit. Hercul. Antiqui sonitus diffi-
culter sanantur: qui uerò ex natiuitate con-
trahuntur, nequaquam sanari possunt, &c.

De graui auditu & surditate.

Differunt inter se grauis auditus & sur-
Hb. iij.

486 DE CONSEN. MEDIC.

ditas, quum hic *ταῖν* diminutum, auditum, illa uerò omnimodā auditus ablationē significet. Hunc Græci *κώφωσις*, illam uerò *δυσκοίαν* appellant.

Loci consentientes de graui auditu & surditate.

Auicē. quarta tertij, cap. 2, Omne auditus nocumentum, uel est ut destruaturs eius operatio, aut auditus minuaturs, ita ut quis audiat quod non audit, &c. Lege Arcul. 9. almans.

De causis surditatis.

Omnis causa uel essentialis est, uel per compatiendi rationem. Si essentialis, aut auris pars aliqua lesa est, aut cerebrum. Si pars uel similis est, uel instrumentalis. Si similis, tunc uel ab intemperie, uel à soluta continuitate afficietur. Si instrumentalis, tunc ab obstructione aliqua, aut à tumore aliquo præter naturam innato, aut ab aliquo aduentitio, ut puta callo, carne, tuberculo, aut à sorde in auribus genita, aut ab humoribus crassis, uel à flatuoso spiritu occupare ob-

oriatur. Si causa sit per cōpatiendi rationē,
tūc uel à toto, sicuti in febribus, ex quibus ua-
pores ad aures deferuntur: uel à crisi iam fa-
cta, uel à membro particulari propinquo &
remoto, sicut à cerebro & à stomacho. Item
fiunt surditates ex paucitate & crassitie spi-
rituum, uel à consumptione corporis, &c.

Loci de causis surditatis & gra- uis auditus.

Galen. 4. de sympt. caus. cap. 3, Grauis au-
ditus & surditas animanti euenire solent,
aut ob auris partem aliquam, aut ob neruum
à cerebro descendentem, aut ob cerebrum
ipsum, si eadem in parte, unde neruus oritur,
lesum fuerit. Proinde harum partium morbi
ab illis huc transferendi sunt, ut ij, qui ad si-
milares pertinent, ex intemperie & conti-
nui solutione aestimentur: qui uerò ad instru-
menta ex obstructionibus, siue ipsarum par-
tium tumor aliquis præter naturam meatum
obstruxerit, utputa abscessus, phlegmone,
œdema & scirrhus, siue aduentitius, isque o-
mnino præter naturam tumor in meatu

Hh. iij.

ipso oriatur, ut quum callosum uel carnosum
innascitur tuberculum. Atque huc pertinent
sordes, quæ creberrimè in auribus gigni con-
sueuerunt. Auicen. quarta tertij, cap. 2, Nocu-
menta auditus aut sunt complexionalia, aut
instrumentalia, aut resolutiua. Singularita-
tis nocumentum in neruo auditus interdum
accidit per omnes causas ægritudinum simi-
lium partium & instrumentalium & solu-
tionis continuitatis. A Egritudines consimi-
lium partium in ipso sunt, unaquæque specie-
rum malæ complexionis singularis & compo-
sitæ. Et quandoque fit unaquæque earum
absque materia, & quandoque cum materia
melancholica, cholericæ, phlegmaticæ, ex phle-
gmate crudo & uentoso. Instrumentales sunt
sicut oppilatio, quam facit humor, aut sa-
nies, aut apostema, &c. Lege eum fusius. Her-
cul. 9. almans. Defectus etiam spirituum se-
minis quum sunt crassi, est causa grauedinis
auditus, & similiter paucitas spirituum, &
corporis exiccatio & consumptio. Vide de
his Mesu. cap. de surditate. Item Gord. &
Sauona.

De signis surditatis & grauis
auditus.

Et si per se surditas manifesta sit, nec alijs indigeat indicijs, nihilominus an per essentiam uel per consensum fiat, nisi indicia cognoueris, non facile rem percipies. Cognoscuntur igitur quæ sunt per essentiam absente totius uel partis mala dispositione: e contra uerò si per consensum, ex totius & partis prægressa ægritudine, qua aucta surditas augebatur, & remota remouebatur. Cognoscitur etiam obstructio tantum ex intuitu sub radijs solaribus. Cognoscitur fieri ex materia frigida, crassa, ex grauitate & loci frigiditate, ex commotione cum sonitu: & quia læsio cū frigidis augetur, cognosces causam esse in neruo auditorio ex dolore. Cognoscitur ex crisi, fieri per præcedentem morbum ad aures terminantem, & eo quòd crisi finita remouetur auditio grauis, &c. Reliqua signa ex relatione infirmi manifesta erunt. Cognoscitur à flatu fieri ex sonitu & tinnitu.

Loci consentientes de signis
surditatis.

*Auicē. quarta tertij, ca. 4, Factum à com-
munitate cerebri significat dispositio in re-
liquis sensibus, sicuti in uirtute matrice: præ-
terea præcesserunt nocumenta cerebri, sicut
sirsē & intellectus cōmixtio, & reliqua quæ
dicta sunt in cap. de ægritudinibus cerebri,
similiter de reliquis plura habet Auicē. quem
fusiùs legere poteris. Lege insuper Arcul. nam
si omnes ad unguē recitare uoluerimus, præ-
terquàm deceat, in mora essemus.*

De cura surditatis & grauis
auditus.

*Si à nuda intemperie surditas prouenerit,
per alterationem in contrarium sanabitur,
aurisque roboratione ac regimine contrario
discrasie indigebit, facta tamen aliquali re-
uulsione, si humorum fluxus timeatur. At si
fuerit frigida intemperies, calidis remedijs cu-
rabitur, utpote cum oleo laurino, costino, a-
mygdalino amaro in aurem infuso. Robora-
bitur auris, si his aliquo modo styptica adhi-
beantur. Similiter calida intemperies cum oleo*

rosaceo, cum aliquantulo aceti bullito cura-
 bitur. Si uerò ab intēperie cum materia mor-
 bus fiat, cogitandum est in primis de quali-
 tate humoris, deinde an principaliter in au-
 re contineatur, an aliunde transmittatur. Et
 tunc in curatione scopi erunt quinque, eua-
 cuare scilicet, reuellere, membrum mandans
 corrigere, deinde causam coniunctam edu-
 cere & resoluerē, denique discrasiam alte-
 rare, & regimen in contrarium instituere.
 Calida igitur intemperies cum materia eua-
 cuabitur per χολάγωγα pharmaca, sicut
 cum decoctione fructuum, rheubarbaro, pilu-
 lis aureis, &c. Frigida materia per sectio-
 nem uenæ uel cum chochys & agarico. Re-
 uellitur etiam materia, ac deriuatur per ma-
 sticatoria, per errhina, caputpurgia, & per
 ea quæ pluries à me dicta sunt, imò etiam per
 cauteria cōmissuræ coronali applicita. Cor-
 rigitur membrum mandans euacuando, corro-
 borando, & eius intemperiem alterando.
 Causa coniuncta resoluitur in causa frigi-
 da per exercitiū, clamores, & uociferationes
 in aure, uel per ea quæ in aures inijciuntur,

492. DE CONSEN. MEDIC.

uel extrinsecè applicantur, ueluti sunt suffumigia, emplastra, &c. uel lotiones cum aqua thermarum. Regimen in contrarium ordinetur, &c.

Loci consentientes de cura surditatis.

De cura surditatis sine materia loquitur Auicenna. quarta tertij, tra. i. cap. 5. ibi, Quod si illic est caliditas tantum, tunc cum infrigidantibus curetur ex oleis & alijs, aut succo granati, ita ut bulliat in cortice suo cum aliquantulo aceri, thuris, & olei rosacei, & destilletur in ipsam aqua lactucæ aut salatri. Illi uerò quod factum est à frigore conferunt omnia olea calida, in quibus sit dissolutum castoreum, &c. De cura intemperiei cum materia, Alexander libro primo, cap. 32. inquit, Quando biliosi humores ad caput delati surditatem inducunt, non difficulter succurritur, modò uenter per $\chi\omicron\lambda\acute{\alpha}\gamma\omega\gamma\alpha$ sedulo euacuetur. At si malum ex crassis & crudis humoribus oriatur, principio statim medicamento purgante euacuandum, ut puta cum oxymelle Iuliano, uel hiera, uel eo quod cō-

stat ex euphorbio. B. De hac cōpositione que paratur ex euphorbio, meminit Mesues cap. de sarditate, & modum parandi docet: sed in pondere ipse decipitur, quum loco scrupulorum quatuor usque ad sex, ipse à quatuor dragmis usque ad septem in ovo sorbili exhiberi iubet, quam quantitatem uix oui cortex absque uitello & albumine caperet. Auic. loc. cit. In eo quod est cholericum oportet ut euacuetur cholera cum solutiuo uentris: nam ut plurimum cum solutione uētris surditas remouetur, si uera materia frigida, &c.

Paul. lib. 3. cap. αὐτὸ δὲ συνηκόας καὶ κωφόσεως, At ex crudis crassisque humoribus prognatas surditates, uel grauem auditum uenæ incisione curato, aut omnino purgatione ex hiera.

De reuulsione habes Alex. locum in primo lib. cap. 32. ibi, Purgatione uerò egregiè facta, utendum est apophlegmatismis, quibus per os capitis pituita purgatur & ἐπὶ πρὸ τοῦ στόματος καὶ πρὸ τοῦ ὤτου, &c. Vide de his latius Mesuen. & Arcul. De resolutione loquitur Auicen. loco supracitato ibi, Et ex-

exercitium est uehementis iuuaminis, & similiter uociferatio uehemens in aure, & clamores buccinarū: & quādoque ponitur in aure caput embubæ, ut ad ipsam peruenire faciat uaporem decoctionū resoluētium, & confert succus rutæ cum melle & castoreo, &c. Obseruentur quæcunque dicta sunt in capite de dolore auris.

Conferentia & acuentia auditum.

Confert & acuit auditum uapor, siue fumus aceti, succus aristologia cum melle, succus foliorum capparorum, uel oleum decoctionis eius radice, castoreum, cucumeris asini succus, acetum decoctionis hellebori nigri, flos acris qui ex eo albus est, tritus & insufflatus, delet antiquam surditatem. Auic. oleum decoctionis seminis laureolæ, mercurialis cum uino instillata serpentaria, suffumigium sulphuris, radix brionia & uitis albæ, oleum laterinum, albuchaßis, oleum cucumeris syluestris, amygdalarum amararum de been, oleum laurinum, sotira Nicolai iniecta auditum reddit, theriaca magna, pi-

lulæ aggregatiuæ, hieralogodion, & fel, & urina capræ cum galbano.

De prognosticis surditatis.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 28, Quibus biliosa deiectiones superueniente surditate cessant, & quibus surditas superuenientibus deiectionibus cessat. B. Intellige cessare surditatem ex deiectionibus, præsertim si à febribus uel bile ad cerebrum mota ipsa fieret: nam in cæteris casibus locum non haberet Aphorism.

Paul. lib. 3. cap. cit. Quæ ab origine, uel à prima natali die, sed longissima & absoluta surditates constituuntur, nullo remedio eliduntur. Quæ uerò non absoluta, sed diuturnæ sunt, ipsæ etiam nullam curam recipiunt, aut certè difficillimam, &c. id est, quæ ab origine fiunt surditates, arte curari non possunt: siquidem neruus auditorius meatum fortè non habet, unde species soni hauriat. uel si habet, locum fortè non occupat, quem iure possidere deberet: aut uehemens adeò inest obstructio ex carne oborta, ut minimè curationem admittat. Vide de his Mesuen.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 60, Quibus in febris aures obsurduerunt, sanguis ex naribus fluens aut aluus turbata soluit.

De Parotidibus.

Parotides sunt abscessus post aures de genere inflammationum, quæ accidunt in carnibus glandulosis, sicuti in emunctorijs.

Loci consentientes de parotidibus.

Paul. lib. 3, Parotis est glandularum sub ipsis auribus passio. Gal. 3. de comp. med. per loc. cap. 2, Parotides ex genere inflammationum sunt, fiuntque glâdulis circa aures affectis. Itidem ait Aet. ser. 6. cap. 89. Avicenn. quarta tertijs, cap. 24, Hæc apostemata sunt ex genere apostematum accidentium in carnibus mollibus & propriè glâdulosis, & nominantur nascentia auris, &c.

De causis parotidum.

Parotides uel à parte uel à toto fieri possunt. A parte, obstructis in capite humoribus: à toto corpore, si qua fuerit crisis in fe-

bribus. Hoc autem contingit ob eam quæ est in febribus caliditatem, relata multitudine ad caput. Fiunt interdum à materia sanguinea aut biliosa, interdum à pituitosa, aut melancholica, aut uenenosa iuxta semitam epidimæ, &c.

Loci de causis parotidum.

Paul. lib. 3. cap. 23, Parotis fit à materia morbi illic emanante, modò à capite humoribus in eo obstructis, modò à reliquo corpore in febribus crissim expertis oritur, &c. Quòd in febribus ob earum caliditatẽ fiant abscessus, lege 4. aphor. Gal. cõment. 31. ibi, Laßtudinẽ habetibus in febribus, &c. Auic. loc. cit. cap. 23, Et hæc apostemata omnino fiunt à materia sanguinea aut cholericæ, & quandoque melancholica aut phlegmatica, & quandoque ex his mixta. Vide latius in hoc Arcul. & reliquos practicanter, &c.

Alexan. lib. 1. cap. 34, Parotidum igitur aliæ originem ad copiosum sanguinem referunt, aliæ ad tenuem calidum & biliosum humorem, aliæ ad gelidum crassumque succum, &c.

De indiciis parotidum.

Si fierent à sanguine, rubor loci, dolor, febris sequens, caliditas, grauitas, manifestè indicant. Si à bile, erysipelas, dolor punctorius, uel mordicans, febris succedens, color pallidus, pauca grauitas aderit. Si à pituita in compressione aderit inundatio, color albus, uel rubedo ad albedinem decliuis, dolor non intēsus, nec sequitur febris, nisi dum pus conficitur, adest etiam grauitas. Si à melancholia, durities, nullus ferè dolor & color liuidus ostendant.

Loci de indiciis parotidum.

Auic. loc. cit. Significant quod est sanguineum rubedo & grauitas, & expulsio eius apud compressionem, & constrictio in meatibus, & significant cholericum ex sanguine subtili, dolor mordicatus, fistulosus, id est corrosiuus sine grauitate multa, &c. Alex. loc. cit. loquitur etiā ipse de his indicijs, ibi, Quæ feruentis humoris plenitati adscribuntur, dolores intentissimos parium: quæ uerò tenui subtilique humori erysipelaceas inflā-

mationes referunt, nulláque gravitate, neque dolore locum excruciant, &c. de alijs indicijs lege latius hunc locum.

De cura parotidum.

Cura eisdemet præsidys, quibus alios abscessus curare solemus, perficitur, præter quod nec styptica, neque repellentia in morbi principio conueniunt: uerùm sanguine exuberante prius sectionem uenæ moliemur, quæ peracta considerandum num parotides in tumorem attollatur, an adhuc altius delitescant: si in tumorem erumpant, tunc lenientibus mollientibusque, ac digerentibus medicamentis utemur, qualia sunt quæ ex farina hordeacea, ex semine lini, fœnigraci, althea, camomilla, lapatho, & infusa axungia parantur. Si uerò altius delitescant, tunc natura cum attractorijs præsidys, ueluti cum cucurbitula & foruū crebro usu, adiuuanda erit. Si uerò abscessus ad suppurationem se conferat, pus mouētibus utemur: deinde scissa cute pus excerni cogemus: quòd si dolores interim agrum molestant,

II. ij.

his dolores mitigabimus quæ moderatè humectant ac calefaciunt, &c.

Loci de cura parotidum.

Auic. quarta tertij, cap. 25, Oportet ergo ne intendas ad curam eius in quantum exiguur ad curam apostematum, adhibēdo styptica & apocrustica in principio, deinde compositionem regiminis, deinde resolutionem puram. Imò oportet ut incipias, & propriè quando accidit in febribus cum dolore capitis, & adiuues ad extrahendum materiam ad apostema cum omni ingenio & cum uentosis, &c. Galen. 3. de compos. med. per loc. cap. 2, Non utimur in parotidibus, ut in alijs partibus inflammatis, in principio repellentibus, sed uice uersa attractorijs, ut affligentem humorem ex profundo ad cutem attrahentes, naturæ opem feramus, &c. Vide latius Aet. ser. 6. cap. 89. Paul. lib. 3. cap. cit. Si igitur altè adhuc delitescens parotis in tumorem non attollitur, natura debet adiuuari præsijs, quæ coactas sordes extrahant, uel etiam cucurbitula adglutinata, uel crebro fotuum usu. Sin in-

inflammatione tentata in tumorem erumpat, is quæ leniant & concoquant, utemur cataplasmaris: at si sanguis exuperare uideatur, prius sectione uenæ ipsum euacuabis: deinde medicamentis utere, quæ puri mouendo sunt: & ubi abscessus ad suppurationem spectarit, cute descissa pus excernetur, uel acrimedicamento erumpetur, &c. Vide Alexan. Tral. longè fusius de singulis his tumorbis differentem.

De mitigando dolore lege Auic. ibi, Si fuerit initium eius cum dolore uehementi, sis contentus uaporatione, &c.

De prognosticis parotidum.

Auic. loc. cit. Et forrasse cōsequitur quandoque ex uehementia doloris eius ut interficiat, & apostematum, quæ fiunt sub origine auris, illud est magis incolume, quod est secundum semitā bonæ crisis. Illud uerò quod est à crisi, cū qua non est signū maturationis, aut præcedit bona crisis, est malū, &c. B. Ratio est, quia quacūque ante materiæ cōcoctionē à natura fiūt crises, malæ sunt: quæ uerò coctæ

II. ij.

materia, bonæ: nam satius est naturam vincere, quàm uinci. Paul. loc. cit. Si in altum recurrat colluies, periculum haud mediocre subsequuturum est, &c. Lege etiam de his fusiùs Arcul. & Sauonarolam.

De narium affectionibus, & primò de polypode & ozena.

Tres inueniuntur narium propemodum similes affectus, Sarcoma, quod in descriptione polypi ponitur, Ozena & Polypus. Sarcoma, est præternaturale incrementum carnis in naribus. Ozena uerò, est ulceratio profunda in naribus tetri odoris atque halitum emittens. Polypus uerò, est quoddam sarcoma simile polypis piscibus: nam sicuti illi multas habent propagines, mollèsque sunt atque augentur, ita hic quoque affectus. Differt tamen sarcoma à polypo magnitudine tantum & opificio, &c.

Loci consentientes de polypode & ozena.

Gal. 3. de compos. med. per loc. cap. 3, Es

Paul. lib. 3. cap. 24, Polypus tumor est præter naturam in naribus ortus, polypodis carni similis iuxta substantiæ proprietatem. Ozena uerò, ulcus est putridū ex humorum acriū illuue creatum. Gal. lib. finit. med. differentiā inter polypum & sarcoma enarrat. Auic. nullum agit de polypo caput, nisi illud sit in quo de hæmorrhoidib⁹ & alharnabeth agit, ubi carnes esse in naso additas asserit, nec de ozena sermonem facit, nisi fortè in capite ulcerum nasi cõtineatur. Vide latius Gal. 3. de compos. med. per loc. cap. 3. ibi, Ex genere tumorum præter naturā polypodes in naribus generantur, &c.

De causis polypodum & ozenæ.

Ozenæ cæterorūque ulcerum ac tumorū causæ esse possunt multiplices, sicuti à uulnere, ab abscessu, ab humorum acrium influxu, à uaporibus acutis paulatim rodentibus, donec ulcera pullulent. Causæ etiam esse possunt quæcunque hæc omnia irritare possunt. Similiter polypodes fiunt ex humoribus crassīs à cerebro ad nares influentibus,

Lib. II.

vel ex ipsarum narium nutrimento, à facultate nutritoria & auctrice, in carnem mutato, &c.

Loci de causis polypodum & ozenæ.

Gal. 3. de cōpos. med. per loc. cap. 3, Manifestum est affectionem hanc polypodis ex crassis & viscosis humoribus generari, & ozenæ ex humorum acrim & putrescibiliū influxu generantur, ita ut si acres solū sint, ægrè curabilia ulcera producere consueverunt, non tamen graueolentia. Auic. quarta terti, de ulcer. in naso cap. 3, Quandoque generantur ulcera in naso ex uaporibus acutis aut malis aut catarrhis acutis, &c. De his legito accuratius Alexand. lib. 1. cap. 35, Et Paul. ibi, Ozena est ulcus ex humorū acrim illuic creatum, &c.

De polypodis & ozenæ cura.

His ambobus curandi scopus idem est, ut primum corpus euacuetur, materiâque per reuulsionem ac derinationem adhuc fluens

intercipiatur, caputque firmetur ac corroboretur: quo corroborato ad narium curationem progrediendum, ita ut in ozenis affecta pars tum per repellentia, tum discutientia pharmaca resiccetur, sed in polypo partim adstringant, partim siccent ac extenuent, partim discutiant ac condensent. Si igitur totius corporis humorum copiae indicia adsint, euacuatio prius aut per sanguinis missionem, aut purgatione per hieram perficitur: deinde loco indantur remedia. Cura ozenae erit prout de ulceribus aurium dictum est. Polypodis uero cura fiet, si cum filo tenui ligetur, & in radice sua incidatur: & ubi aeger manulem abominatur operationem, procurandum est ut acribus medicamentis polypus extirpetur, sicut cum puluere corticum granatorum, arsenico, aere usto, nitro, cathartidibus, &c.

Loci de cura polypodis
& ozenae.

Gal. 3. de compos. med. per loc. cap. 3, Ceterum curatio utrisque his communis ozenae

& polypodi, ut primū caput siccetur, fir-
 meur, & corroboretur, quum palām sit, ob
 uitiatorum humorum redundantiam deflu-
 xum ex eo prouenire: quo roborato, ad naris
 curationē progredieris, scopo in orzenis pro-
 posito, ut affecta pars per mixtae facultatis
 pharmaca, tum repellentia, tum discutientia,
 resiccetur. Repellunt austera & acerbā, quae
 adstringentia dicuntur: discutiunt uerō cali-
 da & sicca facultate praedita. Similiter in
 polypode mixta materia medicamentaria
 opus est, ut partim astringat, partim siccet
 & attenuet, partim discutiat & condenset,
 &c. Paul. lib. 3. cap. 24. itidem ait, ibi, Quum
 totius corporis humorum copiae suspicio fue-
 rit, haec prius aut sanguinis dimissione aut
 purgatione ex hiera euacuetur, &c. Auic. &
 Mes. curationem polypodis manualet docet,
 per incisionem & cauterium cum ferro igni-
 to, aut acri medicamine, quos, si lubeat, leges.
 Hercul. recitat ung. de quo, inquit, modernos
 se profiteri omnem polypum & carcinoma
 curare, & est medicina fortis, cuius operatio
 durat tribus diebus, sed circumstantes partes

cum defensiuis & siccis frigidis defendantur, cuius descriptio hæc est. R̄ cātharidarū p. i. arsenici sublimati p. 5. uel plus & minus, prout fortius aut imbecillius operari desideras, & cum oxymelle simplici aut sapone nigro fiat unguentum: caue tamen membra principalia: nam tota uis in arsenico reponitur, &c.

Polypum & ozenas curantia.

Faciunt ad remotionem polypi, puluis arsenimonij, arsenici, aristologia, calcanti, ciclamini, dragontea, æris usti, floris æris cū melle uel succo serpentaria, succus mali granati, uidelicet grano rum eius acerosorum cum ossibus suis cum melle coctus ad spissitudinem, hermodactilus cum ære usto. Faciunt etiam ad ulcera narium, aloes, aristologia, auri pigmentum, ciperus, ciclamen, licium, plantago, sicla, sumach, bleta, &c.

De polypi & ozenæ prognosticis.

Auic. quinta tertij, ca. 2, Carnes additæ si sunt, molles, albæ, & nō sit in eis dolor, sūt fa-

cilis curationis. Quæ uerò sunt rubæ aut fusæ, uehementis doloris: cum sanie fœtida, sunt difficilis curæ. B. Molles, quia pituitose facile curationem admittunt, sed liuidæ difficulter, quum canceri propemodum naturam sapiant. Mesu. cap. de polyp. nar. Polypus qui fit in naribus durus, niger, & non tractabilis, & mollis & putridus & fœtidus, fortassis nō sanatur: sed qui elōgatur & pēdet, habēs radicem gracilem, non nimis profundatam, curatur per incisionem, &c.

De dolore dentium.

Manifestum est quid dolor sit dentium, sed locus doloris adeò latet, ut uix à medico diuinari possit. Quæ de re triplex erit doloris locus, aut in substantia ipsius dentis, aut in neruo ad radicem dentis prostrato, aut in gingiuarum substantia inflammationem patiente, &c.

Loci consentientes de dolore dentium.

Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 8, Ex

dentium affectionibus aliquæ euidenter apparent, ueluti quum perforati, denigrati aut dekriti sunt, aut frigida nec calida ferunt, sed ab utrisque aut ab altero solo dolor eis contingit: aliquæ non manifestè apparent, ueluti quum circa corpus dentis in profundo obortus sentitur, &c. lege de his Paul. lib. 3. cap. 26. & Auic. septima tertij, cap. 4.

De causis doloris dentium.

Causa doloris dentium aut est mala intemperies, aut soluta continuitas. Si mala intemperies, uel nuda erit, uel cum materia: quæ si fuerit multa, partes extendens, dolorem excitabit: si uerò pauca, tenuis & acris, tunc ulcus inde orietur, & per consequens dolor: at si erit intemperies nuda absque materia, tunc erit uel flatuosa, uel nimis calida & frigida, &c.

Loci consentientes de causis doloris dentium.

Auic. septima tertij, cap. 4, Cause doloris dentium sunt aut malitia complexionis pura

§IO DE CONSEN. MEDIC.

cum frigore & calore, aut est cum materia aut uentositate: si cum materia, uel hæc est multa uel pauca, crassa uel acuta, aut materia apostemans dentem, uel erodens, uel uermem nasci faciens, & tunc uel à capite, uel à stomacho, uel à toto, ut in febris materia descendit, &c.

Galen. 5. de compos. med. per loc. cap. 8, Perforantur dentes ex acrium ac rodentium humorum influxu, uelut ulcera in cute citra externam causam: similiter dentes liuidi siue denigrati ex humorum uitiatorum influxu fiunt, &c.

De signis doloris dentium.

Dentes esse affectos cognoscimus ex sua nigredine uel corrosione: sed si in suo permanserint colore, inquirendum est, num malus color in gingiua uideatur, aut si tumida, aut quid erosionis uel putrefactionis in se habeat: nam tunc ex se dens non dolet, sed ex mala affectione in gingiua: uerum si nihil horum adfuerit, coniecturandum est affectionem esse in neruo, præsertim si dolor in

profundo sentiatur. Cognosces etiam hæc, si
gingiuam gingiue, uel dentem denti compa-
raueris: ita etiam mala intemperies siue cali-
da siue frigida, per colorem cognoscitur, ut si
pallida, rubea, alba, item ex applicitis, iuuā-
tibus ac nocentibus, &c.

Loci consentientes de si- gnis doloris dentium.

Gal. 5. de comp. med. per loc. cap. 8, Si de-
res liuidi per omnem suam substantiam facti
appareant, nihil mirum est ipsos quid inflā-
mationi simile pati, &c.

Auic. septima tertij, cap. 5. omnia ferè re-
citatur quæ à me nuper relata sunt. Vide insu-
per Arcul. 9. almans. & Mesu. cap. proprio.

De cura doloris dentium.

Cura duplex est, uniuersalis & particula-
ris. Vniuersalis in se continet euacuationem,
reuulsionem, & fluxus cohibitionem. Eua-
cuatio fit uel per sectionem uenæ, aut uentris
solutionem, præsertim ubi abscessus aliquis,
aut sanguinis copia in causa fuerit. Secetur

igitur primum uena cephalica, deinde quæ sub lingua latet. Reuulsio fiat cum cucurbitulis & extremarum partium frictionibus, &c. Fluxus cohibetur per pilulas alchaiber nominatas. Cura particularis duplex, regularis & coacta. Regularis erit in materia calida, ut primum destillationes repellantur cū frigidis, sicut rosa, myrtho, cāphora, &c. deinde repellentibus discutientia cōmisceantur, & in fine resoluentia & maturantia, prout ad inflammationem pluries dictum est, adhibeantur. Cura coacta consistit in auferendo sensum, quo ablato dolor sedatur. Si uerò inflammatio fuerit in neruo dentis, tunc dens eradicandus erit. Si uerò præ molliitie dens erosus sit, reddere oportet eum duriorē per austera & acerba medicamina. Si luidi & nigri, per resiccantia pharmaca.

Loc i consentientes de cura
doloris dentium.

Galen. 5. de compos. med. per loc. cap. 8,
Erosiones dentium, siue cauernæ, per exiccationem influentis humoris uitiosi sanantur: qui si paucus fuerit, ex localibus auxilijs

exiccātibus medela sufficit: si multus influēs humor, uniuersi capitis rationem habere conuenit: sed si caput à reliquo corpore afficiatur, totius corporis cura gerenda est. Porro erosos dentes, qui præ mollitie perpeſsi sunt, reddere oportet duriores per austera & acerbā medicamenta. Simili etiam cura indigent liuidi & denigrati cum perforatis per resiccantia pharmaca, &c. Auic. septima tertij, cap. 6, Inquirendum an per se uel per cōsensum fiat dolor: si per cōsensum, incipe ab euacuatione membri consentientis cum phlebotomia, & uentris solutione, cum hiera aut scamonio: si uerò per se, cum scarificatione, & similibus: deinde si materia calida, cum frigidis: si frigida, cum calidis: si sicca, cū humectantibus & dolorem lenientibus: si fuerit in causa siccitas, confert ut fricetur dens cum butyro & adipe anatis, &c. Mesu. Intentio in cura duplex est, uniuersalis & particularis: uniuersalis habet tres res, prima est euacuatio, &c. Vide eum fusius: uide etiam Arcul. 9. almans. cap. proprio, & alios practi-
cantes, &c.

Kl̄. i.

Obseruatio in cura doloris dentium.

Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 9, In dolore dentium citra gingiuarum inflammationem, siue in proprio dentium corpore, siue in neruo dolor fiat, uehementissimis opus est medicamentis, siue quis uelit repellere, siue discutere doloris causam, siue humor sit, siue uentus, & propterea omnia acerrimo aceto praparentur, &c.

Nocentia dentibus.

Nocent dentibus, brassica, dactyli, gumæ, granata dulcia, lac, nix, porrum, raphanus.

Curantia dolores dentium.

Ad dolorem dentium ualent acetum, uinū decoctionis acetosæ, acorus, aphodillus, allij decoctum cum pini ligno & olibano, alumen, amygdalarum folia in aceto cocta, asfa been, betonica, borax. Pulsationem dentis mirabiliter tollit chameleontis nigri decoctio, cappares, lac capræ, radix chelidonia, cypressus, colocynthus, cornu cerui decoctum,

IN CVR. MORB. LIB. II. SIS

radix cucumæ masticata, hedera, galla, gith,
gramē, lacca, malua, melissa, mezeron, morus,
nasturcium, peucedanū, pinus, pyrethrū, por-
tulaca, rosmarinus, sandaraca rosa, ruta, su-
mach, saxifragia, hyssopus, sparagus, oleum
uermium terrestrium, myrthinum, de citro, de
uitellis ouorum, oleū benedictum Nic. & dē-
tifriciū Democriti. Auic. tra. 4. sum. 2. 5. me-
dicamen Andronici. Auic. eodem in loco. mi-
tridatū Nic. Sotira Auic. prima quinti, &c.
Reseruant ad dolorem dentium, succus cepa-
rum, sanguis testudinis marinæ fricatus, &c.

De doloris dentium pro-
gnosticis.

Auic. tertia tertij, cap. 5, Si affectio fuerit
in gingiua, nunquam remouebitur dolor cum
dentis extirpatione: si uerò in neruo fuerit,
nec per remotionem dentis interdum remo-
uetur, & interdum iuuat. B. Quòd dentis
eradicatio minimè utilis sit, omnibus no-
tum est: at si in neruo fuerit, exempto dente
facilè curatur, quum materia quæ prius cum
dente erat retenta, exitum habeat: non iuuat

Klx. ij.

interdum, quum materia sit crassa & nervo
nimis adhæreat, &c. Hipp. 4. aphor. aphor.

53, Quibus circa dentes in febris quidam
lentoires nascuntur, ijs fortes fiunt febres. Le-
ge etiam prognost. 1. rex. 24. ibi, Si quis stu-
deat dentibus non consuetus à pueritia ita
facere malum.

Authores erronei dissentientes circa dolores dentium.

- 1 Adserere, dētes per se dolorem posse pati
cum 20ar primo theisr.
- 2 Adserere, dolores dentium magis affici à
calido, quàm à frigido.
- 3 Adserere, dentes ab alijs ossibus non dif-
ferre.
- 4 Adserere, in dentibus non posse aposte-
ma spurium fieri.

Confutatio dissentientium circa dolores dentium.

Ad primum, Arist. 1. & 3. de anima, Pilis,
ossibus, unguibus nullus est sensus, quum sint
naturæ terreae, propter quod etiam plantæ

nullum habent sensum: sed dētes sunt ossa per
 Auic. prima primi, cap. de anoth. ossium, &
 secundo de generatione animalium cap. 6.
 igitur dolorem non patiuntur: nec obstat di-
 ctum Gal. 3. de sympt. cau. nec Arist. pro-
 blem. 2. & 3. cap. 6. problem. 22. ubi habe-
 tur, quòd dentes celeriter & dolent, & sen-
 tiunt frigus & sic patiuntur: nam hoc non
 per se, sed potius per accidens euenit.

Ad secundum, Hip. aph. 5. aph. 18, Frigi-
 dum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cere-
 bro, spinali medullæ, calidum uerò utile, ubi
 Gal. Quæcunque partes sunt natura frigi-
 diores & penitus exangues, citius ac magis
 à frigido offenduntur, quàm à calido, &c.

Ad tertium, Arist. 2. de generatione ani-
 malium cap. 6. & 2. de anima, inquit, quòd
 ossa non crescunt, ibi, Omnium natura con-
 stantium impositus est finis magnitudinis &
 augmenti, sed dentes crescunt, ut patet expe-
 rientia, igitur ab alijs ossibus differunt: alio-
 qui in contritione & contactu, nisi cresce-
 rent, omnino contriti perderentur.

Ad quartum responder Serapio, 2. de den-
 Klz. ij.

ribus, ibi, Si dentes in suo toto corpore uiriditatem accipiunt, tunc non mirandū si consequatur eos, quod simile sit apostemati. Vel dic posse apostemari per uiam congestionis, id est, ex superfluitate nutrimenti, non per uiam rheumatis, sicut alia apostemata. Lege Concil. dra. 96.

De gingiuarum affectionibus.

Accidunt gingiuis inflammationes, ulcera serpentia, parulus & epulis. Inflammatio est calidi sanguinis influxus. Parulus, est alicuius partis inflammatio, quæ nisi discussa fuerit, in suppurationem uertitur. Epulis, est carnis excresecientia, quæ ab inflammatione contracta ad intimos molares dentes pertinet, nõnunquam cum febre & dolore, &c.

Loci consentientes de gingiuarum affectionibus.

Gal. 6. de comp. med. per loc. cap. 1, Inflammatio est calidi sanguinis influxus, &c. Aer. ser. 8. cap. 24, Parulus est inflammatio alicuius partis gingiuarum cum tumore, quæ ubi non dissoluitur, suppuratur. Epulis uerò, est ex-

crescentia carnis ab inflammatione consequuta, iuxta interiorem dentem molarem, aliquando cum febre & uehementi dolore internarum mandibularum, ut neque os aegro aperire liceat, contingens, &c. Lege de his etiam Paulum.

De causis gingiuarum affectuum.

Causa uel est extrinseca uel intrinseca: si extrinseca, tunc erit uel pluuiosa constitutio calida & humida, uel ceteræ dispositiones ad humorum putredinem paratæ. Si intrinseca, uel à parte ortū habet, uel à toto: à parte, sicuti à capite uel à stomacho: à toto, sicuti in febribus, uaporibus scilicet ad gingiuas peruenientibus, ex quibus ulcera & inflammationes oriuntur, eo quòd in hac oris partes tam tenues & debiles facillimè imprimantur, &c.

Loci consentientes de causis affectuum gingiuarum.

Auic. octaua tertij, cap. 1, Gingiua accidit apostemata causa materiei descendens ad ipsam secundū plurimum ex capite, & quā-
Kl. iiij.

doque ex communitate stomachi, & quandoque accidunt in principio hydropisis ex malitia formæ ob id quod ex uaporibus corruptis ad eam eleuatur, &c.

De signis affectionum gingiuarum.

Cognoscitur humor putridus per colorem & tactum: nam cognitio nostra quæ per uisum quandoque decipitur, ex tactu interdum certior fit: ex tactu enim omnes qualitates percipimus, ut durum, molle, calidum, frigidum: interdum inflammationes & ulcera per se manifesta sunt, & plerunque cū febre fiunt.

Loci consentientes de signis affectionum gingiuarum.

Auic. loc. cit. Et significatur genus materie per colorem & tactum, & quandoque sunt ex eis manifesta, recentia, uelocia ad suscipiendam curam, &c.

De cura affectionum gingiuarum.

Vbi totum corpus apparuerit aut multitudine humorum refertum, aut eorum malitia uitiatum, primum antequam ad topica per-

uenias, per sectionem uenæ, per purgationem ac inediam curabis: quū uerò ad topica accesseris, duo scopi erunt considerandi: alter ab ipsius affectionis indicatione, alter à particula quæ curatur natura. In ipsa affectione conuenit ut in principio id quod influit, repellatur. Repellentia sunt quæ adstringendi uim habent, post principium usque ad morbi finem pharmaco opus est repellente & discutiente, sed primo tempore adstringens præcellat, in fine uerò discutiens, intermedio tempore æquales utriusque partes sint. Si uerò quid induratum de inflammatione relinquatur, non sunt adstringentia cum discussorijs miscenda, sed ita curandum, ut concoctoria præcedat ad discussoria. In particula natura, consideretur superficiem oris esse cute totum corpus ambiente molliorem ac rariorem. qua de re non fortibus auxilijs indiget, &c. Cura parulidis fiet per discussoria, antequam suppuretur, sicuti per collutiones ex decocto seminis lini, sed epulidis inflammatio cum discussorijs ac siccis deprimentibus auferetur, &c.

Loci consentientes de cura affectionum gingiuarum.

Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 1. eandem methodum enarrat, quam nuper retulimus, sed longè satis fusiores. Aet. ser. 8. ca. 24. & 25, Parulis dissoluenda est antequam suppuretur per collutiones, quales sunt, succus prisanæ, decoctum seminis lini, deinde siccis deprimenda est carnis eminentia. Similiter epulis inflammatio cum dissoluentibus & siccis deprimentibus curanda est: quod si suppurentur, incidantur, & ulcus per collutiones curetur. habes remedia epulidis ex Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 9. & à Paul. lib. 3. cap. 26.

Auic. octaua tertij, cap. 2. loquens de inflammatione, inquit, Si materia est superfluitas calida, tunc administra euacuationem & phlebotomiam, & cura in principio cum collutionibus oris infrigidantibus, & sic in eis stypticitas, sicut aqua myrthi, & foliorum frigidorum stypticorum, & decoctio balanstiarum glandium, & succus portulacæ, ar-

noglossæ, &c. Lege de his Galenū fufius in loco nuper citato, &c.

Obferuationes de repellentibus
& discutientibus.

Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 9, Inflammationes repellentibus citra asperitatē & discutiētibus sine asperitate indigēt. Hoc idem refert etiam Aet. ser. 8. cap. 20. Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 1, Quum gingi-
narum caro fit mollis & rara, idcirco forti-
bus auxilijs non indiget. Vitentur insuauia
ob eius sensum, itē uenenosa, ne ob duos me-
tus subiacentes aliquid in uentrem uel pul-
monem influat, &c.

De linguæ batracho.

Ranunculus, Gracè βάτραχος dictus, est
tumor uenarum qua potissimum sub lingua
continentur. Sunt inter Auicennianos qui
morbum appellant glandulam. Crescit ac si
noua lingua oriretur: unde sunt qui uelint
carnem additam esse linguæ batrachum, alij
apostema picuifum.

Loci de linguæ batracho.

Paul. lib. 3. cap. 26, Batrachus, tumor est ad inflammationis similitudinem, sub lingua erumpens, maximè in pueris. Idem adserit Act. ser. 8. cap. 37.

De batrachi causa.

Si tumor fuerit pituitosus, omnino ab humiditate uiscosa à capite descendente fiet: si uerò caro addita, tunc fiet sicuti & alia caro, &c.

Loci cōsentientes de batrachi causis.

Auic. sexta tertij, cap. 17, Et causa eius est humiditas uiscosa, &c. uide ipsum fufius.

De batrachi indiciis.

Cognoscitur, quia similis est ranæ in colore, quum superficiei & uenarum linguæ tumor sit, &c.

Loci consentientes de batrachi indiciis.

Auic. loc. cit. Est similis glādulæ duræ existentis sub lingua, cuius color est similis colori

cōposito ex colore superficiei linguae & uenarū quæ sunt in ea, & est similis rana, &c.

De batrachi curatione.

Considerandum in primis est, num in puerulis, an in perfectæ ætatis hominibus cura fieri debeat: nam si in puerulis, tūc collutiones tantū cōueniunt: si uerò in maturis hominibus, tunc primū sectio uenæ sub lingua: & si ranunculus magnus fuerit, oportet ut scindatur & extrahatur. Verū in primis experiundæ sunt medicinæ corrosiue, incisive ac resolutiue: deinde si nihil profeceris, nil erit quod ab operatione manus te excuset. Medicinæ igitur in principio parantur ex sale, ammoniaco, & gallis, & diu fricetur locus, deinde flore æris, dragacanto, & similibus uti poteris, &c.

Loci consentientes de batrachi curatione.

Aet. ser. 8. ca. 37, In cura hoc discriminis est, ut aliter in pueris ac imperfectæ ætatis hominibus medendum sit, si quidem ijs sectio uenæ sub lingua, illis uerò collutiones tantū

conueniunt. lege de his Paul. lib. 3. ca. cit.

Auicē. sexta tertij, cap. 18, Experiantur in ipsa medicina corrosiua, incisiua, resolutiua, in quibus est superflua exiccatio, ut sal, ammoniacus, & fricatio cum flore aeris, & dragacato, & administrentur phlebotomia sub lingua & medicina fortis alcola: si autē non ualuerint, nō erit excusatio ab operatione manus, &c.

De aphthis, id est, oris vlceribus.

Quas Graci α φ θ ε ς dicunt, Auicēniani alcola, nos pustulas in superficie oris appellamus, &c.

Loci consentientes de aphthis.

Gal. 6. de comp. med. per loc. cap. 4, Aphthæ sunt ulcerationes in superficie oris obortæ, habentes quidpiam caliditatis igneæ, &c.

Act. ser. 8. cap. 39. idem refert. Auicē. sexta tertij, cap. 23, agit de his sub nomine alcola & ulceribus malignis, &c. Vide Hippo. 3. aphor. aphor. 24. ibi, In ætatibus talia contingunt paruis & nuper natis puerulis, oris ulcera quæ aphthæ uocantur, &c.

De causis aphtharum, id est,
oris ulcerum.

Fiunt aut à lacte nutricis vitiato, aut ex humorum vitiosorum ad os influxu, aut ab acredine eorum quæ bibuntur ac comeduntur, &c.

Loci consentientes de causis
aphtharum.

Gal. 6. de cõpos. med. per loc. cap. 4, Fiunt ut plurimum pueris lactentibus, quum vitiosum fuerit nutricis lac, aut non probè ipsum cõcoxerit infans, &c. Auic. sexta tertij, ca. 23, Non accidunt eis nisi propter malitiam lactis, aut malitiam digestionis eius in stomachis ipsorum, & quandoque accidit ex humore omni. Aet. loc. cit. Fiunt etiam in his qui ad perfectam ætatem peruenerunt, tum propter vitiosorum humorum ad os defluxum, tum propter acredinem eorum quæ bibuntur ac comeduntur, &c. lege aphor. 3. Galen. cõmẽt. 24. ibi, Causa harum nil aliud est quàm mollities instrumentorum, quæ neque tactum, neque lactis sustinent qualitatem. Et com. 32. eiusdẽ, Vbi, inquit, à substantiam te-

nuem habentibus, & à mordacibus humoribus fieri, &c.

De aphtharum indiciis.

Cognoscuntur ex tactu & visu aphthæ: ex tactu, dum calor & tumor excitantur: visu cognoscuntur ob colorem: nam albus pituitā, flauus bilem, rubeus sanguinem, & niger atram bilem significat, &c.

Loci consentientes de aphtharum indiciis.

Aet. ser. 8. cap. 39, Cognitio omnium facilis est, utpote uisui & tactui subiecta: ad tactū quia calidiores quàm expediat loci sunt, tumoresque excitantur: visu uerò cognoscuntur ob colorem, nam rubicundiores à sanguine, &c.

Auicē. sexta tertij, cap. 23, Cognoscitur ex colore suo: album enim est phlegmaticum ex phlegmate salso in pluribus, & citrinum est cholericum uehementioris inflammationis quàm alia, & nigrum est melancholicum & rubeum, clarum est sanguineum, &c.

De cura aphtharum.

In primis curandum est, ut humor ex quo

ulcerationes fiunt, statim euacuetur, deinde fiat uenæ sectio: nam in his ulceribus maxime conducit: quibus peractis, tunc si subrubra fuerint ulcerationes, uti oportet refrigerantibus & moderatè adstringentibus, à principio præsertim & in puerulis, deinde his quæ citra mordacitatem discutiunt. Si uerò subflaua fuerint, tunc similibus utendum, sed frigidioribus: si nigra, discutientibus, &c. In adultis uerò efficacioribus remedijs utendum, &c.

Loci consentientes de cura aphtharum.

Auicena. loc. cit. cap. 24, Oportet ut intendatur primò humori dominanti & facienti alcola, & euacuetur ex corpore toto, si est dominus, deinde phlebotometur ex uenis quæ sunt sub mento. Phlebotomia enim confert omnibus ægritudinibus oris calidis, &c. Galen. 6. de compo. med. per loc. cap. 4, Quæ in superficie tantum sunt, facile ex moderatè adstringentibus curantur: quæ uerò diuturna & depascētia sunt, fortioribus remedijs utendum. Aet. ser. & loc. cit. Si subrubra infan-
Ll.i.

rium ulcerationes fuerint à principio cum his
 quæ mediocriter adstringunt & refrigerant:
 deinde his quæ citra mordacitatem discu-
 riunt: si subflauæ, iisdem similiter utendum,
 uerum magis frigidis, &c. Vide fusius.

Obseruatio in cura aphtharum.

Auicē. sexta tertij, cap. 24, Et oportet ut
 alienet omnia olea, usque ad oleum de oli-
 uis, &c.

Aphthis nocentia.

Nocent ori & palato quædā species bras-
 sica & capparorum, lacticina, melongia, na-
 ces, raphanus.

Aphthas curantia.

Ad ulcera oris prosunt absinthium, ompha-
 cium, alumen, butyrum, camomilla, campho-
 ra, acatia, aloes, uerbena, lutū armenum, plan-
 tago, rosa, rubus, spodium, dragacantum cum
 amylo, & aqua rosacea dissolutum, granata
 mala, galla, oliua, malua, litium, lac, apho-
 dillus, &c.

De aphtharum prognosticis.

Auicē. loc. cit. Cholericum est uehementis inflammationis, sed omnibus malignius est melancholicum siue cum apostemate siue singulare sit. Et omne ulcus eueniens in superficie oris est uelox ad dilatandum. B. Scito ulcera in temporibus pluuiosis & in febris pestiferis multiplicari. Quod uerò ulcus facile dilatetur, ut ait Auicē. ex eo fortè contingit, quòd locus in quo ulcera fiunt, caliditate non deficit, & cutis mollis & humida facilius ulceratur. Paul. lib. I. cap. 10, Quod modo crusta nigrescit, omnium perniciosissimum & lethale est, &c.

Ll. ij.



IOANNIS

BACCHANELLI

Regiensis, De cōsensu
Medicorum in curan-
dis morbis, Lib. 3.

De tonsillarum columellæque
inflammationibus.



ONSILLAE, aliàs
glandula, ob quandam
glandis similitudinē, à to-
le, qui authore Festo est
fauciū tumor, dictæ sunt,
fiuntque circa columellā
ex utraque parte infra fauces, & Græcè *παι-
είδμια*, & Arabicè amygdala uocātur. no-
vis uero siue gurgulio, uel columella (quāquā

gurgulio propriè pars sit gutturis à naribus
ad pulmonē, constās ex cartilagine & carne
per quam spiritus meat ac remeat) accipitur
tamen pro columellā caruncula, quæ dū sum-
ma existit, gurgulio dicitur: dum uerò colūna
instar propēdet, columna uel columella: hæc
dum superius angusta est, & inferius rotūda,
ob uuis similitudinem uua & uuula dicitur:
dum uerò gracilescit, uel ab influxu humido
laxior euadit, tanquam loro similis pendēs,
lorum dicitur.

Loci consentientes de tonsillis
& gurgulione.

Galen. aphor. 3. com. 26, Tonsillæ sunt lo-
corum ad isthmum attinētiū inflammatio-
nes. B. Intellige per isthmum, partem illam
quæ os & gulam interiacet dictā per meta-
phoram. Aet. ser. 8. cap. 40, Gurgulionem
quidam columellam appellant, uua uerò no-
mine accipienda est quedam in eo affectio,
quum uua acino simile summum gurgulio-
nis apparet. Lorum uerò aliam affectionem
uocant, quum ex suffitu, nimium ignis
Ll. iij.

gracilescit, & loro similis propendet, &c.

Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 3, Columella carnosam quædam est particula in summo ore depēdens, quæ duobus nominibus appellatur à ueteribus Græcis gargareon & cion, id est gurgulio & colūna: quāquam non cion, sed cionidem posteriores medici, id est columellā uocarint: nec dicēda uia est, quum sit hæc gurgulionis affectio, &c. Gal. aphor. 3. cōment. 26, Tonsillæ sunt nonnunquam solius tunicae uentri ac gulæ & faucibus totique ori cōmunes inflāmationes, nōnunquam uerò & subiectorum ipsi musculorum, &c.

De causis tonsillarum & gurgulionis.

Omnis inflāmationis causa procatartica est, uel nimia meri potio, multaque ciborum maximè acriū denoratio. Causa uerò antecedens est humorū influxus, uel humores liquidi, quibus lingua larinxque & aspera arteria humescere solent, ad malignū redacti, uel uapores ipsi à febrili calore concitati ac elati. Causæ coniunctæ sunt humores ad actum inflammationem reducentes, &c.

Loci consentientes de cau-
fis tonsillarum.

Gal. 6. de cōpos. med. per loc. cap. 3, Fiunt
hæc, quemadmodum dictum est de alijs in-
flammationibus, ex humorum influxu, &c.
Aet. ser. 8. cap. 45, Tonsillarum inflamma-
tiones plerūque fiunt à nimia meri porione,
& à multa ac auidiore ciborum deuoratio-
ne maximè acrium & asperorum, fiuntque
ijs maximè, qui plurimo abundant sanguine,
uel pueris qui texturam habent teneram.

Auicē. nona tertij, cap. 12, Illis quandoque
accidit catarrhus apostemans eas (nam de
columella loquitur) ita ut prohibeat anhelu-
rum, & quandoque mollificatur uua præter
apostema, & indiget eo quod adstringit,
&c. B. Scias quòd Arabes quatuor uuule
morbos enumerant, & sunt apostema, ulcus,
corrosio, & casus. Apostema fieri potest à
quacunque materia, ulcus tantum à materia
ulcerante, corrosio à multa & acri materia,
casus à sanguine uel à pituita gurgulionem
remolliente.

L. iij.

De columellæ indiciis.

Cognoscitur facile per uisum, si lingua deprimatur, uel si aeger in radice linguae aliquid insistere sentiat, difficultas præter hæc deglutiendi adest, item dolor, & interdum febris, cognoscuntur humores ex eorum coloribus, apostema uerò, ulcera & corrosiones per se ex uisu manifestant, &c.

Loci consentientes de columellæ indiciis.

Galen. 6. de compos. med. per loc. cap. 3, Cognoscitur hoc si quis aperto plurimū ore toto linguam deprimat, &c.

Aet. ser. 8. cap. 45, In tonsillarum inflammatione accidit difficultas transglutiendi, dolor & aliquando etiam febris, &c. Vide in hoc Auicennam, qui tantam deglutiendi difficultatem interdum esse inquit, ut aeger digitis suis eam comprimere cogatur, donec transglutiat, & hoc præsertim fit, quum tonsillæ & columella plus iusto humiditatis recipiunt, uel laxantur, uel inflammationem expeririuntur.

De cura tonsillarum &
gurgulionis.

Si ex inflammatione periculum imminet,
primò euacuandum per sectionem uenæ cu-
biti, deinde reuellendum ac deriuandum cum
cucurbitulis collo ac mento affixis, & cum
gargarismis, primò leuiter adstringentibus,
postea ex decocto fursure, passularū paratis.
Quòd si ad suppurationem uertantur ton-
sillæ, tunc fiant gargarismi ex decocto cari-
carum & aqua mulsa: si uerò augeat mor-
bus, uenæ sub lingua secantur, aliusque sub-
ducatur, postque pharmacis acribus multum
discussorijs utendum est. Si uerò quispiam
sectionem gurgulionis moliatur, reuera præ-
stantius est cauterio gurgulionem resicare,
quàm ferro: siquidem nullo potiore remedio
tota humiditas ad illam extremitatem de-
fluxa exiccabitur quàm cauterio. Vstionem
siue incisionem fiendam denotant uuula at-
tenuatio, & si ab extremitate eius resudet
ueluti pus, & liuiditas eius partis appa-
reat, &c.

Loci consentientes de cura tonsillarum & gurgulionis.

Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 3. Communiter tum tonsillis, tum columella inflammatis aut exulceratis in principio conuenit quies, inedia & consequens diæta, gargarismi simplices leuiter adstringentes. In uigore morbi aluus subducatur, gargarismi ex decocto ficuum aut prisanae succo, in quo passulae sint incoctae. Si uero tonsillae ad suppurationem ueniunt, gargarismi fient ex decocto ficuum, aut aqua mulsa calida: si amplius augeat malum, & principium suffocationis suspectum sit, aluus forti clysteri uel glande subducatur, uena cubiti secetur, cucurbitula cum scarificatione collo ac mento affigenda, fomentis ac cataplasmatibus frequenter & gargarismis utendum. Quod si morbus ad nullum horum praesidiarum cedat, sed augeatur, uena sub lingua secetur, aut iuxta angulos oculorum uel ea quae in fronte est, &c. De sectione gurgulionis loquitur Hippoc. prognost. 3. cap. 9. tex. 13. ibi, Gurgulio cum periculo se-

catur, aut uritur, & scarificatur, quādiu rubidus fuerit & magnus: nam inflammatio ad hanc consequitur, & sanguinis eruptio, sed hunc oportet alijs medicamentis extenuare. Vbi uerò separatū fuerit, quod sanè uua uocāt, extremūque gurgulionis maius & liuidū fuerit, superior uerò pars tenuior, in hoc sanè tēpore tutum est manus admoliri: praestat autem alio prius euacuata manū adhibere, si tempus permittat, & homo non suffocetur, &c. Auicē. nona tertij, cap. 15, Consideretur uuae subtiliatio & detumescitio, & propriè in inferiore parte eius, & si ingrossatur extremitas eius, & refundat ex ea sicut pus, tunc est melior hora incidendi cum ferro aut medicinis cauterizantibus, &c.

B. Quoniam uocis plectrum est columella, ut Gal. de usu partium, & in eius incisione sequatur quandoque sanguinis profluum, fiatque ex eius abscissione frigidior inspiratio, unde fit ut thorace & pulmone refrigeratis quādoque multi intereant. Idcirco cautius procedēdū arbitror, ne dum partē sanare cupimus, maius nocumētū inde sequatur.

Habes etiam remedia per omnia morbi tempora ex Aet. ser. 8. cap. 45. & à Paulo lib. 3 cap. 26. Vide & alios practiçantes, &c.

De angina & strangulatione.

Angina quæ à Græcis *συνάγχη* dicitur, est musculorum, faucium interiorum inflammatio, quæ fauces anguntur & strangulantur, anhelitum uel deglutionem impediens, sicuti *παρεσυνάγχη* exteriorum. Hic morbus ab imperito medicorum uulgo deflexa uoce à *synanchi*, Squinantia dicitur. Dicitur consilla etiam, quâquam Plinius consillas ab angina seiungat. Strangulatio uerò est subitus ob inspirationis defectum interitus. Angina quatuor habet differentias, ut infra in Aet. uidebitur.

Loci consentientes de angina & strangulatione.

Galen. aphor. 4. cōment. 34. Quum musculi gutturis anteriores unâ cum ambiente tunica inflammationem patientes uiam spiritus ualent intercludere, medici ealem dispositio-

nem vocāt synanchen, &c. Pau. lib. 3. cap. 27,
 Angina quæ πυρόγχι à Græcis dicitur, mus-
 culorum faucium interiorum est inflamma-
 tio, sicuti parasyñache exteriorum. Auicen.
 nona tertij, cap. 8, loquens de suffocationibus
 describit esse apostema in gutture anbeli-
 tum uel deglutionem uel utrunque impediens,
 &c. Gal. aphor. 4. comment. 34, Strangula-
 tio nil aliud est quàm subitus interitus ob
 inspirationis defectū, qui fit ex angustia ali-
 cuius instrumenti ex ijs qui seruiunt respi-
 rationi, &c. De angina differentijs loqui-
 tur Aetius ser. 8. cap. 47, Anginae quatuor
 differentiae existunt: prima, quum fauces in-
 flammantur. Altera, quum nec circa oris re-
 gionē, nec iuxta fauces, nec forinsecus quic-
 quam apparet, sed iuxta asperæ arteriæ ex-
 tremū suffocatio egrum angit. Tertia, quum
 externa regio unā cum interna fuerit iuxta
 mentum inflammata. Quarta, quum cervicis
 uertebrae à suo loco excidunt, unde lingua à
 luxata uertebra ad suam radicem impulsa
 quandoque ex suis proprijs locis excidit, &
 difficultas respirandi magis infestat, unde

aperto ore semper hiare, atque aërem attrahere ager cogitur, &c. B. Præter has quatuor differentias à loco sumptas, sunt alia quatuor species ab humoribus sumptæ, scilicet à sanguine, bile, pituita, atra bile, quāvis raro hæc ultima ob sui crassitiem eueniat. Speciem uerò, quæ ex luxatione cervicis uerticuli contingit, caninam suffocationem uocat Auicenn. ad similitudinē canis, qui aperto ore uehemēter ex lassitudine anhelat. Vide Gal. 2. prorrh. cōment. 54. & aphor. 4. cōment. 35. De alijs anginae speciebus mentionē facit Hippoc. & Gal. 3. prognost. tex. 16. & ibi quid sint fauces euidenter exponit. Similiter aphor. 4. cōment. 34. inter gulam & guttur spacium fauces nominat, &c. Lege de speciebus anginae Galen. 4. de loc. aff. cap. 3. circa finem, &c.

De anginae causis.

Causæ procatarticae sunt ciborum facultas, qualis est potus frigida, ebrietas, nimia satietas, frigiditas aëris, & quaecunque ex respiratione attrahuntur mala. Causæ antecedentes sunt totius uel partis repletio, aut

partium quæ circa fauces gutturque existunt,
 uel humores fluentes, ut sanguis, bilis, pituita,
 &c. Causæ cōiunctæ sunt humores anginam
 actū facientes, qui partim fluxi sunt, partim
 fluunt, ex quibus binæ species pullulant: alte-
 ra scilicet à glutinosa frigidâque fluxione,
 altera uerò à calida & acri, &c.

Loci consentientes de cau-
 sis anginæ.

Aet. ser. 8. cap. 47, Anginæ causæ multæ
 sunt, frigiditas magis quàm ardor, & plaga,
 & ex piscibus ossa ad tonsillas impacta, &
 potus frigida, & ebrietas, nimia satietas, &
 quæ ex respiratione attrahuntur mala. Auic.
 nona tertij, cap. 8, Et quandoque causa est
 propter quosdam cibos, &c. Et subdens cau-
 sam antecedentem inquit, Quòd non est sem-
 per repletio totius corporis, nec superabundat
 superfluitas, nisi in membris uicinis gutturi,
 & facit euenire apostema, &c. Et subdit,
 Quàdoque accidunt ex sanguine, uel ex cho-
 lera rubra, aut ex phlegmate, rarò uerò ex
 melancholia. De causis cōiunctis loquitur Gal.
 4. de uic. rat. in mor. ac. com. 30. Et Hippoc.

eodem in loco, ibi, Synache, id est angina, fit quum hyeme uerèque fluxio multa & uiscosa ad uenas iugulares defluerit, &c. unde Galen. Fluxionum quæ à capite deferuntur, quædam sunt substantia tenues, alia ex crassis uiscosisque humoribus fiunt. Tenues penetratis latis uenis in angustioribus detinètur. Crassæ uerò contrarium obtinent, ut in latis contineantur, strictas penetrare non ualentes. Quum igitur in faucium uenis tales impacti fuerint humores, pars in tumorem attollitur, &c. Scias quòd quum nerui & ligamenta ad partes inflammatas extenduntur, tunc uertebrae uel intra, uel ad latus, ob eorum copulam, qua simul coniunguntur, citò uertuntur. Et de his lege Gal. aphor. 4. comment. 35 & Aet. in præallegato loco, &c. Vide etiam Galenū aphor. 3. cōment. 22. ubi anginam fieri inquit ex biliosis humoribus qui ad fauces autumnò decumbunt, & à pituitosioribus, qui uerè cum orthopnoea accidunt, &c.

De anginae indiciis.

Indicia anginae sunt, difficultas spirandi,

febris, genarū rubor, deglutio impedita, dolor circa guttur, tumōrque non extrinsecus appārēs, interrupta uox. Fluxionū humoris indicia sumuntur à colore, à dolore, & à sapore. Cognoscuntur à colore, si rubidus, flauus, albus, liuēs humor fuerit. A dolore, si grauis, tēsius, pulsatilis ut in sanguine, si punctorius ac mordicans ut in bile, si paruus & obtusus ut in pituita, &c. A sapore, si dulcis ut à sanguine, si amarus à bile, si salsus uel insipidus à pituita, si ponticus ab atra bile, &c.

Loci consentientes de anginae indiciis.

Paul. lib. 3. cap. 27, Anginae notae sunt, spiritus recta ceruice uix trahitur, nonnullis febricula oboritur, faciei rubor, aeger ore cōuiuet, cibum potūque deglutire non potest. Gal. 3. prædict. cōment. 16, Quia inflammatione uexātūr muscoli in gutture, meritò dolore afficiuntur, &c. Hippocr. 4. de uict. in mor. ac. tex. 30, Præterita quæ intuenti apparent haudquaquā tumētia uidētur, tēdinēsque ceruicis posteriores tendūtur, uoxque ἀπὲρ ῥωγῆς,

Mm. i.

id est abrupta est, &c. Avic. ipse inquit, quòd uidetur loqui cū narib⁹, additque exitus amborū oculorū & egressio linguæ. Lege fusius de signis quādo extrinseci laborant muscoli, quādoque intrinseci, &c. De indicijis fluxionum humoris lege Auicem. nona tertiū, cap. 9. ibi, Et signa eius quæ est sanguinea, &c. Similiter ibi, Et signa cholerica. Et ibi, Signa phlegmatica sunt salsedo & sapor baurach, &c. lege etiam Arcul.

De cura ipsius anginae.

Curatio in remouenda antecedente causa triplicem scopum exigit, primo ut euacuetur, secundo ut fluxio prohibeatur, tertio ut reuelatur. Euacuatio fiet per sectionē uenæ usque ad defectum animi, exclusiue, ni morbus inducias dederit, ualida maximè existente uirtute cum repletionē copiosa. At ubi morbus moram fecerit, partienda erit sectio uenæ, ita tamen ut non desinere morbo, primū à comuni, deinde à cephalica extraxeris, postea hanc ad secandas sub lingua uenas te conferes: uerū si pauca fuerit repletio, à cepha-

lica eiusdē lateris ad uenas sub lingua inci-
 pies: deinceps si abundauerit bilis, alius sol-
 uenda erit cum bilem educentibus. Fluxio
 prohibeatur cum his quæ materiam incras-
 sant, quale est diacodion & opiata, &c.
 Si uersio fiet, per cucurbitulas, frictiones,
 enemata. Confert etiam diuersio per deriua-
 tionem. Curatio in remouenda causa con-
 iuncta, siue phlegmone discutiatur, siue in
 pus conuertatur, tres etiam medendi scopos
 expostulat. Primus erit reperiens, quæ re-
 percussiva nisi facta euacuatione suspecta
 sunt. Secundus partim repellens, partim dis-
 cutiens esse debet, maximè dum uiget mor-
 bus. Tertius discutiat tantum, & hoc à me-
 dio statu usque ad morbi inclinationem.
 Quod si ad suppurationem inflammatio uer-
 tatur, tunc aperientibus, abstergentibus ac
 mundificantibus opus erit. At si sapiens à
 dolore prematur, tunc anodinis ut garga-
 rismus ex lacte caprino dolori ipso uacan-
 dum erit. Interim diæta sit tenuissima: suf-
 ficat enim ut sumatur ptisana, uel panis in
 aqua decoctus, & bibatur aqua, &c.

Mm. ij.

Loci consentientes de cura anginae.

Hippoc. 4. de uic. in mor. ac. tex. 30, Sanguinem igitur ex brachijs detrahens mox uenas quæ sub lingua sunt secabis, &c. Itidem adserit Paul. lib. 3. cap. 27. Auic. nona tertij, cap. 10, Oportet ut euacuetur in principio cuiuscuiusque materia faciens illud cū phlebotomia & solatione uentris, & ut retrahatur materia ad partem diuersam, saltem cum uentosis positus super loca longinqua opposita ei, & ligatione extremitatum dolorosa, &c. Lege in hoc Mes. & Paul. fusius. De cura causæ coniunctæ loquitur Mesu. cap. de synanch. ibi, Distinguamus in administratione particularium operationum per tempora morbi: nam in augmento sit magis uincens medicamen, stypticum & prohibitium agitationis, & discursionis rheumatis, &c. Lege fusius: nā præter has intentiones etiam remedia docet in omni tempore morbi opportuna. Auicen. similiter loc. cit. ait, ibi, Incipiatur cum medicinis stypticis mixtis cum ijs, quæ parū abstersionis habet, & gargari-

ratio cum aceto est ex eis quæ repellunt & prohibent attractionē humiditatis plurima, deinde fiat gradatio ad maturatua, &c. Et cap. 2, Et quādoque dolor fit fortior in principio rei: quare oportet ut stypticis admisceatur aliquid quod sedet dolorem, sicut Syrupus uiol. &c.

Paul. lib. 3. cap. 27. loquitur de uictu quū dicit, Cibus sit triduo aqua mulsa, inde prisanae cremor cum dulci quadam portione, deinde & ouorum lutea, &c.

Obseruationes de phlebotomia.

Mesu. cap. de synan. Sit principium nostrū à phlebotomia si morbus accidit ex plenitudine sanguinis: si uerò cū sanguine abundet cholera, præponimus euacuationē cholerae ad sanguinis detractionē, deinde facimus sequi phlebotomiā. Paul. lib. 3. cap. 27, Non uniuersim, sed pluribus interpositis uicibus euacuetur, ne cumulata, uniuersimque facta euacuatione, anima ipsis deficiente suffocationis periculum superueniat, &c. Auic. nona tertij, ca. 2. idē adserit, & Aet. ser. 8. ca. 47.

Mm. ij.

Observatio de gargarismatis.

Auic. loc. cit. Gargarismata postponantur, si illic est repletio, & si fuerint gargarismata dolorosa, sed administrentur post modificationem, &c. Mirum in modum laudantur etiam uentosa super collum ad secundam uertebra, si deglutio fiat difficilis, &c.

Observatio de percussiuis.

Mesu. loc. cit. Percussiva nisi facta euacuatione suspecta sunt, unde Gal. 3. art. parua, Corpus plenum existens percussione non recipit, &c.

Observatio de victu.

Auic. loc. cit. Et prohibeatur nutrimentum, ut sit corpus eius utens sanguinis eius nutrimento, & conuertens ipsum a parte apostematis, quare minorem cibum necessario aut uoluntarie, &c.

Nocentia gutturi.

Nocent gutturi amyllum, mustum, platanus, artica, nux, piretrum, andachoca, &c.

Anginae conferentia.

Anginae conferentia sunt acetum per se.

gargarizatum, omphacium, oximel, agrimonium cum uino, uinum granatorum, diamorron, robnucum, succus rubi, ebuli, anisum cum melle, hyssopo & aceto, gargarisma, stercus canis ossa comedentis, uiola purpurea, hyssopus, Antirum confectio Haly. 27. antid. diabolibanum Nic. diayrundinis. Auicen. prima quinti, philonium romanū, theodoricon magnum Hali. 7. antid. hiera Archigenis, &c.

De prognosticis anginae.

Hippoc. aphor. 6. aph. 37, Ab angina habito si tumor fiat in collo bonum, foras enim morbus deducitur. Et similis sententia est 7. aphor. aph. 50, Et ratio aphor. est quia satius est ex intimioribus & principalioribus membris morbos extrudi, quàm è diuerso. Hippoc. prædict 3. text. 16, Angina grauissima est, ac celerrimè interimit, quacūque nec in ceruice, nec in faucibus cōspicuum aliquid efficit, sed plurimum doloris infert, ac spirationis difficultatem, orthopnoeam dictam. Hæc enim eodem die, & secundo & tercio & quarto strangulat. Quacunque uerò dolorem alteri

Mm. iij.

subsimilem infert: attollitur uerò, ac rubore in faucibus efficit, admodum exitiosa, sed paulò longior quàm superior est. Paul lib. 3. cap. 27, Pueris raro talis affectus accidit, nisi cū ceruicis uertebrae affectu loco excidunt, uerùm illis ceu curā non recipientibus ac deploratis manū admoliri non oportet. B. Habes aphor. 43. secundae sectionis, Strangulati ac dissoluti nondum mortui non referuntur, quibus spuma circa os fuerit: nam in ijs exitiale signum est spuma circa os. Verùm Gal. inquit, Nonnulli etiam strangulorum, quibus circa os spuma uisa est, relati sunt: unde etiā Auic. Quū tamen quādoq; accidat ut praefatus spumet, deinde sanetur. Hippoc. aphor. 4. aphor. 34, Si à febre habito, tumore non existente in faucibus strangulatio repēte superuenerit, lethale. B. Habes hanc eandem sententiā 2. prorrhēt. tex. 53. ubi inquit, Fauces dolētes, &c. Ibi quòd libri huius author à Gal. damnatur. Et aphor. 4. aphor. 35, Si à febre habito collū peruerit, & uix potest deuorare sine ullo tumore, lethale est. B. Vbi non uisitur tumoris uestigiū, dictum inflām-

rione in gutture, uel in eius musculis esse, qua-
 re exitiale signum est maxime, quū febris ad-
 sit, tanquam una ex causis mortem porten-
 dentibus: unde Auic. Si cum præfocationibus
 uehemens febris fuerit, tunc mors festinat,
 quoniam febris facit ægrum magno anhelitu
 indigere, &c. Et aphor. 5. aphor. 10, Qui-
 cunque ab angina liberantur, ijs ad pulmo-
 nem uertitur, & in septem diebus pereunt: si
 uerò has effugerint, suppurantur. B. Dictum
 est ab Hippoc. 2. aphor. aphor. 19. quòd acu-
 torum morborum non sunt certæ prænun-
 ciationes aut salutis aut mortis, quia non-
 nūquam humor noxius ex uno loco ad alte-
 rum transfertur, unde si angina ad pulmo-
 nem uertatur, uel interficit, uel in pus con-
 uersa suppuratur: si ad cor, omnino ægrū
 perdit. Auic. 9. tertij, cap. 9, Quum autem fa-
 cies sit uiridis & denigratur situs oculorum,
 tunc ipse moritur. Similiter quando minora-
 tur pulsus, & infrigidatur extrema, & gros-
 situdo lingue & ipsius denigratio sunt ex
 signis malis, &c.

Hippoc. prædict. 3. tex. 20, Securißima est

angina, si rubor quàm maximè foras uertatur. Et prædict. primo, Fauces dolètes tenues cum quadam difficultate strangulantes uelociter exitium afferunt, &c.

Authores erronei dissentientes circa anginam.

- 1 Adserere, ab inflammatione asperæ arteriæ strangulationem posse effici.
- 2 Adserere, in gutture nullum posse fieri tumorem absque dolore.
- 3 Adserere, in angina non conducere repercussiuam, ne materia introcludatur.
- 4 Adserere, anginam pluries fieri à pituita, quàm ab alijs humoribus.
- 5 Adserere, sectionem uenæ in omni angina non conferre.

Confutatio dissentientium circa anginam.

Ad primum, Gal. aphor. 4. comment. 34, Asperæ quidem arteriæ inflāmatio difficultatem spirādi aliquam efficere potest, strangulationem uerò non potest.

Ad secundum, Gal. eodemet cōmen. Quum

tumorum triplicem differētiā enumerasset, postea in fine commenti inquit, possibile esse multitudine humiditatis, pituitosa præcipuè, madefaciēte tunicam gutturis interiorē, aliquem fieri tumorem absque dolore.

Ad tertium responderet Avic. 9. tertij, cap. 10, Et gargarizatio cum aceto est ex eis quæ repellunt & prohibent attractionem humiditatis plurimæ: hæc tamen non conducere, si materia esset crassa ac tenax. Videtamen de his supra in observationibus, &c.

Ad quartū Gordonius & Gilbertus Anglicus & Geraldus de solo super 9. almans. cap. de squinantia dicunt, quòd apostema hoc fit secundū plurimū à sanguine, & rarò à pituita. Præterea quum hæc inflammatio sit morbus peracutus, à frigidis fieri nequit, igitur non pluries fit à pituita.

Ad quintum, Avic. 9. tertij, cap. 10, Oportet ut euacuetur in principio uniuscuiusque materia faciens illum cum phlebotomia: præterea si non euacuatiua, saltem reuulsiva in omni angina specie conueniet: habes etiam de hoc supra plures authoritates, &c.

De destillatione, grauedine,
& raucitate.

Destillatio à Græcis κατὰ ῥῆος dicta, nil aliud est quàm superabundantis humoris ex capite in partes subiectas fluxio. Differt à broncho qui raucedo, & à coryza quæ grauedo à Latinis dicitur, eo quòd catarrhus fauces & palatum oblineat, bronchus guttur ac arteriam, coryza uerò nares tantùm molestat. Has species destillationum Gerardus quidam his duobus uersibus explicuit,
Dū fluit ad pect⁹, dicitur Rheuma catarrh⁹,
Ad fauces bronchos, ad nares dico coryzā.

Loci consentientes de destillatione, grauedine, & raucitate.

Paulus lib. 9. ca. 28, Communis est omnibus uitijs excrementitiæ humiditatis ex capite in subiectas partes descensus, si in nares defluat κόρυζα, si per palatum ad nares κατὰ ῥῆος, si in guttur & asperam arteriam, ita ut membranam internam exasperet, Βρόγχος & ἀσπρηακὼν à Græcis dicitur, si fluxio in pectus pulmonēsque decumbat, ruffus

sine, ut ipse inquit, βήχες ἀπὸ τοῖς ζῴοντα κα-
 χονδεῖς, &c. Gal. 6. de sympt. cau. ca. 4, De-
 stillatio est per palati foramina multorum hu-
 morum delatio, &c. Vide etiam Aet. Ser. 8.
 ca. 53. & Gal. 2. prognost. comment. 49. ibi,
 Humorem de naribus secretum tenuē & in-
 coctum omnes medici grauedinem nominare
 solent, &c.

De causis destillationis, graue- dinis, & raucedinis.

Causæ procatacticae sunt aër frigidus,
 mora sub radys lunæ, septentrionales uenti
 dum humiditates exprimunt, similiter aër ca-
 lidus, uenti meridionales caput replentes &
 humiditates liquefacientes. Item somnus, coi-
 tus, & omnia ad caput euaporantia & ipsam
 replentia, sicut ebrietates & crapulae, exer-
 citium & ira. Causæ antecedentes sunt uel
 per se uel per consensum. Per se sunt humores
 superflui in capite existētes, intemperies ca-
 lida, frigida, & humida. Per consensum sunt
 aut à toto corpore, ut in febribus humorē elā-
 quantibus: aut membro particulari, ut à sto-

macho in digerendo debili, & à reliquis mēbris. Cause coniunctæ sunt humor actū fluēs, qui sepe est calidus, subtilis, interdum crassus & frigidus, &c.

**Loci consentientes de causis
destillationis.**

De causis procatarteticis lege comm. apho. 5. lib. 3. ibi, Austri caput aggravantes caliginosi, &c. Item aphor. 12. & 13. eiusdem lib. ibi, in cōmento, In quibusdam uerò coacto in unum & compresso quodammodo capite, expressa materia inutilis ad loca capite inferiora descendit, &c. Act. ser. 8. cap. 53, Destillationis & muci causa est cerebrum, quod à frigore ad frigidam intemperiem perducitur, &c. nam in hoc loco enumerat omnes alias procatarteticas causas à me superius descriptas. Gal. 6. de Sympt. cau. cap. 4, Destillationis & grauedinis cerebrum statim causa est, ut pars quidem similis, uel à frigore, uel à solis ardore ad intemperiem reductum, ut instrumentum uerò, quatenus à plenitudine infestatur. Lege latius Mes. de

cura catarrhi, ibi, Austerarum facit ac replet, &c. Lege similiter Arcul. comment. almans. cap. de catarrho. Item Gor. Sauon. &c. De fluxionum causis lege Gal. 2. de diff. feb. cap. 2, Nam ibi ex parte laborante binas causas intelliges, alteram ex accensa caliditate, alteram à dolore excitato, unde minus plùsue attrahitur quod influit. Nam si uehementior fuerit calor, multum attrahit: si minus, tunc debilius. Similiter & in dolore. Ex parte uerò mittente, nam si pars mittens minus superfluitatibus abundet, parum aliquid attrahenti parti immittit: si uerò plus materia inutilis habeat, tantum ingerit amplius, quanto plus à naturæ modo recesserit, &c.

De destillationis indiciis.

Id scias uelim, quòd destillationum indicia ex capitis intemperie siue calida siue frigida sumi possunt, item à sapore, odore, calore, & ab ipsius symptomatibus, ut gratia exempli: Si caput calidæ fuerit tēperaturæ, facies rubescit uel flaua est: si uerò frigida, erit alba & pallida. À sapore, ut si quod influit acris aut salsi, aut amari uel fœtens

quidpiam habuerit, calidam censero: si insipidi uel dulcis, frigidum. A colore, ut quod rubescit, uel flauet, calidum: quod albescit, uel liuet, frigidum. A symptomatibus, ut si adsit ardor, pūctio siue mordacitas, calidū: si nullius sensus particeps cū gravitate & narium obstructione, frigidū. Relinquo ea etiā indicia, quæ sumi possunt ab his quæ iuuāt & nocent: sed ad differentiā quæ est inter tenuem & crassam destillationē nunc trāseo. Tenuis igitur cognoscetur ex eo dum expuitur, quòd labilis sit & fluēs: at è cōuerso crassa in globum uertitur, & in se permanēs non fluit. Si quid uerò in medio crassum & in circumiacentibus partibus tenue fuerit, tūc indica destillationē omnino esse tenuē, quum hæ partes ad crassitiē nōdū deuenerint. Signa quòd destillatio sit à toto sunt, quia in febrium augmento augetur, & in earū remissione remittitur. Similiter de particulariū partiū consensu intelligendum est. Signa per essentiam in capite sunt, si diu persenerauerit destillatio, nec adsit aliarū partium morbus de quo suspicari possit, &c.

Loci consentientes de indiciis
destillationum.

Paul. lib. 3 cap. 28, Qui ex aestu grauedinē
uel destillationem concipiunt, ijs particulae
incalescunt, acris tenuisque humor tum per
nares tum per os descendit, facies rubescit &
nasus. Qui ex frigore, ijs frons & caput un-
dique distenditur, meatūsque athmoides di-
cti clauduntur, &c. Lege de his Auic. & Ar-
cul. Mes. & Razem fusius, & inuenies plura
qua tuo arbitrio huc traduces, &c.

De cura destillationum.

Sex in catarrho requiruntur medēdi intē-
tiones, prima regiminis regula, secunda erit
catarrhi alteratio siue digestio, tertia eua-
cuatio, quarta diuersio, quinta catarrhi in-
terdū fluentis retētio, sexta accidētū corre-
ctio accipitis roboratio. Regimē erit in ca-
tarrho calido, si calida omnia uitētur, & ea
quæ etiā cerebrum debilitare possunt. In fri-
gido, somnus longus & meridianus, & supi-
nē dormire in frigido, malū est. Digestio si-
ue humoris preparatio in calido cū frigidis

Nn. i.

incrassantibus, sicut cū syrupo uiol. de Iui-
 bis, de papauere myrthino cū aquis farfarae
 endiuiae, aqua ordeī, & similibus parabitur
 in catarrho frigido, si crassa fuerit materia
 cum calidis attenuantibus, sicut cum syrupo
 de glycyrrhiza, de hyssopo de passio, oxymelle
 simp. & composito, cum aquis cap. uen. sal-
 uiae, decocto pectorali calido. Vacuatio in
 calido fiet cum fructuum decocto, cassia, mā-
 na, rheubarbaro, & cum pilulis aureis aggre-
 gatiuis de hiera simplici. In frigido, cum pi-
 lulis de hiera, cum agarico, polypodio, turbit,
 pilulis chochyis, &c. Viretur sectio uenae, si
 possibile fuerit: si minus, fiat à uena commu-
 ni. Diuersio siue reuulsio fiet per caput pur-
 gia, masticatoria & cauterizantia, uel per
 fricationes, lotiones, inſecturarum ligationes,
 cucurbitulas & hirudinū applicationes. Ca-
 put purgia fiūt per liquores, per nares attra-
 ctos, ut puta in calido cum aqua uiolacea uel
 hordei, &c. In frigido cum aqua maioranae,
 cum succo blitis, decocto nigella, ireos uel cy-
 claminis. Cauteria fiant in commissura co-
 ronali uel in humeris. Retentio catarrhi quae

fieri non debet nisi maxima urgente necessitate, pluribus medijs perficietur: primo cum stypticis, ut cum bolo armenio, spica, olibano. Secundo cum his quæ à proprietate incrasant, ut cum iuleb violaceo, Zuccharo violaceo, penidijs, diadragacanto, loch de papauere, diacodione liquido, pilulis bechichijs. Tertio cū gargarismis ex aqua rosacea, aceto, sandaraca, &c. uel cum pilulis de cynaglo. Remotio symptomatum erit, per ea quæ malā capitis intemperiem siue calidam siue frigidam remouere possunt. Roborabitur deinceps caput in causa frigida cum confectione pliris arcoticon Nic. cum diamusco, in causa calida, cum electuarijs frigidis, &c.

Loci consentientes de cura destillationum.

Mesu. cap. de cat. Commune est sex res, prima ponit studiū in uita patientis, secunda adequat materiam, tertia abscindit eam, quarta diuertit, quinta abscindit fluxum eius, sexta corrigit accidentia, & de his singulatim agit, ut latius uideri potest. Hercul. & Marcus Catinarius de
Nn. ij.

564 DE CONSEN. MEDIC.

his etiam fusius pertractant. Videant in sua
praxi qui optāt rem medullius introspicere.
De reuulsione, euacuatione & deriuatione
loquitur Gal. 4. meth. ca. 6. ibi, Destillatio-
nem fluere incipientem ad contraria trahē-
dam esse dicimus, fixam uerò in laborante
particula euacuandam. Similiter meth. 5. ca.
2, Quæ uerò in oculis, aure, palato, fluxiones
accidunt, eorum ad uicina deriuatio est per
nares, &c. Hinc etiam elice quot modis fiat
reuulsio. Lege etiam Aet. Ser. 8. cap. 53. ibi,
Expedit fontem malorum excindere sanato
uidelicet capite, &c.

Observationes in cura.

Gal. 3 de loc. aff. cap. 5. dicit, exemplifi-
cās de grauedine & destillatione, quòd qua-
litas & quantitas excrementorū atque cau-
sarum, quæ præcesserunt, contemplatio & ca-
pitis dispositio siue calida, ut in uisione, siue
frigida, ut in refrigeratione, primū à te
consyderentur: quæ nisi discretè cognoueris,
idoneam dispositione curationem haudqua-
quam inuenies.

Observationes in phlebotomia.

Mesu. in cur. cat. phlebotomiam non nisi in tribus casibus fieri posse adserit: primus, si destillatio calida fuerit cum multa sanguinis copia in corpore calido: secundus, si calida descendens in aliqua principali parte figatur, ut in oculis, pulmone, diaphragmate: tertius, si cum febre & maxime continua fuerit destillatio, ita ut in uenis putrescere humores existimentur, in ceteris uero nequaquam.

Observationes de gargarismatis.

Mesu. Suspecta sunt gargarismata in quatuor casibus: primus est suspicio catarrhi ad pectus & pulmonem fluentis, id est, in paratis ad phrism & asthma. Secundus, si sit de genere subtilium, acutorum & mordicantium, eò quòd facile cum gargarismis concitatur. Tertius, in præfocationibus quæ fiunt citò, id est, in paratis ad suffocationes. Quartus, si sit uehementis multitudinis.

Nn. iij.

Observationes in diuersionibus.

Marcus Catin. in cur. cat. inquit, Nota quòd caputpurgia & sternutatoria non debent à principio fieri, sed factis exacuationibus, quia per ista fit motus & agitatio, &c.

Mesu. Securus est regimen diuersiũ quàm abscissium, & licet regimen diuersium dilaret materiã & multiplicet, tamen multiplicatam conuertit ad partem cõmunem non timorosam, &c.

Observationes in abscissione catarrhi.

Mesu. Et sunt ex stolidis qui ante digestionem & mundificationem communem administrant abscindentia catarrhi, & sunt causa cumulationis & multiplicationis ipsius. Fiãt igitur post mundificationem & sedationem agitationis uehementis: in aliquibus tamen casibus in principio fieri potest, primò si ad partes nobiles reperet, aut catarrhus esset prefocatiuus, &c.

Catarrho conferentia.

Conferunt catarrho assatæ cum pipere

sumptæ, betonica, bolus armenius, cinnamomum, gramen, lac caprinum, grana lauri, manna, myrrha, uitella ouorum sorbilia, fumus sandaracæ, laudani & asphalti uapor, suffumigium utriusque storacis retinet catarrhum, item suffumigium uernicis, sebesten & hyssopus, acharistum Nic. confectio de iacur Mesu. Phylonium Romanum Auic. loch de papauere, pilulæ pro catarrho Mes. 10. antid. Pilulæ de papauere Mes. Rob de nucibus Mes. 5. antid. Rob de papauere Haly. 19. antid. Syrup. de papauere, &c.

De prognosticis destillationum.

Hippocr. aphor. 2. aphor. 40, Raucedines & grauedines in ualde senibus cōcoctionem non admittunt. B. Quia frigiditas illa ex senili ætate acquisita, reprimi non potest, imò & in quibusdā iuuenibus difficulter concoquuntur. Hippoc. prædict. 2. tex. 49, Grauedines & sternutamenta per omnes morbos qui in pulmone fatigent præire & subsequi malū est, &c. B. Ratio est, quia si grauedines sint signa, indicant pulmonem malis humori-

Nu. iij.

bus repleri: si uerò sint causæ, sunt etiam male, ex eo quòd ab alijs affectionibus prauis cõmittantur. Lege etiam pro his aphorif. 12, & 14, & 31. libri tertij aphor. & plura intelleges de prognosticis, &c.

Authores dissentientes circa destillationes.

- 1 Adserere, sternutamenta in destillatione esse salubria.
- 2 Adserere, cum Artemide medico, plumbeã laminã pro uoce tremula pectori esse applicandã.
- 3 Adserere, destillationes tantùm uocari, quæ ex capite per asperam arteriam ad pulmonem feruntur.

Confutatio dissentientium circa destillationes.

Ad primum, Gal. prædict. 2. comment. 49, Sternutamentum sequitur grauedines magna ex parte, sed sanè concutit thoracem & uiuat pulmonem: igitur in destillatione non est salubre, quia ex suo motu efficit, ut materia à capite ad subiectum pulmonem descenda :

vel signum est insalubre ostendens per consensum etiam affici cerebrum, ut ibi Gal.

Ad secundum, Hippoc. 5. aphor. 24. aphor. Frigida qualis est nix & glacies pectori inimica tusses mouent & destillationes, &c. Sed plumbea laminae sunt huiusmodi, igitur pectori non applicanda.

Ad tertium, Galen. aphor. 3. commen. 12, Non quia communi uocabulo destillationes consueuimus nominare, quae scilicet fiant ex capite ad pulmonem per asperam arteriam, sed omnes fluxiones quae feruntur per uenas à capite ad partes inferiores, &c. scilicet uocamus destillationes, &c.

De tussis definitione.

Tussis, βήξ Græcè dicta est, quoddam aggregatum ex duobus motibus, scilicet dilata-tione & cōstrictione impetuosa pulmonis & pectoris, ad expellendum nociua à uirtute expul-soria naturali pulmonis facta cum adiu-torio diaphragmatis. Nam tussis ita pectori inest, sicuti cerebro sternutamentum, ut per eam nocumentum à pulmone expellatur, &

à membris , quæ ad pulmonis consensum patiuntur, &c.

Loci de tussis definitione.

Gal. 5. de sympt. cau. cap. 4, Tussis nil aliud est quàm uehementissima efflatio, quæ plurimus spiritus celerrimè foras erumpens impetu suo extrahit, exploditque excrementa meatuum ipsius obstruentia, &c. Auicen. fen. 10. tra. 3. cap. 1, Tussis est ex motibus quibus expellit natura nocumentum ex membro aliquo, & hoc membrum est pulmo & membra quæ ei continentur. Vide de his latius Gal. loc. cit. cap. 3. & 4. de sympt. cau. Similiter de loco lesionis uide cap. 6. eiusdem quinti libri, &c. Vide etiam Arcul.

De causis tussis.

Causæ procatartice sunt, sicut dictum est in destillationum causis, causæ antecedentes uel per se sunt, uel per consensum. Per se, ut mala intemperies cum materia, uel sine materia calida, frigida, sicca, humida: aut solutio continui, uelut in ulcere pulmonis, in phthisi. Per consensum, uel à toto, ut in fe-

bribus: aut à partibus, ut à cerebro destillante, uel à pectore ut pleuritide & orthopnoea, aut diaphragmate ulcerato, uel in abscessum conuerso, aut à stomacho, splene, hepate, quum abscessum patiuntur: nam facta diaphragmatis compressione, siue à tumore, siue ab alio quopiam fit tussis. Materia in pulmone quandoque imbibuntur, interdum inhaerent, obstruunt, & resolutis partibus subtilibus in petram condensantur. Causae tussis siccae sunt uel mala complexio, uel materia in pulmone contenta, quia uel nimis crassa expulsiōi inepta, uel apostemata pulmonis, uel materia in uenis pulmonis contenta, sua acuitate uel multitudine stimulans, uel imbecillitas facultatis expulsiōis, &c.

Loci consentientes de causis tussis.

Aet. ser. 8. cap. 54, Causae tussis sunt uariae, nam humor à capite ad asperam arteriam destillans tussim efficit. Asperitas insuper intrinsecae pelliculae arteriae asperae, cibi & potus praeterlabentes tussim promouent. Lumbrici stomachum infestantes, etiam tussiculas

parvus excitant, similiter & acrus humor stomachum perturbans, & intemperies frigida instrumentorum respirationis tussim irritat: Vide de his fusius Auicem. 10. 3. tra. cap. 1. ibi, Cause primitiue tussis sunt, &c. Nam fusissimè has pertractat. Vide insuper Galen. de sympt. causis, cap. 4, & ibi intelliges, quomodo intemperies tussim excitet, & à mala intemperie dolor fiat contra plures, qui de mente Gal. hoc nō posse fieri certò affirmat.

De signis tussis.

Signū malæ complexionis calidæ, cognoscitur ex præcedentibus causis calidis, & laeditur ex similibus, & iuuatur à contrarijs, caliditas etiam sentitur ab agro, uehementia sitis, magnitudo anhelitus & pulsus, rubor faciei cum tussi sicca. Signa complexionis frigidæ sumuntur ex causis frigidis præcedentibus, iuuatur à contrarijs, &c. Signa tussis ex sanguine sunt, rubedo faciei, uenarum tensio, sapor in ore dulcis, & interdum sanguis excreatur. Signa bilis sunt, flauities uultus, sapor in ore amarus, sitis, & quod expuitur, ci-

trinum est, & ut plurimum tussis sicca est. Signa pituitæ sunt, pallor faciei, & albedo, sapor insipidus aut salsus cum humiditate superflua, paucæ sitis, circa fauces viscosa pituita, commotio uomitus, &c. Signa atræ bilis sunt, fuscus color, sapor ponticus, tardus aventus, longa duratio. Signa subtilitatis & crassitiei ex tenuitate fluxûque materiæ, & quia subito accidit, & è cōuerso, materia viscosa, tarda in fluxu, &c. Signa siccitatis sunt, quia sedatur ex sorbitione amyli, multiplicaturque, quū fames & sitis adest, & apud somnum alleniat, similiter dum comeditur & bibitur. Signa per consensum, est antecessio læsionis vetriculi vel hepatis, tussis adest sicca, est insuper minus continua & minus laboriosa, quàm quæ est per essentiam. Signa apostematis, ulceris, & similium cognoscuntur ex relatis in pleuritide, peripneumonia, & phtisi.

Loci consentientes de signis tussis.

Aetius serm. 8. cap. 54, Tussis quæ cum titillatione partium ab utraque palati parte contingit, palam ostendit destillationem à cæ

574 DE CONSEN. MEDIC.

pire ad asperam arteriam & ad pulmonem
deferri: quòd si nihil expuatur, tenuem flu-
xum indicat, &c. Auic. 10. tra. 3. ca. 1. de his
pertractat signis, ibi, In tussi frigida, est ad-
ditio ex frigore, &c. Lege hunc locum fusius,
& habebis omnia quæ à me nuper relata
sunt. Lege etiam Arcul.

De cura tussis.

Dictum est in capite destillationis, fluxum
humoris esse diuertendum, & quod iam flu-
xum est, euacuandum. Nunc etiam dicimus
in tussis cura duplicem scopum requiri, al-
terum in preparanda materia, alterum in ab-
stergendo & preparatam educendo. Tenuis
igitur & acris destillatio per infrigidantia
& incrassantia, & fluxum intercipientia
curatur, sicut cum syrupo de papauere vio-
laceo, iuiubino, cum decocto hordei, iuiuba-
rum, sebesten, uel cum diacodione tēpore som-
ni, uel pilulis bechichijs. Si uerò fuerit frigi-
da, crassa ac tenax, tunc cum calidis exte-
nuantibus ac dissecantibus digeratur, ut cum
syrupo de glycyrriza, de hyssopo oxymel-

lite. Syrup. de prassio, oxymellite scillitico cum decocto caricarū passularum. cap. uen. hordei, &c. cum loch de pino, de scilla, cum iure galli decrepiti, &c. Evacuatur deinceps subtilis materia cum cassia, electuario de sebesten, addita pectorali decoctione, uel cum pilulis aureis aggregatiuis, &c. Frigida cum pilulis cochys elephanginis. T. de ag. &c. Quod uerò superest in pulmone, exiccetur tum bibendo, cum lambendo ac euaporando, de quibus satis pertractauit Mesu.

Loci consentientes de cura tussis.

Aet. serm. 8. cap. 54, Medemur tussi à tenui fluxu facta per antidotum ex papaueris cap. inspissantes, aut per alterius pharmaci dolorem leuantis. Quae autem à crasso aut uisoso fit humore per extenuantia & discindentia, instrumentorum respirationis frigiditati per calefacientia medemur. Quae ab asperitate, per lenientia & mordacitatem arceria sanantur, qualia sunt ex arteriacis compositionibus simpliciora, &c. Gal. 6. de compositionibus simplicioribus, cap. 2. & 3. nō diuerso à no-

bis sermone hac dilucidius pertractat, ubi habet insuper multas ad tussim cōfectiones, &c. Lege etiam Auicē. 10. 3. tract. 9. cap. de cura tussis, & Arcul. & Mesu. Vide etiam quaecunque dicta sunt de destillatione, nam huc referenda sunt.

Observationes in cura per exiccantia.

Hercul. 9. almag. cap. de cur. tussis, multas conditiones observari in his inbet: Primò, quòd non nisi reiteratis euacuationibus exhibeātur. Secundò, quòd non adsit febris notatu digna. Tertiò, ut uirtus constet. Quartò, ut incipiatur à minima quantitate, &c. Vide eum fusius.

Nocentia & conferentia tussi.

Nocent tussi, acetum, succus ebulli, præsertim tussi recēter factæ, nam antiquæ prodest mel non spumatum, nuces, &c. Conferunt tussi amyllum cum zucchero & oleo amygdalino, semen bobicis, bdellium, radix chamaleontæ, cinnamomum, cochleæ, adiantū, hyssopus, dragacantum, enula, faba, scænu-græcum,

cum melle, phistici, furfur triticeum cum aqua
 hordei decoctum & colatum in frig. & sic.
 tussi, galbanū, gentiana, granata dulcia, iuiu
 bæ, lac asinæ uel capræ, decoctū glycyrrhiæ
 in uino, malua, māna, mastix, mulsa, oua cum
 melle, papauer, passulæ, peucedanū, grana pi
 ni, pulmo asini, prassium, rosmarinus, sebestē,
 semen lini, serpentaria, sulphur, sea, storax,
 ptisana, terebentina cum melle, uiolæ, zedoa
 ria, urtica, radix ireos. Composita sunt, dia
 codion Mesu. diapapauer Mesu. in tussi ca
 tarrhali, diasulphur Serap. diacodion cōpo
 sitū Serap. diaolibanū, diapenidion, diadra
 gantum, diairis, diacalamentū, diatrion pi
 pereon, diahyssopum, diazingiberis, emplastrū
 adip. Auic. sexto tra. emplastrū gabadi Ha
 ly. loch de pino, de papauere Mes. de allys
 Auic. & Mes. in quīta antid. in cur. tussis hu
 mida, loch de semine lini. Auic. quinta quin
 ti, oleum amygdalarum dul. uiolaceum sifa
 mi, cucurbitæ. Pilulæ pro catarrho Mes. 10.
 antid. bichichia Mes. ad tussim. Auic. syrup.
 uiolaceus, myrthinus, acetosus Mes. Iuiubinus
 de prassio, de hyssopo, de cannis, de papauere

re, alteraniabim, &c. Athanasia magna, Syrup. de liquiritia, de calamento, de theriaca maior. trochisci de stella, Auicen. 8. 5. de berberis, de papauere, de arsenico, &c. Aliud cotum, & bacca lauri, &c.

De prognosticis ipsius tussis.

Auicen. decima terij, loc. cit. Et tussis frequens plerunque perducit ad sputum sanguinis. Arcul. 9. almans, de cur. tuf. Si diuturna sit & frequens, in pregnantibus abortum facit: expuitur sanguis fractis in pectore uenis. Hippoc. aphor. 6. aphor. 46, Qui gibbi ex anhelitu aut tussi efficiuntur, ante pubertatem intereunt. Lege etiam aphor. 54. lib. 4, Quibus ut plurimum tusses sicca leuiter irritantes in febribus ardentibus fiunt, &c. Vide etiam Hippoc. in cap. de destillatione aphor. supra recitato.

Authores dissentientes circa tussim.

- 1 Adserere, tusses à nuda intemperie fieri non posse.
- 2 Adserere, tussim siccam à nulla alia causa fieri posse, quàm à mala intemperie sine

materia.

3 Adserere, tuſſim plerūque fieri cauſa tantū calida & ſicca, ut Gerardus.

4 Adſerere, pilulas bechichias conferre in omni ſicca tuſſi.

Confutatio diffidentium
circa tuſſim.

Ad primum, Galen. 5. de ſymp. cau. cap. 4, Tuſſim, inquit, fieri refrigeratis tantū reſpirationis instrumentis, ita ut affecti nihil inter tuſſiēdum expuant. Itidem ait Aer. ut ſuprà de cauſis dictum eſt.

Ad ſecundum, Gal. 2. prædict. cōment. 42. inquit, Quòd ſi humor craſſus & uiſcoſus, uel adeò tenuis ſit, ut expelli nequeat, ſiccā tuſſim efficit: unde modicè craſſus facilè ſcreatur. Et aphoriſ. 4. comment. 54, Siccæ tuſſes ſunt, in quibus nihil expuitur: ſunt etiam aliquando ob intemperiem instrumentorū quæ ſeruiunt reſpirationi, aliquando in faucium aſperitate, uel à pauco & tenui humore deſtillante. Igitur ſicca tuſſis etiam à materiali cauſa effici poteſt.

Oo. ij.

Ad tertium, Galen. aphoris. 3. comment. 23, Ob hanc igitur ipsam frigiditatem tusses hyeme maxime fiunt, &c. Similiter 9. 12. eiusdem libri, Caput prius repletum in calida & humida constitutione, frigus autem superueniens ueluti manus quadam extrinseca capiens ac premens, quandā uti spongiam, cerebri illam, quæ in ipso continetur, humiditatem, unde fiunt tusses & grauedines, &c. Igitur à causa frigida & humida plerunque, & magis quàm à calida & sicca fieri potest.

Ad quartum dicimus pilulas bichichias conferre tantum in causa calida & sicca, ut restatur Mesu. Sed tussis sicca ab alia causa fieri potest, ut monstratum est, qua de re in omni sicca tussi conferre non potuerunt, &c.

De asthmate dispnoea & orthopnoea.

Asthma est affectus qui respirandi difficultatem cum magno conamine præ se fert. Hæc spirationis difficultas dum modica est, *ὑσπνοία* Græcè dicitur: at quum uehemen-

rior fit, & spirare ager sine anhelitu & sono non potest, tunc αἰμα uocatur: si uerò accidat in spirando ut non nisi recta ceruice spiritus trahatur, tunc ὀρθοπνοία nominatur: quos igitur Græci uocant αἰμαπνοίς, Latini anhelosos siue suspiriosos dicunt.

Loci cōsentientes de asthma,
dispnoea, & orthopnoea.

Auic. decima tertij, ca. 4, Asthma est agri-
tudo pulmonis cum qua patiens non inuenit
excusationem ab anhelitu frequenti, sicuti est
anhelitus quo laborat præfocatus & festina-
tus. Gal. aph. 6. com. 46, Multæ sunt spirandi
difficultates, sed solam illam Hippoc. consue-
uit asthma nominare, in qua contingit satis
crebrum anhelitum fieri. Vocant τὸ αἰμαί-
νειν, id est, anhelare, id quod fit in cursib⁹ &
uehementioribus exercitijs, &c. Vide de his
Gal. 7. de cōp. med. per loc. ca. 6, ibi, Qui ci-
tra febrem dense respirant, &c. B. Nota quòd
asthma interdū sumi ur pro difficultate spi-
ritus sine febre & apostemate, interdum pro
constrictione nō facta à causis materialibus,

Co. iij.

interdum pro malitia spirandi à materia crassa inhaerente facta: & sic in hoc loco à Gal. accipitur, &c. Gal. 4. de uict. in mor. ac. comment. 21, Sicca orthopnoea ea est spirandi difficultas, quæ sine sputis uel tussi usque adeò uehemens est, ut inclinari citra suffocationem qui ita afficitur non possit.

De causis harum affectionum.

Causæ procatarticae sunt caliditas uel frigiditas, aëris casus, percussio, nimius corporis motus, fumus argenti uiui, odor rectum pectus constringentium, &c. Causæ antecedentes per se, ut à mala intemperie frigida coarctante uel obstruente, uel à materia ut plurimum pituitosa in pulmone, uel eius bronchijs infarcta. Per consensum fit uel à toto, ut in febribus & hydrope, aut ab aliqua parte, sicut ab occipite, neruis, uertebis colli, à pectore, diaphragmate, hepate, stomacho, splene, ab occipite inquam spiritibus ad pectoris musculos transire non ualentibus, à neruis motum diaphragmatis impediētibus, à colli uertebis & pectoris, quum extra sedem diuer-

tuntur, à pectore, sicut ab eius angustia, ab sc-
 cessu, paruitate, ulcere, & colluue, à dia-
 phragmate, hepate, splene, ob eorum abscessus
 & ulcera: interdum fit etiam ab exiccatione
 pulmonis, &c. Causæ coniunctæ sunt ipsi hu-
 mores infarcti in arterijs & uenis pulmonis
 morbum facientes, & similia.

Loci consentientes de causis.

Auicē. decima tertij, cap 14, Et quando-
 que accidit propter multitudinem uaporis,
 quando coarctatur in pulmone, & propter
 uentositatem coarctatam in membris anhel-
 tus, & quandoque causa generationis in ipso
 est frigiditas eius. Vide de his latius apud
 Mesu. cap. proprio. Galen. 7. de compos.
 medic. per loca, cap. 6. loquens de causis an-
 tecedentibus, inquit: Manifestum est coar-
 ctationem locorum præter naturam intrin-
 secus adesse, cuius etiam sensum ægri mani-
 festè perceptant. Coarctatio uerò fit, quum
 aut crassorum & tenuium humorum multi-
 tudo pulmonis bronchijs fuerit infarcta,
 aut tumor abscessui similis in ipso constite-

Oo. iij.

rit, &c. Auic. loc. cit. Et quandoque fit propter nocumētū in ipso pulmone, & in eis quæ ipsi cōtinuantur, propter inuiscationē humorum crassorū in arterijs & ramis eorum, & quādoque in cana pulmonis, & eius raritate, & in locis uacuis. Et istæ materia effusæ sunt ad ipsum ex capite. Et quādoque isti humores nocēt sua qualitate, quātitate, & multitudine, & quandoque fit & rarō ab exiccatione pulmonis, & quandoque fit propter communitatem membrorū uicinarum cōprimētiū membra anhelitus, &c. Vide de his Gal 4. de uic. in morb. ac. com. 21, & 3. aphor. com. 26, & 4. aphor. com. 50. ibi enim à quibus causis spirandi difficultas fiat, apertē intelliges: lege etiam 4. de loc. aff. cap. 7.

De indiciis asthmatis, orthopnoæque.

Frequēs adest anhelatio, nec spirare possunt, nisi recta ceruice, pallescit eorum facies. Si ab iniēperie absque materia fiat, adest pectoris lenitas absq; sensibili grauitate, tussis sine spūto: calida ex caloris sensu & ex anhelitu & pulsu magno frequēti cognoscitur: fri

gida ex frigore in partibus spiritualib⁹ percepto & ex anhelitu, pulsu paruo ac tardo: sicca ex asperitate, ex siti, & à causis exiccanti-
 b⁹: humida ex causis cōtrarijs. Vel intēperies omnes cognoscūtur ab his quæ iuuāt & nocēt, nā calidis frigida prosum, frigidis calida: humores cognoscūtur ex sapore, odore, crassitie ac tenuitate. Locus læsus cognoscitur, quoniā si in pulmone est læsio, tunc adest grauitas, screatus, tussis laboriosa, & difficilis anhelitus: si in aspera arteria, sonus adest in respirando, screatus facilis: si in brōchijs, screatus fieri nō potest, nisi cū multa tussi: si fiat à peripneumonia, signa suo capiti ascribentur: si fiat asthma à toto per cōsensum sicuti in febribus, ex eo inde cognoscet, quòd ad earū augmentum augetur, & in recessu minuitur: si per cōsensum ex partibus, facile etiam cognoscet ex earum morbis superuenientibus, &c.

Loci consentientes de indiciis asthmatis.

Auic. decima tertij, ca. de sig. asthmatis, si humores uel humiditates fuerint causa asthmatis, tunc aderit cōstrictio, in principio an-

helitus, cum excreatione, oscitatione, & retentione humoris permanentis, & gravitas cum spuro, &c. Vide hunc locum fusius: nam de singulis signis hîc pertractatur. Vide insuper Arcul. Sauro. Gordo, &c.

De cura asthmatis & orthopnoæ.

Primus in curando scopus, (dummodo totius corporis repletio appareat) sit sectio venæ. Secundus sit humoris preparatio, ita ut tenuis incrassetur, tenax & viscosus attenuetur cū syrupis in capite catarrhi memoratis. Tertius sit euacuatio, prout opportuna fuerit in humore peccate. Quartus sit humoris cum cucurbitulis & frictionibus ad partem oppositam reuulsio. Quintus residuum exiccat. Sextus sit regimen ex his quæ dilatant anhelitum. Vitentur acria, acetosa, styptica, tolerantur fames & potus, vitetur insuper somnus meridianus ac diurnus, &c.

Loci consentientes de cura asthmatis & orthopnoæ.

Paul. lib. 3. ca. 29, Hæc cura sit, ut per abs-
tergentia extenuatiâque medicamina gluri-

nosus humor & crassus abscindatur: quòd si
 necessitas urgeat, etiã uena ante omnia inci-
 datur, & quantum uires patiuntur, sanguis
 detrahatur, &c. Gal. 7. de cõpos. med. per lo-
 ca. ca. 6. Cæterùm curatio ambarũ affectio-
 num aliquid cõmune habet, & aliquid cuique
 proprium: cõmune utrisque est, ut redundãtia
 humoris affectiones generantis cõsumatur &
 expendatur: proprium uerò, ut si à crassis ui-
 scosisque humoribus fiant, per attenuãtia &
 extergentia consumantur, &c. Consule in his
 & alijs non solùm Auic. sed Mesu. ipse enim
 singula declarat. Vide & Arcul. & alios pra-
 cticantes.

Obseruationes in præpara- tione humorum.

Paul. loc. cit. duo notat, alterum ut quum
 crassitiem & tenacitatem humorum secamus
 & attenuamus, humiditatẽ cum pharmacis
 adhibeamus, quo facilius efferãtur, unde lar-
 giorem potũ anhelosis cõmendat: alterum, ne
 uehementer calidis uel frigidis in hac affe-
 ctione utamur, quia tenaces & crassi humo-
 res à uehemẽti calore uiscosiores redduntur,

Et sic difficulter auelli possunt, frigidis ne crassescant ac cogantur, &c. Vide similiter Aet. ser. 8. cap. 57.

Auic. loc. cit. Vitandæ sunt medicinæ multum incisivæ, ibi & non sis contētus, &c. Secundò, miscendæ sunt medicinæ hepaticæ, sicut eupatorium, cum pectoralibus, præsertim si crassities hepatis asthmati adiungatur. Tertio, quum morbus sit natura longus, medicinæ sæpius permutentur, non ex eodem genere in aliud, sed in eadem cōsimili facultate mutata permaneāt, ut uoluit quarta primi, cap. 1. ibi, Immò in una medicatione medicinā permuta, &c. Quartò in ægitudinibus chronicis interpolationes fiāt. Quintò, si causa coniuncta & antecedens aduersentur, attendatur illi quæ magis infestat. De observationibus aliarum intentionū lege Mesuen.

Conferentia asthmati & orthopnoæ.

Conferunt asthmati & orthopnoæ acetum scilliticū, amygdala amara, ammoniacū cum melle, assa fœtida in ovo sorbili, bolus armenius, calamentum, cappares saliti, de-

coctum centaurij Mes. dauci, diptami, enulae,
 caricarum, adianti, gentiana, iuniperi, gra-
 norū lauri, marrubij, origani, pastinacæ, oxy-
 mel scilliticum, peucedanū in ovo sorbili, pix
 humida cum melle, sulphur in ovo sorbili uel
 fumus eius in ore per embotum, scilla, thymus,
 hyssopus cum ruta, ficubus & melle, alliū co-
 ctum, betonica, gentiana, ius galli antiqui,
 galbanū, scœnugræcum cum melle, urtica cum
 melle, bacca lauri, myrrha, uiolæ, zucharum.
 Composita sunt, T. de agarico, alipta musca-
 ta Nic. præsertim in pueris, diapapauer,
 diaprassium, loch de pino Mes. loch de scil-
 la Serap. loch de papauere Haly. quadru-
 meron conf. Nic. rosata magna Nic. syrupus
 de hyssopo, de prassio, de calamento, de iui-
 bis, de liquiritia, theodoricon magnum Ha-
 ly, 6. antidota. theriaca magna Nic. hiera,
 logodium, hiera Archigenis, Phylonium ro-
 manum, &c.

De prognosticis asthmatis.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 50, Difficultates
 spirandi in febre intermittente, lethale: uide
 etiam aphor. 46. lib. 6.

Auicen. loc. cit. Hæc ægritudo cū accidit decrepitis, non forsitan sanatur, neque maturatur, quum ipsa in iuuenibus ut plurimū sit difficilis, & est ægritudo lōga, habēs cū hoc paroxysmos acutos iuxta similitudinē paroxysmorum epilepsiæ & spasmi, & multotiēs mutatur ad peripneumoniam, &c.

Authores dissentientes circa difficultates spirandi.

- 1 Adserere, asthma uerum non esse morbum pulmonis.
- 2 Adserere, orthopnoeam non posse fieri absque febre.
- 3 Adserere, apnoeam non dari posse in animali uiuente.
- 4 Adserere, pulmonem esse proprium anhelitus instrumentum.
- 5 Adserere, anhelitum esse motum tantū naturalem & non uoluntarium.
- 6 Adserere, spirandi difficultatem indicare tantummodo læsionem membrorum spiritalium.
- 7 Adserere, uinum in spirandi difficultate non esse exhibendum.

88 Adserere, pharmaca non ualde solu-
entia in asthma conuenire.

Confutatio dissentientium circa
difficultates spirationis.

Ad primum, Razes quarto cōment. cap. I,
Asthma est ueraciter, quod in canalibus pul-
monis habet humiditates multas uiscosas,
prohibētes ex ipsarum uiscositate, ne aēr tra-
hatur quāritate opportuna. Et Auic. Asthma
est agritudo pulmonis, igitur erit uerus mor-
bus pulmonis.

Ad secūdū, Gal. aphor. 6. cōment. 46, Nō-
nulli simpliciter asthma nomināt, nōnulli or-
thopnoeam, quādo absque febre agroti iugi-
ter anhelitū habēt difficilē: ex quibus uerbis
cognoscitur orthopnoeam absque febre fieri.

Ad terciū, Gal. de loc. affe. cap. 7. in fine,
Nā impossibile uidetur, ut animal omni spi-
ratione exactē priuatū in uita seruari possit,
quāuis animalia quæ in cauernis latēt, tho-
racem mouere minimē uideantur, quare aut
exiguā fieri spirationem, ut sensum effugiat,
aut huiusmodi animalia tunc spiratione
omnino non indigere, sed eam spirationem

quæ per uniuersū corpus fit, sufficere, quippe hæc cor ipsū p arterias efficit, ex quib⁹ apparet ut apnoea dari possit uiuēte etiā animali.

Ad quartum, Conciliator differentia 99, Sciendum quòd instrumentum proprium anhelitus est diaphragma, pulmo uerò coadiuariū se habens ut ad secantem serra, &c. Probat etiā alia potiori ratione, ex eo quod insensibilis sit pulmo, tum quia tot musculos in pectore frustra natura procreasset.

Ad quintum, Avic. IO. 3. tenet, quòd anhelitus completur duobus motibus, inter quos sunt duæ moræ, &c. ita ut componatur ex motu uoluntario & naturali. Iridem confirmat Gal. de usu partium, &c.

Ad sextum, Hippoc. prædictionū 1. tex. 27. & Galen. in eodē. com. At uerò, inquit, rara spiratio, hoc est, multo tēpore interposito, si magna est, indicat delirium: si parua, extinctionem natiui caloris: igitur aliam à thora-ce etiam lationem indicat, &c.

Ad septimū, Razes 4. cōment. Vinū tenue & subtile facit ad asthmatis passionē, si in potu accipiat, multa quātitas. Hoc tamen

intellige in resolutione materiae, uel ubi uinum sit cibus & potus.

Ad octauū, Paul. lib 3. cap. 29, Ex antido-
tis hiera & purgatio cōtinens, ex ualidissi-
mis medicamētis petita. Idē Auic. utitur hel-
leboro & colocyntide. Præterea probatur e-
tiam ratione, nā materia quæ sunt à uijs du-
ctū remotæ, educi nō possunt nisi per phar-
maca uehementia: sed in asthmate ita sunt,
igitur non nisi per ualidissima pharmaca
educi poterunt, & per consequens uehemen-
ti indigent pharmaco, etc.

De peripneumonia.

Peripneumonia nil aliud est, q̄ pulmonis
inflāmatio cū febre acuta & spirādi diffi-
cultate: & est duplex, uera & spuria: uera
cum à sanguine: spuria, quum ab alyis humo-
ribus oriatur: unde non immerito Mesues
alioquin oculatus à Cōciliatore reprehēdi-
tur differentia 100 dum inquit, ueram fieri
ex pituita, & esse minus mortalem, etc.

Loci consentientes de pe- ripneumonia.

Paulus libro 3. cap. 30. ἡ περὶ πνευμονία,

Pp. i.

φλεγμονὴ τῆ πνέμονος ἐστίν. similiter
 Aet. ser. 8. cap. 66, Peripneumonia est pulmo-
 nis inflammatio cū febre acuta. Itidem Auic.
 decima tertiā, tra. 4. cap. 10, Peripneumonia
 est apostema calidū in pulmone. Lege Gal.
 2. meth. & in lib. de finit. med. Item in lib.
 de part. art. med. cap. 4. ibi, Peripneumonia
 tantū dicitur, quū à sola inflammatione
 pulmo afficitur, &c.

Mesu. cap. de peripneu. Ex ea quædam est
 uera, quædā non uera, &c. Vide eū tūlatius,
 uide etiā Cōciliatorē loc. cit. lege etiā de his
 Hippoc. & Gal. prædict. 1. tex. 29. Item Ar-
 cul. & Gord. & ceteros practīcantes, &c.

De causis peripneumoniæ.

Causæ antecedentes sunt angina, pleuri-
 tis, catarrhus, uel alia materia ab aliqua
 corporis parte ad pulmonē transmissa. Cau-
 sæ coniunctæ sunt humores ibi coarctati &
 putrefacti sicuti est sanguis, bilis, pituita: fie-
 ri enim potest ferē ab omni humore.

Loci consentientes de causis peripneumoniæ.

Haly abbas in sua praxi, Et hoc apostema

aliquando fit ex materia sanguinea, aut ex cholera quæ ad pulmonem incurrit, nonnunquam à catarrho à capite descēdente, interdū à pleuritide, iugulatione, &c. nam pulmo imbecillis ea facile suscipit, quæ ab alijs membris repurgantur. Paul. lib. 3. cap. 30. idem sentit, ibi, Inflammatio fit ut plurimum à ualentibus in eam partem destillationibus, aut angina, aut suspirio, aut pleuritide, &c. De causis uerò coniunctis loquitur Auicē. decima tertij, cap. 10. ibi, Et peripneumonia fit ab omni humore, sed ut plurimum fit à phlegmate, quoniam in membro rarò non continetur humor subtilis, &c.

B. Intellige Auicē. uelle peripneumoniā à sanguine, & à pituita frequenter fieri, rarò ex bile, rarissimè ex atra bile, unde Auicē. plura capita facit de hac re, quem legere poteris. Gal. aphor. 7. coment. 12. causas peripneumonice etiam tetigit, quem fusius uidebis.

De indiciis peripneumonix.

Indicia cōmunia omni inflāmationi sunt rubor, tēsiō, dolor. Propria sunt, febris acuta,

Pp. 4.

grauitas absque dolore, nisi pellicula ipsius thoracis sint inflāmatæ, quoniam tunc dolor percipitur, spirādi adest difficultas, rubescunt malæ & facies, nasus fissus, uenæ rēporum eleuantur, appetitus deiectus est, linguæ adest siccitas, tussis sicca præcipue in morbi principio, respiratio calida est, sputum biliosum, spumosum, & quandoque cruentum, uigiliae adsunt quæ deliriū & stuporem inducunt, extremitates frigida, ungues liuidi incuruantur, & hi plerunque in 4. uel 7. pereunt: si uerò ad salutem tendat morbus, sanguinis ex naribus profluium sequitur, excrementitia per sedem excernuntur, &c.

De locis cōsentiētibus de indicis peripneumonix.

Gal. 4. de loc. aff. cap. 8, Quando cū spirandi difficultate, cui & angustia & grauitas cōiuncta est, acuta quoque febris inciderit, is affectus inflāmatio pulmonis est: quod si fuerit intolerabile incēdiū, angustia uerò & grauitatis sensus minor, erysipelas ipsum uexare censendū est. Et 2. de loc. aff. cap. 7,

Signa inflāmarionum cōmunia sunt, ut partes inflāmatæ rubescāt, tēdātur, remittantur, intumescant & doleant. Et 2. de loc. aff. cap. 9, Cognoscitur pulmonis inflammatio, quia tanta inducitur spirādi difficultas, tantāque angustia, ut suffocari laborātes uideantur, ac recti sedere cogantur, calida adest respiratio. Quocirca ubi plurimūm perflant, iuuari uidetur: in tussiedo modo hoc, modo alio colore infectū expuitur, ut rubrum, flauum, rufum, spumosum, nigrum & liuidum. grauitatis sensus adest, dolorque ab imo ad pectus & ad spinam, & febris acuta adest, &c. Lege de his fusius Aer. ser. 8. cap. 66. Vide similiter Auicē. decima tertij, cap. 2. ipse enim addit, quod dolor ascēdit ad iugulū, & pulsatio est usque ad spatulam, & furculam, & mamillas saltē apud tussim, & quādo dormit super latus præfocatur, & lingua primō rubescit, deinde nigrescit, & q̄ adest inflatio oculorū, grauitas palpebrarum, pulsus undosus, lenis & diuersus, & ibi reddit rationem horū omniū. Vide insuper Hipp. 2. prognost. tex. 60. Vide etiā Arcul. & Razē 9. almās.

Pp. iij.

ibi, Cum alicui superuenerit febris, & in aë-
ris attractione tantam patitur constrictionē,
ut se præsocari putet, &c.

De cura peripneumoniæ.

Primus in medendo scopus erit reuulsio,
ut inflammationis augmentum prohibeatur,
quæ fieri potest cum sectione uenæ, cum cu-
curbitulis, cum impositione enamatum, &c.
Secundus est humoris digestio, unde si fuerit
à sanguine uel à bile, conueniunt syrupus uio-
laceus, iuiubinus cum aqua hordeacea uel
zucharacea, uel syrupus myrthinus de papa-
uere cum decocto pec. Si uerò fuerit à pitui-
ta, conueniunt syrupi de glycyrrhiza, de his-
sopo, oxymel simp. miscendo secū syrup. uiol.
cum decoctis pectori conducentibus, &c. Ter-
tius est euacuatio, quæ fieri potest cum man-
na cassia, rheubarbaro 7. de uiol. de agarico
cum electuario de sebesten, &c. Quartus est
sputi prouocatio, & completur cum his quæ
in ore lambuntur, ut patet in cura pleuriti-
dis, &c. uide ibi plura.

Loci consentientes de cura
peripneumoniæ.

Gal. meth. 13 cap. 4, Quum aliqua particula phlegmone urgeri cœperit, uidendum est an propter calorem aliquem, qui in illa præter naturam ortus sit, an propter dolore uel ipsius uel propinquæ alicuius partis hæc contraxerit, quò scilicet adempta causa phlegmone non amplius increascit. Post hæc considera num uicina particula sanguinem largius ad partem phlegmone obsessam transmittat, deinde si corpus succorum æqualiter auctorum redundantia laboret. Si igitur corpus fuerit plethoricum, uel malo succo reddet, cogimur sanguinem mittere, & membrum, ne quid transmittat, corrigere, &c. Aet. ser. 8. cap. 66, Si nil obstiterit, uena in cubito secanda: & si uires ualidæ fuerint, ex utroque brachio sanguis extrahatur, &c. Vide latius Auic. loc. cit. & Arcul. & Marcum Catin. & Sauonarolam & Gordon.

Observatio in sectione venæ.

Herc. 9. alman. Reiteration sanguinis fieri
Pp. iij.

non debet, nisi plethoricum sit corpus, uel membrum influens sit hepar, uel aliqua euacuatio solita, puta menstruorum, hæmorrhoidarum repressa sit, aut si quam putaremus ad membra principalia materiam defluere, in alijs enim periculosa & suspecta est, &c. Auic. decima tertijs, cap. 1. commendat plus sectionem uenæ, quam uentris solutionem, quia in ipsa, inquit, non est timor sicut in solutione, quoniam interdum non soluat, interdum superflua sit, prohibet etiam narcotica, quoniam sputum & maturationem prohibent, &c.

Observationes in topicis.

Platearius, Nunquam utendum est repercussius, sed diaphoreticis & resolutiuis. Præterea caueant aquæ calidæ infusionem super caput, quia liquefacit humiditates, & superfluitates ad pectus descendere cogit, &c. Auic. loc. cit. unum aduertit, quod in topicis exterius applicitis maior esse debet in penetrando uis, quam in pleuritide: nam in penitiori loco affectio collocata est, unde ad cataplasmata, fomenta & linimenta addatur aliquid quod sit tenuium partium. Et nota

quòd debent applicari tam retro supra spō-
dilos, quàm antè ex directo partis inflam-
mata, &c.

Conferentia peripneumonix.

Conferunt peripneumonix, althea, amyli,
aqua mellis, butyrum cum melle, bolus arme-
nius, capillus Veneris, semina cucurbitæ, ci-
truli melonum, crocus, decoctio hyssopi, faba
fressa in cibus, farina hordei, carica cum fœ-
nugræco decoctæ, succus gētianæ, iuleb uiol.
iuiubinum, iuleb Alxemes Mes. in cur. pleu-
rit. Glycyrrhiza, organū cum melle penidy,
pix cum amygdalis & zucharo, porrum cum
melle, mucilago psylli, ruta cum anetho sicco
cocta, viola, hypericon, iris, hyssopus cum ruta
ficubus & melle. Composita sunt oleum de
amygdalis, oleum narcissi, de cucurbita, vio-
laceum, syrupus de cucurbita, violaceus, de vi-
no granatorum dulcium, iuiubinus, unguen-
tum violaceum, zucharum violaceum, confe-
ctio catasici Haly, 6. antid. Dialthea, esypū,
diapapauer, diadragacantum, diaolibanum
Nic. Phylonium Nic. cum melle, loch de pa-

pauere Mes. rosata magna Nic. sotyra Nic.

De prognosticis peripneumoniæ.

Hippoc. aphor. 5. aphor. 10, Quicunque ab angina liberantur, us ad pulmonem uertitur, & in 7. diebus pereunt: si uero has effugerint, suppurantur. Et aphor. 6. apho. 16, A morbo laterali, uel pulmonia habito, alui profluium adueniens, malum. Et aphor. 7. aphor. 2, A morbo laterali inflammatio pulmonis, malum. B. Nota peripneumoniam fieri à pleuritide, sed non econuerso, quia si mixta fuerit inflammatio, omnis humor noxius per sputum expurgatur: si sit perniciofa, antequam costæ patiantur, strangulat. Et aphor. 7. aphor. 12, A pulmonis inflammatione phrenitis malum. Et secundo prognost. ca. 69, Qui purulenti ex pulmonia sunt, &c. Vide tu Galeni commentum: item secundo prognost. tex. 64. ibi, Quibus abscessus, &c. Et tex. 67. eius de libri, Auic. Peripneumonia quæ à cholera rubea fit, secundum plurimum sua acuitate interficit, cum sit uicina cordi, & appositio cum infrigidantibus non peruenit ad locum, &c.

Mes. Et dixit Gal. quòd peripneumonia est
 difficilioris curæ quàm pleuresis, & prom-
 ptior ad interficiendum, eò quòd solutio cõ-
 tinui in pulmone rarò est susceptibilis curæ:
 uel quia uirtus cordis non tantùm patitur,
 immo deficit ab inflàmatione eius, &c. Her-
 cul. Peripneumonia longa & diuturna per-
 ducit tandem ad nocumentum hepatis, ita ut
 erret eius digestiua, & tumescant pedes &
 crura, interdum etiam uenter. Auic. decima
 terti, cap. 2. Et Hippoc. dixit, quòd quando
 accidunt exituræ apud mamillas, uel ea quæ
 sequitur ad eas, & aperiuntur pustulæ, eua-
 dunt, & similiter quando accidunt exituræ
 in crure, sunt signa laudabilia, &c.

Authores dissentientes circa
 peripneumoniam.

- 1 Adserere, peripneumoniam fieri non pos-
 se à pituita per uiam influxus.
- 2 Adserere, peripneumoniam pituitosam
 esse biliosa deteriore.
- 3 Adserere, in peripneumonia ex alijs mor-
 bis facta conferre sectionem uenæ.

Confutatio dissentientium circa
peripneumoniam.

Gal. 2. de loc. aff. cap. 9, respōdet primo,
Quippe iam ostendimus omnem inflamma-
tionem ex affluente fieri sanguine, quapro-
pter si biliosus fuerit sanguis, flauum aut pal-
lidum erit sputum: si pituitosus & spumans,
candidum, &c. Ex quibus inferri potest hāc
e iam inflammationem pulmonis à pituitoso
sanguine gigni posse, &c.

Ad secundum respōdet Mes. & omnes au-
ctores, quòd deterior est biliosa, quum mor-
bus sit acutior, seu inducens accidētia, &c.

Ad tertium, Paul. lib. 3. cap. 30, Vitabimus
sanguinis detractionem, dum ex alijs morbis
peripneumonia dependeat, & si in statum
morbus fuerit, &c.

De sputo sanguinis.

Sputum sanguinis nil aliud est, quàm qua-
dam sanguinis reiectatio per os undecunque
proueniens. Hic considera potius locum à
quo sanguis emanat, quàm ipsam definitio-
nem, ut monet Gal.

De causis sputi sanguinis.

Causa eius primitiua sunt percussio, casus, uociferatio, acuitas uocis, uomitus laboriosus, cibi acuti, calidi, timor & angustia sanguinem acuens, sanguisuga gutturi inhaerens, frigus constringens, caliditas dissoluens, &c.

Causae antecedentes sunt multitudo materiei & ciborum, aut retentio menstruum, aut sanguis ex haemorrhoidibus, aut abscissio membri, aut acuitas humorum, aut uehementia motus, aut flatuosus spiritus, &c. Causae coniunctae sunt, quia si proueniat à uenis, erit aut incisio, aut perforatio, aut apertio, aut erosio, aut ualida abstersio: si uerò non prouenerit à uenis, tunc erit uel uulnus, uel ulcus, quod à corrosione, uel putrefactione, uel ab abscessu sanguineo fiet, &c.

Loci consentientes de causis sputi sanguinis.

Auic. decima tertij, cap. 4, Causa primitiua fit ex percussione aut casu super pectus aut super hepar, aut à re incisua, aut à tussi frequenti, aut à uociferatione, aut ab acui-

tate uocis sine gradatione, aut à rixa, aut à uomitu laborioso, & propriè in preparatis, aut assumptione solutiuerum acutorum, aut ciborum calidorum, aut à timore & angustia sanguinem acuate, &c. Galenus 4. de lo. is affectis capite octauo, Voco precedentes causas, aut cùm aliquis ex alto, uel in ludo, uel in certamine ceciderit, aut ubi lapis uel lignum thoracem offenderit, aut ira cum exclamatione acuta uehementique uoce, ut cytharædis tragædisq; accidit, uasa diruperint: uide locum hunc fusius. De causis antecedentibus & coniunctis loquitur etiam Gal. 4. de loc. aff. cap. 5, Sanguis reijcitur uel rupto uel eroso uase aliquo, uel ore alicuius uenæ patefacto rumpitur uas, uel ob sanguinis abundantia, aut ob frigus à uicinis partibus contractum, aut ob innatam intemperiem. Quandoque ruptionis causa est aut uehemens motus, aut humorum abundantia qui unà cum crudo & frigido & flatuoso spiritu uenas extendunt, &c. Lege hancmet sententiam cap. 8. eiusdem: similiter 6. de symptom. cau. cap. 2. ad medium. Vide etiam

Auic. decima tertij, tract. 3. cap. 4. Similiter lege omnes practitantes.

De signis sputi sanguinis.

Quoniam locum cognoscere ex quo sanguis emanat necessarium est, ne inter stolidos quos redarguit Gal. computemur, diligenter aduertendum, quod si à capite sanguis fluat, quod capitis uel dolor uel aliud nocumentum præcessit, si proueniat ab arterijs, magno cum impetu exierit, eritque tenuior, rubeus cum claritate, uixque cohibetur. Si à pectore, præcessit dolor: tussis & grauitas, si à pulmone. Habes Hippoc. aphor. 13. lib. 5. ibi, Quicumque spumofum sanguinem expuunt, ijs è pulmoneeductio fit cum tussi multa, extenuatio corporis, alteratio in genis, &c. Nota etiam quod spumofus sanguis de mēte Auic. prouenire potest etiā à cana pulmonis. Si sanguis prouenerit à rupto uase, in primis erit multus, deinde paucus cum aliquali dolore. Si ab eroso uase, accidunt affatim sanguinis uacuationes, præceduntq; exigua sputa, atq; acres ex capite in pulmone destillationes, eritq; tenuis.

Sanguis ex apertione orificiorum in principio est paucus, deinde augetur, & est sine dolore, sanguis ab apostematibus, corrosionibus & ulceribus cognoscitur ex præcessione eorū, & interdum expuitur sanies, &c. Sanguis proueniens ex naribus faciliè cognoscitur, iū ex rubore faciei, tum quia dum exprimitur, nasus adhuc fluit. Vel rem breuius sic habe: Sanguis ab ore proueniens per quatuor modos cognoscitur, aut expuitur tantū, & est ex partibus oris: aut exit cum sreatu, & est ex colatorio, uel uuula palati & partibus eorum: aut exit cum uomitu, & prouenit uel à meri, uel à stomacho, aut ab hepate & finibus eorum: aut exit cum tussi, & tunc uel est ex pectore uel pulmone, aut cana, aut lacerto uocali, aut epiglotti, &c.

Loci consentientes de signis sputi sanguinis.

Gal. 4. de loc. aff. cap. 5, Cognoscitur sanguis qui à gula & uētriculo reycitur ex ipso uomitu: si ex spiritalibus partibus, ex ipsa tussi: si ex faucibus & gurgulione, ex sreatu:

si ex ore, ex simplici expuitione. Cognosces ex erosa uel exesa uena, si nulla precedente causa existere, sanguis plurim⁹ inter tussiedū reijciatur. Cognosces à pulmone educi, ubi fuerit sanguis spumofus. Cognosces à partibus pectoris emanare, si illic dolor adfuerit: nam in thorace multi adsunt nerui, quibus dolores percipi possant. Cognoscitur à primaria thoracis affectione fieri, si neque multū, neque rubrum, sed nigricantem grumosūque sanguinem coniecero, &c. Vide etiam cap. 8. huius lib. Item Paul. Aeginetam cap. 31. lib. 3. Itē Aet. ser. 8. cap. 59. Et Auic. 10. 3. tra. 3. ca. 4. Tibi ad unguē omnia intelliges. Vide etiam Mesu. cap. de exitu sanguinis ab ore: similiter Arcul. & alios practicanes.

De cura sputi sanguinis.

Primus scopus in medendo erit, sex res nō naturales ad frigidum & siccum ordinare, ut sanguis cohibeatur & frigefiat. Cibi igitur sint uiscosi glutinosique, stiptici & frigidi, quales sunt prisana hordeacea, uel ex amylo cōfecta, aut pisces uiscosi, carnes cras-

Qq i.

610 DE CONSEN. MEDIC.

se, pingues, & animalium extremitates. Cō-
 veniunt etiam caseus recens, portulaca, lentes,
 miliū, alica ac coriza. Bibatur aqua chaly-
 beata, uitetur exercitium, loquutio, &c. Se-
 cundus erit reuulsio, quæ fieri potest per
 phlebotomiam multoties repetitam, quæ pro
 singula uice sit modica. Hinc ualet ligare
 extrema, menstrua & hæmorrhoides euo-
 care, cucurbitulas natibus affigere, &c. Ter-
 tius est malam sanguinis qualitatem tempe-
 rare, reprimendo eius aquositatem, uel (ut ita
 dicam) biliositatem. Si enim fuerit aquositas
 illa pituitosa, præparetur cum rhodomelle &
 syrupo rosaceo, deinde euacuetur cum myro-
 balanis, chebulis & rheub. At si sanguis
 fuerit biliosus, digeratur cum syrupo rosaceo
 de semine acerosæ, de granatis, de omphacio,
 de citonijis, myrthino, de portulaca, cū aquis
 plantaginis, portulacæ, &c. deinceps eua-
 cuetur cum myrobalanis citrinis & rheub.
 cum cassia. Quartus est sanguinis cohibi-
 tio, quæ primū & statim fienda erit, ne
 fortè adeò uires agrotantis prosternat, ut
 difficultas sit in reuocando. Primū conue-

IN CVR. MORB. LIB. III. 612

nit portulaca, lapis hamatites, corallus, cornu ceruinum ustum, terra sigillata, bolus armenius, semen myrthi, flores & cort. granatorũ, gumi arab. &c. Sextus est, ut si sanguis in pectore uel uentriculo coaguletur, statim dissoluatur cum oxymelle simplici & composito, cum aquis hyssopi, scabiosæ: aliqui exhibent theriacam & coagula leporis, &c.

**Loci consentientes de cura
sputi sanguinis.**

Auic. 10. 3. tra. 3. cap. 6. loquitur de sex rebus supranaturalibus dicens, Et cibi conuenientes eis, sunt omne conglutinatium & oppilatiuum, & omne consolidatiuum, & omne infrigidatiuum sanguinis, prohibens feruorem eius, & custodiantur ab omnibus causis mouentibus sanguinem, ut sunt cibi calefacientes, saltus, clamor, rixa, coitus, loquutio plurima, &c. Vide de his latius Mesuem.

De Reuulsione loquitur Paul. lib. 3. cap. 31. Quibus destillatio cruentum sputum cõcitat, uena protinus debet incidi, & pro uiriũ modo sanguis detrahi. Auic. loc. cit. Cura est

Q. 9. 4.

ut succurratur cum phlebotomia basilica, in qua existimatur esse resolutio singularis, &c. Et fricentur eius extremitates & ligentur, incipiendo à superioribus ad inferiora, &c. Vide de his latius Marcum Car. Arcul. Gord. & reliquos practiçantes, &c.

Item Mesuem ibi, Secundam rem complens administrationes phlebotomiæ cum iterationibus, &c. De Rectificatione sanguinis loquitur Auic. loc. cit. ibi, Et sumant in potu medicinas frigidas conglutinativas, &c. Vide de his uberius Mes. & Arcul. De constrictione sanguinis loquitur Galen. 7. de comp. med. per loc. cap. 4, Curamus aperitionem osculi alicuius uasis per obturationem, & rupturam per eius conglutinationem, & uasorum erosionem per renutritionem erosorū. Obturatur osculum dilatatum per adstringentia, conglutinatur ruptum per eadem & quaecunque ipsis in compositione citra mordacitatem resiccantia, & glutinosi quid habentia miscent, ut lemnia terra. Renutriantur corrosa per cibos boni succi, & pharmaca carnem gignentia, &c. Vide fusius Gal. 5.

meth. cap. 5. 6. & 7. Item Aet. ser. 8. cap. 63.
Et Auic. ibi, Et confert tribuere ei in potu
trochiscos de charabe, &c. Vide de his iuxta
Arcul. Mar. Cat. Sauon. Guilielmum Plac.
Gordonium, & reliquos practicantes, &c.

Obferuationes de euacuatione.

Mesu. cap. de flu. sang. ab ore, Si fuerit
acuitas & inflammatio & ebullitio in san-
guine propter mixtionem cholerae acutae in
ipso, oportet ut euacuetur cholera prius, de-
inde phlebotometur: hoc enim est secundum
canonem artis, demum sequatur in frigidati-
o, &c.

Obferuationes in adstringentibus.

Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 4, Con-
ueniunt adstringentia ijs qui non tussunt sim-
plicia: sed illis qui ex pulmone, aut thorace,
aut arteria sanguinem reieciunt, miscenda
sunt adstringentibus calida, & tenuium par-
tium existantia, ut per totum corpus distri-

Q. q. ii.

butio fiat: ubi uerò circa stomachum aut alium affectio hæc contingat, huiusmodi pharmacorum mixtura opus non est, &c. Razes 15. comment. In ruptura uena pectoris & phthisicis noli prohibere sreatum perseuerante adhuc catarrhi descensu ad pectus uel pulmonem, &c.

Cohibentia sputum sanguinis.

Cohibent sreatum sanguinis, aloes, amyllum, balauſtia, barba hircina, betonica, bolus armenius, cinis cancri, cortices castaneorum, cauda equina, cætaurium maius, nux cupressi, cydonia, & eorum flores, coagulum leporis & hædi, colla piscium, corallus, corrigiola, coriandrum, cornu cerui uſtum cum dragacanzo, radix draconteæ, hæmatites, gummi arabicum & amygdalarum, cortex glandium, flores granatorum, hyosciamus, charabe, lachryma lentisci, litium, lutum sigillatum, mastix, fructus myrthi, mumia cum mastice, ænãthe, omphacium, cortex rad. oliuæ, cortex oli bani, albumen oui, pix, portulaca, plantago,

psyllium, rheubarbarum, rosa, succus rubij, salix, sandaraca, sanguis draconis, symphytum, synopida in ovo, cortex suberis, sumach, spina alba, spodium cum succo plantaginis, stercus apri, terra samia, triticum, uernix, uirga pastoris, hypocystis. Composita sunt, Trochisci hemathicorum Mes. in cur. sputi sang. T. de charabe, de terra sigillata, de papauere, de stella Auic. triphera saracenica Nic. theriaca maior Auic. sotira confectio, confectio mirabilis Mes. in cu. rufis hum. medicamen Andromachi Auic. phylonium persicum, diabolibanum Nic. loch de papauere Haly, diapaouer Mes. diasulphur Serap. aqua aluminosa, chalybeata, athanasia magna Auicen. I. 5. &c.

De prognosticis sputi sanguinis.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 25, Sanguis quidem supra qualiscunque fuerit, malus, infra autem bonus. B. Si immoderantia sanguinis adsit, siue inferne uel supernè exeat, semper malum est: immoderata enim nullo modo naturæ quadrat, &c. Et aph. 4 aph. 47, Excretiones
Q. 9. iiij.

in febris non intermittētibz liuida, cruenta, foetida, omnes mala. Et aphor. 4. aphor. 27, Quibus in febris sanguinis fluxerit multitudo quacunque ex parte, &c. Et aphor. 5. aphor. 3, Vbi sanguis plurimus fluxerit, singultus aut conuulsio superueniens, malum. B. Intellige nisi à plenitudine profiscatur, alioqui ad ualerudinem confert. Verum si ex euacuatione alius morbus sequatur, necessario prognosticum erit malum. Nam Hippoc. aphor. 7. aphor. 9, A profluvio sanguinis desipientia & conuulsio, malum. Et aphor. 6. aphor. 10, Caput dolenti & circundolenti pus uel aqua uel sanguis effluens per nares, aut os, aut aures, morbum soluit. Et aphor. 7. aphor. 15, A sanguinis sputo puris sputum, malum. B. Hoc intellige de sputo maligno quod ex pulmone educitur, alioqui sensus aphor. non esset semper uerus. Et aphor. 7. aphor. 37, Quicunque euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare: si uerò cum febre, malum: curare uerò acerbis & refrigerantibus, &c. Gal. 7. de compos. med. per loc. cap. 4, In reiectione

sanguinis, primum periculum est, ne immoderata euacuatio fiat, &c. Auic. 10. 3. tract. 3. cap. 4, Et ille cui accidit sputum sanguinis est preparatus ut adueniat ei ulcus pulmonis: & ille qui est à pectore, non est tantum timoris, quātum in eo quod est ex pulmone. Et multoties quidem est spurum sanguinis causa sanitatis apostematis in hepate aut splene, &c. Lege & aphor. 3. aphor. 29. ibi, Iuuenibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, &c.

Authores dissentientes circa sputum sanguinis.

- 1 Adserere, sputum sanguinis cum tussi semper à spiritualibus membris prouenire.
- 2 Adserere, spumosem sanguinem semper esse indicium affecti pulmonis.
- 3 Adserere, aperitiua in sputo sanguinis à retentione menstruorum facto conferre.
- 4 Adserere, omnem sanguinis reiectionem per superiora semper esse malum.

Confutatio dissentientium circa
sputum sanguinis.

Ad primum, Gal. 4. de loc. aff. cap. 5, Nos
uero sanguinem qui a cerebro ad gurgulionis
partes internas, ut ad fauces affatim descē-
dat, tuſſiendo educi ſæpenumero conſpexi-
mus, quippe gutturi ſubito irruens tuſſim mo-
uere poteſt: ex quibus reprehendit Medicos,
qui eruptionem periculoſiſſimam tanquam
pulmone affecto credebant.

• Ad ſecundum, Auic. cap. de ſig. ſpu. ſang.
Et quandoque eſt ſpumofus ſanguis ex cana
pulmonis proueniēs. Et paulò poſt, Et ſpuma
cū dolore pectoris ſignificat locū ægritudinis
unde non ſemper erit à pulmone ſpuma, &c.

Ad tertium, Auic. 10. 3. de cur. ſpu. ſang.
Caueant à cibis calidis & omnibus calefa-
cientibus, ſed aperitiua ſunt calida, igitur nō
conferunt. Præterea Hipp. aph. 7. aph. 37, Cu-
ra cum acerbis & refrigerantibus, nō calidis
& prouocantibus: ſed in hoc caſu fac ut mo-
net Gal. 5. meth. ubi per ſectionem uenæ men-
ſtrua prouocat, & nō aperitiuis. Nec ſtyptica
cū aperitiuis admiscenda ſunt, quā alcerū ab

altero facile in operatione impediatur.

Ad quartum, Gal. aph. 4. com. 25. inquit, eam quæ supra fit per os solam excretionem non esse semper malam, illa quæ fit per nares omissa, quæ etiã nō est mala, quoniam Hipp. aph. 7. aph. 37, Quicūque euomunt sanguinē, si sine febre quidē, salutare, &c. igitur non semper erit mala, &c.

De purulentis & tabe siue phthisi.

Empyema est purus collectio in media inter thoracem & pulmonem regione. Tabes uerò quæ à Græcis φθίσις dicitur, est pulmonis uel thoracis ulceratio cum febre de bili ac tussicula corpus consumens: nam à uerbo φθίω, quod est diminuo, dicta est: ex ulcere enim corpus cōsumitur, diminuitur, ac colliquatur. Hæc differt ab hectica, quum omnis phthysicus sit hecticus, & non e contra: præterea hectica tam ab ulcere, quàm à non ulcerato pulmone oritur. Marasmus etiam ipse consumptionem corporis importat quæ à febre acuta dependet. Tabis tres sunt species: una quum corpus non alitur,

ita ut summa macies oriatur, à Græcis ἀτρε-
φία dicta. Altera, ubi malus corporis habitus
est, in quo ferè omnia alimenta corrumpun-
tur, & hanc Græci καχεξία uocant. Ter-
tia est quæ à Græcis dicta est φθίσις, & fit
quum à capite in pulmonem catarrhus de-
scendit, & frequens tussis oritur. Interdum
tamen à medicis pro uno & eodem morbo
accipiuntur.

Loci consentientes de empye- mate & phthisi.

Paul. lib. 3. cap. 32. ἐμπύημα κατὰ τὰ νε-
ρὰ τοῦ θώρακος ἢ τοῖ κατὰ τὸν ὑπεζωκότα σπλῆ-
νατα, id est, si uerbum uerbo reddideris, Em-
pyema in uacuis thoracis regionibus, uel in
membrana costas subcingente colligitur.

Gal. lib. de tum. præter naturam, cap. 3.
ἐμπύους, hoc est purulētos dicunt, quibus pus
in media inter thoracem & pulmonem re-
gione fuerit collectum. Similis sensus habetur
5. meth. cap. 8. & aphor. 6. comment. 27. &
4. de loc. affect. cap. 5. Aet. ser. 8. cap. 67,
Phthisis propriè est ulceratio pulmonis ad

sanguinis spuitiones consequens. Gal. aphor. 7. comment. 16, Quam propriè phthoen nominant Græci, hanc Hippocr. phthisim appellat, quæ pulmonis ulcera insanabilia consequitur, & totius corporis cū febre parvam extenuationem. Vide etiam hanc definitionem in lib. de fin. med. & 5. de loc. affect. cap. 3. Vide etiam Mesu. ibi, Phthisis est detrimentum desiccationis & consumptionis, cadens in corpus ex calore februm habitualium & ulcere pulmonis.

De causis empyematis & phthisi.

Empyema fit uel à sanguinis eruptione, uel ab ulcere, aut ab inflammatione abscessa & rupta, aut à catarrho à capite ad pectus fluente. Causæ primitivæ phthisis sunt aër, motus violenti corporei, regio borealis frigida & sicca, cibi & potus salsi & acres ac caput replentes, casus, percussio, autumnus pluviosus, & temperies ægri frigida & sicca, &c. Causæ antecedentes sunt destillatio acris mordicans ac corrodens, aut præcedens peripneumonia iam putrefacta & ulcerata,

aut pleuritis rupta, aut putrefactio & corrosio præcedens in substantia pulmonis, aut aliqua causarum sputi sanguinis uenam aperiens, &c. Causa coniuncta est ipsa materia producens phthisim ad actum, &c.

Loci consentientes de causis empyematis & phthisis.

Paul. lib. 3. cap. 32, Purulenta scretio fit uel propter sanguinis eruptionem, aut ab ulcere in pulmone, aut ab inflammatione abscessa & rupta, aut à destillatione à capite fluente ad pulmonem, &c. De causis primitiuis plura habes ex Auic. 10. 3. cap. 15. ibi, Et causa extrinseca est sicut casus & percussio, aut multiplicatur quum æstati boreali sicca succedit autumnus pluuiosus, &c. Vide de his Arcul. fusius. De causis antecedentibus loquitur Mes. cap. de phthisi, ibi, Ulceratio huiusmodi causam habet, aut ex præcedenti catarrho acuto, ulceratiuo, instillante in pulmonem, quandoque ex præcedenti pleuritide aut peripneumonia, &c. lege eum fusius. Lege etiam Auic. 10. 3. tract. 4 cap. 19, ibi, Cau

ſæ ulcerum pulmonis ſunt catarrhus mordi-
catus, &c. Vide etiam Gal. 4. de loc. affe.
cap. 8. fuſius de his cauſis pertractantem &
alios practiſantes, &c.

De ſignis empyematis & phthiſis.

Signa ab exeuntibus ſunt ſputū ſaniei cum
ſignis ſuis, urina eſt naturalis, uerū inter-
dum oleaginea, interdum habet ſurfures, quæ
omnia humidi conſumptionem ſignificant: in
proceſſu morbi lienteria aut diarrhœa ſu-
peruenit, & ſudor in fine digeſtionis. Signa
à qualitate mutata ſunt febris continua uni-
formis, genæ liueſcunt, pedes tumefcunt, car-
nes conſumuntur, unguis curuantur, palli-
di apparent. Signa ab actione læſa, malè dor-
miunt, pulſus minutus, frequens, uniformis, di-
uerſus in fine, anhelitus naturalis, ſed in fi-
ne ob uirium imbecillitatem diuerſus, appe-
titus deiectus, & quod ſurſum uergit, fœdi eſt
odoris, &c.

Loci conſentientes de ſignis.

Hippocr. prædict. 2. ſex. 60, Cognoscuntur

purulenti principio si febris non dimittit: sed
 interdum tenuior, nocturne uehementior. Si copia
 sudoris elicitur, ac tussendi cupiditas adsit,
 nec quidquam tamen dignum commentatio-
 ne expuunt, si oculi caui redduntur, maxillæ
 ruborem contrahunt, ungues manuum curuan-
 tur, digiti potissimum summi calescunt, in pe-
 dibus tumores consistunt, neque cibum appe-
 runt, & pustulæ circa corpus erumpunt,
 &c. B. Causas horum signorum habes in com-
 ment. Galen. Lege de his Paul lib. 3. cap. 32.
 ibi, Phthisis confirmata, &c. Lege etiã Gal.
 2. de morb. cau. ca. 7. & fusius 1. de diff. feb.
 ca. 9. Lege etiã Aet. & Paul ibi, Pus collectũ
 attestatur grauitas pectoris, tussis ualida sic-
 cãque, &c. De signis preparatorũ ad phthi-
 sim loquitur Gal. & Hipp. aphor. 5. aphor.
 9. ibi, Tabes fiunt, &c. Et Auic. 10. 3. trac. 4.
 cap. 20. ibi, Isti sunt alati, habentes pectus stri-
 ctum, &c. ubi infert quod collum gracile &
 longum præ se ferunt, & humeros ad modum
 alarum & scapulas quasi à pectore semotas
 habent, si macilenti sint, & carnẽ cum humorũ
 acrium influxu mollem habeant, ad phthisim

inclinati sunt. Vide de his fusius Arcul. & Galen. de diff. feb. 1. cap. 9. Cognosce etiam ex Gal. & Hippo. prognost. 2. tex. 62. Quatuor eruptionis suppurationis signa, quæ sunt dolor, spirandi difficultas, tussedo, & screatio: quæ si contineantur, & uehementer infestent, celerè significant eruptionem: si minus, diuturniorem, &c.

De cura phthisis & empyematis.

In primis an phthisis curari possit, lege Conciliatorem differentia 193. Si curanda erit, unica erit intentio, ut uidelicet causam tam conseruatricem, quàm productricem amoueamus: quæ si fuerit à sanguine, per sectionem uenæ reiteratā: si à bile, per cholagoga: si à phlegmate, per ea quæ pituitam educunt: quanquam sciam Auicen. à Raze in hoc differre, ut ipse solutiua ad causam remouendam exhibeat, quæ à Raze ratione phthisis factæ interdiciuntur. Si uerò fiat phthisis à pleuritide, cura erit in capite pleuritidis nota. Si ab empyemate, tunc puris concoctio adiuuetur, deinde euacuetur: nam suppuratio si rum.

Rr.i.

patur, uel deorsum tender, & expurganda erit per aluum, intestina, ac uesicam: si sursum, uersus pulmonem, tunc per asperam arteriam elicitā tussi educetur. Verū si neutra harum uia à natura tentetur, superest tantū, ut locus in quo sanies consistit, ita aperiatur, ut extrudi possit. Si phthisis proveniat ab ulcere, tunc cura erit ut in primis ulcus abstergatur cum hydromelle, aqua hordeacea, cum cicerum ac zachari, uel cum decocto hysfopi, &c. deinde fluxus destillationum prohibeatur cū his quæ pulmonē roborant, sicut est syrupus myrrhinus, puluis pulmonū uulpi, &c. Tertiò, residuum permanens exiccetur cum melle & galbano, deinde ulcus consolidetur cum bolo armenio. Aliqui exhibent lac quod abstergendi & conglutinandi uires habet: sunt qui exhibent aquam hordeaceam cum cancriis fluuiatilibus coctam, & precipuè confert, &c.

Loci consentientes de cura phthisis
& empyematis.

Mesu. cap. de phth. Primam rem complent

quæ abscindunt nocumēta catarrhi, & si cau-
sa eius fuerit ex empyemate, peripneumonia
& pleuritide, cura eorum dicta est. Secundam
rem complent euacuationes causas abscinden-
tes, unde si cognoueris ex plenitudine sangui-
nis, phlebotomamus ex basilica: si choleram
abundare, euacuamus. Auicen. cap. de empye.
Cūque eruperit sanies, & existimas quod
pauca sit, ut mundificetur cum sputo ad qua-
draginta dies, tunc oportet ut administren-
tur post eam abstersiua, lauatiua, mundifi-
catiua, dādo ea in potu, quum incipit expui,
id quod erumpitur, & cum decocto hyssopi
rad. lilij, syrup. de melle, &c. Paul. lib. 3. cap.
32, Puris concoctio primū adiuuanda est
fomentis, cataplasmatibus: promouet etiam ru-
pturam uomicae sani lateris incubitus, mulsæ
sorbitio & succus ptisanæ cum melle. Valen-
tius decoctū hyssopi & thymi cum melle, &c.
Vide latius de his Galen. 5. meth. cap. 8. &
Aet. ser. 8. cap. 65. & de cura ulcerum, 5. me-
theo. cap. 1. & Auic. de cura ulcerū partium
pectoris, & inuenies quacūque à me dicta
sunt, &c.

Rr. ij.

Obferuationes in cura.

Galen. 5. meth. cap. 8, In ulcere pulmonis primū fac, ne magno ager utatur respira-
tu, sed semper agat silētium. Præterea statim
à ruptura uasis facta, curā incipias, quò cru-
entum adhuc uulnus priusquam phlegmonem
excitet, glutines. Mes. cap. cit. Quando con-
solidatio & cōglutinatio uulneris queritur,
tunc cibaria sint desiccatiua, non eleuata in
gradu, multæ exiccationis, & sint cōglutinan-
tia, ut sunt extremitates porcorum & hædo-
rum, &c. Et paulò infra, Prohibeatur eis o-
mnis lubricitas uentris & constipatio uisce-
rum: nam lubricitas uehemens resoluit uirtu-
tem, &c.

Conferentia tabidis.

Conferunt tabidis, ius adipis capræ bibitū,
amylum, barba hirci cum aqua hordei, beto-
nica, lutum armenium, butyrum, decoctio can-
crorum, dragacantum, sænugræcum, gumi al-
botim, peucedanum, pix humida, plantago,
portulaca, confectio dicta mirabilis. Mes. in
cur. tus. hu. loch de pino, de papauere, Troc.
de papauere Haly. Phthysicis conferunt ra-

dix acori cum ptisana, & betonica, berbena-
 ca, cancri cum aqua hordei, decoctio scilicet
 citoniorum, cocleæ cum uino, iecur apri uel
 lupi, semē lini, lantum armenium, marrubium,
 porrum, pulmo cerui, plantago, salvia, stercus
 uaccarum, confectio de satyrion Mes. confe-
 ctio dicta mirabilis, confectio de iacur. Mes.
 in curanda phthi. diadragacantum, diape-
 nidion, diarrhodon, diapapauer Nic. phylo-
 nium rom. loch de spodio Auicen. loch al-
 bum Mes. in cu. russ. hu. Syrup. de papauere,
 uiolaceus de hyssopo, de psyllo. Mes. Triasan-
 dali Nic. Troc. de camph. Mes. de citonys Se-
 rap. de arsenico & zacharum ros. nouum.

De prognosticis phthifis & empyematis.

Aet. ser. 8. cap. 65, Quoniam rumpuntur
 suppuraciones uel sursum uel deorsum. Quæ
 uerò sursum, in uacuum thoracis locum fun-
 duntur, & periculosiores sunt. B. Nota quòd
 suppuratio multis modis terminatur, aut sta-
 tim sua multitudine suffocat, aut à collunie
 pulmo putrescit, unde phthifis, aut sputo ex-
 Rr. ij.

purgate liberatur, aut per uiam magnæ uenæ ad uesicā cū urina crassa extruditur, aut per uia secessus per intestina euacuatur, aut per tumorem in cute pectoris enatum & ruptum educitur, qui modi ferè omnes præter primos optimi reputantur. Hippo. aphor. 5. aphor. 11, Qui à tabe molestantur, si sputum quod extussiunt, graue olet iniectū carbonibus, & capilli à capite defluunt, lethale. B. Capilli defluunt uel ob maximum alimēti defectum, uel ob humorum perniciosam corruptionem, & est pessimum signum.

Hippoc. aphor. 5. aph. 12, Quibuscūque tabe laborantibus capilli à capite defluūt, & alius profluuio superueniente moriuntur. Et aphor. 5. aphor. 14, A tabe habito profluuium alui superueniens, lethale. Et aphor. 6 aphor. 27, Quicunque suppurati, aut aquam intercutem patientes uruntur, aut secantur, si pus aut aqua uniuersim effluxerit, omnes moriuntur. B. Vide etiam aphor. 10. & 13. & 22. & 29. lib. 3. circa hanc materiam: item 8. lib. 4. Et aphor. 7. aphor. 16, A puris sputo phthisis & fluxus: quū uerò sputum retinetur, moriuntur.

tur. Aet. ser. 8. cap. 67, Difficillimè curantur
 ulcera pulmonis, eo quòd citra tussim non
 repurgantur, & à tussi mutuo ulcus corrup-
 pitur. Præterea pharmacorum vires ad ulcus
 pertingere non valent, priusquam in uentre
 permutantur. præterea pulmo per spiratio-
 nes semper mouetur, & tussiendo lancinatur.
 Itidem si curentur, ita ut fistulosa & callo-
 sa cicatrices relinquantur, progressu tempo-
 ris fricantur, & leui ex occasione recidi-
 uatur. B. Vide de his fusius Gal. 5. met. cap.
 8. & 7. de compos. med. per loc. Intellige ta-
 men tu ut Gal. q̄ ulcera in superficie pul-
 monis facta curari possunt, sed antiqua &
 à phlegmone facta difficulter, uel planè nū-
 quā sanari possunt. Vlcera uerò pectoris fa-
 cilius curatur, tū quia carnosum est pectus,
 tū quia paruo motu indiget, tū quia substā-
 tiam ita mollem & ad erosionem pronā non
 habet ut pulmo. Vide de his latius Gal. loc.
 cit. & 4 de loc. aff. cap. 5. ibi, Vlcera in
 pulmone, &c.

Hippoc. aphor. 5. aphor. 15, Quicumque ex
 morbo laterali suppurantur, si in 40. diebus

Rr. iij.

purgatur à die qua fit ruptio, liberatur, si minus ad tabem trāseunt. Et prognost. 2. tex. 63, Supersunt, quos febris eodem die dimiserit, & cibum citius appetunt, & à siti liberati sunt, & uenter exigua & cōsistentia deijcit, & pus album leue & cōcolor est, & sine labore ac tussi ualida reijcitur. Qui uerò contrarium habent, pereunt, &c. Et 2. prognost. tex. 52, Quicumque dolor circa thoracem & pulmonem non desinit, adhibitis opportunis auxilijs, in suppurationem uerti sciendum est. Vide textus alios sequentes ad prognosticum etiam maximè spectantes.

Gal. 5. meth. cap. 8, Si phlegmone semel inuaserit, exigua glutinādi est eius spes, in longius tamen protrahere potest tempus, &c. B. Ratio est, quia in pulmone nec sanies nec pus elui potest, quod in phlegmone soluta prima est intētio, nec uulnus glutinari, quum in perpetuo motu ob respirationē pulmo sit.

Authores dissentientes circa empyema & phthisim.

I Adserere, omne empyema esse per incisionem uel uersionem curandum.

2 Adserere cum Erasistrato, nihil ex thoracis spatio in pulmonem posse recipi.

3 Adserere, phthisim fieri posse à siccitate per se.

4 Adserere, humiditatem per se posse pulmonem ulcerare.

5 Adserere, phthisim ex ulcere pulmonis antiquo esse curabilem.

6 Adserere, lac nullo modo competere phthisicis.

7 Adserere, zacharū rosaceum recens nullo modo conferre phthisicis.

8 Adserere, abstergentia expurgantiāque solū in phthisi conuenire.

Confutatio dissentientium circa empyema & phthisim.

Ad primum, Galen. aphor. 6. comment. 27, Vstione tantū indigent qui plurimum habent puris, adeò ut desperent per spuitiones posse expurgare: sed omne empyema tale non est, igitur nec per incisionem curandum, &c.

Ad secundum responderet Gal. 5. de loc. aff. cap. 3. ibi, Ii nāque uel ex thoracis spatio in

pulmonē quippiam recipi impossibile esse si-
bi persuadentes, &c. & ibi docet modum &
uiam qua fit hic transitus. Similiter & 5.
meth. cap. 8.

Ad tertiū, Gal. aphor. 3. cōment. 16, Mor-
bi tabitudines nominati ad has duas sequū-
tur constitutiones, & ad frigidissimam, ex
qua nōnulla ex uasis quæ sunt in respiratio-
nis instrumentis dirumpuntur, & ad alteram
quæ coniunctam habet cum caliditate humi-
ditatem, quarum occasione caput repletum
mittit ad pulmonem fluxiones: à sicca uerò
constitutione omnia alia magis quàm tabi-
tudines consequuntur, & sic à siccitate nullo
modo phthisis oritur.

Ad quartū, Cōciliator differētia 193. in
eius appēdice inquit, q̄ humiditas per se non
causat phthisim, nisi fuerit coniuncta humi-
do catarrhali uel caliditati uel frigiditati.

Ad quintum, Gal. 5. meth. cap. 8, Vlcera
pulmonis non modò ad curandū sunt diffici-
liora, sed quibusdā etiā impossibilis eius cura
uidetur, & hoc ratione & experientia. Ra-
tione, quoniam pulmo est semper in motu: sed

quæ sunt sanāda, quiete indigēt. Experiētia, quia neminem eorū ita affectorum sanatum uiderim. Item 4. de loc. aff. cap. 8. multos ex hoc morbo defecisse, imò inquit, quapropter omnes perire necesse est.

Ad sextū, Gal. 5. meth. cap. 12, Veteres uerò etiā mulierē lactātem, ijs qui phthoc consumeretur, ad stare uoluerūt, quorum sentētiæ ipse quoque accedo, &c. Vbi lac summopere cōmendat. Itidem adserit septimo meth. cap. sexto, Præterea id quod est facilis assumptionis, optimæ digestionis & bonæ nutritionis, itē optimè humectās, cōsolidās & abster-gēs, cōfert phthisicis: sed lac habet has cōditiones, ut refert Auic. igitur est dandū phthisicis. Quare si ab alyis irritetur, idcirco fit, quia in febre putrida non competit, &c.

Ad septimū, Auic. decima tertij, tra. 4. ca. 6, Vnum de maximè conferentibus phthisicis est, zucharum rosaceum, & ex eis quæ multotiens sum expertus, in corporibus & regionibus diuersis est, ut utatur pane zucharo ros. & si angustetur anhelitus, detur in potu syrupus de hyssopo: & si inflāmur,

636 DE CONSEN. MEDIC.

dentur trochisci de camphora, &c. Mesu. Ex rebus mirabilis iuugamenti ad consolidationes & sanationes ulcerum pulmonis est zucharum ros. recens & supra quod non præterijt annus, &c.

Ad octauum, Conciliator differētia 194, Medici plerunque errant circa phthisis curationem, eo quòd uolentes purgare sanient tantum abstersiuis, eam expurgatibus utuntur, ut sanguinis sputum denuò inducāt, &c. ibique notat zucharum ros. non nisi præcedētibz mundificatiuis esse exhibendū, &c.

De pleuritide.

Pleuritis duplex, uera & mendosa. Vera est subcingentis costas pectoris membrana cū suis musculis inflāmatio, cum dolore punctiuo & acutissima febre. Mendosa uerò est inflammatio in panniculis pectoris extrinsecis. Intrinsecus enim in pectore tres continētur mēbranae, quarum quaedam à Grecis dicuntur *ὑποϋσχωρῶτες*, id est subcingētes Latine, Arabicè pleurae: quæ uerò rectè per medium thoracis ad iugulum feruntur, & g-

φρακτορες, id est intersepientes, barbarè mediastinum dicitur, deinde diaphragma, &c.

Loci consentientes de pleuritide.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 3, Inflammationes quæ in subcingētes costas mēbrana ac muscu-
lis illi continuis fiunt, morbum quem latera-
lem uocant, efficere solent. Hæc eadem sen-
tentia est iuxta Gal. de part. art. med. cap.
4. & de constit. art. med. cap. 15. & aphor.
6. cōment. 33. ibi, Qui acidum ructum, &c.
Mesu. Pleuresis quædam uera, quædam non
uera. Vera est apostema cadens in pāniculis
& lacertis, &c. Non uera quæ fit in lacer-
to & uelamine extrinsecus, &c. Vide de his
Auic. decima tertij, cap. de pleuritide. Item
Alex. & Aet. ser. 8. cap. 68. ibi, Pleuritis ex-
quisita & propria est inflāmatio membra-
næ extrinsecus latera succingentis, dolorem
punctiuum uehementer inferens, cum acutis-
sima febre, &c.

De causis pleuritidis.

Causæ primitiue sunt casus, percussio pe-

638 DE CONSEN. MEDIC.

etoris, denudaréque se post laborem in aëre frigido, uenti septentrionales, aquæ frigida potus & similia. Cause antecedentes sunt humorum influxus, uel eorum superabundantia, uel retentio superfluitatum exire consuetarum. Cause coniunctæ sunt sæpius sanguis & bilis inflammationem actu producentes, rarò pituita, rarissimè melancholia, quia quod est densius, rarò ad hæc membra penetrat, &c.

Loci consentientes de causis pleuritidis.

Gal. lib. de cōstit. art. med. cap. 5, Inflammatio ex humorum influxu suboritur, quia hæ partes non aequè ut cutis sunt densæ & cōpactæ, sed raræ potius. Et aphorif. 6. comment. 33. idem adserit, ibi, Quum unaquæque inflammatio ex alicuius humoris, &c.

Auicē. decima tertij, cap. de pleu. Et materia huius apostematis ut plurimum est cholera, aut sanguis cholericus, quoniā in membris tunicosis non penetrat, nisi subtilis sanguis cholericus uel purus, &c.

Mesu. cap. de pleu. Commune est intrinsecis ac extrinsecis p̄niculus ab omni materia apostemari, uerum à sanguine & cholera frequentius, à phlegmate & cholera nigra rarius, &c. & hac de causis antecedentibus & coniunctis. De causis uerò primitiuis lege Arcul. Gord. Sauona. & Auic. ibi, Et quandoque facit pleuresim multitudo potus aqua frigida, & frigus additum, & facit euenire caliditas uehemens, & potus uini puri, &c.

De indiciis pleuritis.

Signa pleuritis inseparabilia sunt febris acuta, dolor punctorius, modò ad iugulum, modò ad praeordia tendens, spiratio frequens & exigua, pulsus serinus ac durus, tussis magna, interdum cum sreatu, interdum absque sputis, quorum signorum si unum deficiat, uera pleuritis esse non potest. Signa materiae inflammationem efficientis sumunt ex colore sputi, unde si rubeus fuerit, sanguinolenta erit inflammatio: si flauus, biliosa: si spumofus, pituitosa: si niger, bi-

lis affata. Signa pleuritidem ab inflammatione hepatis interstinguētia sunt, quia loco, pulsu, dolore, colore & tusi differunt. Loco, quia infra costas in dextra tantum parte sentitur durities uel tumor. Pulsu, quia in inflammatione hepatis undosus est. Dolore, quia non acutus, sed grauis. Colore, quia facies malè colorata. Tusi, quia adest sine screatu spirationēque maiori, cōtrā uerò in pleuritide. Signa quibus differt peripneumonia à pleuritide sunt, quia in peripneumonia pulsus est undosus, & genarum male rubent ac si fuco deliniarentur. Signa quibus differat à phrenitide sunt, quia pleuritis sine alienatione, praesertim dum incipit, prouenire solet: contra uerò phrenitis cum alienatione incipit, & cum anhelitus constrictione desinit, &c.

Loci consentientes de indi- ciis pleuritidis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 3, Huius signa inseparabilia sunt, febris acuta, dolor perinde ac si locus intēdatur uel pungatur, spiratio fre-

quens & exigua, pulsus parvus arteriam duram & quodammodo intensam demonstrans, tussis magna cum sputis coloratis, nonnunquam sine his, &c. Orib. aphors. 1. comment. 16. ibi, Accessiones, &c. Signa inquit pleuriticorum sunt quatuor, scilicet tussis, respiratio difficilis, febris, & dolor acutus, quorum unum si deficiat, pleuritis esse non potest. B. Habentur hæcmet signa ab Hippoc. 4. de uic. in mor. acu. tex. 72. & lege causam horum signorum ex ipso Gal. in comment. Gal. de constit. art. med. cap. 15. ex colore sputi, quis humor peccet, nobis demonstravit, ibi, Si sputum colore rubro inficitur, tunc sanguinolentum erit: si flauo, biliosum: at si spumosa excreentur, pituitosum: si niger fuerit screatus, tunc iudicandum an fluxio siue biliosa siue sanguinolenta assetur, &c. Lege etiam fusius 5. de loc. aff. cap. 3. & aphor. 6. comment. 33. ibi, Quæ à flauis ac ruffis sputis fit ex biliosis humoribus, &c. De alijs signis quibus ab alijs morbis interstinguatur pleuritis, fusius habes iuxta Paul. lib. 3. cap. 33. & à Gal. 5. de loc. aff. cap. 3. De signis pleu-

viridis mendosa fit mentio à Galeno ibidem,
 §. de loc. aff. ibi, Sunt & alij laterum dolores
 cum febre & exigua respiratione, &c. &
 sunt hæc, grauitas lateris sine tussi, nullū red-
 ditur spurū, dolor extrinsecus est, tumor de-
 inde extrā apparet, &c. Signa concoctionis
 pleuritidis habētur ex Galeno in cōment. 12.
 lib. primi aphoris. ibi, Accessiones & consti-
 tutiones morbi indicant, &c. Lege Galenum
 etiam secundo de loc. aff. cap. 9. ibi, Quòd si
 tussiendo nihil expuat, fieri potest ut nihilo
 minus pleureticus sit ille, &c.

De cura ipsius pleuritidis.

Cognoscas id in primis licet, an notha uel
 uera sit pleuritis: si notha, tunc cura tenta-
 tiua utitor cum foru tum humido tum sicco,
 quale est decoctum camomillæ, anethi, melli-
 lothi, semine lini, fœnugræci, &c. uel saccu-
 lum ex sale, milio, fursure, &c. & cum his
 quæ potius uentrem leniunt, quàm ualidè sol-
 uant. Si uera fuerit pleuritis, uel ad resolu-
 tionem, uel suppurationē, uel ad alium mor-
 bum trāsmutabitur. Si ad resolutionem, tunc

in primis id quod influit reuellendum cum sectione uenæ, cum leuibus clysterijs, cum cucurbitulis cruribus applicitis, cum fricatione partium inferiorum. Secunda intentio erit materiae præparatio, quæ si fuerit sanguinea uel biliosa, præparabitur cum syrupo uiolaceo, iuiubino, cum aquis uiolarum, hordei, citruli, melonis indi, cucurbitæ, &c. uel cum decocto rerum pectus frigidantium. Verum in materia biliosa requiritur id quod plus infrigidet & humectet quàm abstergat, in sanguinea plus abstergat quàm humectet, in pituitosa plus abstergat quàm infrigidet, quale est decoctum hyssopi & syrupus de liquiritia, hydromel & oxymel. Tertia intentio est euacuatio à loco, in quo fit inflammatio, & perficitur cum sectione uenæ ex eodem latere patiente, uel solutione uentris, ubi materia ad has partes declinet: nam quò natura uergit, eò ducere oportet per loca conferentia, & hæc fiet tutius per cassiam, mannam, rheubarbarum. T. de agarico, de uiolis, &c. Quarta intentio erit spiritus euocatio ac faciliseductio, & perficitur

Ss. ij.

cum uleb & syrupis iam dictis, uel aliquo eclegmate, uel inunctione ex oleo uiolaceo, amygdalino dulci, &c. Quinta intentio est residui resolutio, quæ fiet cum topicis in modum emplastri & fomenti cum camomilla, &c. Si uero ad suppurationē uertatur, prima intentio erit puris cōcoctio, quæ fiet cum emplastris ac unctionibus mollientibus, sicut cum oleo amygd. dul. butyro, adipe gallinæ, &c. Secunda intentio est rupturæ uomicæ promotio, quæ fiet cum ualida russi, & cum his quæ dilataant pectus, qualis est mulsæ sorbitio, incubitus eiusdem lateris cum ualido corporis motu, &c. Tertia intentio est, abstersio cum aqua sacchari uel hydromelle, cum iure cicerum. Quarta intentio erit conglutinatio, & perficitur cum bolo armeno & cum similibus, &c. At si ad alium morbum transmutetur, cura eiusdem morbi curabitur, &c.

Loci consentientes de cura pleuritidis.

Hippoc. 2 de uic. in mor. ac. tex. 1, Lateris

dolorem siue is per exordia fuerit, siue postea exortus sit, tentare calidis fomentis dissoluere non abs re existit, &c. & hac de cura nothæ tentatiua, ubi laudat fomēta ex aqua calida, & quæ ex sale & milio parantur. Auic. de cur. pleu. plura habet, ibi, Verūm humida cūm non iuuant, non nocēt, &c. De cura ueræ pleuritidis loquitur: deinde Hippoc. 4. de uic. in mor. ac. tex. 73. ibi, Si dolor sursum uel ad clauiculam, uel ad mammam, uel brachium ascenderit, uenam brachij internam secare oportet, qua parte dolor afficit, sanguinemque auferre pro corporis habitu, anni tempore, etate, immò si dolor acutus fuerit, usque ad animi defectum detrahes, postea clysterē exhibebis: si uerò sub thorace dolor fuerit, pleuretico uentrem subpurgabis. Lege etiam secundo de uic. in mor. ac. tex. 10. 11. ubi non ad animi usque defectum uenam secare iubet, sed eousque extrahere, donec rubidior multò, aut pro rubido liuidus fluxerit, &c. Quoniam latere secunda sit uena, dubitauit primus Gentilis, deinde omnes neoterici: quanquā meo iudicio ef-

ss. ij.

ficaciores sint eorum rationes, qui à parte
 læsa dicunt extrahi, quàm qui ab opposita.
 Pro his lege Manardum lib. 12. epistolarum
 ad Iacobum Pharusium, plures rationes ad-
 ducentem. Galenus secundo de uic. in mor.
 ac. comment. 11, Tutius est per uenæ sectio-
 nem euacuare, quàm per purgantis medica-
 menti administrationem, etiam si ad hypo-
 chondriorum regionem dolor finiatur, im-
 mò per uenæ sectionem nullum impendet pe-
 riculum, eo discrimen maximum subeunte,
 quod per purgationem tètatur, maximè quū
 morbus hic acutus sit cum febre uehementis-
 sima. Quòd etiam diuersio ad hanc inten-
 tionem spectet, lege Auicen. ibi, Oportet ut
 prohibeas materiam eueniētem cum euacua-
 tione & attractione, &c. De secunda inten-
 tione loquitur Mesu. ibi, Mundificationem
 corporis oportet ut præcedant preparatiua
 ad materiei digestionē necessaria, & si ma-
 teria fuerit cholericæ, requiritur infrigida-
 tio maior cum humectatione non spoliata
 à uirtute abstersionis, &c. Si materia erit
 sanguinea, requiritur uirtus infrigidationis

minor, & abstersionis maior: si phlegmatica, requiritur minor infrigidatio, & maior abstersio. De tertia intentione loquitur Auicē. decima tertij, de cur. pleu. ibi, Dicamus igitur, quod cura est phlebotomia, si sanguis fuerit uincens, & si est humor alius, euacua non cum eis quæ sunt sicut myrobalani, &c. Paul. lib. 3. cap. 33, Recentiores omnibus uenam incidunt, ueriti, ut opinor, turbationem, quam purgatio solet accersire, &c.

De quarta intentione plura habes ex Mesue, ibi, Quintam rem complens administrationes medicinarum sputum facilitantium, quæ fiunt cum humectantibus & lenificantibus, procedēdo ad res temperatæ abstersionis, &c. Auicē. loc. cit. Oportet ut sit tua magnifica intentio ad hoc ut sputum facile sit, & ex eis quæ multiplicat sputum, est dormire super latus infirmum, &c. De alijs intentionibus curatius habes etiam plura ex Auicē. loc. cit. ibi, Et ex eis quæ sunt sollicitè attendenda est, ut succurras maturationi ægritudinis, & si sanies fiat, oportet
Ss. iij.

ut succurras cum mūdificatione, &c. lege de his uberius Mes. Marc. Cat. Arcul. Gordonium, & ceteros practicanes.

Obferuationes circa curam tentatiuam.

Mesu. cap. de pleu. Et canon est, debere ab humidis & debilioribus incipere, & quāto compactior & siccior fuerit materia, tanto tardius ad fortiora prorumpere, ne resoluitur quod est subtile, & cadat durities in residuo. Cauēdum insuper, ne uapor ex euaporatorijs ad nares egri ascendat, dissolutionem enim & tristitiam & anhelitus constrictionem generat, &c.

Hippocr. secundo de uic. in mor. ac. tex. 9, Verūm si fomentis dolor non placetur, non diutius calefacito: siccatur enim id pulmones, atque ad suppurationem excitat, &c.

Obferuationes in phlebotomia.

Auic. decima tertij, cap. de pleu. Cūmque phlebotomas & euacuas, & non sedantur accidentia, tunc scias quod prohibitio collectionis, quam quæris, difficilis est: non igitur

tur reiteres phlebotomiam, ut non congeletur materia, quæ habitura est collectionem. Et post hac, Dispositio debilitatis uirtutis non est quæ tolerare possit phlebotomiam & solutionem, sed necessarium est tunc uti clysterijs, &c. Mesu. Oportet phlebotomiã præponi solutius, nisi uentris fuerit constipatio, tunc enim præcipimus lenire prius naturam, &c.

Obseruationes in solutiuo pharmaco.

Auic. decima terti, cap. I, In solutiuo est timor magnus, ipsum nanque interdum mouet, & quandoque non soluit, & quandoque superfluit. Vide de his Gal. 2. de uic. in morb. ac. comment. 2. deinde inquit Auic. Nec soluatur uenter cum pharmaco laborioso, sed leniente, & utetur styptica, sicuti myrobalani.

Conferentia pleuritidi.

Conferunt dolori lateris & pleuritidi, amygdalæ, anethum, berbena, betonica, bdellium, brassica, galbanum, gentiana, malua, capillus Ven. uiolæ, horden, passulæ, iunibæ, penced. an, saluia, uerbascum, urtica, iris il-

lirica, colatura furfuris cocti in aqua hor-
deacea, althea, alchana, camomilla, carica,
hyssopus, penidij, zucharum uiolatum, &
quaecunque dicta sunt superius in capite pe-
ripneumoniae.

De prognosticis pleuritidis.

Hippocr. aphor. 3. aphor. 23, Hyeme uerò
morbi laterales, &c. Et aphor. 6. apho. 33,
Qui acidum eructant, non ualde morbo la-
terali corripuntur. Et aphor. 6. aphor. 16,
A morbo laterali uel pulmonia habito, alui
profluvium adueniens, malum. B. Intellige de
fluxu à natura non regulato: nam qui à uir-
tute regulante fit, etiam in principio, bonum,
nisi ullum aliud accidens fuerit, quod uirtu-
tē prosternat: unde Auic. Et fluxus in princi-
pio apparēs, bonū est signū, &c. Et aphor. 5.
aphor. 8, Quicumque morbo laterali laboran-
tes in 14. diebus non repurgantur, ū ad sup-
purationem uertuntur. Et aphor. 15. eiusdem,
Quicumque ex morbo laterali suppurantur, si
in 14. diebus purgantur, à die qua fit eru-
prio, liberantur: si minus, ad tabem transeunt.
Auic. decima tertij, cap. de pleu. Quae est

propinqua cordi & parti sinistra est dete-
rior, sed ad hoc ut maturetur conuenien-
tior, & quæ est remotior à parte sinistra,
est salubrior, sed ex parte resolutionis & ma-
turationis magis inobediens. Et paulò pòst,
Et apparitio fluxus sanguinis narium est ex
signis bonis ultimis in pleuresi. B. Adde tu,
quòd non tantùm à naribus, sed ab hamor-
rhoidibus & matrice proueniens sanguis in
casu laudatur. Galen. 10. meth. cap. 5, Si pul-
monis uel membranæ quæ costis subtenditur,
uel uentriculi, uel iecinoris phlegmone sit,
quæ has partes occupet, non modò his qui
imbecilles sunt uiribus, sed etiam quibus ua-
lentiores sunt mortifera esse solet. Hippoc. 3.
prorrh. tex. 5, Dolor lateris ex spuris bilio-
sis, si absque ratione euenerit, in furorẽ agun-
tur. B. Facto scilicet bilis ad cerebrum transi-
tu. Auicen. decima tertij, tra. 4. cap. 1, Et
quando accidit prægnantibus est pernicio-
sum, & accidens decrepitis ob debilitatem
uirium in spuenendo interficit. B. Nam solet
hominem interimere uel ex eius uehemen-
tia symptomatum, uel ex præfocatione.

Primo modo pregnantēs moriuntur, secundo decrepiti non ualentes materiam extrudere. Hippoc. lib. de aëre & aqua, Qui habet uentrem natura humidum, minimè morbo laterali atque alijs morborum generibus corripuntur. B. Hic locus citatur à Gal. aphor. 6. comment. 33. & ratio est, quia abundante bile aut pituita salsa & acri irritatur aluus ad deiectionem, in qua plures humores excerni solent, &c.

Authores dissentientes circa pleuritidem.

- 1 Adserere, pleuritidē posse fieri absque febre, Anaxionis exemplo.
- 2 Adserere, profluvium alui in omni pleuritide esse signum periculosissimum.
- 3 Adserere, pleuritidem plerunque fieri à tenui pituita.
- 4 Adserere, percussiva in pleuritide iam facta conferre.
- 5 Adserere, pleuritidem dextri lateris deteriorē quàm sinistri.

Confutatio dissentientium circa pleuritidem.

Impugnat primum Gal. aphor. 1. comm. 12. ibi, In morbo laterali acuta quidem febris una cum spirandi difficultate & tussi & dolore lateris pungēte signa passionis significatiua nominantur. Et 5. de loc. aff. ca. 3. uocat hæc signa inseparabilia, igitur absque febre fieri non potest.

Ad secundum, Gal. aphor. 6. comment. 16, In mediocri uerò morbo laterali profluvium alui superueniēs potest prodesse ratione euacuationis, & magis quum signa concoctionis apparuerint, inesse passionibus, neque adest timor, sed morbus est citra periculum.

Ad tertium, Gal. aphor 6. cōment. 33, Pulmo in omni parte rarus ac laxus, promptus est omnes suscipere humores, membrana autē subcingens plus bilioso, ob hanc igitur causam, quibus pituita natura superabundat, raro à morbo laterali corripimur, &c. Vbi habes non plerunque à pituita fieri.

Ad quartum, Gal. 2. meth. cap. 17, Parcius ad pectus est adstringentibus utendū, quando

alia humores, qui phlegmonem excitant, in pulmones & cor nonnunquam reprimant. Et paulo post, Quippe foras trahere potius, quàm reprimere in eo debemus. Itidem ait Auic. decima terij, in ser. communi de cur. doloris. Vnde non mirum si Mes. à Gord. hac de re derideatur, quum in eo morbi principio principiante nullum opus medici ab infirmo petatur.

Ad quintum respondet Conciliator diff. 100. & tenet quòd deterior sit respectu situs materiae, item ratione nobilioris partis, item quia seuiora fiunt symptomata, &c. Lege fusius ubi de peripneumonia agit.

De cordiaca passione.

Sunt cordis passionēs se inuicem consequētes numero tres. Prima, est cordis imbecillitas. Secunda, est palpitatio. Tertia, est cardiaca syncopa. Nam facta imbecillitate cordis uehementi agitur uirtus, unde palpitatio ex qua deinceps syncopis oritur, nec inter se differūt, nisi secundū magis & minus. Palpitatio est quædam dilatatio atque contra-

ctio præter naturæ ordinem facta: cardiaca
 uerò syncopa est innati roboris labefactatio
 & languor siue præceps uirium lapsus.

Loci consentientes de cardiaca
 passione.

Mesu. de agritud. cor. A Egritudines cordis
 sunt, debilitas pulsus, tremor & syncopis, non
 aliter inter se differētes, nisi sicut debiles &
 fortes. Debilitas facta fortis, usque adeò ut sit
 agitata uirtutis, facit tremorem, tremor su-
 perueniēs generat syncopim, ultimitas in syn-
 copi est extinctio & mors. B. Nota quid Ara-
 bes pro palpitatione cordis tremorem dicūt,
 nescientes inter palpitationem & tremorem
 interstinguere. Sed de his fusius dicemus in
 fine huius morbi. Gal. lib. de tre. & palp.
 cap. 5, Palpitatio est quædam dilatatio at-
 que contractio præter naturæ ordinem. Et
 12. meth. cap. 5, Syncope est præceps uirium
 lapsus. Auic. decima tertij, cap. 6, Syncopa
 est destructio maioris partis plurium uirtutū
 motiua ex sensibilibus propter debilitatem
 cordis & aggregationē totius ad ipsam, &c.

De causis syncopæ.

Causæ syncopæ sunt uel extraneæ uel interaneæ. Extraneæ sunt ambientis aëris malitia, uel res uenenatæ, uel animalium uenena, uel aliquis animi deflexus, qualis est ingens dolor, timor, &c. uel plures motus, uigilie, respirationis prohibitio, &c. Causæ interaneæ uel primario affectu fiunt, uel per consensum totius & partis. Si primario affectu, erunt uel mala intemperies, calida, frigida, sicca, humida, uel mala compositio obstruens & spiritus præfocans, uel solutio continui: quæ si fuerit in superficie, mors usque ad diem secundum prologatur: si ad uentriculum penetret, statim interficit: uel erit aliqua inflammatio uel abscessus, ex quibus breuiter aut aliqua mora facta mors sequitur. Si per consensum totius corporis, tunc uel erit febris acuta colliquans, uel uehemens raritas corporis, ex qua magna sudoris copia elicitur. Si per consensum partis, uel erit ab ore uentriculi, uel à mala hepatis dispositione, aut uteri strangulatu, aut à retentis menstruis, aut à uermibus, aut ab immodica hæ-

morrhoidarum euacuatione, aut à medicamento fiet.

Loci consentientes de causis
syncopæ.

Gal. 12. meth. cap. 7, Occasiones quibus syncopæ succedunt, sunt sex, dolor uehemens, uigilia, immodica inanitio, interdum motus, & principiorum intemperies. Et cap. 5. eiusdem, Fit syncope ex ambientis aëris malitia, uel ex uenenatis facultatibus, uel ex animalium uenenis, uel ex aliquo affectu animi & pluribus motib⁹, ex uigilijs, ex immodica eius tenuitate, ex continentium corporum raritudine, ex respiratu prohibito, & ex nutrimenti defectu, &c. De alijs uerò causis loquitur 5. de loc. aff. cap. 2. ibi, Affectus cordis si primario affectu fiant, erunt aut malæ intemperies, aut uenenosus humor, aut erysipelas, aut inflammatio, aut alius quispiam præternaturalis tumor, &c. Lege de alijs à me recitatis totum hoc caput. Et 12. meth. ibi, Si per consensum ab ore stomachi, &c. Vide etiam de his quæ per compatiendi rationem fiunt Mes. lōgo satis sermone pertra-

Tt. i.

Etantem. & Avic. decima tertij, cap. 6. & Paul. lib. 2. cap. 38. Similiter uide Aet. & reliquos practicantes: nam Avic. tres causas ponit, quarum prima est attractio, totius aut maioris partis spiritus ad cor: secunda est prefocatio spiritus in corde, spiraculum non inuenienti: tertia est paucitas spiritus in toto, ita ut non superfluat præter illum qui est in minera, &c.

De signis syncopæ.

Signa ipsius syncopæ est animi defectus, pulsus parui, extremorum frigus & sudor frigidus perirumpens. Signa primarij affectus sunt, quia nulla manifesta causa in alijs membris inuenitur, nec in ore stomachi, quum nõ adfit nec uomitus, nec nausea. Signa malæ complexionis calidæ sine materia sunt caliditas, æstus, incēdium, febris, pulsus frequens & uelox. Signa compl frig. sunt pulsus & anhelitus tardus, rarus, præcesseruntq; longa ægrotudo, sanguinisque euacuatio, &c. adest somnolentia, color pallidus. Signa siccæ cōp. sunt extenuatio corporis, nulla sentitur hu-

miditas, pulsus durus, &c. Si sanguis uel bilis peccet, sentitur caliditas, pulsus magnus, plenus, fortis. Si melancholia, adest timor, tristitia, sollicitudo, pulsus durus, &c. Si pituita, abest sitis, cor percipitur, ac si in aqua nataret, pulsus mollis, &c. Signa oppilationis sunt diuersitas in pulsu percepta cum imbecillitate & paruitate, &c. Signa per consensum sumuntur à membris communicantibus materiam: nam si à cerebro, tunc præceßit dolor capitis, uertigines, imaginationes falsæ. Si ab hepate, cognoscitur ex debilitate, caliditate & grauitate in eo percepta cum suis alijs morbis. Si à pulmone, cognoscitur ex difficultate spirandi, ex tussi & ex catarrho. Si à stomacho, cognoscitur ex uomitu, nausea, difficultate digerendi, &c.

Loci consentientes de signis syncopæ.

Paul lib 3 cap. 34, Notæ ipsius sunt, resolutio animæ q; defectus, pulsus paruitas, extremorum frigiditas, & in sudorem proruptio. At si cor incaluerit, magnâ crebrâque edit respirationem: si refrixerit, exiguam & rarâ.

Tr. ij.

De signis primarij affectus & per consensum, lege Auic. decima tertij, ca. 7. ibi, Et quando syncopis non habet causam manifestam, & est cum tremore cordis frequente, & non est, quod est in ore stomachi causa faciens ipsam, tunc ea est cordialis confirmata: illa uerò cum qua est nausea & conturbatio, est stomachalis, &c. Loci de alijs signis habentur fusius ab ipso Auic. cap. de signis tre. cordis: similiter ab Arcul. Sauro. & Gor. & ab alijs.

De cura tremoris cordis ac syncopæ.

Primum regimen erit contrarium cause efficienti tremorem siue palpitationem: nam si fuerit causa calida, regimen erit frigidum, cordiale: si frigida, calidum, &c. Secunda quæ occurrit intetio, erit digestio, præsertim si ab aliquo humore fiat, in causa calida cū frigidis, ut cum syrupo uiol. de ribes, de suc. acetosæ, de limonibus, acetosa simp. cū aquis uiolarum, rosarū, boraginis, nenupharis, &c. Tertia erit euacuatio, quæ peccante sanguine (uirtute roborata) fiet per sectionem uenæ

in parua quantitate, aut peccante bile, per
 leuia pharmaca, qualis est infusio rheubar-
 bari in rebus cordial. cum myrobalanis citri-
 nis, cum manna ac cassia. Pituita uerò su-
 perabundante cum diaphinicone, electuario
 indo, cum myrobalanis, chebulis & agarico,
 additis semper rebus cord. calidis, in melan-
 cholia peccante cum confectione hamech, pi-
 lulis indis de lapide lazuli, &c. Quarta in-
 tentio est reuulsio, qua reuellimus materias à
 corde, & deducimus ad membra ignobilia
 cum fricationibus, cucurbitulis, cum sectione
 uenæ saphenæ, cum lotionibus & clysterijs,
 &c. Quinta est robur cordi addere, remo-
 uendo intemperiem calidam cum frigidis, ut
 puta cum rosis, camphora, sandalis, acetosa,
 nenuphare & similibus: in causa frigida cū
 calidis, ut cum buglossa, zedoaria, melli-
 sophyllo, cort. citri, musco, ambra, &c. aut
 cum compositis, ut puta cum zucharo boragi-
 naceo, buglossaceo, electuario de gemmis,
 diambra, diamusco: hinc etiam parari
 possunt epithemata, unctiones, sacculi, pul-
 ueres, &c. Syncopis maximè si in paroxysmo

Tt. ij.

fuerit, tres in eius cura requirit intentiones. quarum prima prohibet resolutionem spirituum, qui remanserunt, ne omnino resoluantur: Et fit cum irroratione faciei cum aqua rosea acetoque mixta, uel aqua frigida uel uino. Secunda regenerat spiritus, et uirtutem roborat, unde huc spectant aromatica, et quae citò reficiunt, qualia sunt uinum, oia sorbilia, aqua carnis, et similia. Tertia excitat uires, et conuertit uapores et spiritus ad exteriora confractione extremitatum, cum pro- uocatione sternutationis, facta cum acri aceto et helleboro albo, etc.

Loci de cura syncopæ.

Auicenna undecima tertij, tract. 2. cap. 4. de cura à causa calida inquit, Et stude ut sit aer infrigidatus ultima infrigidatione, ut sint rorationes et odoramenta aromatica camphorata, etc. Vbi commendat etiam res in cibo acetosas cum succis fructuum agrestibus et malis acetosis, etc. Pro secunda intentione inquit, Da ei ad sorbendum Syrupum de fructibus, etc. Pro tertia intentione in ma-

teriali omni feratur auxilium cum euacua-
tius in sanguineo cum phlebotomia & ex-
tractione sanguinis ultima, &c. Lege eum
fufius, & plura inuenies à me dicta. Lege
insuper Arcul. Marc. Catin. Sauon. & Gor-
dian. & ceteros neotericos. De cura syn-
copæ loquitur Galen. 12. meth. cap. 5, Quum
essentia uirium, quibus regitur corpus tum in
spiritu, tum in solidorum corporum tempe-
ramento consistat, hæc si integra sint, serua-
ri debent: si corrupta, ad integrum reuocan-
da. Quæ igitur portio defluit, hanc appo-
nendo refarcimus, quod alterascit, in debi-
tam temperiem per contrariam alteratio-
nem uindicemus, &c. B. Habes curam il-
lius syncopæ quæ per consensum oris uentri-
culi fieri solet ab ipso Galen. 12. meth. cap. 3.
præcipuè si à crudis crassisque humoribus
fiat: si uerò à flaua bile, habes similiter cu-
ram cap. 5. eiusdem lib. ibi, At quibus ex fla-
ua bile, quæ os uentriculi infestet, syncopæ
incidit, &c. Lege Paul. A Egi. ca. 36. & 37.
lib. 2. omnia ex Galeno satis bellè recitan-
tem, &c.

Tt. iiij.

Quot modis dicatur medicina cordialis.

Auicē. in lib. de uiribus cordis, Septem modis dicitur medicina cordialis : Primò, quia reficit spiritus & nutrit, ut uinum: & de hoc etiam loquitur ipse secunda primi, summa de pulsibus, & undecima terti, in cura syncope, similiter aqua carnis, oua, & similia. Secundò, quia illustrat spiritus, ut margarita & siricum. Tertiò, quia congregat substantiam cordis & spiritus, prohibendo resolutionem eorum, ut charabæ, terra sigillata, bolus armenius. Quartò, quia amica est cordi, quale est dulce & odoriferum. Quintò, quia per uirtutem suam alterant & uiuificant roborando per qualitates manifestas, qualia sunt simplicia temperata, ut borago, buglossum, aurum. Sextò, quia euacuant depurando humorem melancholicum à corpore, aut euacuando quod nocet cordi, ut sunt myrobalani, &c. Septimò, quia sua proprietate occulta roborat ac cōfortat cor, ut hiacynthus, semina citri, buglossum, &c.

Observationes in cura.

Auic. undecima tertij, tract. i. cap. de can-
alceribus cor. Oportet ut sit uelox studium
in cura malarum dispositionum cordis, ita ut
non fiat error, quia incorrigibilis esset, quod
non accidit alijs membris, &c.

Observationes in euacuatione.

Auic. loc. cit. Obseruamus ne superfluat &
cadat uirtus, deinde post euacuationem ui-
uificemus uirtutem. Repletio sanguinea re-
mouetur phlebotomia basilicæ dextræ, & re-
pletio uaporosa cū phlebotomia basilicæ si-
nistre. In alijs euacuationibus misceantur
medicinæ cordiales, &c. Mich. Sauon. de
mente Auic. inquit, Audaciores esse debemus
in administrando phlebotomiam in aegritu-
dinibus cordis quā pharmaciam, nam phle-
botomia non peruenit ad cor ledendo sicuti
pharmacia cum suis uaporibus.

Observationes in remouenda
mala complexione.

Auic. in cura calidæ, Si inueneris uirtutem
debilem, & rimueris extinctionē, non erit ex-

cusatio, quin permisceas frigida calidis. Mar. Cat. Non debemus excessiue calidis & frigidis uti, & quum infrigidare desideramus, medicinam calidam aromaticam miscere debemus, quia frigida claudunt uias, & penetrare non possunt, uel hæc simul miscemus ut naturalis calor & spiritus una conseruentur: nam Auicen. confidimus, quod si natura fuerit fortis, discernet inter frigidum & calidum, & afferet frigidum cordi, & calidum spiritui, &c. Vide eum fusius. Gal. 12. meth. cap. 5, Ad robur uirtutis conseruandum, & ad syncopalem accessionem, quo minus repente incidat, cauendam, singulare præsidium est temperamenti custodia, &c. Vide Mesu. de his, &c.

Nocentia ac conferentia cordi.

Nocent cordi, alsebra, colocynthis, euphorbium, genista, mezereon, lac, scamonium. Conferunt debilitati, syncopa, & tremori, aurum, caro cochlearum, margarita, menta, melissa, & xyloaloes, ambra, borago, cinnamomum, crocus, granata acerosa, lapis lazuli, acerosa, my

IN CVR. MORB. LIB. III. 667

robalani, aqua florum myrhi, rosa, poma acerofa, sandali, fena, fpica inda, fpodium, os de corde cerui, omphacium, zingiber, perdix, firicum, argentum, been, acetofitas citri, coralli, coriandrum, doronici, emblici, endiua, epithimum, folium, charabe, mumia, rheubarbarum, perfica, uinum, oua. Composita sunt diamargariton Nic. electuarium de pomis Mes. diamufcus dulcis, aromaticum mufcatum Mes. electuariũ de gẽmis Mes. pliris arcoticon Nic. cõfectio xyloaloes Mes. diasenæ, dianchos, diarrhodon Nic. electuarium latifcans Mes. zucharũ ros. boraginaceum, diambra, ambra cum ligno aloẽ & offe, de corde cerui cum aqua rosacea in modũ pilularum, electuarium de citro, prælator regum Mes. gallia mufcata, oleum millinum Mes. oleum basiliconis Nic. perfica & pyra condita, rob de ribes, de berberis, de sumach, de pomis, de granatis acetofis, de citro, syrupus ros. de pomis, de acetofa, theriaca magna Auic. triphera ioanitij Mes. theodoricon magnum, troc. de xyloaloes, de musco almanus, potio mufcata Nic. foryra cõfectio, etc.

De prognosticis syncopis
& palpitationis.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 65, In febris circa uentriculū & fortis aestus & cordis tremor uel dolor, malum. Et aphor. 2. apho. 41, Qui frequenter ac fortiter absque causa manifesta exoluuntur, derepente moriuntur.

Paul. lib. 3. cap. 34, Si syncope ualida sit, medicinae locus non est, sed si uires adhuc tantillum constent, aliquando ad sanitatem recursus est, &c. Gal. 12. meth. ca. 6, Existimandi sunt insanabiles, qui uiribus iam languentibus aliquod eorum uiscus phlegmone infestetur, quoniam nutrire eos assidue non possumus, nec seruare eos, si non nutriantur: licet, &c. Auic. undecima tertij, tract. 2. cap. 6, Et scias quod syncopis confirmata curam non recipit, & propriè quando perducit ad uiriditatem faciei & conuersionem colli, & ille cuius res peruenit ad hoc, tunc quum caput eleuat, statim moritur. B. Tria requiruntur ad hoc, ut confirmata dicatur, primum quod sit continua, secundum ut sit uehemens, tertium quod nulla adsit causa manifesta, ut dictum

est in aphor. Gal. 12. meth. cap. 5. Si copia humorum crudorum vires premant, & propter tum multitudinem tum crassitiem exiguos animalis meatus obstruant, iam multis nominibus exitialis est syncope, &c. Auic. loc. cit. Quumque confirmatur in corde malitia complexionis, non recipit curam, & quando non est confirmatio, non facile curatur, apostema quidem calidum est interficiens statim, & frigidum ex eis est, quæ sunt difficilia. quumque cor non toleret ut apostemetur, quomodo tolerabit ut collectio & saniositas in ipso fiat? cor longinquius est ad hoc ut toleret solutionem singularis. Et quando accidit, ut penetret usque ad ventres eius, interficit statim: & si non est penetrans, postponitur eius interfectio usque ad secundum diem. Et quando permutantur materiae expulsæ ad cor ex pleuritide, & peripneumonia sunt causæ magni timoris & mortis subitæ. Et quando calor purus aut frigus purum peruenit ad cor moritur, & quandoque uidi congelatum loqui, & iam moriebatur cum sudore, &c. Lege hunc locum fusius.

Authores dissentientes circa cardiacas passiones.

- 1 Adserere, idem esse palpitationem & tremorem cordis.
- 2 Adserere, syncopim frequenter accidentem esse signum mortale.
- 3 Adserere, sectionem uenæ usque ad syncopim non esse faciendam cum Auerrhoe.
- 4 Adserere, uinum in defectu animi non esse exhibendum.
- 5 Adserere, in actu syncopis reficiencia spiritus non præmitti debere stypticis.
- 6 Adserere, syncopim & lipopsychiam nullo modo inuicem differre.

Confutatio dissentientium circa cardiacas passiones.

Impugnat primum Galen. lib. de tre. & palp. cap. 5. ibi, Tremor est partium quæ sursum uicissimque deorsum feruntur, inuoluntarius motus, sed sursum ferri & distrahi, & ferri deorsum & contrahi non idem est, igitur nec tremor & palpitatio idem sunt, &c.

Ad secundum Gal. aphor. 2. com. 41, Non

omnes qui exoluuntur, derepente moriuntur, sed qui saepius, fortiter, ac sine causa manifesta exoluuntur: igitur frequens syncopis hoc non efficit, sed tantum seruatis tribus dictis conditionibus.

Ad tertium, Gal. apho. I. com. 2., In maximis inflammationibus & in febribus adurentibus, mensura euacuationis est usque ad animi defectum: nam in febribus ardentissimis statim totius corporis habitus refrigeratur, febris extinguatur, & plurimis alius citatur, sudores emanant, &c. In maximis uero doloribus nullum maius inueni remedium, quam usque ad animi defectum euacuatur, &c. unde argumenta Auerrhois non concludunt, quum plerumque ea quae natura inchoat ars, deinde perficiat, & econuerso.

Ad quartum respondetur, quod si uinum interdici deberet, maxime illis qui syncopi laborant, ex flaua bile interdiceretur: sed Gal 12. meth. cap. 4. omnibus quos syncope male habet, offerri iubet, eo quod deductionem in corpus promoueat, igitur in syncopi uinum eris exhibendum, intellige tu omnibus phlegmone interiori non laborantibus, &c.

Ad quintum respondetur, quòd actu existens syncopis refici uirtus desiderat, & sic præcedet reficientia styptica, sed si timeatur de futura syncopi, ob nimiam euacuationem, debent præmitti styptica, & hæc ex Galeno 12. meth. cap. 6.

Ad sextum, Galen. 12. meth. cap. 5. loquens de succis grauātibus, ac obstruentibus, inquit, Quòd si nec obstruant, nec onerent, syncopē ycertè nō inferunt, sed quas lipopsychias Græci uocant: ubi lipopsychiā à syncopi differre dicit. Præterea syncopis accipitur tāquam genus, lipopsychia tanquam species, igitur aliquo modo inter se differunt, &c.

De vomitu, nausea, & uuluo- losa subuersione.

Vomitus est motus facultatis expulsiuæ stomachi, cum quo expellitur id quod est noxium per uiam oris.

Loci consentientes de vomitu.

Galen. 6. de sympt. cau. cap. 2, accipit nauseam pro uomitu, dum inquit, Nausea est ex-

pultriciſ facultatis motus deprauatus, quo per gulã id celerrimè euacuatur, quod uētriculo eſt noxium. Interdum accipitur nauſea pro præuia ad uomitũ diſpoſitione, ſicuti primo de loc aff. ca. 4. dũ inquit, Quòd ſi humor quiſpiam in iſſis uentriculi tunicis contineatur, nauſea quidem uexabit, ſed inanis & ſine uomitu, & quæ irritat duntaxat, nullũ humorem euacuans, &c. Et octauo de cõp. med. per loc. ca. 2, Appellant eos ſtomachicos, quibus nauſea cõtingit, & maximè ſi ad uomitum impellat: erunt igitur quatuor ſcinnuicem ſequentia ſymptomata, primum ἀπεψία, quæ ſit quum ſtomachus in temperie uitioſus, aut humorum redundantia cibos auerſatur: hæc dum creſcit, nauſeam parit, ex qua adhuc aucta, ſubuerſio oritur, quæ ſit dum fundus ſtomachi ad ſuperiora uertitur, unde quum uehemens eſt ſubuerſio, uoluuloſa à Galeno octauo de compos. med. per loc. cap. 3. dicitur, non minus ac ſi uehementi contentione & uiolētia, ueluti in uoluulis ſiue ileis, dum ſtercora uomuntur, ſubuerſio fiat, à qua demum uomitus ſiue reiectatio fieri ſolet, &c. Auic.

Vii.

13. ca. de uom. Vomitus & subuersio sunt motus stomachi ad expellendum ex eo quod est in eo per uiam oris.

De causis vomitus & nauſææ.

Causæ procatacticae sunt aër corruptus foedi odoris, cibis & potus in odore & sapore malus, aut nimia eius assumptio, aut mala eius preparatio & unctuositas, motus à cibo statim laboriosus, ira & cætera animi accidentia, imaginatio alicuius rei obscæne, similiter casus, percussio, ueneni potus & animalium uenenosorum morsus. Causæ antecedentes per essetiam sunt mala intemperies, calida, frigida, aquea, & flatuosa, materiae stomacho inherentes uel natantes, quæ grauando, pungendo ac extendendo uomitum excitant, item acuitas sensus oris stomachi, mala compositio, sicuti accidit in oppilatione pylori, id est, ianitoris, uel morbus in numero, ut uermis mordicando ac pungendo, solutio continui, inflammatio & abscessus pustula, dolor & imbecillitas ipsius stomachi, &c. Causæ per consensum uel fiunt à toto, ut in febribus, & tunc

uel est creticus uel symptomaticus, sicuti accidit in febribus malignis, & est pessimus: uel fit à parte, sicuti à cerebro materias transmittere, uel ipso percusso & uulnerato, uel ab hepate, splene, intestinis, &c.

Loci consentientes de causis vomitus.

De causis primitiuis lege Arcul. & ceteros practiçantes. Gal. 6. de sympt. caus. cap. 2. circa medium, Huiusmodi excretiones fiunt interim grauatò ob multitudinem uentriculo, ut quum plurimum cibi ingestum est, interim ob rem mordacem, quæadmodum per cruditates cibus ingestus, uel acidum ructum uel nidore, uel amarore, uel acrimoniam refert: & in hoc genere continentur pituitosa ac biliosa & acetosa excrementa, tum ibi nata, tum ex uniuerso habitu animantis in ipsum deriuata. Est & tertium causarum genus, quibus uentriculus ad uomendum concitatur, nulla uel graui uel mordaci re ipsum irritate, sed ob id duntaxat, quod præter naturam quippiam in eo continetur. Vocantur præter naturam quacumque postquam conco-

Vii. y.

Et sunt, alere non possunt. quare non tam acida pituita & salsa, uerum dulcis, & sanguis quandoque in uentriculo consistentes ipsum ad uomitum impellunt, &c. Lege etiam Gal. 1. de loc. aff. ca. 4. Item aphor. 6. com. 1. &c. Habes etiam de his causis sensum Auic. 13. tra. 5. cap. 8. ibi, Et id quod commouet os stomachi ad uomitum, aut est qualitas operatiua operatione materiae, ex qua leditur membri communicantis ut cerebri, aut aduentus percussione, aut materia grossa imbibita, aut infusa in ipso corrumpens cibum, &c. Lege eum fusius. de his Arcul. uberius agit, &c.

De signis vomitus, &c.

Signa ad uomitum præcedentia sunt, nausea, subuersio, tremor, labiorum & hypochondriorum tensio. Signa uomitus qui fit per consensum sunt: quod si à toto, uel à parte fiat, in eorum augmento uomitus & nausea augeatur, & in eorum morbi decremento minuitur. Indicia per essentiam sunt primò, si à nuda & mala intemperie sine materia fiat,

quòd tristis quidam aderit sensus in ore uentriculi, nec ulla aderit in uentriculo grauitas, nec ructus exiens erit alicuius extranei saporis, sed frequens & inanis aderit nausea absque uomitu. Signa à mala intemperie cum materia sumuntur à grauitate percepta, à ructus sapore siue amaro, dulci, acido & fætido, à siti si humor sit calidus, à putrefactione & ab eo quod uomitur. Indicia obstructionis pylorò sunt tarda cōcoctio & cibi descensus, nisi moræ in causa sint aliæ causæ. Signa uermium erunt commotio quædam, siue titillatio circa uentriculum. Signa solutæ continuitatis sumuntur à dolore, ab exitu sanguinis, & à similibus, &c.

Loci consentientes de signis vomitus.

Auicē. decimatertia tertij, tract. 5, Signa uomitum antecedentia sunt nausea, subuersio: tremit labium, accidit tensio hypochondriorum. Signa humoris calidi putridi sunt sitis, & sapor malus in ore, & putrefactio apparens, &c. Vide de alijs signis eum fusius. Gal. Vn. iij.

len. lib. de plen. circa finem libri, de his etiam signis mentionem fecit, ibi, Patet stomachum hoc loco appellari os ipsius uentriculi, ubi si pituita colligatur, appetitiones excitat: si uerò bilis flaua fuerit, sitim & cibi fastidium pariet, præterea os erit illis amarulentum. At si atra bilis, morosi & tristes & sine siti, saliuâque plurimum illis scatet: nec tamen omnes cibum fastidiunt, imò eorum in quibus atra bilis acida fuerit, nonnulli satis famelici sunt, &c. Lege etiam primo de loc. affect. cap. 4. ibi, Rursus distinguendo inuestigabimus, num ab intemperie ipsius uentriculi hoc eueniat, an à flaua bile in ipso contenta, an à iecinore malè suo officio fungere, an is ex uniuerso defluat corpore, an etiam in ipso gignatur uentriculo, &c. B. Ex hoc loco postremo elice, quòd ex frigido ciborum cupiditas excitatur, &c. lege de sig. omnibus Arcul. & Sauon. & Gord. fusissimè loquentes. Vide etiam Platearium, &c.

De cura vomitus.

In cura uomitus primùm considera an e

balis sit, an humoralis, item an creticus an
 symptomaticus: si cibalis, uel per essentiā, uel
 consensum. Si per essentiam, tunc quatuor e-
 runt curandi intentiones: prima est causæ uo-
 mitus remotio: secunda est uentriculi robo-
 ratio: tertia est diuersio & accidentium cor-
 rectio: quarta est uictus ratio. Prima igitur
 & secunda intentio uno & eodem tempore
 cum contrarijs moderatè stypticis alteranti-
 bus malam complexionem remouebit. Ter-
 tia perficietur cum reuulsione, cum cucurbi-
 culis suppositorijs, clysterijs, frictionibus:
 quod si acciderit, syncopis eisdemet auxi-
 lijs, ut suprà dictum est, curabitur. Quarta
 intèrio sit moderantia in cibo & potu, par-
 ticipent aliqua stypticitate remedia & ci-
 baria, sinque facilis concoctionis, saporis
 nō ingrati, uinum laudabile, & quod patien-
 ti placeat, &c. Si uerò fuerit uomitus per cō-
 sensum, tunc moderanda erit siue totius siue
 partis consentiētis dispositio, similiterque ro-
 borāndus erit stomachus cum his quæ exterius
 & interius applicari possunt: deinde cum
 diuersionibus prohibere fluxum humorum

Vñ. iiij.

ad stomachum. Quòd si uomitus sit creticus, tunc uel integrè iudicatur, & sic naturæ re-
linquendus: uel in aliquo deficit, & tunc in
eo quod deficit, supplere oportet: si uerò su-
perfluat, compescendus est. Vomitus uerò sym-
ptomaticus uel ex stomacho prouenit, uel ab
alijs membris aliunde deriuatur. Si primò,
tunc intentiones medendi erunt tres, prima
euacuatio humoris in uentriculo contenti: se-
cunda est stomachi intemperies corrigenda,
simulque stomachus roborandus: tertia est di-
uersio, ne fluant ab alijs membris humores, &
accidentium correctio, quæ omnia etiam su-
prà relata sunt. Si ab alijs membris proue-
niant uomitus, similiter in primis euacuandum,
deinde diuertendum, & membra tam man-
dantia, quam suscipientia roboranda, ut al-
terũ ne mittat, & alterum ne suscipiat pro-
hibeamus, &c. Vomitus igitur si non fuerit
qualis esse oporteat, tunc si sanguis cum alijs
humoribus peccauerit, secunda erit uena com-
munis, maximè etiam si ex suppressione men-
struorum & hæmorrhoidarum proueniat. Si
uerò à sanguine peccent alijs humores, tunc fa-

et aliquali præparatione, sicuti in bile pec-
 cante, cum oxysachara, syrup. de agresta, de
 granatis, de citro, de limonibus, de endiuiâ,
 de citonijs, de papauere, cum aquis endiuiâ,
 plantaginis, lupulorum, &c. In pituita cum
 rhodomelle, syrup. de absinthio, de menta, de
 bisantijs, de fumo terræ, de epithimo cū aquis
 menta, absinthij, &c. Fiat euacuatio in bile
 cum rheubarbaro, myrobalanis, cit. pilulis a-
 loephanginis: in pituita cum rheubarb. & my-
 robalanis cheb. agarico, &c. Reuulsio fiat ut
 dictum est cum cucurbitulis natibus ac coxis
 affixis, cum ligaturis iuncturarum, cum lo-
 tionibus pedum, cum pruritacione urinae &
 sudoris. Fluxus etiam intercipitur vias ob-
 struendo, humores incrassando, & uentricu-
 lum roborando, cum diacitonite & troc. de
 olibano Razes, &c.

Loci consentientes de cura vomitus.

Auicenna decimatercia tertij, trac. 5. cap. 12,
 Sermo uniuersalis in cura uomitus est huius-
 cemodi, ut qui generatur à corruptione ad-

ministrationis cibi, rectificetur, & adiuuetur ex quibusdam confortantibus stomachum boni odoris, calidis & frigidis, secundum quod conuenit, & ille cuius causa est materia mala, aut plurima, euacuetur illa materia cum ebibitis, & clysteribus, & minor etiam cibus, & subtilietur, &c. Gal. 1. de loc. affe. cap. 4. Igitur si ipsum quod molestat nil aliud quam intemperies fuerit, calidam refrigerando, & frigidam calefaciendo, illico hominem iuue-
 rus, maxime si uideris refrigerantibus tum me-
 dicamentis, tum uictus ratione hominem sa-
 nari & calorificis ladi, &c. Lege fusius Ga-
 len. 8. de cōpos. med. per loc. cap. 1. ad finem,
 & cap. 3. ibi, Vomitus ob imbecillitatem gra-
 uati stomachi aborti curantur, &c. Vide de
 his Arculeum & Gordonium, &c.

Obseruationes in cura vomitus.

Hip. aphor. 4. aphor. 6. & 7, Graciles &
 facile uomētes purgare superius, cauentes hye-
 mem: uomentes uerò difficulter & mediocri-
 ter carnosos, per inferiora, cauentes aestatem.
 B. Quomodo & quibus conueniat uomitus

habetur ab Hippocr. in lib. de salubri diæta
 tex. 17. ubi inquit, Vomitus hoc modo irrita-
 re oportet homines obesos, ieiuni uomāt cur-
 rendo, aut celeriter eundo, graciliores & im-
 becilliores à cibo uomitum pronocent. Lege e-
 tiam tex. 20. & 22. eiusdem, & uide in com-
 ment. latius Galenum. Gal. lib. de sect. uen. ad
 finem, Caue ne noxam stomacho inferas: nam
 stomacho læso multæ aliæ corporis particule
 læduntur, &c.

Obseruationes ante vomitum.

Ioan. Arcul. cap. de uom. & eliciuntur ex
 Auicenn. quarta primi, cap. de uomitu, Insue-
 ri prius ad uomitum assuescant leuibus nomi-
 tiuis, ne ad insueta tam citò fiat trāsitus. Se-
 cundò, ante uomitum præcedat uentris leni-
 tio, & cibetur cibus diuersarum uirtutum mi-
 xtis ex incisuius, abstergentibus, uiscosis, dul-
 cibus, unctuosus, acetosis, &c. Tertiò, ante
 uomitum fac, quòd extrema & stomachus
 sint calida, & quòd tempus sit calidum in
 meridie, &c.

Observationes post
vomitum.

Ioan. Arcul. Finito uomitu lauet sibi faciem cum aqua rosacea, cui parum aceti sit admixtū, lauetque os ex uino. Tardet cibum per duas horas, & quū cibatur, tribuatur res boni odoris & suauis saporis, pauca quantitatis, facilis digestionis, uelocis penetrationis, pauca superfluitatis, dormiat & non bibat, &c.

Gal. 8. de compos. med. per loc. cap. 3, Erit ob id curationis scopus, ut simul ad affectas partes odoratas qualitates imponamus, quales aromatum sunt: nam quemadmodum graueolentia omnia stomachum subuertere solent, sic odorata corroborare, &c.

Conferentia vomitui.

Conferunt uomitui, absinthiū, acetum scilicet, acetosa, omphacium, allium, aloes, anethum, anisum, aurata piscis, betonica, calamitū, castanea, caepe, citonium, citrum, coriandrum torrefactum, grisonila, endiuia, feniculum, phystici, cariophyllum, mala granata, acetosa, lapinus dulcoratus, mastix,

IN CVR. MORB. LIB. III. 685

mellissa, myrthus, mespila, nux muscata, oliba-
num, origanum, pyra, piper, poma, pulegium,
pruna, rosa, rosmarinus, sumach, spica, sce-
noanthos, tamarindi, uua non recentes, aca-
tia, &c. Cōposita sunt, alipta, moschata Nic.
antidotū hæmagogum Nic. aqua thermarū,
aluminosa, rosacea, aromaticū ros. Mes. Cō-
fectio alchanxi Mes. diacitomiten, diaoliba-
num Nic. electuariū de myrtho Auicen. phylo-
nium Nic. cum posca, menta cum aceto, musc.
almans. hiera picra, Gal. pilulæ arom. Ha-
ly. rob de ribes, de acetosa, de agresta acetosi-
tatis citri, de berberis, de citonijs cornuum,
fructuum, granatorum, pyrorum, pomorum,
sy. de agresta, de menta, de acetosa, de succis,
acetosus de citonijs Mes. de fructibus Auic.
de citonijs, de granatis, de rosis, troc. de ro-
sis, de olibano almans. sotira Nic. rosata
nouella Nic.

De prognosticis vomitus.

Hippoc. aphor. 1. aphor. 2, In perturba-
tionibus uentris & uomitibus spontaneis si
talia purgētur, qualia purgari oportet, cō-
fert & leuiter ferūt: si minus, cōtra. Et apho.

4.apho.22, Morbis quibuscumque incipientibus si atra bilis uel supra uel infra exierit, lethale, &c. Et aphor. 7. eiusdem, Vomentes uero difficulter & mediocriter bene carnosos per inferiora, timentes astatē. Et aphor. 6. aphor. 15, A longo alui profluvio habito spontaneus uomitus superueniens morbum soluit. B. Hic nota naturam esse medicorum magistrā : nam retractionem edocet, quam imitari debet medicus. Et aphor. 7. aphor. 3, A uomitu singultus & oculorum rubor, malum. B. Quotiescunque uenter ab humoribus infestatur, uel per uomitiones uel inferne eos abicit, & statim a singultu liberatur : quā uero singultus nō desinit, duorum alterum significat, uel cerebrū, uel uenter non mediocrem pati inflammationem, &c. Et aphor. 7. aphor. 10, Ab ileo uomitus, singultus, desipientia uel conuulsio, malum. B. Quia nil ad inferiora descendere significat. Et aphor. 37, Eidē quicumque eundem sanguinem, si sine febre quidem, salutare : si uero cum febre, malum : curare uero acerbis & refrigerantibus. B. Intellige de uo-

mitu qui à uentriculo tantum prouenit, non à pulmone. Est enim salutaris uomitus, quus nullius inflammationis suspicionem afferat, praesertim si sine febre fuerit. Vide Gal. in comment. Hippoc. prognost. 2. cap. 7, Vomitus utilissima est, si pituita ac bile mixta quam maxima est, si non multa, non crassa est: syncerior enim deterior est. Et tex. 39, Si uomitus fuerit prasea, aut humida, aut nigra, quodcunque ex his fuerit, malum. Et tex. 40, Si idem homo omnes uomit colores, exitiale admodum est. Et tex. 41, Vomitus liuida si graue olet, ocysimam indicat abolitionem. Et tex. 42, Omnis subputris ac foetidus odor in omni uomitione malus, &c.

B. Habes rationes ex Galen. quur syncerum deterius sit permixto, & de alijs quæ tibi in legendo apertissima erunt, &c. Auic. tertiadecima terti, tra. 5. cap. 8, Et ex nausea est, quæ est signum crisis, & quandoque est signum malum, sicut in febribus pestilentialibus. Et quum multiplicatur in conualescentibus, indicat conuersionem: & in administratione uomitus cum æqualitate, est ius-

uamentum maximum, & assiduatio eius maxime debilitat uirtutem stomachi, & facit eum lacunar superfluitatum. Et uomitus quidem creticus euadere facit spasmum: nam accidit febricitanti spasmus aut epilepsia, & subito euomit humorem ut flos aris & euadit. Et multotiens uomitus sanat ex singulis clamoso. Et ex administratione uomitus cum equalitate conseruantur renes, & curantur nocumenta eorum, & nocumentum pedum, & eruptio uenarum, &c. Et deterior uomitus est ille uomitus sanguinis, nisi secundum necessitatem sit. Et amatur quidem ut administretur in mense bis, & melior horarum uomitus est, quæ est post balneum & cibum, &c.

Authores dissentientes circa vomitum.

- 1 Adserere, uomitum quolibet tempore & in omni homine posse tuto prouocari.
- 2 Adserere, uomitum non nisi à re grauantem uel mordaci irritari.
- 3 Adserere, in syncope ex consensu uentriculi facta non conferre uomitum.

Confutatio dissentientium
circa vomitum.

Ad primum, Gal. aphor. 4. comment. 7,
Cui imperandus est uomitus, oportet ut sit
gracilis & facilis ad uomendum, & quod non
sit hyem: & sic non quolibet tempore pro-
uocandus, nec in omni homine. Nam medio-
criter carnosos & difficulter uomentes per
inferiora, non per superiora purgandos ad-
monet, &c.

Ad secundum, Gal. 6. de sympt. cau. cap.
2, Est & aliud causarum genus, quibus uen-
tricus ad uomendi impetum concitatur,
nulla uel graui, uel mordaci re ipsum irri-
tante, sed ob id duntaxat quod præter na-
turam quidpiam in eo continetur.

Ad tertium dicitur, quod est opinio Gal.
1. art. cur. ad Glau. cap. 14. quod prouocetur
irritando stomachum. Itidem Auic. 2. 3. de cu-
ra syncopis. Item Haly abbas 6. pract. cap. de
syncopi: & in hoc latret Auerrhois quantum
libet, uerum si syncopis cum sudore fieret,
tunc nequaquam fieri iubet Auicen. loco ci-
tato, &c.

De corruptione concoctionis
& eius imbecillitate.

Concoctio est secundum qualitatem, quam nimirum ventriculus facit, dum cibos sibi similes reddit, alteratio, quæ trifariam læditur, uel omnino abolita est, & talis permanet cibus, qualis ingestus est: uel imbecilla fit, & cibus tardè concoquitur, unde βραδυπεψία, id est tarda concoctio à Græcis dicitur: uel deprauata est, & tunc cibus in alienam qualitatem permutatur, unde ἀπεψία, id est cruditas appellatur. Cibus uerò interdum & ipse ita corrumpitur, ut nullam concoctionem admittere possit, & nullum proprium nomen habet, &c.

Loci consentientes de corruptione concoctionis.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1, Concoctio est secundum qualitatem, quam nimirum ventriculus facit, dum sibi similes cibos reddit, alteratio, &c. lege eum fusius.

Et tertio de sympt. cau. cap. 4, Alteratrix similiter uel omnino abolita est, quum cibus secundum omnes qualitates talis permanet,

qualis assumptus est : imbecilla, quum tardè concoquit: deprauata, quum in alienam qualitatem cibi permutantur, &c. lege eum fusius. Lege etiam 6. de symp. cau. cap. 1. ibi, At bifariam uitium fieri potest: aut enim tardè alterantur cibi, ut uix propriam transmutationem suscipiāt: aut corrumpuntur omnino ut nullam concoctionē admittant: illud βραδυπεψία, hoc uerò nullum proprium nomen habet. Vide Auic. 13. 3. Tr. 3. cap. 1. ibi, Et cibus aut conuertitur ad id quod facit digestionem integram, aut cōuertitur ad id quod digeritur digestionē aliqua non integra, &c. lege eum fusius.

De causis corrūptionis, concoctionis, ac eius imbecillitatis.

Causæ primitiue imbecillitatis concoctionis sunt aēr corruptus, fœtidus, uaporibus malis admixtus, similiter uentriculi uel alicuius membri sibi compatientis caliditas nimium dissoluens, aut frigiditas calorē naturā extinguēs. Cibus qui sua qualitate mala, aut sua quātitate confici nō potest, aut quia

Xx.ij.

intempestive, aut non recto ordine, aut quum
 diuersimode ingeritur. Porus similiter quum
 bibitur plusquam ad cibum spectet. Coitus
 in cibo, & accidentia animi immoderate
 spiritus commouētia, &c. Causæ anteceden-
 tes & coniunctæ per se sunt mala uentricu-
 li compositio, mala figura, ut si fuerit maior
 uel minor quàm deceat, uel figuræ rotundæ,
 quum naturaliter oblongæ sit. Causa simi-
 liter erit lapsus ad frigidam & siccam in-
 temperiem, & humores cuiuscunque generis
 in uentriculo superfluentes. Per consensum à
 toto fit etiam imbecillus concoctio, sicut in fe-
 bribus, hydrope, crisi, &c. A parte, ut læso
 cerebro, splene, hepate, &c. Causæ corru-
 ptionis uel erunt in uentriculo, uel in cibis
 aut in rebus superuenientibus. Si in uentricu-
 lo, uel fiet per proprios uentriculi morbos, ex
 quibus corruptio ciborum sequitur, sicuti ex
 solutione continui, ex eius inflammatione,
 &c. Si in cibis, uel corruptio fiet per suam
 malam qualitatem, uel uaporosam, uel aci-
 dam, aut fœtidam, aut putridam, &c. uel per
 suam quantitatem, ut dictum est, &c. In re-

bus superuenientibus sicuti ab errore externo
accidente, uel à uitijs humoribus in ipso
cumularis.

Loci consentientes de causis.

Gal. 6. de sympr. cau cap 1, Causa cōmunis
est alteratricis potentia à scopo aberratio.
Fit autem bifaria, uel à potētia ipsa affecta,
uel ab externo errore. Potentia rursus bifa-
riam leditur, uel per suam ipsius essentiam,
aut per aliquē instrumentorū morbum. Error
triplex est, uel à uentriculi excrementis, aut
à cibis, aut dormiēdi tēpore. Per suam essen-
tiam ex intēperie quadā agentium qualita-
tum. Per instrumentorum morbos, ut per erysi-
pelata, œdemata, phlegmones, scirrhus, ab-
scessus, & propter alios morbos simplices &
cōpositos in uentriculo existētes, quibus ma-
lè uentriculus concoquit læsa existente eius
potentia. Interdū etiam animal non conco-
quit, aut ob immodicam ciborum potuūque
quantitatē, aut prauam qualitatem, aut quia
intempestiuē, aut non recto ordine ingeran-
tur, &c. Lege Gal. 1. de loc. aff. cap 3 ibi,
Corruptionis ciborū tres sunt differētiæ, &c.

Xx.ij.

Anic. 13. 3 cap de corrupt. dig. Et ad summū
 causa in hoc aut est in cibo, aut in recepto-
 re cibi, aut in rebus accidentibus superuenien-
 tibus eis, &c. Vide eum fusius: nam ibi omnes
 causæ recitantur, quæ nuper à me dictæ sunt,
 &c. Vide etiam Gal. 3. de loc. aff. cap. 6. ibi,
 Quia concoctionis opus, &c. ibique intelliges
 quòd digestio fit in fundo uètriculi, sicuti in
 eius ore ipse appetitus, &c. Lege etiam
 Arcul.

De signis corrupt. concoctionis,
 ac eius imbecillitatis.

Indicia debilis concoctionis cognoscuntur
 ex grauitate, extentione, & ex mala cibi to-
 lerantia. Cognoscuntur etiam ex visu & pa-
 tientis relatu, ex uentositate, ex rugitu, ex
 mora cibi in stomacho, ex pauca corporis re-
 fectione, faciei que pallore, & ex multo spu-
 ro. Signa diminuta concoctionis sunt, si post
 decimam horam ructus odorẽ malum redo-
 leat. Signa corrupta sunt, si nidorosum, fæti-
 dūmq; aut aliã non consuetã qualitatem sa-
 piat. Signa mala temperatura & mala cõ-

positionis solutique continui ex dolore, & ex his quæ de uomitu dicta sunt, iam patent. Intemperiem uerò frigidam & humidam attestatur, sitis modica, sapor insipidus, acidus ructus, color linguæ albus, pallor uultus cum albedine. Calidam uerò & siccam demonstrat sitis assidua, sapor oris amarus & ructus fœtens nidorosus, color linguæ flauus, pallor cum flauitie. Attestantur esse in stomacho flatu rugitus & extensio. Signa corruptæ cōcoctionis & materiæ corruptæ sunt fœtor, sapor inconsuetus & horribilis, nausea, uomitus, singultus & syncopis. Vbi uerò mora fuerit plurium dierum, & non continuo hæc adsint, aliunde materiam prouenire indicium certum est, &c.

Loci consentientes de signis corruptionis.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1, Corruptiones nidorose sunt à calidioribus & biliosioribus, acide à frigidioribus & magis pituitosis. Acidæ quidem creant quæ pituitosa sunt & frigida, fumosæque calida & biliosa. Et paulò

Xx.iiij.

post, Tardas etiam concoctiones cibi difficulter corruptibiles faciunt, si ultra quam vires tolerari sumantur, similiter et uigiliae, etc lege locum fusius. Auic. 13.3. Tra. 3. cap. 4, Illam quae levis est significant grauitas et extensio et remanentia cibi in stomacho longior, etc. Vide Auic. fusius hic, et in cap. de corrupt. digestionis. similiter Arcul. Cord. et ceteros practicanes, et habebis quaecunque à me recitata sunt, etc.

De cura corruptae concoctionis & eius imbecillitatis.

Considerandum an per se uel per consensum ab alijs partibus afficiatur stomachus. Si per se, tunc si à modica repletionem fiat, per somnum longum sanabitur: si uero à multa repletionem, tunc educto per uomitum cibo iam corrupto cum alijs humoribus admixtis, primum stomachi discrasiam per sui contrarium curato, et causis quae alteratricem facultatem debilitant auferto, uentriculumque roborato. Vnde in causa frigida roboratur uentriculus, simulque materia preparatur cum Syrup. de

absinthio, de menta cum mina citoniorum
aromatica, cum rhodomelle, cum aquis absin-
thij mentæ. Roborant etiam uentericulum plu-
rimæ confectiones, sicut aromaticum rosa.
diagalanga, diaciminum, diatrion pipereon,
etc. In causa calida primùm facta euacua-
tione uel per uomitum uel per secessum, ma-
teriæ præparatio fiet cum syr. rosaceo, et
alijs quæ supra in cap. uom. memorata sunt.
At si per consensum morbus fiat, tunc quod
transmittit membrum, corrige per euacuatio-
nem et reuulsionem, et stomachus ne humo-
res aliunde fluentes recipiat, roboretur, et
sui demum intemperies permutetur, resque nõ
naturales in contrarium ordinentur, etc.

Loci consentientes de cura corru-
ptæ concoctionis, &c.

Aet. ser. 9. ca. 24, Si à ciborum corruptio-
ne fiat cruditas, statim per uomitum tollenda
est corruptio. Quod si quis natura difficul-
ter euomat, enemate succurratur. Si à defectu
uentriculi, cum his quæ concoctionem adiu-
uāt curato, etc. Auic. 13. 3. tr. 3. ca. 5, Cũ fue-

698 DE CONSEN. MEDIC.

rit debilitas digestionis à causa leui, aut à repletionem antecedere nō plurima, tunc sufficit in ea lōgitudō somni, &c. lege eū fufius. Lege etiam cap. 7. ibi, Primum est ut educatur corruptum in stomacho cum uomitu aut solutione uentris, & rectificetur regimen, &c. lege eum ulterius, & inuenies quodcunque dictum est: lege Arcul. & Mar. Catinariū, &c.

Obferuationes in cura cibandi.

Aet. ser. 9. cap. 24, Ad cauendam cruditatem præuidere debemus, ut neque in multitudine, neque in qualitate eorum quæ in cibo accipiuntur, neque in acceptionis opportunitate, neque in ordine delinquat, sed quæcūque cōcoquere ualeat, ea tantū ingerat, &c.

Auic. 13. 3. tra. 3. ca. 7, Caue à frigidis subtilibus (quoniam subtilia corrumpuntur in eorum stomachis) non uomat ante cibum, ne stomachus debilis fiat, sumatque res stomachum roborantes, &c.

Obferuationes in topicis.

Gal. 8. meth. ca. 5, Quacunque applican-

tur stomacho, sint ualde calida: nam tepida firmitudinem uentriculi dissolunt, & talia in duplici uase calefacienda sunt, ne eorum facultas uitietur, &c. Nota etiam quacūque dicta sunt de uomitu circa stomachum supra, &c.

Conferentia concoctioni & stomacho.

Conferunt stomacho, & concoctioni proficiunt hæc simplicia calida, ut sunt absinthium, agaricus, aloes, calamentum, calamos aron; cardamomum, cinnamomum, ciperi, nuses cupressi, citrum conditum, phistia, galanga, gallia, gariophyllum, grana pini cum rucharo, macis, mastix, laudanum, menta, oliua, olibanus, oua, passula, rheub. scoria ferri, uinum, xyloaloes & rucharum. Composita calida sunt, aromaticum ros. garyophyllatum, diaciminū, confectio Alexandrina, confectio de xyloaloes, de galanga, de citonys, de scoria ferri, cerotum Alexandrinū Mes. emplastrū diaphinicon, oleū masticinū, de absinthio, de mēta, pilulae stomachicae, aloephagina, syr. de absin. de mēta, de

700 DE CONSEN. MEDIC.

fumo terre, de cort. citri, theriaca magna, tri-
phera minor, troc. de ros. de absinthio, hiera
Gal. Simplicia frigida sunt, acetosa, acetum,
agresta, aqua chalybeata, belirici, berberis, ci-
tonia, corallus, coriandrum, emblici, endivia,
cicorium, uinum & aqua extinctionis ferri,
granata, lxarabe, chebuli, lactuca, myrobala-
ni, myrthus, mespila, persica, poma, pruna da-
mascena, ribes, rosa, sorba, sumach, smaragd⁹,
perdix, pellicula interior stomachi gallina-
rum, capillus Veneris, coriandrum, &c. Com-
posita frigida sunt, diacitoniren, diarrho-
don, electuarium de sorbis, rob de ribes, de
berberis, de sumach, de citonijs, de pyris,
de pomis, de granatis, de citro. syru. de myr-
tho, ros. zucharum ros. oleum citoniorum,
ros. &c.

De prognosticis corruptæ conco-
ctionis & eius imbecillitatis.

Auic. 13. tract. cap. 3, Quandoque perdu-
cunt debilitas digestionis & conuersio cibi
ad phlegma, ad tremorem & frigus extre-
mitatum, & commotionem paroxysmi febris,

uerum pulsus non est pulsus ut initio febris.
 Et dicitur in libro mortis uelocis, Qui habens
 nauseatiuam satietatem & tarditatem di-
 gestionis, bothor apparens niger super oculos
 eius similis ciceri, & rubet pars eius, & ui-
 ridis fit pars alia, tunc ipse moritur in 17.
 Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2, Quum coctionis
 gradus quatuor enumeretur, primus fit in ue-
 triculo, secundus in uenis, tertius in qualibet
 parte, quartus qui alterationis species est as-
 similatio dicitur. Porro concoctio uel omni-
 no deficit, uel deprauata est. Si deficit, cor-
 pus assumpto cibo non pascitur, & fit atro-
 phia. Si deprauata est, fiunt uirilignes, leu-
 cas & elephas: uide eum fusius. Auic. 13. 3.
 tra. 3 cap. 1, Sanguis qui non est digestus di-
 gestione conuenienti naturæ non recipitur à
 membris, sed putrescit & foetet, nec fit ex eo
 nutrimentum, nec bona assimilatio: unde non
 mirum si sequatur lyëteria, hydrops, scabies,
 &c. Immo corrupta digestio in conualescen-
 tibus semper recidiuam pronunciat, &c.

Authores dissentientes circa
concoctionem.

- 1 Adserere, hominem posse uiuere naturali-
ter pluribus diebus sine cibo.
- 2 Adserere, à siccitate & humiditate abs-
que alijs qualitatibus actiuis coctionē lēdi.
- 3 Adserere, posse assignari tēpus moræ ci-
borum in stomacho.

Confutatio dissentientium
circa concoctionem.

Impugnat primum Gentilis & experien-
tia, nam quum recitasset ex Alberto, uerulam
in Lombardia uixisse per 40. dies sine cibo,
ipse inquit, Hæc difficilia sunt in homine a-
pud me: nam tales humores deberent potius
putrescere & carere regimine naturæ, quàm
nurrere, &c. Vnde naturaliter loquendo, non
solum impossibile est, sed etiam non creden-
dum, &c.

Ad secundum, Auic. de noc. digest. Verū sic-
ca & humida nō perueniunt ad hoc secūdu
plurimum, ut appareat ex eis solis cū æqua-
litate ambarum aliarum qualitatū nocu-

mentum in digestionē: igitur non laedunt absque alijs qualitatibus.

Ad tertium, Quum diuersimodè loquuti sint authores de hac re, idcirco tale tempus assignari impossibile existimo: nam Auerrhois dixit, quòd tempus moræ est, 16. horarum: Gentilis, 10. horarum. Auic. de cur. feb. phlegmatici, inquit, Hora cibi sit post paroxysmum teporem & eradicationem eius, & ante paroxysmum ad minus quatuor horis. Vbi concludi posset, quòd stomachus in spacio quatuor horarum sit à cibo vacuus: nam superius dixerat, Caue ne occurrat paroxysmus, nisi uentrem habeat vacuum, &c.

De appetitu canino.

Quum appetitus ad naturalem actionem pertineat, nō ad animalē, ut ipse Gal. ait, ad appetitum necesse est ut præcedat inanitio, deinde inanitarum partiū naturalis appetitus, hunc mox sequitur uentriculi per uenas suctio, deinde suctionis sensus qui est famēs, demum animalis appetitus omnium ultimus: hic erit duplex, alter ad cibum, & est

appetitus calidi & sicci, alter ad potum, & est appetitus frigidi & humidi. Quorū uterque trifariam aboleri potest, si uel suctionis sensus pereat, uel suctio non fiat, uel corpus non inaniatur: unde dicimus quòd appetentia, uel est abolita, uel imbecillis, uel deprauata. Abolita, quum nihil quis appetit: imbecillis, quum in appetendo deficiat: deprauata, quum immoderatam cibi portionisq̃ exhibitionem appetat, aut ad alienae qualitatis desiderium uertitur. Appetitus igitur caninus erit plurius, quàm possit digeri intensior appetentia, à cuius assumptione animal non satiatur: alienam qualitatem appetere est, ac si ea quae secundum naturam non sunt, quis appetat, qui morbus à Galeno citatus. i. pica siue malacia, eo quòd utero gerentes mulierculas infestet, uocatur, ita ut carbones extinctos & testas & similes absurdos cibos appetant, &c.

Loci consentientes de appetitu canino.

Gal. 4. de symp. cau. cap. 7. de his longiori

sermone pertractat, quem fusius uidere poteris. Facit etiam mentionem de appetitu canino, 6. de loc. aff. cap. 2. ibi, Qui canina appetentia uexantur, &c. Et 5 de loc. aff. cap. 6. locus affectus demonstratur, ibi, Quæ aut canum more, &c. Et est os uentriculi deuoratorum pondus sustinere non ualens, &c. Similis etiam sensus habetur in com. apho. 20. lib. 2. Vide etiam latius Auic. tertiadecima tertij, tex. 8. cap. 10. de corruptione appetitus: & Aet. ser. 9. cap. 20. & 23. de uirioso appetitu: uide etiam Arcul. & alios, &c.

De causis appetitus canini.

Causæ quæ caninum appetitum excitant sunt plures, quandoque excitatur hic appetitus post diurnas euacuationes ac febres prolixas, interdum à uirtute retentrice corporis, quandoq; à uermibus cibum assumptum deuorantibus, interdum à catarrho ad uentriculum stillante. Sed ad summum tres erunt præcipuè causæ, frigiditas scilicet cogens ac exprimens, calliditas resoluens, & inanitio consumens, frigiditas erit uel ab acida pituita uel à melancholia, &c.

Yy.i.

Loci consentientes de causis
appetitus canini.

Auic. 13. r. 2. cap. 12, Multotiens excitatur hic appetitus caninus post euacuationes & febres prolixas resoluentes, & quandoq; accidit ex debilitate uirtutis retentiuæ in corpore, & quandoque propter caliditatem superfluam in ore stomachi resoluentē, &c. lege locū hunc fusius: Gal. 4. de symp. cau. ca. 7, Canina appetētia binæ sunt causæ, quarum una est acidorum humorum uitiū, altera est plurima per totum corpus inanitio, siue ipsa caloris uim sequatur, siue retentricæ facultatis imbecillitatem, &c. Habes etiam in 2. apho. cōment. 21, quod canini appetitus uel propter solam intemperaturā frigidiorē, uel propter humores acidos, quos exorhuit os uētriculi, fiant. Similis sensus habetur à Paulo lib. 2. ca. 51. & ab Act. ser. 9. ca. 21. & 22. sed latius consule Gal. loco citato: nam præter alia, plura exempla affert de siti immodica, sicuti de messore q̄ uinū, in quo uipera extincta fuerat, bibit & mortuus est: Itē de eo qui ex ueteri uino inebriatus, & de his qui

in naui aquam marinam bibere ausi sunt,
 & de quodam febre ardenti laborante, &c.
 quorum causa erat salsus uel biliosus humor
 uentriculum mordicans. Quòd uerò uermes
 sint causa appetitus canini, legere poteris
 non solū Auic. sed & neotericos omnes, &c.

De signis appetitus canini.

Signa humorum acidorum in uentriculo
 sunt, multa deiectio eorū quæ deuorata sunt.
 Signa inanitionis ipsius habitus exacta in-
 anitio, nec cibus per totum corpus distribui-
 tur. Signa frigiditatis sunt eo quòd nulla uel
 parua adest sitis, copiosa adest deiectio, ad-
 est etiā fames assidua, & cibi assumpti gra-
 uitas, flatus multiplicatio, praua concoctio
 cum singultus copia. Signa caliditatis sunt
 sitis uehemens, corpus non impinguatur, nec
 quicquam per uomitum uel per secessum ex-
 cernitur, &c.

Loci consentientes de signis appetitus canini.

Gal. 4. de symp. cau. ca. 7, Canina appetē-
 Yy. ij.

tia si ab acidis humoribus fiat, cognosces. quia eorum quæ fuerunt ingesta, multa fiet deiection: si ab inanitione, quia per habitus exactam inanitionem cibus per corpus non digeratur, &c. Razes 9. almans. Si cibus nec eum grauat, nec ipsum euomit, nec per secessum expellit, signum est à ui caloris morbum fieri: si uerò assidue famem patitur, & cibus post assumptionem grauat, ita ut uel uomere, uel per secessum reijcere necesse sit, signum est morbum à frigore oriri, &c. Lege etiam Aët. ser. 9. cap. cit. Auic. 13. tra. 2. ca. 13, Signum eius qui fit post euacuationes & ægritudines est antecessio earum, &c. Signa eius qui fit ex frigore sunt paruitas sitis, multitudo facis, inflatio, &c. Signa ex caliditate sunt fortitudo sitis, & non est uomitus acetosus, & natura est ue plurimum constricta, &c. Signa eius qui fit ex debilitate uirtutis retentiuæ est multitudo egestionis crudæ, &c. Signa ex humore acetoso aut melancholico sunt paucitas appetitus, & acetas eructationis, &c. Vide Arcul. etiam & alios practiçantes, &c.

De cura appetitus canini.

Omnem operam dabis in remouenda causa : nam si fiat post euacuationes & febres prolixas, tunc reficientibus unctuosius quæ os stomachi mundificat opus est, sicuti eclegma est ex oleo amygdalino dulci cū zucchero paratū. Si fiat à retentricis facultatis imbecillitate, tunc per cōtrarium eius cōplexionis curato, ut si humida cū siccis, si calida cū frigidis, &c. Si fiat à catarrho, tūc cura erit: prout dictum est in capite destillationū. Si uerò fiat ab acida pituita, quemadmodum sæpius fieri solet, tunc his potissimum utendum est quæ incidant ac repurgent, ut sunt dulcia, salsa, & alioqui abstergetia calida, qualis est hiera Gal. deinde uinū dulce. Prosunt etiam calida pingua, sicut butyrū cum brodijs pinguibus, cinnamomo, garyophyllis & croco paratum. Si uerò fiat à uermibus, conferunt ea quæ uermes interficiūt, deinde utetur stypticis. Si fiat à calore plurimo resolvente, remoue cum frigidis tam intrinsecè quàm extrinsecè applicatis poros carnis obstruentibus, ut cum oleo myrthino ros. &c. abluatūrque aqua

Y. ij.

frigida & aceto, nisi quod prohibeat: cibi uero sint frigidi, crassi, uiscosi, quales acidi, acetosi & congelati, unde confert etiam in hoc casu panis azymus & similes cibi, &c.

Loci consentientes de cura
appetitus canini.

Auic. decimatertia, tra. 2. ca. 14, Verū illos quibus accidit hoc post febres fortes & euacuationes, oportet cibari ex unctuosisque mundificant os stomachi, quæ non sint malæ substantiæ, quale est oleum amygdalarum dulcium cum zucchero, &c. Illis uerò qui patiuntur ex debilitate uirtutis retentiue, licet secundum plurimum debilitetur propter frigus, tamen debilitatur omnis uirtus propter omnem malitiam complexionis, idcirco oportet ut cognoscas complexionem, & opponas cum contrarietate curæ, &c. Hip. apho. 2. aph. 21, Famē δὲ πηξίς, id est, uini porio soluit. Gal. in comment. inquit pro fame intelligi debere non naturalem quæ ex longa inedia, aut ab alia euacuatione facta sit, sed tantum appetentiam caninam, quæ uini portione & cibis pinguibus & oleaginis cura-

tur, quia hoc symptoma plerunque fieri solet à frigida intemperie, siue nuda, siue humoribus imbuta, unde uinum calefaciēdo excludit humores & stomachi intemperiem emendat.

Obiectio.

Videtur hoc in loco Auic. discordare à Gal. i. in ordine assumendi: nam Gal. uino præmittit pingua, Auic. pinguibus uinū, dum inquit, Ipsum sanat sumptum in potu calefactum in ieiuno. Præterea Auic. non semper laudat uinum, ut Gal. maximè, si adsit uentris solutio, quum dicat, Oportet ut omne uinum tunc deuitent, &c.

Responsio.

Dicimus uinum tantum conferre post pingua, uomitus ratione, sed ad resoluendum humorem uiscidum, ieiuno stomacho ut Auic. In reliquis uerò sunt concordēs, si bene considerentur. Paul. lib. 2. cap. 15, Quoniā igitur à pituita potissimum acida constituitur affectus, ijs utendum est, quæ hanc incidant repurgentque, ut sunt dulcia, salsa, & alioqui abstergentia calida, &c. Aët. ser. 9. cap. 22,
 Y. iiij.

Nullo alio tutiori medicamento expurganda est acida materia, quàm picro appellato pharmaco, quod non tantum calefacit, sed dissecat, repurgat, extrahitque ex profundo oris uentriculi, quin et uetri robur addit, ne facile humorẽ nociuũ suscipiat: appetitus uerò qui à fortitudine caloris prouenit, nõ hoc medicamento, sed ijs tantum indiget, quæ curẽ condensare ac spissiore reddere possunt, ut est oleum ex immaturis oliuis expressum: abstineant à potu uini et ab omnibus quæ tam intrinsecus, quàm extrinsecus calefacere possunt, etc. Lege Auic. ibi, Et similiter cura ei est, quæ accidit propter resolutionem plurimam, etc.

Conferentia appetitui canino.

Conferunt canino appetitui omnia pinguis, uinum, diaciminum, diatrion, pipereon, emplastrum aggregationis. Auic. 3. 5. emplastrum purgamenti ferri Haly. 14. antid. theriaca. Serap. hieralogonion Haly. 7. antid. hiera pica Galen. etc.

De prognosticis appetitus canini.

Auic. 13. Tra. 2. ca. 12, Et scias quod appe-

titus caninus multotiens perducit ad bulimū
 & subet & mortē, &c. Gal. 4. de Sympt.
 cau. cap. 7, Non mirum si affecto ore uentri-
 culi, ubi appetentia consistit, quādoque do-
 lores & animi defectio sequatur: nā tum ob
 exactam sentiendi vim, tum ob situs uicini-
 tatē hoc cōtingere potest, &c. immò ex ner-
 uorum aut arteriarum consensu cardialgia,
 morbus comitialis, grauis sopor & deliria cō-
 sentiente cerebro eueniūt, &c. Hip. aph. 5.
 aph. 27, Qui noctu bibere appetunt, ijs ad-
 modum sitientibus si superdormierint, bonū,
 &c. B. Quia cōquieti per somnum subdescē-
 dit id quod sitim efficiebat. Et nota q̄ qui
 ex humidi defectu ualde sitiunt, ijs dandus
 est potus: nam succurrere defectui, est, inquit
 Gal. medicinale Theo. Vide tamen de siti in
 lib. de febribus infra, &c.

De bulimo.

Bulimos, est intensus membrorum appeti-
 tus cum deiectione appetentiæ stomachi, un-
 de uenæ fiunt uacue, sed stomachus respuit
 ac abhorret cibum, &c.

Loci consentientes de
bulimo.

Anic. decimateria, tra. 2. cap. 15, Bulimus vocatur fames uaccina, & est membrorum fames cum satietate stomachi, & uena quidem sunt uacua, & stomachus cibum respuit, &c. Gal. aph. 2. comment. 21, Passio bulimos appellata est casus potentiae appetitricis à frigiditate exteriori, qui à fame quidem inchoauit, sed non habet amplius eam adiutam, &c.

De causis bulimi.

Causae primitivae sunt motus per loca niuosa & frigida, uel mala uentriculi intemperies, uel eius imbecillitas, uel frigiditas uirtutem attractoriam & sensibulum mortificans, similiter & inanitio, &c.

Loci consentientes de causis bulimi.

Gal. 4. de sympt. cau. cap. 7, Accedit ad hoc bulimos, id est, uehemens fames, quae fit quum simul penuria, imbecillitate & refrigeratione uentriculus afficitur, &c. Anicē.

13. tra. 2. ca. 15, Et multoties accidit iter agē-
tibus in frigore & congelatis, quorum sto-
machi ex frigore uehementi inspissantur, &
causa eius est malitia complexionis, mortifi-
cans uirtutem sensibilem & attractiuam, &
fit ex humoribus, &c.

De signis bulimi.

Signa bulimi recitata sunt supra capite
de appetitu canino, nam communia prope-
modum sunt. De his uide Gal. lib. de fin. med.
ibi, Bulimos est ingens fames, & dispositio,
in qua fit cibi inquisitio ex paruis interual-
lis: qui hac detinentur, resoluuntur & conci-
dunt, decolorésque fiunt, perfrigescent ijs ex-
trema corporis, & torquetur stomachus, uix-
que pulsus percipitur, &c.

De cura bulimi.

Quum morbus fiat à frigore exteriori, cu-
retur cum calidis aromaticis in quibus adsit
stypticitas, deglutiantque panem infusum in
uino odorifero Cretico, deinde fiat aliqualis
diuersio, ligando extrema manuum & pe-
dum. Somnus interdicator, pungantur

ac suscitentur, cum urtica & virgis paruis
 suauiter flagellentur, fiântque emplastra cir-
 ca regionem uentriculi ex odoriferis ac cor-
 di congruentibus, & si aduenerit syncopis,
 tunc spargatur eorum facies ex aqua frigi-
 da, stringanturque manus ac pedes, euellan-
 turque capilli: quum uerò syncopis desinit,
 statim cibentur, &c. In causa calida utantur
 frigidis uelut rosa, nymphaea, uiola, coriandro
 preparato, sandalis, camphora, fiântque epi-
 themata frigida ex aqua ros. nenupharis cū
 sandalis, &c. Cibaria sint boni nutrimenti cū
 omphacio cōditi. Potus sit uinum granatorū
 cum iuleb ros. ungatur etiam stomachus cum
 oleo ros. myrrhino, &c.

Loci consentientes de cura bulimi.

Auicē. decimatertia tertij, tra. 2. cap. 17,
 Est cura casus appetitus, & oportet ut odo-
 rentur cibi promouentes appetitum, habē-
 tes species & fructus odoriferos & aromati-
 ca odorabilia, in quibus est stypticitas, ut con-
 gregetur uirtus, & deglutiāt panem infusum
 in uino odorifero, &c. Vide hunc locum su-

sius, & omnem curam intelliges. Lege etiam Aet. serm. 9. cap. 20. de cura perditionis appetitus, nam ambo hi morbi simul coincidunt, &c. Vide etiam Arcul. & Marc. Cat. &c.

De prognosticis bulimi.

Aet. ser. 9. cap. 6, Assidui bulimi & exolunt, & in animi deliquia incidunt, quibus ægrè auxilium reperitur. B. Nota quòd syn-
copis ex bulimo, tum ob corporis inanitionem, tum ob oris uentriculi nocumentum, cui cor compatitur, accidere solet: quæ si longo durauerit tempore, plerunque ægros ad interitum perducit, &c. Intellige etiam de bulimo quæcunque dicta sunt de prognosticis appetitus canini.

Authores dissentientes circa bulimum.

- 1 Adserere, idem esse bulimum & appetitum caninum.
- 2 Adserere, uinum in quolibet appetitu canino conferre.
- 3 Adserere, cibaria crassa tantum in bulimo & appetitu canino competere.

Confutatio dissentientium circa bulimū.

Ad primum respōdetur, quòd definitiones utriusque datæ sunt, quæ manifestant non idē esse. Præterea Gal. aphor. 2. com. 21. in fine eos reprehendit dicens, quòd pro generali & uniuersali faciūt specialem & particularem. Præterea bulimos tantū à frigiditate exteriori fieri potest, & non appetitus caninus. Demum bulimos incipit cum fame, sed perseuerat sine fame, quod non facit appetitus caninus, &c.

Ad secundum, Gal. eodē in com. Talem famē uini potio sanat, nō autē eam quæ ex longa inedia, uel alui profluuio, aut fluxu sanguinis, aut alia aliqua facta euacuatione, &c.

Ad tertium respōdetur, quòd & si cibaria crassa, eo quòd magis sedent appetitū, uideantur congrua, nihilominus tenuia danda sunt, tum quia uirtus imbecillus est, tum quia facilius per membra distribuuntur, &c.

De dolore stomachi & eius flatu.

Dolor stomachi est eius quidam tristis sensus

sus à mala intemperie nuda uel materiali, aut à soluta continuitate proveniens, cuius causæ primitivæ sunt percussio, casus, offensio stomachi uel membri consentientis, ut cerebri, nervi intestinorum, uel regimē cibi inordinatum, uel aliarum rerum non naturalium. Causæ antecedentes sunt nuda intemperies, uel cum materia acri & mordicante, uel à sanguine, pituita, aut potus aquæ frigida, aut flatus extendens, aut soluta continuitas sicut ab ulceribus, uel ab aliquo abscessu. Causæ coniunctæ sunt ipsi humores, uel reliqua dolorem stomachi actu efficientia, &c.

Loci cōsentientes de causis doloris stomachi.

Auic. decimateria tertij, tra. 2. cap. 1, Dolor stomachi accidit aut propter malitiā cōplexionis absque materia, aut cum materia, & propriè acuta mordicativa, aut propter solutionē continuitatis ex causa uentosa extensiva, aut mordicativa adusta, aut aggregativa ambarū rerū simul, sicuti est in apostematibus calidis, &c. Lege eū ulterius, & inuenies etiam causas, quur dolor accidat ante

comestionem, & sedatur quum comeditur;
 &c. Consule in hoc etiam Arcul. 9. alman.
 Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2, Spiritus in uen-
 triculi spatijs oriri solet, quum humores pi-
 tuitosi ibi contenti, uel cibi ab imbecilli ca-
 lore in uapores resoluuntur. Nam ut absolu-
 tum frigus uaporē non excitat, ita calor ma-
 gna ex parte quæ comprehendit uincens plus-
 quam pro uaporis generatione cibum exte-
 nuat, nisi fortē suapte natura in flatū trans-
 eat. Quare relinquitur quòd à calore imbe-
 cilli cibos non omnino conficiente, sed quo-
 dammodo dissolvente, flatus siue spiritus exo-
 riatur, &c. Lege etiam fusius Galen. de caus.
 flatus, 14. meth. cap. 7. ibi, Porrò halituosum
 spiritum in animalis corpore ex succis, &c.

De signis doloris stomachi.

Signa bilis sunt mordicatio, dolor puncto-
 rius, sitis, oris siccitas atque amaritudo. Si-
 gna pituitæ sunt, oris salsedo, præsertim si sal-
 sa fuerit pituita, inflatio, grauitas sensibilis,
 aliquando frigiditas: interdum fit sitis ratio-
 ne doloris & clamoris, item adest uomitus pi-

tuosus, pallor faciei, &c. Signa flatus sunt eructatio, rugitus: ructus fiunt uel strepitus, & extensio in hypochondrio, iuuatur per emissionem strepitus, dolor permutatur frequenter. Signa apostematis sunt appetitus destructio, eminet in parte exteriori, praesertim si fuerit circa os uentriculi: si uero fuerit in fundo, concoctio destruitur, nec apparet eius eminentia, adest febris, &c. Cognoscuntur ulcera ex sanie & reliquis exeuntibus, &c.

Loci consentientes de signis doloris stomachi.

Auicē. decimatertia, tract. 2. cap. 2, Et mordicatio cum inflatione est significatio materiei calidae propter qualitatem acutam, uel salsam: si mordicatio non est stabilis, imò renouatur, significat effusionem cholerae ex hepate, &c. Et signa ex uentositate sunt eructatio & rugitus & extensio in hypochondrijs, &c. De his consule Acul fufius. Galen. 6. de sympt. caus. ca. 2, Cognoscitur flatum esse in uentriculo, quoniam si per os reijcitur, facit ructum: si per inferiores partes, flatum

Zz. i.

reddit uel strepentem uel sine strepitu : quòd si per neutram partem deferatur, symptoma uentriculi efficit ob imbecillitatem non potentis spiritum redundantiem & nebulosum expellere, &c. lege hoc totum caput : nam ex flatu acuto ac tenui sono, & similiter ex bōbosis diuinare te docebit, qua ex parte flatus procedat, & alia ad rem facientia : lege etiam neotericos, &c.

De cura doloris stomachi.

Diuersimodè curabitur dolor, prout causa efficiens fuerit : nam si nuda ac sola intemperies mala sit in causa, tunc sola alteratione per contrarium curabitur : si uerò materialis intemperies in causa fuerit, tunc curandi intentio quinque intentionibus perficietur. Prima erit circa regimen sex rerum non naturalium, ita ut in contrarium causæ omnia adhibeantur, ut in calidis frigida, & econuerso. Secunda est doloris mitigatio, quæ statim in opus dirigenda est, quoniam stomachus sit membrum sensitivum, ex cuius læsione facile totum corpus compatitur. Hæc duobus modis perficitur. Primò abscindendo ab foris causam,

Et hæc fit cū solutiuis et sectione uenæ: quod
 si materia nimis stomacho adhereat, ac fixa
 et compacta persistat, ita ut aliqua præpa-
 ratione indigeat, præparanda tunc erit pro-
 ut in altera inentione dicetur. Interim al-
 ter sedandi modus erit cum rebus anodinis
 quæ parari possunt per fofus, cataplasmata,
 cerata, olea, etc. Fofus fiunt cum floribus ca-
 momillæ, anethi, melliloti, et semine lini,
 fœnugræci, aliheæ, etc. Deinde in casu ne-
 cessitatis ad opiata concurrendum: unde in
 causa frigida datus phylony rom. 3. 5. us-
 que ad 3. i. cū modico uino, et in calida tan-
 tundem requiet Nicol. etc. Tertia intentio est
 humoris peccantis præparatio, unde in causa
 calida procedimus cum syrupo acetoso simp.
 uel oxysacchara, syrupo de endiuia, uiol. de
 agresta cū aquis endiuie, lupulorū, uiolarum,
 etc. Quæ bilis si aliunde flueret, præparanda
 esset cum his quæ aliqualem in se stypticita-
 tem cōtinent, ut cum syrupo ros. de semine a-
 cetosæ, de granatis, de citonij, cum aquis en-
 diuie acetosæ, plātaginis et cichorij, etc. In
 causa frigida cū rhodomelle, oxymelle simpl.

Zx.ij.

Et compos. scilliticóque syrupo de absinthio,
 de menta, si fuerit pituita salsa, cū syr uiol.
 Et oxymelle simplici, cū aquis camomillæ, en-
 diuiæ: si melancholia cum syr. de fumo terræ,
 de epythimo acetoso simplici. syr. uiol. Et cum
 aquis fumi terræ, lupulorum, boraginis, &c. si
 sanguis extrahatur per uenæ sectionē. Quar-
 ta intentio est euacuatio, quæ in materia bi-
 liosa ita parabitur. R. manna electæ mast. 3.
 xij. electuarij de semine ros. 3. ij. semē syr. uiol.
 3. i. cum decocto fructuū Et florum cord. fiat
 potus. Vel in materia crassa cum cassia dia-
 phinicone. In melācholia cum cassia Et con-
 fectione hamech: laudatur insuper hiera Ga-
 len. simpl. pilulæ aleophāginæ, &c. Si in cau-
 sa fuerit uērositas, curato post euacuationem
 factam cum calefacientibus Et exiccantibus,
 præsertim si materiam fouentē habuerit, un-
 de in hoc commendatur cucurbitula cum ma-
 xima flamma applicita. Item fiant forus ex
 decocto mēta, absinthij, camomillæ, calamen-
 ti, pulegij, rutæ, cinnamomi, galangæ, calami
 arom. &c. uel cum oleo in quo ruta, apium, cu-
 minum, maratrum bullierint. &c. Quia in-

tentio est mala complexionis derelicta remotione, quæ si fuerit calida, frigidis remouebitur: si frigida, cum calidis, quæ parantur per cerata cataplasmata, linimenta, &c.

Loci consentientes de cura doloris stomachi.

Auic. 13. tra. 2. cap. 3, Cura eius qui est ex malitia complexionis calida sine materia est in potu sumere lac acetosum, & aquam frigidam, & in cibo pullos, perdices, cucumeres, cucurbitā, portulacā, &c. & sic intelliges de frigida cōplexione, quod per contraria curetur. Quod doloris mitigatio tribus dictis modis fieri possit, lege etiam Auic. 2. primi, doct. 2. sum. 2. ca. de cau. sedādi dolorem. Item quarta primi, cap. de sedatione doloris. Lege etiā neotericos practicantes Arcul. & Mar. Cat. Mich. Sauona. Razem & Bauarium fol. 66. &c. Auicen. 13. tra. 2. cap. 3. loquens de præparatione simul & euacuatione humoris dolorem efficiētis, inquit: Er quando dolor fuerit ex humore cholerico calido, euacuabis, & administrabis syrupum acetosum cum aceto
Zz. ij.

in quo fuit infusum absinthium, &c. Galen.
 14. meth. cap. 7, In curatione omne princi-
 piū est totū corpus euacuare ea euacuatione
 quā ferre potest: purgatio sit uel missio san-
 guinis, uel purgatio tum per ea quæ subter
 expellunt medicamenta, tum per quæ supra,
 ut uomitoria, deinde per ea, ut uno uerbo
 me expediam, quæ calefaciunt & exiccant,
 &c. Gal. 12. meth. cap. 8, De cura flatus uen-
 triculi cōmendat cucurbitulam maxima cum
 flamma admoram, & ita hoc præsidium ua-
 lere, inquit, ut incātamenti cuiuspiam simi-
 le uideatur. Et 8. meth. cap. 5, Flatus sanan-
 di sunt, oleum in quo ruta & semina quæ
 flatus discutiunt, fuere incocta, ut sunt apij
 cumini, marathri, atq; alia id genus. Et 14.
 meth. cap. 7, Est illud, inquit, cōmune præce-
 ptum omnium ferè quos uiciosus succus creat
 morborum, quòd in fine calefacientibus &
 exiccantibus sit utendum, &c. Vide Aet. ser.
 9. cap. 27. ex Archigene curam, & Auicē.
 13. tra. 2. cap. 3. ibi, Et dolores quidem sto-
 machi frigidos & uentosos sedat, &c.

Obſervatio circa curam do-
loris ſtomachi.

Marc. Cat. de mēte Auic. Debemus in pri-
mis cū diligētia & bona cura procedere, &
cauſam cognoscere, ne ſi error cōtingeret, ob
id quod ſtomachus chylum generat, talis er-
ror toti corpori communicaretur, &c.

Nocentia ac conferentia do-
lori ſtomachi.

Dolorem & mordicationem inducūt ble-
ſa, bulbus, fructus cedri, dactyli, grana pini,
iuniperus, lac, rapa cruda, ſcamonium. Cōfe-
rūt dolori & mordicationi, abſinthiū, aloes,
acetosa, acetum ſcilliticum, betonica, cala-
mus aromaticus, corallus, coriādrum ſurfur,
galāga, gariophyllū, gentiana gariophylla-
ta, granata, acetosa, lactuca, maiorana, men-
ta, mellilotū, nepita, nux moſchata, oſtraca,
oua ſemicocta, origanum, puritaria, paſſula,
peucedanū, portulaca, pulegium, rheubarba-
rū, roſa, ruta, rubus, lac ſicomori, ſiliqua, ſi-
ſamus, ſpica ſpina alba, ſcenoanthos. Cōpo-
ſita ſunt alphendiſicon. Auic. tertia quinti,

Zz. iij.

728 DE CONSEN. MEDIC.

Apozima de absinthio quarta quinti Auic.
 Athanasia maior Haly. 6. antid. Ceratum
 hyssopi, filiagrios hyssopi Pauli, stomaticon
 Mes. secunda antid. electuariū de carui. Auic.
 de ambra serap. electuariū indum de baccis
 lauri, gallia muschata, infusio hieræ Mes.
 oleum de absinthio, de menta, de costo, nar-
 dinum, rosaceū, masticinū, myrthinū, de cito-
 nys, pilulæ aleophanginæ, masticina de hiera
 cum agarico hieræ simpl. Quadrumeron
 confectio Nic. Rob granatorum de citonys,
 theodoricon magnum Auic. theriaca maior,
 theriaca diateffaron, triphera magna Nic.
 triphera saracenica Mes. troc. de diarrho-
 don, de absinthio, de rosis, unguentum cardu-
 meni Auic. secunda antid. zucharum ros.

De prognosticis doloris
stomachi.

Auicen. 13. tra. 2. cap. 1, Et quandoque mo-
 ritur subito propter aduētum doloris ad cor.
 Secundo, et quandoque descendit dolor, et
 facit prouenire colicam. Tertiò portendit in
 pregnatibus prefocationem matricis. Quar-
 tò, timetur in illo in quo prolongatur dolor

stomachi, quod attrahat apostema stomachi.
 Quintò, Hippoc. in lib. morbis festina, Quan-
 do apparet cum dolore stomachi super pe-
 dem dextrum quoddã simile uestica, tũc pa-
 tiens moritur in uigesimumseptimum diem.
 Et si habet dolorem uentris, & apparet in
 supercilio eius uestigium & bothor, similis
 fabæ, deinde fit ulcus, tunc ipse morietur, &
 huic accidit suber, &c.

Authores dissentientes circa dolores stomachi.

- 1 Adserere, succum absinthij magis con-
ferre stomacho, quàm ipsius herbam.
- 2 Adserere, in omnibus maximis doloribus
sectionem uenæ semper conuenire.

Ad primum, Auic. 13. tertij, Quoniam suc-
cus eius est separatus à stypticitate retēta in
herba, idcirco non ita conducit stomacho ut
ipsa herba, quæ ob partem terream in se ma-
nentē sit magis styptica & cōfortatiua, &c.

Ad secūdum, Auic. quarta primi, Tibi quo-
que cauere debes à minutione in hora fortis
doloris, item cauendū à phlebotomia in cor-

poribus habēribus subtilitatem nimiam oris
stomachi, quoniam ex ea in syncopin cadunt.
Præterea in frigido, crasso ac uiscofo humo-
re non competit, igitur non semper compe-
tit, sicuti etiam in dolore uires prosternente
non competit, &c.

De imbecillitate hepatis.

Hepatis imbecillitas est alteratricis facul-
tatis in proprijs actionib⁹ impotētia absque
alicuius uisceris malo manifesto, &c.

Loci consentientes de imbecil- litate hepatis.

Gal. 8. de compos. med. per loc. cap. 6. ad
finem, Imbecillitas hepatis est citra manife-
stum aliquod in uiscere malum in proprijs
actionibus impotentia alteratricis faculta-
tis. B. Intelligendus est hic Gal. de alteratri-
ce facultate, & si ad unguem eam non ex-
presserit: nā huic attractoria & retētrix &
expulsoria tanquam principaliori seruiunt.

Auic. 14. tra. 2 ca 1, Hepaticus est ille cu-
ius est debilitas absque re manifesta in ope-

rationibus hepatis, &c. Inuenio iuxta Gal. in lib. fin. med. iocinorosos appellari, quos iecoris dolor cum tumore & duritie & corporis colore malo comitatur, & his febris ardens superuenit, & lingua arefcit, quæ omnino euenire solêt, quum alteratrix facultas suo non probè fungitur officio: ad ipsam enim pertinet sanguinem generare, unde à Gal. 5. de loc. aff. cap. 7. sanguifica speciatim alteratrix dicitur, & ab Auic. digestiua. lege Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2.

De causis imbecillitatis hepatis.

Causæ primitiue sunt casus & percussio super hepate, & quæcunque à rebus non naturalibus prouenire possunt, malè dispositis. Causæ antecedentes sunt uel per se uel per consensum: per se fiunt uel à mala intemperie sine materia, uel ut placet Auic. cum materia abscessum, uel erysipelam, uel œdema generante per consensum uerò, uel à toto, ut in febribus, uel ab aliqua parte quæcunque sit debilitante fieri solent. Causæ coniunctæ sunt uel ipsa intemperies, uel quid aliud facultatem alteratricem actu imbecillitans, &c.

Loci consentientes de causis
imbecillitatis hepatis.

Auic. 14. tra. 2. cap. 1, Et id est aut propter malitiā cōplexionis singularis sine materia, aut cum materia, cuius principium est ab hepate, aut à membris alyis, sicut est fel quādo non trahit choleram, aut splen quādo non trahit melācholiā, aut renes, aut uestica, aut matrix propter uehementiam fluxus sanguinis, & propter uehementiam retentionis menstruorum, &c. Et quandoque non est propter malitiā cōplexionis solā, immò propter apostema sanguineū, erisypelam undimiam, aut propter ulcus, &c. B. Nota an hoc loco decipiatur Auic. Nam dictum est à Gal. nō solū in descriptione iam dicta, sed etiā 8. de compos. med. per loc. cap. 6. quòd hepatica peculiariter appellata citra tumorem præter naturam contingat, &c. Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2, Intemperies quæ alteratricis facultatis imbecillitatem parit, si calidior, quā oporteat, fuerit, interdū biliosum, interdum melancholicum excrementū efficit: si frigidior, pituitosum & aquosum excremen-

tū similiter parit. Lege in super Gal. 5. de loc.
aff. cap. ult. ibi, Omnium facultatū essentia,
Ec. Itē 3. de sympt. cau. Et Aet. ser. 10. ca. 1,
Et Paul. lib. 3. ca. 46. Et Arcul. 9. almas, Ec.

De indiciis imbecillita-
tis hepatis.

Indicia sumuntur à colore corporis, ab e-
gestionē, à dolore leui, ab intēperie calida,
frig. sic. Et hum. à facultatibus ipsius hepa-
tis. Si uerò per consensum morbus efficiatur,
ex membri lesione, à quo fit consensus. A' co-
lore cognoscitur, quia si à flaua siue palli-
da bile, aut à pituita fiat, tota cutis erit alba
siue pallida, siue flaua: ab egestionē, quia quæ
eğeruntur, similia carnis loturæ apparent.
A' dolore leui, quia sicut ex cibo uentricu-
lus premitur, ita ex chylo iecur, unde dolor
leuis accidit: à cōplexione cognoscitur ex eo,
q' à suis cōtrarijs inuatur: à facultatibus he-
patis, nā si ab alteratrice, sanguis diminutē
erit cōcoctus, qualis est sanguis pituitosus, aut
superfluē erit concoctus, qualis est biliosus Et
adustus. Si ab attractoria facultate morb' fie-
ret, tūc uix prima cōcoctione celebrata, chy-

lus egreditur, quum ad iecur attrahi nō possit: si à retentoria, tunc id egreditur quale intrauit: si ab expulſoria, tunc id non expellitur quod est superfluum, sed admixtum sanguini cernitur: aut cognoscitur ex eo, quòd multæ ad uentriculum fluunt humiditates. Sunt & harum facultatum alia indicia: nam si sanguis corruptus sit, uel ad putredinem decliuis, uel colore uariis uel pituitosus, tunc alteratricem cognoscimus esse diminutam: si totius corporis adsit macies & imbecillitas, tunc attractoriam uim esse imbecillem coniectamur, & sic de reliquis. At si morbus per consensum fiat, cognoscitur ex alterius membri læsione: nam si per cōsensum fellis fieret, tunc ex colore icterico cognoscitur: si ex consensu stomachi, ex concoctionis malicia, & sic de reliquis, &c.

Loci consentientes de indiciis
imbecillitatis hepatis.

Auicē. 14. tra. 2. cap. 2, Color est ex rebus quæ significāt secundū plurimū dispositionem hepatis, &c. Et egestio & urina similes aquæ carnis significāt debilitatē hepatis in

generādo sanguinē, &c. Cōplexiones autē significātur ex radicibus prædictis, &c. Lege fusius hunc locū, & indicia à me dicta inuenies. Gal. 5. de loc. aff. cap. 7, Igitur alui quū sedimina aquæ, in qua mactata caro abluta est, similia esse uideris, tunc efficacissimū esse affecti iecoris signū non dubites. Et paulò pōst facit mētionem de cōplexionū signis, ibi, Calidæ intēperies hepatis, &c. Habes tamē rem magis expeditā 8. de compos. med. per loc. cap. 6, ibi, Calida igitur intēperie circa hepar existēte, colliquationes fiūt primū humorum, deinde carnis ipsius hepatis, &c. Similiter habes signa facultatum hepatis 5. de loc. aff. cap. 7, ibi, Si attractrix facultas afficitur, tunc cibus in uētriculo in saccū transmutatus relinquitur, &c. Vide 8. de cōpos. med. per loc. cap. 6. fusius de hac re. Item Paul. & Aet. & Arcul. &c.

De cura imbecillitatis hepatis.

Perficitur hæc cura quatuor medijs. Primo, remouendo causam imbecillitatis. Secundo, roborādo hepar. Tertio, remouēdo si quæ aduenerint symptomata. Quarto, regulando

agrum in sex rebus non naturalibus. Causa
 si fuerit primitiua, ut potus aque frigida,
 remoue eā cum calido, ut puta cum potu uini,
 & abstineat se ab aqua, & sic de reliquis
 causis primitiuis. Si causa antecedens in he-
 pate fuerit intemperies calida, remoueat
 frigidis stypticis hepatis conducentibus, fri-
 gida calidis aromaticis aperientibus, humi-
 da siccis, &c. Si uero fuerit apostema, ulcus,
 uel aliqua alia soluta cōtinuitas, curabis per
 ea quæ ad apostemata, ulcera, & solutā con-
 tinuitatē faciunt, ut aliās dictum est. Si cau-
 sa sit per consensum ab alio membro, tunc il-
 lius membri mala dispositio remouenda est
 cum euacuatione, reuulsione, ac membri ro-
 boratione, ne quid amplius ad hepar, trāsmi-
 tatur, demum hepatis nocumentum iam im-
 pressum remoueat, &c. 2. Robur hepatis fit
 decem medijs, ut ex Auic. & neotericis elici-
 tur 1. Cum leuiter calefacientibus, ut natu-
 ralis eius temperies seruetur, & hoc intelligi
 potest de his quæ ad penetrandum exhiben-
 tur 2. Cum leui apertione, quā semper de ob-
 structione hepatis timor sit, & tunc utimur

physticis & absinthio. 3. Cum maturatione
 & lenificatione, quæ cum passulis & uino
 granato conficitur. 4. Cum abstergentibus
 quæ parantur cum aqua hordeacea & hy-
 dromelle. 5. Cum incidentibus, ut cum uino
 granatorum, quod ad acetū uergit. 6. Cum
 his quæ moderatam in se stypticitatem ha-
 bent, ut scenoantho, rosis, absinthio. 7. Cum
 prohibētibus putredinem, ut cinnamomo, cas-
 sia lignea. 8. Cum exiccantibus, ut cum spo-
 dio. 9. Cum mundificantibus, ut cum melle
 & uino subtili. 10. Cum his quæ à proprie-
 tate ualent, ut spica, lupi hepar, limatijs
 rheub. passulis. Verū in his memoriæ in-
 terim mandandum, quenam facultas prin-
 cipaliter læsa sit, ut eius robori magis inten-
 das: nam attractoria uis calidis & siccis, sed
 magis calidis: retētoria frigidis & siccis, sed
 magis siccis roboratur: alteratrix calidis &
 humidis, licet magis calidis: expultrix calidis
 & humidis, licet magis gaudeat humidis,
 &c. In causa igitur frigida cōueniūt absin-
 thiū, rheubarbarū, troc. de rheub. diacurcu-
 ma, sy. de absinthio, de eupatorio. Itē electua

Aaa.i.

738 DE CONSEN. MEDIC.

riū Gal. in tex. Auic. descriptū, ibi, R^x. ligni
aloes, rosarum, spica, nardi, cinnamomi an.
3.ij. &c. In calida cōueniūt cichorium, aqua
limatiarū, diarrhodon Abbatis, triasandali.
T. de rosis, syr. de endiuia, de cichorea cum
rheub. 4. Cibaria nullam crassitiem, uel uisco-
sitate participent, carnes sint boni nutri-
menti, unde conueniunt uitelli ouorum sorbi-
lium cum cinnamomo & pipere aromati-
ti. Item passula limatia, &c. Potus sit aqua
hordeacea cum aliquantulo mellis, &c.

Loci consentientes de cura
imbecillitatis hepatis.

Auic. 14. T. 2. cap. 3, Vt plurimū debilitas
hepatis est propter frigus aliquod aut humi-
ditatē aut siccitatē aut propter materias ma-
las retētas in ipso, & propter hoc plurimum
cura eius est cū calefactione subrili, cū aper-
tione & maturatione & lenificatione per-
mixta cū stypticitate cōfortatē & prohibētē
putrefactionē, & sit cū medicinis aromati-
cis, in quibus est apertio & maturatio, ut cro-
cus. Et quandoque indigemus propter reten-
tionē materiæ in ipso phlebotomia & solu-

rione uentris, &c. Gal. 8. de compos. med. per
 loc. cap. 6, Scopus curationis in eiusmodi af-
 fectionibus fit communis quidem iuxta in-
 temperiei contrarietatem: peculiarem uerò
 per cuiusque contrarium. Verum in his siue
 exterius applicitis, siue intra adhibitis, sem-
 per aliquid ex adstringētibus miscere oport-
 tet ut iecoris robur seruetur, &c. Et 2. meth.
 cap. 16, Siquidem in uentriculo & iocinore
 robur resolui est perniciosissimum, &c. De
 cura facultatū hepatis laboratū habes ple-
 nē iuxta Auic. loc. cit. ibi, Si debilitas à dige-
 stiua prouenit, cōforta cum stypticis aroma-
 ticis: si à retētina, adde in confortatione de
 stypticitate & minus de calefactione, &c.
 Lege fusius, & inuenies cetera à me iā pridē
 exarata: lege etiā Arcul. in hoc, & Marcum
 Cat. De cibis lege etiā ibi Auic. Et cōuenien-
 tiores cibi sunt, in quib⁹ nō sunt crassitudo &
 uiscositas, &c. lege eū fusius & Arcul. &c.

Observationes in curatione.

Auic. Medicinæ hepaticæ sint apertiuæ
 cum leui caliditate, quarū uirtus sit lenitiua
 & abstersiua, nec stypticitate careant, quum

Aaa. ij.

hepar sit membrum laxum, &c.

Nocentia & conferentia im-
becillitati hepatis.

Nocēt hepati aloes, assa, colocynthis, dactyli, helleborus, euphorbiū, esula, ficus, lac, mezereon, oxymū, serpentaria, serapinū, scamoniū, scebrā, triphera ferruginea Nic. Conferunt imbecillitati, & eam roborant absinthium, acorus, aloes boni, amygdalæ amarae, ammoniū, asarum, berberis, calamus aromaticus, cinnamomum, cortex citri, costum, cuscute, crocus, cichoriū, endiuia, eupatoriū, physici, fumus terræ, granata acetosa, lactuca, laudanū, lignum aloes, liquiritia, hepar lupi, macis, mastix, myrobalani, cit. nux musc. organū, passulæ, rheubarbarū, rosa, rosmarinus, rubea, spica, spinachia, scenoanthos, Composita sunt citronia condita, conditum de citro, de succo citoniorū, de muscho, diarrhodon, dialacca, diacurcuma, diareos, letificans Mes. el. de myrtho Mes. de camphora Auic. empl. diaphinicon, diaspermatoron, gallia sebelien Mes. oleum masticinum, amygdalarum amararum, irinum, costinum, pilulæ ag-

gregatiua, de rheub. stomatica Auic. de agarico Serap. syr. de endiua, de cichorea cum rheub. de acetositate, diarrhodō, de fumo terræ, de absinthio, tro. de ligno aloes, de rosis, de aniso, de absinthio, de lacca Haly, de eupatorio, hiera Damasceni, tudiarū rosa. &c.

De prognosticis imbecillitatis hepatis.

Auic. 14. tract. 2. cap. 2, Et multoties perducit ad hydropem & colicam phlegmaticam, &c. Arcul. Debilitas hepatis notabilis quum inueterata fuerit, aut difficillimè, aut fere nunquam emendatur: lege etiam Gal. 8. de compos. med. per loc. &c.

De inflammatione iocinoris.

Inflammatiō est calidi sanguinis influxus quæ in hepatis substantia, uel in eius gibbosa uel concaua parte, aut in musculis uel tunicis colligentibus, uel in uenis eius accidere solet: nec inquirendum utrum in uenis mesenterij hoc accadat, quoniam si in concaua iecoris parte fuerit inflammatiō, etiam in uenis mesenterij necessariò erit.

Aaa. iij.

Loci consentientes de inflammatione hepatis.

Auic. 14. T. 3. cap. 1, Apostematū in partibus hepatis accidentium quædam fiunt in ipso hepate, quædam in lacertis positæ super ipsum, & alia sunt quæ accidunt in meseraicis: & eorum quæ fiunt in ipso, quædam accidunt in partibus eius superioribus & ad latus gibbosum, & alia in partibus inferioribus, & ad latus concavum, & alia in uelaminib⁹ & pāniculo & in uenis ipsius, &c. Lege Gal. 5. de loc. aff. cap. 7. & 13. meth. cap. 14. ubi etiam inquit, Quòd cauo iocinoris phlegmone obseſſo, protinus etiam uenas quæ in mesenterio sunt, una phlegmone laborare necesse sit. Vide etiam Gal. in lib. de tum. præter naturam cap. 2. ibi, Inflammatio est calidi, &c.

De causis inflammationis hepatis.

Causæ primitiua est nimius calor ex immodico motu, aut ex sole igneque acquisitus, aut acre medicamentum, aut nimius potus, uel cibus calefaciēs, percussio aut torsio, &c.

Causæ antecedentes uel per se sunt in hepate, uel per cōsensum fiūt. Per se sunt intēperies calida, malos humores attrahēs, aut intēperies frigida quæ alteratricē & expultricem debilitat, unde tumores fieri possunt: similiter obstructio ex qua humores retinētur, aut dolor materiam ad iecur attrahens, aut iecoris imbecillitas. Causæ coniunctæ phlegmonis est sanguis copiosior, quā pars postulet, in ipso hepate contentus, &c.

Loci consentientes de causis inflammationis hepatis.

Galen. 13. meth. cap. 6, Istius caloris causa aut est immodicus mōtus, aut ex sole & igni tepor, aut acre medicamentum, &c. Auic. 14. tra. 3. cap. 1. etiā de alijs primitiuis causis loquitur, ibi, Et cibi quidem calefacientes & crassi, & qui non digerūtur ualde adiuant ad faciēdum apostemata in hepate, & quandoque accidit propter percussionem & torsionē, &c. De causis etiam antecedētibz hic uerba facit ibi, Causæ illius sunt cōplexio frigida prohibēs digestionem & expulsionē, aut debilitas stomachi, aut oppilatio cōgregās

Aaa.iiij.

humores, &c. lege eum fusius. Gal. 13. meth. cap. 3, Communis omnium phlegmonum generatio ex sanguinis influxu est copiosioris, quam pars postulet. Causa uerò quur influit sanguis, tum à partibus mittētibz, tum ab his quæ ad se attrahunt, peruenire potest: mittunt enim partes, quum nimiū copia superuacua est, aut quū à sua qualitate molestantur: quæ uerò attrahunt, ea ob morbosum calorem attrahunt, uel ob sui, uel uicinæ partis dolorem, aut ob partis recipientis imbecillitatem, ut testatur Gal. 23. meth. cap. 5. Lege etiam de his Gal. 13. meth. cap. 6. ibi, Dolor prouenit, uel ob intemperiem & uultus confusionem, & distorsionem & tensionem, uel obstructionem quādam, &c. Lege etiam 14. meth. cap. 1. ibi, Inflammatio fieri solet, quū sanguis copiosus in aliquam particulā procubuit, &c. Lege de his uberius Arcul. 9. almans. &c.

De indiciis inflammationis hepatis.

Indicia hepatis inflāmati sunt dolor inseparabilis in dextro hypochondrio, grauitas

in eo maior quàm in oppilatione, forma corporis mutatur: apparet enim in facie & in alijs membris tumor siue inflatio: color tendit ad citrinum uel pallidum, nulla adest pulsatio, ut in ceteris inflammationibus, costæ nothæ ut plurimum dolent, exigua & sicca tussicula adest, singultus quoque sequuntur, dormire non ualent super latus dextrum, & super sinistrum dormire graue est, febris adest acuta. Signa quando adest in gibba parte sunt grauitas maior, quàm in concaua, singultus minor, tensio apud suspensoria manifestior fit tactui, præcipuè in debili, tussis sicca, difficultas anhelitus maior, ob consensum diaphragmatis, urina pauca cum mordicatione, lingua est citrina, ad nigredinem decliuis. Signa quando fuerit in concaua, singultus maior, grauitas minor, eò quòd à stomacho sustètatur, tussis parua, & anhelitus paruus, dolor uehementior, nausea, appetitus destructio, sitis uehemens, uomitus biliosus, frigus extremitatum, & nigredo linguae & syncopis, &c.

Loci consentientes de signis
inflammationis hepatis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 7, Iecur affici declarant in dextra præcordiorum parte grauitas, dolor tota præcordia contrahens, & ipsius usque ad iugulū extēsiō, exigua tussis, linguae color in primis ruber, deinde niger, ingēs ciborū fastidiū, sitis inexhausta, uomitus tū sincera bilis, tū quæ ouorū vitellis similatur, quæ postea æruginis colorem refert, aluus adstringitur, si inflammatio cū eius visceris imbecillitate excitetur, spiritus adest difficultas, febris acuta, &c. Et paulò post, Inflammationes in simis iecoris partibus fastidiū, nausēā, uomitū biliosum, sitim ingētem, tussim atque dolorē usq; ad dextræ partis iugulū excitant, nōnunquā utrique parti dolor adest, nothæ costæ cōsentiant. In gibba uerò parte inflāmatione existēte, præter dicta, tumoris cumulus cōprehensim conspicuus in superficie tactui, maximè si abdomen gracilescat, cōprehenditur, dolores circa respirationem, & tussicula magis intēdūtur cum dolore ad iugulū extēso, ut detrabi uideatur ma-

gis quàm intima parte. Si uerò in rectis muscu-
lis inflāmatio accidat, tumor erit præter na-
turā oblongus, atque per totū uētre extēsus,
umbilicū cōprehendēs, &c. Lege de his Auic.
14. tract. 3. cap. 2. ibi, Signa communia sunt,
quòd inuenit æger grauitatem sub hypochon-
drijs inseparabilem, & inuenit illic dolorem
uehementem, &c. Lege similiter Arcul. 9. al-
mans. Item Gal. 2. de loc. aff. cap. 9, ibi, Si
incognita nobis fuerit inflāmatio, iubendum
est agro, ut magnā edat respirationem, &c.
Vide etiam de hac re Paul. lib. 3. cap. 46. &
Aet. ser. 10. ca. 3. & Gal. 2. de loc. aff. ca. 8.

De cura inflammatio- nis hepatis.

In curatione hac tota adhibenda est dili-
gentia, ne hepatis læsio per totum corpus di-
spargatur. Erunt igitur intentiones curationis
sex, prima erit reuulsio. 2. re percussio. 3. hu-
moris præparatio. 4. euacuatio. 5. resolutio.
6. malæ cōplexionis derelictæ remotio, cū re-
gimine sex rerū non naturalium. Reuulsio fiet
cū sectione uenæ basilicæ, aut cephalicæ, quæ
an fienda sit ex opposito, an ex eodem late-

re, dubitat Conciliator differentia 198. quæ
 fusius uidebis. Diuertimus etiam cum frictio-
 nibus, ligaturis, cucurbitulis circa partes ex-
 tremas positis, & similibus. Repercussio fiet
 tum per exteriora, tum per interiora. Conue-
 niunt extrinsecus epithemata & inunctiones
 ex oleo ros. de citonijs, uel ex aquis rosarum,
 solatri cum syndone madefacta & hepatis
 applicita, quibus addi possunt pulueres
 ex sandalis rub. & al. & cit. ex rosis, cor-
 ticibus & floribus granatorum, & aliquid
 camphoræ: sed in materia frigida accipimus
 aliquid absinthij masticeis cum oleo ros. ma-
 sticino, &c. Intrinsecus ualent syr. ros. de
 succo acetosæ, plantaginis, cichorij, cap. si-
 ne aquis, in causa frigida: rhodomel, syr.
 de duabus rad. oxymel cum syr. ros. Et hæc
 faciunt etiam pro tertia intentione, uno ta-
 men animaduerso, quod styptica tantum
 in principio, sed cum materia iam fluxa est,
 alijs non stypticis uti possumus, ut syr. ace-
 ros. simp. uiol. de endiuia, de fumo terræ,
 &c. Euacuatio fiat rursus peccante sangui-
 ne, cum sectione uenæ hepaticæ, aut pec-

MEDIC.
IN CVR. MORB. LIB. III. 749

cante cholera cum rheubarbari infusione,
aut cū alijs pharmacis, prout millies dictum
est. Resolutio fit cum his quæ resoluunt, ad-
dendo aliquid quod nonnihil stypticitatis
secum afferat: & huc spectant inunctiones,
cataplasmata, & epithemata cum anetho,
melliloto, althæa, camomilla, rosis, ab-
sinthio: similiter cum oleo anethino, camo-
millino, ros. &c. Si uerò ad suppurationem
uerteretur, tunc suppurantibus utendum,
qualis est decoctio passullarum, caricarum,
althæe, malvarum, semen lini, fœnugræci,
cum oleo amygdalarum dul. cum pinguedi-
ne gallinæ, anatis, butyro, ex quibus pa-
ramus cataplasmata, &c. Maturata in-
flammatione tunc uomica, uomitu, tussi &
sternutamentis, & similibus prouocanda
est: deinde abstergenda, si in gibba fuerit
parte, cum urinam prouocantibus & ab-
stergentibus, qualis est aqua hordei, cice-
rum rub. hydromel, hydrosaccharum, &c.
Si in concaua, cum his quæ per secessum edu-
cunt, qualis est cassia, serum caprinum, ta-
marindi, &c. deinde consolidandum erit, si-

ue conglutinādum cum bolo armenio & terra sigillata, &c. Quòd si abscessus ad duritiē permutetur, quanuis rarò curationem admittat, nihilominus cum emollientibus procedemus, sicuti cum althæa, maluis, &c.

Loci consentientes de cura inflammationis hepatis.

Gal. 13. meth. cap. 6, Communis omnium phlegmonum curationis indicatio est euacuatio : quæ uerò adhuc in generatione sunt, in ijs prior euacuatione est influentis in affectū locum sanguinis inhibitio, &c. Et cap. 11. eiusdem lib. Quum iecur inflammationem patitur, tum reuellendus, tum educendus, qui ad iecur fluit, sanguis est, interna in dextro cubito insecta uena, propterea quòd è directo & ampla uia cū uena, quæ caua dicitur, societatem habet, qua non apparente media secanda est : quòd si ea nec se ostenderit, reliqua ac tertia incidenda est, &c. Ex quibus notare debes, quòd stante uirtutis robore modo κατ' ὄν, id est, è directo extrahatur

sanguis : & si alia atque alia uena secetur,
 non multum referre, quum singula uenae sibi
 in euacuatione respondeant. Auic. 14. tra.
 3. cap. 12, Phlebotoma igitur in primis, & nō
 hæsites in hoc, quum non est prohibitio for-
 tus, & extrahe sanguinem abundantem. Et
 scias quod indiges in initio eius eo quod est
 simile in casu de percussione & infrigida-
 tione, &c. Gal. 13. meth. cap. 16, In iecinoris
 phlegmone, etiam si nihil affluat, reprimen-
 tibus utendum : & reddit binam rationem :
 primò quia in principio parum est quod af-
 fluit, tum magna ex parte non crassum, tum
 recipientis partis uirtus ualentior : secundò,
 quia nondum in afflicta parte uiolenter im-
 pactum est. Quum uerò phlegmone in suo ui-
 gore consistit, contrario modo omnia se ha-
 bēt, adest enim multitudo sanguinis craffi
 ac impacti, tum uirtus partis debilior, ut à se
 superuacuo emolliri nō possit. De digestionē
 lege Auic. ibi, Medicinæ conueniētes aposte-
 matibus hepatis in initio rei, quū illic est ca-
 liditas superflua, sunt, aqua endiuiae & aqua
 solatri cum syr. acetoso, zucharino, & aqua

hordei, arnoglossæ, cuscute, cucumeris, cucurbitæ, &c. De euacuatione loquitur Gal. 13. meth. cap. 15. ibi, Considerandum an in gibba uel in caua parte fiat inflammatio: si caua parte, purgare per aluum conuenit: si in gibba, per urinas. Lege etiam 14. caput huius, ibi, Expellere iecinore oportet, quicquid in totum atræ bilis, tum saniei ex phlegmone prouenientis iam collectum est, &c. De regimine resolutionis loquitur etiam Auicenna. ibi, Quapropter indiges ut incipias à regimine resolutionis materiei in hac ægritudine: plusquam sit tua inceptio in reliquis apostematibus, timeto lapideitatem & duritiem, &c. De cibo & potu habes plura ex Gal. 13. meth. ca. 14. ibi, Poscit ergo tum iecur ipsum, tum os meatus, qui bilem transmittit, cibos & pharmaca quæ obstructa recludant, qualia sunt non lenta, sed quæ tenui consistētia sine qualitate mordente (nam à mordentibus phlegmones irritantur) non dulcia, quia à dulcibus tum iecur tum lien intumescunt. Talia igitur erunt, ut in cibis prisana, & in pharmacis oxymel cum aqua mixtum, puni-

ca mala, & quaecunque adstringunt, interduntur, quum bilis meatus os arcler, & bilem ipsam excerni prohibeant, & phlegmonas ipsas quæ in cavo sunt uisceris irritent, magis quàm in gibbo: nam quum ad gibbum perueniunt, iam quæ assumuntur, mutata sunt, ut sic nec adstringat uel mordeat, &c. Auic. in fine ca. Cibus autem melior est chisch hordei, in frigidat enim & abstergit, & non facit acquirere oppilationes, & festinat eius penetratio: panis non ex frumento, sed ex simila, & ex oleribus, lactuca & attriplices, ex fructibus granata dulcia, &c.

Obiectio.

Miror mirum in modum, mala punica, dulcia hinc ab Auic. concedi, tum quia adstringunt, tum quia ex dulcibus hepar intumescit, & aquam hordeaceam hinc concedi, & in altero sequenti textu renui, ibi, Et aqua hordei quanuis abstergat sine mordicatione, tamen est dulcis, & dulce facit incurrere oppilationes, &c. tamem à Raze, Serapione & Haliabate commendatur, &c.

Bbb.i.

Responsio.

Gentilis putat Auic. tex. corruptum, & loco aquæ hordei, legi debere aquæ mellis. Vide tu commentatores Auic. & intelliges causam alterius obiectionis.

Observationes in cura inflammationis hepatis.

Marcus Cat. de mēte Auic. Statim, inquit, succurrendum est huic ægritudini, non tantū in iecore, sed in quocunque membro principali, alioqui cura esset uana, &c. Galen. 13. meth. cap. 8, Prohibendum ne tumor augeatur, nec suppuretur, cauendo etiā ne ad scirrhum conuertatur: nam facilè tumor in duritiē euadit, &c. Auic. 14. tra. 3. cap. 12, Nullis remedijs succurrendum, ni prius facta sit sectio uenæ, aut antequam pharmacum non conueniente sectione sit exhibitum. Nam, inquit, si phlebotomas, & dimittis materiam in hepate, & administras styptica & apocrustica, procul dubio induratur apostema. Caue tamen in exhibendo pharmaco, ne nimium soluentibus utaris, nam hepar ultra quod imbecille reddunt humores, etiam commouent, ut

interdum maiori copia ad locum laesum re-
fluant, &c. Vitandum insuper ne urinā pro-
uoces morbo in concaua parte existente, aut
soluas uētre, si in gibba parte tumor fuerit,
&c. Gal. 13. meth. cap. 12, Quacunque ieci-
nori intrinsecus uel extrinsecus applicantur,
non sint actu frigida: nam ultra quod ad lo-
cum difficulter penetrarent, meatus etiā cutis
occluderent, &c.

Observationes de repellentibus
& resoluentibus.

Auic. loc. cit. Repellentia sint in styptici-
tate remissa, & nisi tumoris augeatur cali-
ditas, cum aperiētibus & incidētibus misceā-
tur: resoluentia citius in iecoris inflammatio-
nibus sunt applicanda, quā in ceterorum
membrorum tumoribus, &c.

Conferētia inflammationi hepatis.

Conferunt inflammationi hepatis agresta,
atriplex, berberis, camphora, capillus Ven.
acetositas citri, cucurbita, endiuia, cichoreū,
hepatica, lupuli, mercurialis, nymphaea, por-
tulaca, rheubarbarū, rosa, sandali, semperui-
ua, solatrum, spodium, sumach, tamarindi,

Bbb. ij.

756 DE CONSEN. MEDIC.

uiolæ. Composita sunt, confectio de acetosis
 Mes. electuarium de psyllo Mes. ceratum de
 sandalis, emplastrum de frumento Mes. de
 semperuiua Haly, oleum irinum rosaceum,
 syr. acetosus de pomis, de portulaca, triasandali
 Nic triphora persica, troc. de sandalis
 Mes. de spodio, de camphora, unguen. ros.
 uiol. hiera, siracost. Mes. papauer cum oleo
 rosaceo, &c.

De prognosticis inflammationis hepatis.

Auic. 14. tra 3. cap. 1, Et apostema quod
 est in gibbositate est deterius eo quod est in
 concauitate. Et apostema hepatis siue calidum
 siue frigidum oppilationem facit, & non re-
 linquit corpori nisi sanguinem aquosum, &
 cum hoc debilitat hepar in separando aquo-
 sitatem, quæ si in meseraicis continetur, est
 causa hydropisis carnosæ & ascitis. Item
 quando permutatur calidum ex hepate ad
 splenem, est bonum: si uero ex splene ad hepar,
 malum. Et cap. 2, Interdum omnis species apo-
 stematum hepatis perducit ad hydropem: &
 scias quod quum apostemati hepatis associa-

tur ventris solutio, est mortale. Et cap. 16,
Non euadit aliquis ex apostemate duro qui-
escente & confirmato. Hippoc. aph. 7. aph.
46, Quorum hepar suppuratur, aduritur, si
pus purum & album fluxerit, euadunt: nam
in tunica his pus continetur: si uerò qualis
amurca fluat, pereunt. B. Quia si pus album
& purum fluat, signum est, quòd ad carnem
hepatis usque corruptio non pertingit, sed
tātū in eius tunica fuisse: si uerò ut fæx olei
fluat, tunc declarat substantiam hepatis esse
corruptam, idcirco non ab re moriuntur, &c.
Hippoc. aphor. 7. aphor. 17, In hepatis in-
flammationibus singultus malum. B. Quia ex
magnitudine inflammationis stomachus cō-
patitur, unde fit singultus. Hippoc. aphor. 6.
aphor. 18, Vesica discissa aut cerebro aut
corde aut septo transuerso, aut aliquo ex
tenuioribus intestinis, aut iecinore, lethale
est, &c.

Authores dissentientes cir-
ca morbos hepatis.

I Adserere, aquam hordeaceam nō conue-
nire in inflammationibus hepatis.

Bbb. 14.

758 DE CONSEN. MEDIC.

2 Adserere, profluuium uētris in apostemate hepatis ex abundanti materia non esse mortale.

3 Adserere, nutrimentum uiscosum non nocere hepati.

4 Adserere, hepati supercalefacto cerusam tanquam frigidam esse applicandam.

5 Adserere, stypticiora magis conuenire in hepatis apostematibus quàm stomachi.

6 Adserere, in apostemate hepatis phleboto-
miā potius in pede, quàm in brachio fiendā.

Confutatio dissentientium cir-
ca morbos hepatis.

Ad primum, aqua hordei nō solūm ab A-
uicen. sed à Serapio 4. tra. ca. 2. & à Rhaze
in lib. diuis. & à Gal. 13. meth. ut suprà. Ma-
ximè igitur dum commendatur conuenit.

Ad secundum, Auic. Quum hepatis aposte-
mati sociatur fluxus uentris, est mortale: &
intellexit propter materiæ exuberationem.
Similiter factus ab imbecillitate hepatis est
mortalis, ut uolunt Auic. commentatores.

Ad terciū, Serapio, Indiget hepar cibis &
potibus, & medicinis apertius, non uiscosis,

sed subtilibus, non mordicatis neque dulci-
bus, neque stypticis & ponticis, eò quòd oppi-
lant, &c. igitur, &c.

Ad quartum respondet Conciliator diffe-
rentia 197, quòd per se cerusa nocet hepati,
quanvis cum alijs quæ suam uirtutem introfe-
rant, possit interdù iuuare, sed melius esse cum
alijs aromaticis operari, &c.

Ad quintum respondetur per ea quæ dicta
sunt in cura. Nam Auic. 13. tra. 4. ca. 1, Quo-
niã ex magis stypticis grande nocumētum re-
sultat, eò quòd hepar uelocius quàm stoma-
chus correspondet duritiei, quam inducunt
styptica, &c. & sic non conferunt magis he-
pati quàm stomacho, &c.

Ad sextum, Auic. allega. cap. inquit, Phle-
botoma, si tibi possibile est, ex basilica: & si
nō, ex nigra: & si non, ex cephalica: eò quòd
directius hepar respiciunt. Et hoc etiam ha-
bes ex Galeno in cura: igitur magis in bra-
chio, quàm in pede.

De morbo regio.

Ictericia dicta est ab ictero aue, quæ nos gal-
bulam siue ficedulā dicimus, de qua facit men-

Bbb. iij.

tionem Martialis, dicens:

Galbula decipitur calamis, & retibus ales

Turget adhuc uiridi cum rudis uua mero.

Dicta est etiam *Aurigo* à colore auri, uel *arcuatus morbus*, à cælestis arcus colore, aut *morbis regius*, eò quòd morbo affectos apparatu regio & ludis lasciuis uti perutile est.

Horatius,

Aut mala quæ scabies aut morb⁹ regius urget.

Est autem *morbis regius* per totum corpus bilis suffusio, quæ interdum nigra, interdum flaua est, ex qua color citrinus uel niger apparet, &c.

Loci consentientes de morbo regio.

Plin. *Ictericis* aus à colore uocatur, quæ si spectetur ab icterico, sanari id malum tradunt, & auem mori. De deductione horum nominum lege fusiùs Cornel. Cel. & Aet. ser. 10. ca 17. & neotericos omnes. Galen. lib. finit. med. *Aurigo* seu *morbis regius* arcuatusue est bilis refusio in cutem, quo fit ut superficies tingatur, lutea que fiat, & uitiatur cutis, &c. Auic. decimaquinta tertij, cap. 3, *Ictericia*

est coloris corporis fæda alteratio ad citrinatatem uel nigredinem tendens, ob cursum humoris citrini & nigri ad cutē sine putrefactione, &c. B. Similis definitio legitur etiam penes Concil. diff. 78. adiungit tamen Auic. sine putrefactione: quia re uera dum bilis putresceret, non icteritiam tantum, sed febrem tertianam produceret. Vide Aet. ser. 10. cap. 17. & Paul. lib. 3. cap. 50.

De causis morbi regii.

Causæ si extrinsecæ fuerint, tres erunt: scilicet, uirus alicuius animalis, assumptio ciborum icteritiam efficientium, uel bilem generantium & obstruentium, & nimius labor in sole calido. Intrinsecæ uel fiunt ab hepate uel ab alijs membris. Si ab hepate, uel erit mala intemperies calida uel frigida cum abscessu uel sine abscessu, aut obstructio, aut facultatis attractoriæ uel secernentis imbecillitas. Si à splene, tunc in causa est apostema, uel obstructio, uel mala complexio, uel eius facultatis imbecillitas, & sic de alijs membris intelligito. Interdum fit per morborum indicationes, &c.

Loci consentientes de cau-
sis morbi regii.

Galen. 5. de loc. affec. cap. ult. Morbus re-
gius nonnunquam fieri solet iecinore nequa-
quam affecto per morbi iudicationem. In-
terdum citra morbi iudicationem, dum san-
guis extranea quadam corruptione in bilem
uertitur, qualis ferarum morsu fieri solet, aut
assumpto ueneno. Interdum fit ab obstru-
ctione, aut ab inflammatione, aut à scirrho
iecinoris, aut citra hæc ab ipsa tantum ieci-
noris intemperie præter naturam mutata,
aut à iecinore suo munere non fungente, aut
ob splenis uitia. Interdum ab attractricis fol-
liculi fel continentis imbecillitate, aut quia
folliculus est obstructus, aut quia eius facul-
tas secretoria est imbecillior. Interdum fit
etiam ob obstructis aut infirmis uasis, quæ ab
ipso exorta ora sua in hepar extendunt, &c.
Auicen. 15. cap. 3. ibi, Ictericia citrina aut
fit multitudine generationis cholerae citrinae,
aut propter euacuationis eius prohibitionem,
& multitudo eius generatur ab hepate pro-
pter causas calefacientes, aut propter apo-

stemata in hepate, & in meatu cholerae, aut propter oppilationem retinentem choleram in felle, aut propter caliditatem complexionis cholerae, &c. Lege fusius, & tam intrinsecas, quam extrinsecas causas icteritiae intelliges. Vide & Gordonium & Arcul. in proprio cap. Gal. 4. apho. com. 62, Tres sunt affectus, quibus morbus regius solet aduenire, tumor durus, inflammatio & obstructio. B. Nam dum sanguis expurgatur, & bilis à uenis ad meatus bilem recipientes transfertur, si trium alterum adfuerit, necesse est sanguinem non expurgari, sed unà cum ipso bilem per totum corpus differri, unde morbus regius oritur. Vide Paul. lib. 3. cap. 50, & Auicem. de oppilationibus hepatis, ibi, Materia quae generat oppilationem aut est humor oppilans propter suam crassitiam, &c. lege eum fusius, &c.

De signis morbi regii.

Signa communia sunt, pigrities & tumor ad motum grauius, dulcibus cibis auersantur, uariis imaginibus uexantur, pruritus totius corporis adest, difficulter exudat, alba oculo

rum, & faciei tempora, & malæ pallorem
demonstrant, &c. Signa malæ hepatis tem-
peraturæ per ea quæ de imbecillitate hepa-
tis diximus satis nota erunt. similiter & abs-
cessus signa per ea quæ retulimus de inflam-
matione hepatis, &c. Signa oppilationis
sunt grauitas, dolorque sub dextra parte, nul-
lo tumore uel urgente febre percepta: item si
egestio flaua non egrediatur, sed alba. Signa
imbecillitatis expulsiuæ facultatis sunt, si u-
rina nullo colore infecta excernatur, etiam si
nulla grauitas percipiatur. Cognoscitur etiã
ex attractoria facultate fieri, si nausea, vo-
mitus, amaritudo oris, nullo apparente in ie-
core grauitatis sensu adfuerit, & flauus co-
lor paulatim & non subitus fiat. Signa ue-
neni erunt, si nulla prius existente humo-
rum malitia, sed ex homine sano statim icte-
rus euadat: nam absque mora uirus per to-
tum corpus diffunditur. Signa sumpta à crisi
sunt, si febres præcesserunt acutæ, & alia quæ
crisim indicare solent. Signa quæ per con-
sensum totius corporis fiat erunt ex febribus,
quæ tenues sanguinis partes in bilem commu-

tant. Signa quòd fiat à cisti fellis sunt quòd accidit subitò, & egestio est alba, adest amarus oris & sitis, & si porus, qui uadit ad stomachum, est oppilatus, tunc urina est colorata, spissa, crocea, egestio tincta crocea, &c.

Signa quòd ex splene fiat, sunt durities splenis, grauitas, & ictericia potius nigra quàm flaua, &c.

Loci consentientes de signis morbi regii.

Aet. ser. 10. ca. 17, Cōmuniter omnibus ictericis adest pigrities & tumor ad motum grauians, &c. Gal. 5. de loc. affect. cap. ult. Si per morbi indicatiū icterus fiat, indicatiū erit, quòd excrementa & urinæ secundū naturam se habebunt. Si sanguis externa corruptione in bilem uertatur, indicatiū erit totius corporis praesinus siue porraceus color. Si ab obstructione folliculi fellis fiat, signum erit quòd citra febrem morbus regius accidit, urgetque in dextra praecordiorum parte grauitatis quidam sensus. Si uerò ab inflammatione uel alio abscessu, tunc febris aderit cum biliosis deiectionibus, & in dextra praecordiorū parte dolor.

Si ab intemperie hepatis humorum corruptio contingat, tunc totum corpus herbis candenti pallore infectis assimilatur, interdum plumbeum aut magis fuscum colorem refert. Si ob splenis vitium, tunc colores veniunt multò nigriores quàm ab hepate, &c. Lege de his 9. de compos. med. per loc. cap. I. B. Nota tamen quòd uelle ex colore tantum affectum sedem diuinare, est malum, ut Galen. refert 5. de loc. affect. cap. cit. de Stesiano exemplum afferens, &c. Lege etiam Auicem. 15. tra. I. cap. de signis icteritiæ citrinæ, Natura omnia illa nuper à me recitata habet, quæ tu latius uidere poteris: si enim omnia in unum congererem, longè à negotio res librum excederet. Vide de his Arcul. & Gord. Paul. & ceteros practiçantes. Similiter de icteritiâ nigra lege Gal. 6. de loc. affect. cap. de affect. lienis, & Aet. serm. 10. cap. 17. Vide etiam Auicem. de signis oppilationis hepatis, ibi, Signa oppilationis sunt, &c.

De cura morbi regii.

Morbus regius indicatoriè ex febribus per

fectè solutis eueniens, uisibilis ad cutem trās-
lata, si multum crassa, balneis uel rebus dis-
cussorijs facilè curabitur, quale est balneū ex
aqua dulci, uel ablutio oculorū & totius cor-
poris cum aceto albo calido, & succo citri,
in quo bullierint flores camomillæ, &c. Ve-
rū si crassa fuerit, in primis extenuantibus
uti oportet, deinde discussorijs. Si à causis
primitiuis fiat aurigo, tunc singulæ remo-
ueantur, ut si morsus uiperarum sit in cau-
sa, curetur ad externas partes uirus dedu-
cendo, & membra principalia tuendo. Si cau-
sæ sint per cōsensum à toto, ut in febris, re-
moveatur febris cum euacuatione, sectione ue-
næ & soluentibus pharmacis, deinde infrigi-
dantibus, ne sua caliditate sanguis in bilem
conuertatur. Si uerò fuerit caliditas hepa-
tis uel alterius membri, remoue per infrigi-
dantia, cauendo obstructionem, & membra
demum roborando.

Cura Arcuati ex multitudine bilis qua-
tuor habet intentiones: Prima est euacuatio,
ne dum superfluit bilis, ipsa suæ multiplica-
tionis sit causa, quæ fieri interdum debet

cum sectione uenæ, interdum cum pharmaco, ut cassia, manna, rheubarbaro, electuario, de suc. ros. ros. Mes. diaprunis sal. &c. Secunda est humoris preparatio, & fit cum acetoso simp. syr. de endiuia, uiol. de cichorea, de suc. acetosæ, de agresta, de limonibus, de acetos. citri cū aquis & decoctis similibus. Tertia intentio est discrasia membri derelictæ remotio; unde in causa calida conuenit tale epithema: R. aquæ endiuie lib. i. ros. un. ij. sandalorum spodyana. drac. i. aceti un. i. spicæ scrup. i. Misce, & cum syndone applicetur hepatis, uel fiat ceratum sandalinum. Electuaria sunt triasandali, diarrhodon, troc. de camphora. Quarta intentio erit sex rerum non naturalium ad frigidum & humidum declinantium, de quibus satis aliàs diximus, &c. Cura icteritiæ ex obstructione quatuor etiā intentiones requirit, prima humoris obstruentis incisio, extenuatio atque reseratio, & fit cum syrupo bisantino, cum aceto de duabus rad. rhodomelle, oxymelle, syrupo de eupatorio, de cichorea, &c. cum aquis fœniculi, apij, cuscute, & eupatorij. Consulerem tamen in hoc,

ut prius stomachus cum cassia uel pilulis aleophanginis purgaretur, antequam ista exhibeamur. Secunda erit euacuatio, quæ perficitur cum ijs quæ bilem crassam & pituitæ admixtam purgant, utputa cum rheubarbaro, agarico, diaphinicone, diaturbit, & ænemate acri, quod ad intestina superiora pertingeret. Tertia intentio est palliditatis uel fædi coloris ablatio, & occlusarum uiarum apertio, & fit cum rebus aperientibus & urinam prolicientibus, ut cum decocto apij, fœniculi, asparagi, brusci, petroselini, aqua raphani, uel decocto marrhubij, prasii, cicerum, rub absinthij, centaurij minoris, cuscute, uel cum infusione cartami in lacte in ore Aui-
cen. uel cum dialacca, diacurcuma, diacalamento, troc. de rheubarbaro, de eupatorio, &c. Quarta intentio sit circa regimen, quod calidum & aperiens & extenuans instituat. Curatur Aurigo, si à facultatum siue iecoris, siue folliculi fel continentis imbecillitate fiat, prout de hepatis imbecillitate iam dictum est, &c.

Ccc.i.

Loci consentientes de cura
morbi regii.

Gal. 9. de compos. med. per loc. ca. 1, Ictericus qui ratione indicationis febrium sunt, curantur balneis aquarum potabilium, & olei discussorij affricu, omniumque rarefacientium cutem, quale anethinum oleum & camomillum. Qui uero regium morbum ex obturatione incurrunt, per omnia quaecunque strenue extergent, etiam si medicamentariam substantiam habeant, & calidae sint facultatis, curantur. Conueniunt ictericis ex inflammatione hepatis quaecunque inflammationes sanant. Si uero inflammatio & obturatio simul coincident, laxantibus, simulque extergentibus opus erit: fugienda tamen quaecunque medicamentariae substantiae & calidae facultatis existunt, &c. Auic. 15. tra. 1. ca. 6, Scias quod in tertio in curatione ictericitiae ad duas res redit, quarum una est, ut remoueatur ictericitia cum eo quod resoluit ipsam à cute & ab oculo cum medicinis lauatiuis & solutiuis educentibus materiam facientem ictericitiam. Secunda uertitur ad causam & abscindit eam, & est aut

rectificatio complexionis, aut confortatio uir-
 tutis, aut regimen apostematis, aut apertio
 apostematis, aut apertio oppilationis, aut e-
 uacuatio per phlebotomiam basilicæ, &c.
 Aet. serm. 10. cap. 18, Secatur uena quibus
 copia sanguinis unâ cum bile in toto corpore
 abundat, aut quibus dolor uel distensio cir-
 ca præcordia fuerit. Et de purgatione lo-
 quens dixit, Quare in principio purgare non
 oportet, priusquâ per deoppilatiâ bilis at-
 tenuetur. Nanque mali causam purgationes
 in principio datæ præhuerunt, &c. Galen. 5.
 de loc. affect. cap. ult. Quibus morbus regius
 citra febrem accidit, urgente in dextra præ-
 cordiorum parte grauitatis cuiusdam sen-
 su, ijs omnibus obstructions aperiens & ci-
 bis & potibus & medicamentis extenuanti-
 bus, deinde medicamentum quod bilem du-
 cere possit exhibens, eorum plurimos una die
 sanitati restituimus, &c. Lege de his omni-
 bus intentionibus Arcul. Gordonium, Mar-
 cum Catin. & ceteros practicanes. De cibo
 & potu & de alijs sex rebus non naturali-
 bus lege Auicen. 15. cap. 6. ibi: Et cibus qui-
 Ccc. ij.

dem ictericorum. Et cap. 7, ibi, Cibi in omnibus illis sint cibi leues. Vide eum fusius. Vide & alios supra scriptos authores.

Observationes in cura.

Auicenn. 15. cap. 6, Omnes qui habent icteritiam ex causa calida, deueniunt iram, & morum primum & balneum, &c.

Conferentia morbo regio.

Conferunt icteritiæ absinthium cum apio uel adiantho, acetosa, acorus, aphodillus, agaricum, aloes, alcacangi, assarum, attri-plex, berbena, betonica, ciclamen, calamentum, chamædrys, chamepitrys, camomilla, cassia, siliqua, centaurium, cartamum, curcuma, cuscutha, helleborus, endiua, eupatoriū, epatica, fœniculum, lactuca asini, lumbrici, lupulus, marrhubium, menta, multipedum aseliue, nepita, origanum, peonia, perdix, peucedanum, aqua raphani, rheubarbarum, rosmarinus, rubea tinctorum, aqua salicis, sulphur cum ouo, scariola, scolopendria siue citrach, stercus asini pulli bibitum, tamarindi, tamariscus, urina, urtica, hyssopus. Com-

posita sunt, confectio de ravedseni, de eupatorio Mes. decoctum fumi terræ & coltulae, diarrhodon Nic. electuarium de psyllo, rosatum Mes. diaphinicon, oleum de cartamo, de absinthio, syrupus bisantinus de fumo terræ, de absinthio, de cichorea cum rheubarbaro, oxymel scilliticum, sotira Nicolai, theriaca, triasandali, triphera persica Mes. triphera saracenica Nic. Tro. de rheub. de rosis, de eupatorio, de camphora, uinum scilliticum, pilula Indæ de fumo terræ, &c.

De prognosticis morbi regii.

Hippoc. aphor. 4. apho. 62, Quibus in febribus morbus regius ante diem septimum acciderit, malū. Et aph. 64. eiusdem lib. Quibus in febribus morbus regius septimo uel nono, uel undecimo, uel quartodecimo superuenerit, bonum, nisi dextrū hypochondrium obduruerit: si uerò non, bonum. B. Morbum regium in febribus accidere ante septimum, malum ex eo est, quia uel ab inflammatione, uel à duro hepatis tumore, uel ab ipsa obstructione oriri indicat: post septimū uerò, bonum, nisi ex dictis quispiam affectus hepatis acciderit. Vide

Ccc.ij.

tamen pro aphor. isto Hipp. 4. de uic. in morbo ac. com. 81. Hip. aphor. 6. aph. 42, Morbo regio laborantibus, si fiat hepar durum, malum est. Et apho. 5, Qui morbo regio laborat, non admodum uentosi sunt. B. Quum nec uentris imbecillitate, nec pituitoso humore, à quibus fieri solet ipse flatus, icterici laborant, idcirco flatuosi non esse possunt. Auicē. 15. cap. de ict. In omni oppilatione in meatu hepatis ad fel, aut in meatu fellis ad intestina, quæ est ex incarnatione, aut porro, non speratur sanitas. Et in eo qui habet icteritiam frigidam, qui non curatur, nec resoluitur eius materia, est timor, & pluribus eorū associatur mors subita. Et quando multiplicatur remanentia urinae albae cum icteritia, aut parum tinctæ, est deterius, & magis timendū ne cadat habens eam in hydropem. Et ad summam, dum non remouetur apostema, & reëctificatur dispositio, non habeas spem in curatione ipsius icteritiæ, &c.

Authores dissentientes circa
morbum regium.

1. Adserere, icteritiam ante septimum appa

rentem, semper esse malum indicium.

2 Adserere, icteritiam post septimum appa-
rentem absque tumore hepatis, esse bonum si-
gnum simpliciter.

Confutatio dissentientium cir- ca morbum regium.

Ad primum respondetur, esse uerum, nisi icte-
ritia cum alia euacuatione cōiungatur, utpu-
ta cum sudore uel uentris fluxu: nā tunc est bo-
na. Et hoc uoluit Gal. in fine com. 62. 4. aph.

Ad secundum responderetur, quòd icteritia
proueniens in 7. 9. Et II. non est iudicanda
bona, nisi materia concoctio præcesserit: Et
hoc uoluit Auic. ubi de signis icteritiæ deter-
minat. Vnde, inquit, si icteritia accidat in 7.
aut 9. cum signis laudabilibus, sine hepatis læ-
sione, tunc erit bona: si minus, neutiquā. Igi-
tur non simpliciter bona, etc.

De splenis affectibus.

Scias quòd omnia morborum genera huic
membro accidere possunt, sicuti intemperies ca-
lida, frigida, humida, sicca, siue nuda, siue cū
aliquali materia, qualis est imbecillitas sple-

Ccc. iiij.

nis aut mala compositio, aut obstructio, quæ nihil aliud est quàm morbus in uis lienis, prohibens naturalium aut superfluarum humiditatum transitum, quæ per ipsum transire naturaliter consueuerunt: aut solutio continui, qualis est dolor, qui est splenis quædam tristis sensatio, nõ per carnem ipsam splenis, sed potius per panniculum eam contegentem facta. Hinc etiam abscessus plures enumerantur species, ut dura, mollis, biliosa, sanguinea.

Loci consentientes de splenis affectibus.

Auic. 15. T. 2. cap. 1, Spleni accidunt omnes species aggritudinum, quæ sunt mala complexio, compositio, sicuti oppilationes, et solutio continuitatis, et similia, et apostemata cum speciebus suis, etc. Gal. 6. de loc. aff. ca. Quum itaque splen multa habeat accidètia cum hepate communia, illa nulla re differre uidentur, nisi quòd quædã magis, quædã uerò minus alterutri euenire solet, etc. Lege de alijs Arcul.

De causis affectuum lienis.

Causa imbecillitatis splenis est ipsa intemperies calida, frig. humi. sicca, etc. Causa ob-

structionis sunt uel cibi craſſi & atrabilarij, aut aliquod apoſtema uel flatus craſſi obſtruentes. Cauſa doloris eſt ſoluta cōtinuitas ſiue à mala intemperie, ſiue ab apoſtemate, ſiue à flatu craſſo facta. Cauſæ apoſtematum ſplenis procatarticae ſunt aër craſſus, uinū craſſum, & cibi atrabilaria. Cauſæ antecedentes & coniunctæ nonnullæ per ſe exiſtunt, aliæ per conſenſum. Per ſe ſunt, uel expulſivis imbecillitas, uel attractoria fortitudo, aut alteratricis debilitas, aut obſtructio illius uenæ per quam atra bilis ad os ſtomachi deſertur. Materia uerò efficiens apoſtema uel eſt ſanguis niger, uel alij humores, quanuis rarò pituita. Per cōſenſum ſunt totius ut in febris, uel partis ut in hepatis intemperie, aut in utero menſtrua retinens, &c.

Loci conſentientes de cauſis
affectuum lienis.

Quòd intemperies ſit cauſa imbecillitatis, lege Gal. 5 de loc affe. cap. ult. ibi, Omnium facultatum eſſentia, &c. Et 6. de ſympto. cau. cap. 2. Auic. 15. T. 2. cap. 9, Oppilatio quandoque ſit ex uenofitate, quandoque ex apo-

stemate & ab humoribus, secundum quod sci-
uisti, & Gal. 9. de compos. med. per loc. ca. 2,
Splen à natura celerrimè indurari solet, san-
guine nimirum in uenis obturato, & ob cras-
sitiem neque excerni, neque discuti facilè po-
tente. Auicen. 15. cap. 13, Dolor splenis aut fit
propter uentositatē & inflationem, aut pro-
pter apostema magnum, aut propter solutio-
nem continuitatis, aut propter malitiā cōple-
xionis, &c. De causis apostematū lege fusius
Arcul. 9. almans. Alex. lib. 3. ca. 25, Oborim-
tur in liene non rarò, ut dictū est, inflamma-
tiones, quarum uniuscuiusque singuli humo-
res possunt existere causæ ut sanguis, bilis,
&c. Similiter Auic. loc. cit. ubi inquit: Sed
phlegmaticum accidit rarò. Lege neotericos
omnes, præsertim Arcul. & Gord.

De signis affectuum lienis.

Signa temperatura calida sunt sitis, infla-
tio lienis, corruptio attractoriæ facultatis. Si-
gna frigida sunt, casus appetitus, fastidiosa
satietas, rugitus ac ructus copia, imbecilli-
tāsque attractoriæ facultatis. Signa sicca

sunt durities corporis, imbecillitas, crassities sanguinis, & color nigerrimus. Signa humida sunt, corporis mollities, nigredo ad albedinem declivis, &c. Signa obstructionis sunt gravitas lateris sinistri, distentio & dolor, nec adsunt signa alicuius abscessus. Signa attractoriae facultatis sunt totius corporis ex sanguine purpureo nigrities & obstructio. Signa retentricis affectae sunt, uomitus sine febre uel alia occasione. Signa inflammationum lienis cognoscimus ex dolore, feruore, distensione, febre, & ex eo quod ad tumidam duritiem, quae scirrhus dicitur, paulò post desinit: hys etiam os foetet, gingivae exeduntur, ulcera in cruribus cicatricem non recipiunt, deinde affecto iecore hydropici fiunt, &c.

Loci consentientes de signis
affectuum lienis.

Auic. 15. tra. 2. cap. 2, Calidam significant complexionem sitis & inflatio in sinistro, & corruptio uirtutis attractivae. Frigidam significant debilitas attractionis & casus appetitus, & iteratio fastidiosa satietatis, &c. lege

eū ulterius. De signis obstructionis lege Paul. lib. 3. cap. 49. ibi, At si lienem grauitas & distentio, & etiam dolor exerceat, meatus obstructio ostenditur, &c. De signis facultatum lienis loquitur Gal. 6. de loc. affe. cap. 1. ibi, Si alteratrix facultas imbecillis sit, sanguis ex iecore in uniuersum corpus impurus transmittitur, quocirca color nigrior euadit. Si uomitione uerō sanguis melancholicus excernatur, qui per inferiora interdum decedere uidetur, indicium est, quod retentrix facultas imbecillis sit. At si euacuatione suppressa mæstitia melancholica superueniat, & cibi auidissimè concupiscatur, acida maximè existente, quæ ad uentriculum transfertur melancholia, expultricem laborare indicium est.

De signis apostematū lienis loquitur Paul. loc. cit. ibi, Inflammationis notæ sunt, feruor, dolor, distentio. Et paulò post, In duritiem occallescit, hoc pressis uitio os fæteret, gingivæ exeduntur, &c. B. Quæ gingivæ corrodantur ratio est, quia uaporis corruptio ad partes gingivarum ascendens eas exedit. Lege de

his Auic. de signis apostematum splenis, ibi,
Communicant apostemata splenis in graue-
dine, magnitudine, &c. Lege etiam Alexan.
Tral. lib. 3. cap. 25. Item Arcul. & Gord.

De cura affectuum splenis.

Cura complexionis simplicis est alteratio
& regimen contrarium, ita ut causa remo-
ueatur. Si uerò fuerit mala intemperies, cali-
da cum humoribus, tunc tres opus erunt inten-
tiones: prima alteratio siue humoris dige-
stio, quæ fit cum syrup. aceroso simpl. syrup.
viol. de endiuia, de fumo terræ de lupulis cū
aquis endiuia, fumi terræ, lupulorū, cichoriū,
&c. Secūda erit euacuatio, quæ fit cū rheu-
barbaro, manna, cassia, pilulis aureis aggre-
gatiuis, electuario de suc. ros. &c. Tertia est
resolutio debilis cum roboratione mēbri, ita
ut mala intemperies remoueatur: & fit cum
zucharo ros. viol. tria sandalis, diarrhodone,
uel per ea, quæ extrinsecus adhibentur, inun-
gendo cum oleo rosaceo, uiolaceo, &c. Tem-
peries uerò frigida curatur cum his quæ hu-
morem pituitosum preparant, quale est oxy-

mel simpl. & compos. scilliticūque, rhodomel, syrup. de duabus rad. bisantinus, euacuatio cum agarico, hiera Gal. diaphinicone, &c. Remouetur mala intemperies derelicta cū electuario diamusc. dul. de baccis lauri, unguendo extrinsecus cum oleo de spica, de ruta, de capparibus, &c. Cura materiae uentrosae similiter digeritur, euacuatur ac resoluitur, & pro resolutione conueniunt diaciminum, diatrion pipereon, theriaca. Extrinsecus resoluunt, fofus ex anetho, ruta, pulegio, calamento, semine anisorum, cimini, fœniculi, similiter oleum rutaceū, de capparibus, &c. Cura inflammationū, quatenus ad causam antecedentem attinet, euacuatione & reuulsione indiget: quatenus uerò ad causam coniunctam, tunc sicuti in alijs abscessibus in primis repellendum, in morbi incremento repellentibus cum aliquali resolutione utendū, in statu & declinatione resoluendum, nisi abscessus in suppurationem uertatur, quia tunc suppurantia opus sunt. Euacuatio igitur in causa antecedente, si humoris copia cum sanguine abundet, tum à uena communi, tum ab

ea quæ inter annularem & minimum digi-
 tum collocatur, sectio fieri debet, uel reten-
 tis mēstruis, uel hæmorrhoidib⁹ à uena in ta-
 lo pedis. Euacuantur alij humores, præpara-
 ta prius cum coctione eorum materia, per ea
 quæ millies dicta sunt. Reuulsio fiet cum enæ-
 mate splen reficiente, aut hæmorrhoidarum
 & menſtruorum prouocatione, &c. Cura a-
 postematis duri tres ſimiliter requirit inten-
 tiones, prima præparatio humorum cum ſy-
 rup. de epithymo, fumo terræ, oxymelle, &c.
 Secunda, euacuatio, quæ fit cum confectione
 hamech, caſſia, myrobalanis indis, epi-
 thymo, &c. pilulis indis, de fumo terræ, de
 lapide lazuli, &c. Tertia eſt mollificatio
 & reſolutio, quæ perficitur cum unguentis
 ceratis, cataplaſmate, foru, &c. de quibus
 plura habes iuxta Arcul. & Gord. Cura fa-
 cultatum affectarum hiſmet remedijs perfi-
 citur, ſi modò quidpiam auſterum adiunga-
 tur, &c. Cura doloris eſt, ut eius cauſa remo-
 ueatur: quæ ſi fuerit mala intemperies, ca-
 lid frig. per contraria remouebis: ſi flatuoſa
 materia, curam habuiſti: ſi ex inflammatione,

cura earum cura, & utere anodinis, prout alias in alys doloribus dictum est. Cura obstructionis splenis sit perinde ac de icteritia dictum est, &c.

Loci consentientes de cura
affectuum splenis.

Gal. 13. meth. cap. 2, Vbi lien phlegmone inuadit, in sinistra manu secanda est uena, siquidem quod euacuandum sit, communis est indicatio. Et 9. de cōpos. med. per loc. cap. 2, Deinde attenuantibus opus est pharmacis, citra manifestam caliditatem, ut ne uehementer incrassescat succus crassus in ipso obturatus. Quò uerò actiones ipsæ conseruentur, ex austeris aliquid his admiscetur, quale etiā adstringentium genus. Ea gratia igitur amara ualde medicamēta ipsi offerimus, & quædā ex austeris ipsis admiscemus. Et 13. meth. cap. 16, Quotiens obstructio quæ in eum incidit, aut phlegmone potissimum ad scirrhum perueniunt, tum ea quæ obstructiones eximāt, tum quæ dissecent, ualentiora exigit. Nam quale medicamentum iecori est absinthium, tale est lieni capparis cortex: & quale est ie-

cori eupatorium, tale est spleni scolopēdrium,
 ꝛc. Alex. lib. 3. cap. 23, Calidiori ꝛ siccæ
 lienis intemperaturæ contrarijs medicamen-
 torum auxilijs, frigoris ꝛ humectantibus
 subueniendum est: frigida uerò ꝛ humida
 calorificis ꝛ arefaciētibus præsidys succur-
 rere expedit, ꝛc. lege eum fusius: nam ibi
 plura ad curam facientia intelliges, ꝛ de-
 mum omne genus eduliorum in morbis sple-
 nis congruentium etiam percipies. Lege insu-
 per Arcul. Mar. Cat. ꝛ Paul. lib. 3. cap. 49.
 ꝛ Auic. 15. Tra. 2. cap. de cura splen. Item
 Aet. ꝛ Gord. ꝛ omnia à me recitata in-
 telliges.

Obferuationes in cura splenis.

Gal. 13. met. cap. 16, Valētiora tantò ma-
 gis lieni congruunt, quantò craſſiori utitur
 alimento, ꝛc.

Auic. 15. tra. 2. cap. 3, Est proxima cura-
 tionibus hepatis, ꝛ indiget ut ſint medicinae
 fortiores ꝛ penetrabiliores: penetrare uerò
 faciunt ea, quæ obſeruāt uirtutem ſuper eos,
 quouſque perficiunt operationes ſuas, ꝛc.

Ddd.i.

Observationes de phlebotomia.

Auic.loc.cit.cap.5, Et phlebotomia plurima apostemat splenem, euacuando subtile, & remanendo crassum: idcirco Razes dixit non multum referre de uena secanda, dummodo uulnus illatum longè pateat.

Observationes circa localia in cura splenis.

Auic.loc.cit.cap.6, Applicanda in curatione seruent latus stypticis, sed cum cautela calefactionis uehementis, ne materia ad crassitiem & duritiem festinet: nam ambo viscera ad duritiem opportuna sunt, sed miscuantur cum eis medicina, in quibus sit incisio aliqua cum caliditate equali. Et cap.7, Et scias quòd res calida ualde non sunt multum cōuenientes spleni, propterea quòd indurant & exiccant, & prohibēt à resolutione, &c. Itidem fatetur Paul. & Gal.

Observatio circa medicamenta.

Gal.13.meth.cap.17, Sanè duplex ratio est eius medicamentorum usus, quum partes superiores posita laborant, per ea quæ edum-

tur & bibuntur, inferiores per id quod fit per
clysterem infusum, &c. Paul. lib. 3. cap. 49,
Cibus cōpetit tenuis, acris, siccus, potio pau-
cissima.

Auic. 15. tra. 2. cap. 7, Omne lac, præter
lac camelarum, est malum spleni. Et in admi-
nistratōe ciborum melius est, ut admini-
strentur ante eos balneationes longæ, deinde
assumat incisiva, subtiliatiua, & faciētia si-
rim, & sumat in potu uinum mixtū cum aqua
marina & subtili, & regimen per tres dies.
Lege Gal. 13. meth. cap. 17. ibi, Scirrho labo-
rantibus cōuenientia medicamenta, &c. lege
etiam Alex. Tral. lib. 3. cap. 23. nam fusi-
mè de omnibus cibis ibi pertractat, &c.

Nocentia spleni.

Nocent spleni lagana, bouinae carnes, da-
ctyli, ficus, lac, lentes, uinum dulce, crassum,
nouum, aqua cruda, frigida, omnia unctuosæ,
legumina, olera, caseus antiquus salitus, aues
aquaticæ, omnes fructus aquosi, omne splē, &
omnis aër crassus, paludosus, autūnalis, &c.

Conferentia spleni.

Conferunt splenis affectibus frigidis, ab-
Ddd. ij.

sinthium, acorus, agaricus, apium, ammoniacum, agrimonium, assa, aristologia, betonica, chamadrys, capparis, caules, cyclamen, cyperus, costus, ebulus, heder, helleborus, epithimū, lapatiū, lapis lazuli, lapis armenus, lentiscus, liliū, mel, menta, mercurialis, nasturtium, nux mosch.oua, origanum, passula, pastinaca, peonia, politrichiū, pulegiū, prasiū, pulmo uulpis, raphanus, ruta, radix capparorum, radix genestæ, salvia, sandaraca, senna, serpillū, stachas, scolopēdriū, spica, squilla, tamariscus, urina hominis, urtica, hyssopus, iris, uinū extinctionis auri, &c. Cōposita calida sunt diacurcuma, diatrio pipereō, syru. de calamento, de stachade, de absinthio, de fumo terræ, troc. de absinthio, de capparibus, hiera, &c. Frigida sunt simpl. acetum scilliticum, aqua chalybeata, bleta, corallus, cornu cerui ustum, lactuca asini, morrus, myrobalani omnes, uitis, uiola, &c.

De prognosticis affectuū spleni.

Auic. 15. tra. 2. cap. 4, Si spleneticus inuenit dolorem interiorē, est magis saluus, quia in ipso adhuc speratur sensus. 2. Quādo acci-

dit fluxus uētris cū sanguine, est melius, quia speratur cū ipso resolutio materiei splenis: jē autē perseuerauerit, aduenit ei lubricitas hydropica, & morietur. 3. Qui catarrhum habet, non ei accidit splen. B. Quia humiditatis copia humidā intēperiem arguit, ex qua raro atra bilis cōtingere solet. 4. Qui habet dolrē in splene suo, & currit ex eo sanguis rubens, & apparent in corpore eius ulcera alba non lādētia, morietur in die secūdo: & si non, cadit appetitus. 5. Quādoque terminantur apostemata splenis fluxu sanguinis nariū, & propriē ex latere sinistro, & apostematibus apud aures difficilis suppurationis & apertionis propter crassitiem materiei. 6. Et laudabilior urina eorū est crassa, sanguinea, & urina in qua est fax uiscosa: quādoque significat sanitatē splenis & destructionem eius. Vltimò, inquit, apostemata splenis cōuerti ad iecur, malū: ecōtra uerò, bonū. Hippoc. aphor. 6. aph. 43, Quicūque lenosi difficultate intestinorū capiūtur, ys superueniente longa difficultate intestinorum aqua intercutis aut leuitas intestinorū adue

Ddd. iij.

nit, & moriuntur. Et apho. 6. aph. 48, Lienosis difficultas intestinorum superueniens, bonum. Lege etiam de hac re aphor. 22. tertij lib. ibi, Autumno uerò, &c. lege etiā Arcul.

Authores dissentientes circa morbos splenis.

- 1 Adserere, materiam in splene posse educi conuenienter per uias urinæ.
- 2 Adserere, omne genus lactis in splenis duritie conferre.

Confutatio dissentientium circa morbos splenis.

Ad primum: impugnat Gal. 13. meth. cap. 17, ubi inquit, gibbum hepatis expurgari per renes, sed lien per intestina: quum per renes enacuari, nulla lieni uacuando uia pateat.

Ad secundum respondetur, quòd lac ex eo, quòd obstructionem inducit, nequaquam conceditur: uerum quum lac camelarum à proprietate lieni conferat, idcirco laudatur ab Auic. & hanc ob causam non omne genus lactis conceditur, &c.

De malo habitu.

Malus habitus, quem Græci καχεξία

dicunt, est præuia quædam ad hydropem dispositio, ex mala hepatis concoctione proueniens, &c.

Loci consentientes de malo habitu.

Paul. lib. 3. cap. 47, Principia aquarum cutem subeuntium uocare Græci καχεξία, Latini malum corporis habitum consueverunt. Aet. ser. 10. cap. 19, Quum corporis habitus in aquositate diffunditur, καχεξία à Græcis appellatur. Auic. 14. tra. 2. cap. 3, Quum corrumpitur digestio hepatis, & communicat super ipsum debilitas, in primis accidit dispositio ad hydropem antecedens, & uocatur cachexia, &c.

De causis mali habitus.

Causæ ipsius cachexiæ sunt longitudo alicuius morbi, durities splenis uel hepatis, consuetarum excretionum prohibitio, deprauata hepatis siue stomachi alteratio: quæ si omnino corrumpatur, non amplius cachexiâ, sed aliquam hydropis speciem efficiet. Denique quæcunq; causæ hydropis esse possunt, dñ leues existât, omnino cachexiâ inducūt, &c.

Ddd. iiij.

Loci consentientes de causis
mali habitus.

Act. ser. 10. cap. 19, Hæc affectio ut plurimum ex longo morbo congregatur, aut ex viscere quopiam in scirrhum indurato, maxime hepate, splene, aut à consueta & cohibita excretionem aliqua. Auic. 14. tra. 4. cap. 3, Fit à corruptione digestionis, uel ab hepatis imbecillitate, & quandoque accidit propter congregationem aquæ in pulmone, &c. B. Hæcmet sententiam habes ex ipso cap. de signis peripneumonia, ibi, Et quando prolongatur tempus cum peripneumonia, facit incurere agrum in inflammatione pedum, &c.

De signis mali habitus.

Primum corpus albicat uel flauescit ob totius malam intemperiem, concoctiones impediuntur ob hepatis uel uentriculi imbecillitatem, remanet tamen ciborum appetentia à frigido elicita, deinde fastidium & defectus animi accidit ob uenenosam materiam ad cor exhalantem, respiratio rara ob consensum pulmonis uel diaphragmatis, extrema corporis inflantur, præsertim si anasarcam

cachexia precedat. Vrina & sudor paucus ob aquosam humiditatem retentam, quæ per consueta loca expurgari nequit, testiculi inflantur, dummodo asciten cachexia præcesserit, ulcera adsunt incurabilia ob sanguinis sinceri defectum, &c.

Loci consentientes de signis
mali habitus.

Act. ser. 10. ca. 19, In hac affectione universa corporis miscella laxior fit ac emollescit, corpusque totum cum virore albicat ac inualidum est: nam inter eundem crura vacillant, concoctiones in primis, manente etiã appetitu, impediuntur, fastidium accidit, respiratio fit rara ac debilis, quæ motibus ac actionibus condensatur. Lege Auic. loc. cit. cap. 3. ibi, In primis permutatur color corporis & faciei ad albedinem & citrinitatem, & apparet inflatio in palpebris, & facie, & extremitatibus manuum ac pedum, &c. Lege fusius, & intelliges cetera à me dicta, &c.

De cura mali habitus.

Cura requirit quatuor intentiones. Prima erit circa regimen, ita ut ager in cibo & po-

tu parcus sit, non comedat ad sarietatem,
 nec nisi celebrata digestionē: sitire ac fame-
 scere in hoc casu utile: fugienda est ciborum
 multiplicitas, aqua interdicatur, nisi alia co-
 geret necessitas. Cibaria igitur in hoc casu
 sint calida, tenuia & exiccantia, praesertim
 in causa frigida, in calida uerò econuerso.
 Secunda est euacuatio: unde si à menstruis
 uel haemorrhoidibus suppressis morbus pro-
 ueniat, uel ab alia excretionē prohibita, fiat
 sectio uenae: si uerò à uitiatis humoribus, tūc
 purgatio ex hiera utilis est, uel ex agarico,
 pilulis de rheubar. hieralogodione, electuario
 indo, diaphinicone, prout materia exegerit.
 Tertia intentio est humorum preparatio,
 unde si fuerit bilis mixta, conuenit syr. bisan-
 tinus de endiuia, cum aquis absinthij cicho-
 rij: & in materia non ualde frigida ualet
 syr. de eupatorio acetosus simpl. & in mate-
 ria crassa ac uiscosa oxymel scilliticum, syr.
 de absinthio, & in materia melancholica
 syr. de epithymo, de hyssopo, &c. Conueniunt
 etiam in hac intentione diacurcuma, dialac-
 ca, triasandali, diarrhodon, troc. de ros. de

absinthio, &c. Quarta intentio est diuersio, quæ fieri potest per uomitum, quia extrahit ab hepate per uenas meseraicas, tum quia ex infimo loco materias eradicat, tū quia à stomacho & ab adiacentibus partibus optimè auertit. Clysteres etiam laudantur, eò quòd à stomachi fundo euacuant, tū quiaeductio per uètrè naturalis magis est, q̃ per uomitū, &c.

Loci consentientes de cura
mali habitus.

Aet. serm. 10. cap. 19, Cibi eorum sint simplices, qui facilè concoqui possint, &c. Lege eum fusius. Auic. loc. cit. cap. 4, Cibus habetium cachexiam sit ex eis, in quibus est suauitas & confortatio naturæ, sicut alcubungi, id est perdices, & sint uina eorum odorificata, cū eis quæ sunt gariophylli, cinnamomum, crocum, &c. & ex fructibus, granata dulcia, & de citonijs parū nō nocet, & misceantur cum cibus ea quæ sunt sicut sinapis, porrum, allia, &c. Paul. lib. 3. cap. 47, Victus sit tenuis, siccus, &c. De euacuatione loquitur Aet. loco cit. ibi, Si hæc affectio ex consuetæ excretionis cohibitione contingat,

excretionem irritare expedit, aut uenam incidere, si nihil præpediat: si minus uena incidenda sit, conuenienti purgante pharmaco, & maximè ex hiera oportet, &c. Auic. loc. cit. Considera an humores sint choleric, & educantur solutione uentris cum hiera picra: nam educit superfluitates absque humiditatibus innatis, &c. Lege eum fusius. De humorum præparatione lege Arcul. & neotericos: lege etiam Auic. ibi, Et ex eis quæ cõferunt, eis ualde sunt syr. de absinthio in ieiuno, mitridatum & diacurcuma, & dialacca, & diaspermaton, &c. De ultima intentione lege etiam Auic. ibi, Et utatur uomitu ante cibum: est enim regimen bonum eis in principio rei cum raphano infuso in syr. acetoso, & in fine cum helleboro, &c.

Obseruatio in regimine.

Auic. 14. tra. 4. cap. 4, Oportet quòd regimen eorū sit, superfluitates prohibens, &c.

Obseruatio in sectione venæ.

Paul. lib. 3. cap. 47, Iis qui copia uiriosorum humorum laborant, uacuatio sanguinis per uenam noxia est: purgatio autē ex hiera

permultum utilis. Auic. loc. cit. Ante uenæ sectionē præcedant quæ sanguinem purificant, qualis est hiera.

Obferuationes de solutione ventris.

Auic. loc. cit. Primū humorum qualitates considerentur & purgentur: quod si nouissimè materia aggregetur, figi eam nō permit-
tas, sed reiterata purgatione educes. Secun-
dò, cauendum ne eorum stomachi à solutiuis
ledantur, quare cum soluentibus aromatica
sunt admiscenda. Tertiò, sex purgationum
modos enumerat. Primus, per ea quæ uētre
soluunt, & obstructions aperiunt. Secundus,
per clysteria attenuantia & resoluentia. Ter-
tius, per moderatum exercitium & per pau-
citatem potus. Quartus, per balnea cū aquis
non calidis. Quintus, per uomitum ante ci-
bum. Sextus, per cibos exiccantes, aperiētes,
& attenuantes cum aromaticis, &c.

Conferentia malo habitui.

Conferunt cachexia, spica, cinnamomum,
absinthium, eupatorium, semen urticæ, cha-
mæpitys, urina hominis, helleborus, sansucus,

maiorana, cricius, handacocha. Confectio
 alcacangi, de raueseni, conditū de buglo-
 sa, diacurcuma, dialacca, diacostum Mesu.
 empl. Alex. Mes. omorusia Auic. theodoricum
 magnū Haly, theriaca, diateffaron, triphe-
 ra minor, pilule de rheub. de alcacangi
 Mes. troc. de diarrhodon, de rosis, de rheub.
 de eupatorio, syr. acetosus de diarrhodon, de
 absinthio, de fumo terre, de squinanto uia-
 tic. 5, &c.

De prognosticis mali habitus.

Aet. ser. 10. cap. 19, Senes facile hac affe-
 ctione capiuntur, maximèque liberantur: pue-
 ri uerò facile pereunt ob uitalis roboris im-
 becillitatem, aut ex succis ob cutis raritatem
 facile transpirantibus. Qui in uigore sunt,
 rarò incidunt, facileque inde se extricant: quū
 uerò malum diutius durat, in aquam inter
 cutem transit, &c.

De hydropo.

Hydrops est morbus à materia intra peri-
 toneum contenta, quæ ab hepatis imbecilli-
 tate prouenit factus, ex quo uenter intumescit,
 & interdum reliqua membra. Huius tres sunt

species, prima ἀσκίτης, id est utricularis: secunda est τυμπανίτης, id est tympania: tertia ὑπόσπρηξ & ἀνάσπρηξ uel λευκοφλεγματία, id est, pituita alba dicitur. Ascites est morbus in quo ueteres crura intumescunt, superiores autē partes gracilescent ac marcescunt. Tympanias autem est morbus in quo plus flatuosi spiritus inuenitur, & minus humoris, ita ut si uenter percutiatur, tympani modo crepitū elidat. Anasarca uerò est morbus, quo totum corpus albidum redditur, atque humore circumluitur, ex quo aegris pudenda peruertuntur, & febres accidunt, &c.

Loci consentientes de
hydrope.

Auic. 14. T. 4. cap. 5, Hydrops est aegritudo materialis, cuius causa est materia exuberans frigida & ingrediens membra, &c. Aet. ser. 10. cap. 20, Hydropis differentiae tres sunt: alius enim ascites ab utre dicitur, alius tympanitis à tympano, tertius sarcites iuxta carnem, à Græcis λευκοφλεγματίας nominatus, &c. hoc idē sentit Paul. lib. 3. ca. 48. & Alex. lib. 3. ca. 29. ibi, Hic morbus, &c.

800 DE CONSEN. MEDIC.

Gal. lib. finit. med. Hydrops, quæ anasarca, id est, per carnem dicitur, est quum totum corpus intumuit œdemare atque humore corpus circumluitur, &c. Ascites, id est, utricularius est in quo uenter & serotum crurâque intumescunt, superiores autem partes extenuantur, &c. Similiter Tympanias est quum in uentre spiritus plus inuenitur, humoris minus, & si quis pulsauerit, sonus exauditur, &c. Lege etiam Gal. de hac re aphor. 4. comment. 11.

Obiectio.

Quur tres tantum species facis, quum Theodorus lib. 5. quatuor enumeret, scilicet anasarcam, hyposarcam, tympanitem & ascitē. Præterea Hippoc. 4. de uic. in mor. ac. tex. 3. duas tantum species esse declarat, una quidem hyposarca, altera cum inflationibus.

Responsio.

Distinctiones interdum dantur penes nomina rerum, interdum uerò penes causam efficientem, interdum penes locum læsum. Erunt igitur quatuor ratione nominis, ut Theodorus: erunt duæ ratione loci: nã aut in omnibus membris continentur, aut tantum in con-

cavitate uentris, & sic erunt duæ species ut Hippocra. erunt tamen tres, ut diximus, quia causæ tres sunt, &c.

De causis hydropis.

Causæ efficientes & primitivæ sunt omnis causa exterior nocumētum in digestionem imprimens, & imbecillitatem maiorem quàm in cachexia inducens: regimen inordinatum in sex rebus non naturalibus, percussio, casus & offensio super hepar, &c. Causæ antecedentes sunt mala dispositio hepatis uel aliorum membrorum, quæ provenit uel à mala intemperie nuda, uel humoralis, uel à soluta continuitate, uel ab aliquo abscessu digestionem impediēte. Causæ per consensum erunt uel à toto, ut in febribus quæ calorem hepatis innatū imbecillant, & digestionē præpediūt, uel euacuationes superflua calorem innatū extinguēt, sicuti euacuationes per uentrē, per uomitū, per sudorem, per menstrua, per sanguinis fluxum, &c. Vel erunt à membris particularibus, ut puta à pulmone, diaphragmate, abscessum uel aquam patiente, uel à stomacho ob malam eius intemperiem, uel à

Ecc. i.

splene ob eius magnitudinem & duritiē, &c. Causa coniuncta est materia ipsa frigida, membra alterans, & in tumorem attollens cū imbecillitate hepatis & digestionis eius assidue illam materiam regenerantis, &c. In anasarca igitur erit materia pituitosa, penetrans cum sanguine per membra. In ascite erit materia aquosa citra peritonium contenta. In tympanite est materia uentosa in illas partes diffusa, &c.

Loci consentientes de causis hydropis.

De causis primitiuis lege neotericos, precipue Arcul. & Sauonarolam, Gordonium, Platearium, & reliquos. De causis antecedentibus lege Auic. 14. tra. 4. cap. 4. ibi, Cause uerò antecedentes sunt omnes ægri tudines hepatis complexionales, instrumentales, sicut paruitas & oppilationes, & apostemata calida, frigida, mollia & dura, &c. Lege eum fusius. Gal. 5. de loc. aff. cap. 7, In omnibus corporis partibus tum supernis tum inferioribus, pituitosus sanguis contineri conspiciatur in ijs morbis, quos Græci anasarcas &

leucophlegmatias nominant: proinde cōsen-
 taneum est, ut ob uisceris refrigerationem ci-
 bus iam redditus in sanguinem transmutari
 non possit, &c. Et inuenies per consensum
 etiam affici, ibi, Laborans aqua inter cutem
 molestari uidetur uitio existente in liene, uel
 in ieiuno, uel pulmone, uel renibus, aut tenui
 intestino, aut mesenterio, aut ubi sanguis plu-
 rimus per hæmorrhoidas excernitur, aut ob
 muliebri profluuium, aut quum retinentur
 menstrua, aut aliam ingentem uteri disposi-
 tionem, &c. De causis particularibus loqui-
 tur Aet. ser. 10. cap. 20. ibi, Ascites fit quum
 inter pelliculam peritoneum appellatam, &
 intestina plurima aquosi humoris collectio
 fiat. Tympanias, quum flatus aere repleti ac
 superflui plurimam collectionem facit, &c.
 Sarcites uerò ab aquosa pituita ortum ha-
 bet, &c. Hoc idem sentit Auicenna. 4. tra.
 4. cap. 4. ibi, Ascitis causa est materia
 aquosa effusa in spacium uentris inferio-
 ris, &c. Vide Galenum de causis hydro-
 pis 2. de naturali facultate. cap. 7. Item 4. aph.
 comm. 11. ibi, Quibus tormina, &c. Itē 4. de
 Ecce. 4.

804 DE CONSEN. MEDIC.

præſag. ex pulſibus, capite de meninge affe-
cta. Itē prognost. i. tex. i. ibi, Cuiusvis aquæ
intercutis genitura est, ubi sanguificatio-
nis officium intercidat, &c. Hippoc. aphor.
7. aphor. 71, A pituita alba aqua intercus
superuenit. Vide Gal. in comment. Vide etiā
Paul. & Alex. lib. 3. cap. 29.

De signis hydropis.

Signa hydropis in genere octo sunt. Primū,
est uitiatus color iuxta hepatis intemperiem,
ut in frigida albus & liuidus, in calida fla-
uus uel rubeus. Secundum, est inflatio oculo-
rum & pedum, ut in anasarca: excipitur tym-
panias, in quo nullus tumor nisi in uētre cer-
nitur. Tertium, sitis inexhausta, quia humor
in his locis retentus salsus est & putrefactus.
Quartum, ciborum fastidium, scilicet in cali-
da hydrope. nam in frigida appetitus inua-
lescit. Quintum, urinae paucitas, rubæ, præ-
sertim in ascite & anasarca, ubi nulla fit se-
paratio sanguinis & bilis. Sextum, febres mi-
tes ac tepidæ. Septimum, accidunt ulcera.
Octauum, nihil cruentum secerni solet, ma-
ximè in ascite & tympania, &c.

Signa particularia Ascitis sunt gravitas sensibilis in uentre; & si percutitur, nullum sonum emittit, sed aqua à latere ad latus commota cernitur. Tactus est utris aquae pleni. Nulla adest membrorum magnitudo, cutis tēsis, paucitas urinae, pulsus parvus, frequens, & ad duritiē decliuus. Signa hyposarcae sunt inflatio totius corporis, uelut in defuncto corpore impinguantur membra, & propriè facies, & cū premitur digito, remanet fouea: nulla adest suminis inflatio aut commotio, ut in ascite & tympanite, fluxus interdū sanguinolentus, pulsus undosus, latus & lenis. Signa tympanitis, egreditur sumen plurimo exitu, nulla adest gravitas, sed tensio plurima, membra ad ariditatem tendunt, & percusso uentre sentitur sonus utris flatu non aqua pleni: adest ructationis uoluntas, ex qua leuius se habet: pulsus ut plurimum uelox & frequens, ad duritiem decliuus, nulla adest inflatio pedum, &c. Signa distinguentia hydropem à pregnantē sunt, quia ab umbilico infra pregnantis uenter extenditur, in hydrope uerò infra & supra, &c.

Ecc. iij.

Loci consentientes de signis
hydropis.

De signis in genere hydropis lege Auic. 14. tra. 4. cap. 8. ibi, *Omnem speciem hydropis sequitur corruptio coloris, &c. lege hunc locum fusius. Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. In anasarca per aluū nihil cruētū, neque in ascite, neque in tympania excerni solet, sed spatium quod est inter peritoneum & partes ei subiacentes aquoso humore impletur: his uero qui ex frigida aqua potu hydropici facti sūt, uehementes ciborum appetitus fiunt, &c. De signis particularibus mētionem facit Alex. lib. 3. cap. 29. ibi, Quum in uētre circa abdomen humores aquosi collecti fuerint, &c. Lege etiā de hac re Auic. 14. cap. 9. ibi, Cum ascite est grauitas sensibilis in uentre, &c. Et cap. 10. loquens de anasarca, inquit, Apparet inflatio in corpore toto sicut accidit corpori mortuo, &c. Et cap. 11, In tympanite egreditur sumē plurimum exitu, &c. Vide fusius Arcul. & Sauonarolam. Hipp. prognost. 2. tex. 2. ibi, Si quibus ex inani parte consistit hydrops, &c. Lege etiam fusius Gal. in hoc commēto, &c.*

De curatione hydropis.

In Ascitis cura tres tantum intentiones
 insurgunt, quarum prima uersatur circa uitæ
 regimen, ita ut sex res non naturales ad ca-
 liditatem & siccitatem uergant, quum causa
 ascitis sit frigida & humida. Nam hepar etsi
 à causa calida primum molestetur, nihilo-
 minus ex imbecillitate & spirituum resolu-
 tione tandem frigescit. Dieta igitur sit te-
 nuis, si uires patiantur. Cibaria parentur cum
 pipere, caryophyllis, &c. Vinum sit subtile, al-
 bum, pauca quantitatibus, aquam uident. Alce-
 ra intentio est in remouenda causa coniun-
 cta, quæ perficitur cum pharmacis hydrago-
 gis, uel cum urinam prolicientibus, uel cum his
 quæ insensibiliter aquam resoluunt, ut sunt
 fometa, emplastra, sacculi, cerata, &c. Solu-
 tiua fiunt cum rheub. agarico, cum succo rad. iri-
 dis, ebuli & sambuci, cum soldanella, uel eius
 succo, cum electuario, & Mezereon quæ laureola
 dicitur, cum pilulis de serapino, de euphorbio,
 &c. Diuretica sunt syrup. bisantinus de dua-
 bus radicibus, oxymelle, syrup. de absinthio.
 Fomenta fiunt cum rebus calidis resoluen-

Ecc. iiij.

808 DE CONSEN. MEDIC.

ribus ut salvia, maiorana, rosmarino, menta, absinthio, pulegio, camomilla, origano, folijs lauri, alumine, sulphure, sale, &c. Emplastra, quale est de granis lauri, de stercore caprino &c. Sacculi parantur ex milio, sale, fursure. Unguenta, quale est illud Agrippæ, & mille alia quæ parari possunt. Conueniunt etiam diacurcuma, dialacca, troc. de rheub. Tertia intentio malam hepatis dispositionem remouet cū his quæ hepar roborant, aperiunt, ac obstructiones dirimunt, extrinsecus cum ceratis & linimentis ex oleo rutæ camomilino paratis, intrinsecus cum confectionibus iam memoratis, &c. Quod si per hæc ascites non cessauerit, cute puncta aqua extrahatur, &c. Anasarca siue hyposarca hisdem intentionibus indiget: nam præter regimen calidum & siccum etiam causa coniuncta remoueri debet cum medicinis soluentibus & alijs, ut dictum est. Verum hoc plus habet, ut sectionem uenæ suppressis hemorrhoidibus, menstruis, uel si ab aliquo apostemate fieret, & humorū præparationē requirit, quod in ascite minimè dictum est: & hoc

fit cum rhodomelle, syru. de duabus rad. de
 bisantio, oxymelle simp. &c. Aduerte tamen
 quòd syrupos in hoc casu simpliciter sine
 aquis & decoctis exhiberem, quòd aque apud
 me suspectæ sint. Laudatur in hoc casu hiera
 simplex, rheub. agaricus, pilula de rheub. Ma
 la autem dispositio hepatis, si ab apostema
 te, uel ab obstructione eius proveniat, quo pæ
 cto curanda sit, supra habuisti: quæ si à ma
 la intemperie oriatur frigida, tunc damus ele
 ctuariũ diacurcumæ, dialaccæ, rheub. hepar
 lupi, absinthium, eupatoriũ: in calida, diar
 rhodõ, abs. triasand. In causa mixta troc. de
 rheub. cum speciebus diarrhodonis Abbatis.
 Tympanias uerò perinde ac dictum est cu
 randa erit, dummodo soluentia pharmaca iã
 dicta flatuosum uentum unã cum aquoso hu
 more resoluant, unde laudatur diaciminum,
 diagalãga, diamuscus, electuarium de baccis
 lauri, itẽ fofus ex rebus calidis & siccis, &c.

Loci consentientes de cura
 hydropum.

De regimine uictus loquitur Paul. lib. 3. ca.
 48. ibi, Cibis erit salsamẽtũ, sinapi & albia

810 DE CONSEN. MEDIC.

ex auibus syluestres & sicca magis. Inter ole-
ra asparagus, porrum, sinapi. Vinum sit ue-
rus & tenue, porio liberalis uitanda est, &
aqua in totum, calidioribus acrioribú sque
cibis & auxilijs, ubi febris cum hydrope fie-
ret, abstineatur, &c. Auic. 14. cap. 13, Opor-
ret comedere cum mēsurā, & dimittere aquā,
ita ut prohibeatur à uisione aquā, ne dicam
à potu, quantum possibile sit, &c. Lege Alex.
de omnibus oleribus, piscibus, uolucris, le-
guminibus, siue bellarijs fusius cap. 30. De cu-
ratione per hydragoga loquitur Gal. 7. aph.
commēt. 56. ibi, Curatio hydropis fit per me-
dicamenta aquositate soluentia, per epithe-
mata, ac per ea quā ciendi urinam & in ua-
pores talē humorē soluendi facultatē habēt.

Item 14. meth. triplicem innuit curandi
rationem, prima ut tumorem in uiscere con-
tentum sanemus. 2. ut humiditatem soluamus.
3. ut per medicamēta urinam citemus. Habet
etiam, quod calidior & siccior temperies
exile corpus reddat, quod fit ex acuta exer-
citatione, & medicamentis attenuantibus, &
uictu, & animi cogitatione, &c. Paul. lib. 3.

ca. 48, Curatio cōmunis ab euacuatione incipit, uerū ascites & tympanias medicamē-
 rum aquam educens requirit, anasarca sanguinis detractionem, modò affectus ex hamor-
 rhoide uel mēstruis retētis oriatur, &c. Gal.
 4. de uic. in mor. ac. tex. 3. ibi, Hydropū duæ
 sunt naturæ. In comment. Anasarca, inquit,
 interdum sanguinis detractionē, dum incipit,
 expostulat, si ex retentione hamorrhoidarū
 uel muliebrium, uel ex quapiā quæ ita sit ple-
 thorica causa inceperit: tympaniam uerò &
 ascitē nullus per sanguinis missionem sanare
 ausus est, &c. Lege Auic. 14. tra. 4. ca. 13, Si-
 militer Mar. Cat. & Arcul. Gord. & Alex.
 de cura hydropū in particulari. Gal. 3. de tē-
 per. ca. 3, Medicamē id quod cātharides reci-
 pit, hydropicis prodest, tamen si cātharis ipsa
 uesicā omnino ulcerat: uerū ubi per ea quæ
 admiscētur castigata, corpori plurimo humo-
 re grauato offertur, & illū & per urinas ex-
 pellit, &c. Et 14. meth. ca. 13, Harū euacua-
 tionem medicamētis quæ digerant molimur,
 uel chirurgia in ascite, adhibita punctione,
 quā paracentesis uocant, &c. Lege quomodo

hac fiat pūctio ex Arcul. & Gulielmo Plac.
& ab alijs omnibus qui chirurgiam pertra-
ctarunt, &c.

Obferuationes de euacuatione.

Auic. 14. trac. 4. ca. 13, Primū in ascite a-
qua, in anasarca pituita, in tympanite flatus
euacuetur. 2. Soluentia ita soluant, ut nihil he-
pati & uētriculo mali inferāt, sed sint leuia.
3. Reiteretur euacuatio, ne materia multum
congregetur, cauendo ne pro uice ita copiosa
sit, ut uirtutem deiciat. 4. A soluentibus sta-
tim hepar & uentriculū cum stypticitate mo-
deratè aromatica. 5. Prouocetur uomitus ut
materia in uentriculo contenta euacuetur. 6.
Enemata conueniunt, dummodo causam an-
tecedentem & coniunctam euacuare possint.

Obferuationes de sectione venæ.

Gal. 4. de uic. in morb. ac. com. 3, Primum
si expedit in principio fiat: secundum non est
fienda, nisi sui causa fuerit retentio sangui-
nis, uel aliqua plethorica causa, uel inflam-
matio hepatis, &c. Auic. loc. cit. Sectio uenæ
nitanda est, quatenus sit possibile, & si tuum

*sit consilium de phlebotomando, minue prius
materias dominantes, &c.*

**Observationes in attenuantibus
& incidentibus medicinis.**

*Auic. loc. cit. quatuor habet annotatu di-
gna. Primò, quòd misceatur cum rebus, hepar
& uentriculum roborantibus. Secundò, quòd
uarianda sunt & mutanda, eò quòd natura
ab eo quod est consuetum non patitur. Tertiò, quòd
in puluerem redigantur, ut citius ad partem he-
patis gibbā perueniāt. Quartò, quòd post eorum
usum iura pingua exhibeamus, ne urinarum
meatus exhauriantur. B. Caue tamen ex hoc
textu, ne decipiaris, quum in omni specie hydro-
pis iura sint suspecta. In puluerem, intellige ut
Gal. crassiusculum. De observationibus circa
uictum, lege fusius Alexan. lib. 3. cap. 30.*

Nocentia ac conferentia hydropi.

*Nocet hydropi, usus aceti assiduus, bovine
carnes, lentes cum corticibus, mezereon, aloes,
& quicquid hepatis temperiem molestat ac
corrumpit. Conferunt hydropi absinthium, aga-
ricus, anisum, apium, betonica, calamentum, ca-*

lami aromaticus, chamæpitrys, chamædrys,
 cātharides, electuariū, cuscute, cichoriū, suc-
 cus radicis ebuli, helleborus, eupatorium, fœ-
 niculus, carica, fumus terræ, chebuli, lac asi-
 ninum, caprinum, lactuca limaciæ, meu, me-
 zereon, myrobalani, myrrhus, origanum, pasti-
 naca, perdices, petroselinum, prasiū, rheu-
 barbarum, rosmarinus, ruta, sansucus, sambu-
 cus, sinapis, scilla, scenoanthos, urina, hype-
 ricon, hyssopus, iris. Cōposita sunt, unguen-
 tum Agrippæ, confectio alcacangi, dialac-
 ca, diacurcuma, diatrion pipereon, empla-
 strum Aristarchi & Andromachi Mes. pilu-
 læ de rheub. de agarico, theriaca, triphera fer-
 ruginea, troc. de lacca, de rheubarbaro, de li-
 gno aloes, unguētum Artanitæ mag. confectio
 de mezereon, de eupatorio Mes. oleū de cher-
 ua, de mezereon, pilula de mezereon, theria-
 ca, diatessaron, &c.

De prognosticis hydropum.

Hip. aph. 3. aph. 22, Autūno plurimi æstiu
 morbi, febres quartanæ & erraticæ, & aquæ
 inter cutem, &c. Vide Gale. in comment. Er

aph. 4. aph 11, Quibus tormina & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque à medicamento, neque aliter soluitur, in hydropem siccā firmatur. Et aph. 6. aph. 8, Aqua intercute laborantibus ulcera in corpore facta difficulter sanantur. B. Quia exiccare expostulant, sed hoc difficillimum ob humiditatis immoderantiam. Et aphor. 6. aph. 27, Quicumque suppurati, aut aquam intercutem patientes, uruntur aut secantur: si pus aut aqua uniuersum effluxerit, omnes moriuntur. B. Eò quòd natura subitaneas mutationes nō tolerat. Et aphor. 6. aphor. 35, Aqua intercutem laborantibus tussis superueniens, malum. B. Intellige, nisi à materia à capite in subiectas partes stillante tussis oriatur: nam si aquosa humiditas adeò excreuerit, ut asperas arterias occupet, periculum de suffocatione imminet. Et apho. 6. apho. 43, Quicumque lienosi difficultate intestinorum capiuntur, superueniente aqua intercute moriuntur. Et aphorif. 7. aphorif. 5, In mania dysenteria aut hydrops, uel mentis alienatio, malum. Et aph. 48. eiusdem lib. Aqua intercute laborās,

si à tuſſi habeatur, desperatus eſt. Et aph. 56. eiusdē, Quibus hepar aqua plenū in omētum eruperit, his uēter aqua repletur & moriūtur. B. Quia eſſluere ad omentū aqua non poteſt, niſi aliquo modo excedatur, unde mors ſequitur, &c. Et aph. 6. aph. 12, A diuturnis ſanato hæmorrhoidibus: ſi urina non ſeruatur, periculum eſt aquam intercutem uel tabē aduenire. Et ap. 14. eiusdē lib. Ab aqua intercute habito, ſi aqua è uenis in uētreſ defluxerit, ſoluitur morbus. Et prognost. 2. cap. 1, Aqua intercus omnis ſi ex acuto morbo exiſtit, malum eſt: non enim ſedat febreſ, ſed doloreſ admodum inferat ad mortem. B. Eò quòd inuenire remedia, quæ utrique affectioni ualida reſpōdeant, difficillimum eſt. Auic. 14. tra 4. cap. 3. multa habet prognostica: Primò aſcites malignior omnibus, deinde hypofarca, deinde tympanitis. Secundò, deterior hydrops illa eſt, quæ fit cum egritudine acuta & uehementius timenda, quæ homini tēperaturæ calide & ſiccæ aduenit: non enim ſine cauſa maxima per contrariū ſuæ cōplexioni agrotat. Terriò, hydrops ex duritie ſplenis magis

salua est, quàm quæ à duritie hepatis prouenit. Quartò, si ex hydrope, dispnoea, & cōstri-
ctio anhelitus contingat, & solutio uentris,
propinquā mortē in tribus diebus significat.
Quintò, & dicitur quòd quando hydropico
descendit sicut caro, prænūciat mortem eius.
Sextò, & habenti melancholiā resoluitur me-
lancholia, eò quòd hydrops eā humectat. Se-
ptimò, & scias quòd fluxus uētris in hydrope
est mortalis. Octauò, dictum est quòd quādo
in facie hominis, aut in manu eius sinistra
mollities, & in naso pruritus accidit in prin-
cipio, quòd moritur in secunda uel tertia die.
Nonò, & si fuerit apostema durum, tunc non
speretur in sanatione hydropis quæ sequitur
ipsum: nā etsi aqua euacuetur qualibet eua-
cuatione, redit tamen & replet, &c.

Authores dissentientes cir- ca hydropem.

- 1 Adserere, cachexiam non precedere hy-
dropem quæ paulatim facta sit.
- 2 Adserere, tympaniam ita à frigiditate fie-
ri, sicuti ascitem.

Fff. i.

3 Adserere, hyposarcā esse ascite deteriore.

4 Adserere, in ascite hydrope semper incisionem esse opportunam.

5 Adserere, omne genus lactis in ascite nullo modo competere.

6 Adserere, tuſsim in hydrope semper esse signum malum.

Confutatio dissentientium circa hydropem.

Ad primū: Auic. 14. ca. 3, Quando corrumpitur digestio hepatis, & antecedit eius debilitas, in primis accidit dispositio ad hydrope antecedēs, quæ uocatur cachexia: sed semper digestio hepatis in qualibet specie hydropis corrumpitur, & antecedit eius debilitas: igitur semper præcedit cachexia. Et hæc opinio confirmatur à Dino, unde maximè decipiuntur, qui contrarium adfirmant.

Ad secundum: Gal. aph. 4. com. 11, Videtur autem à maiori frigiditate generari aquosus hydrops, quem asciten uocant, à minore tympanias: nam humida substantia in flauosum aërem sine calore aliquo trāsmutari non potest, & sic isti decipiuntur, qui oppositum

astruunt, &c.

Ad tertium: Auic. 14. cap. 3, Ascites est malignior omnibus, &c. Præterea illa species est deterior, quæ causas & symptomata seuerissima habet: sed ascites est huiusmodi, cū adsit sitis uehemens, grauitas, suffocatio & syncope: igitur erit hyposarca deterior, &c.

Ad quartum: Conciliator diff. 199, refert ex Gal. neminem uidisse ex incisione liberatum. Præterea Auic. loc. cit. de incisione myrach, Scias, inquit, quod parum proficit, nisi in corpore forti ualde, quando potens est tolerare sitim & minorationem cibi. Vnde non oportet ut audeat fieri, dum possibilis est alia cura, &c. imò, ut refert Conciliator, plerique ex hac incisione moriuntur.

Ad quintum: Auic. loc. cit. Non respicias ad illud quod dicitur in ipso, ex hoc quod decipiuntur sophistæ, quod natura lactis est contraria hydropi: imò scias quod hoc medicamen est iuuatiuum per illud quod est in eo de absterfione, & est conueniens per id quod est in eo de proprietate. Et paulò infra, Et scias quod lac camelarū & caprarū Ara.
Fff. ij.

bicarum est uehementis iuuamenti, &c.

Ad sextum, Gal. aph. 6. com. 35, Neque enim quū ex alia sit occasione, in homine a-
quam intercutē patiente, tussis est signum exi-
riale, sed quando ex ipsius morbi ratione, &
sic non est perniciosum signum.

De leuitate intestinorum, id est lienteria.

Leuitas intestinorū, quæ λιεντεῖα à Græ-
cis dicitur, est celerrima ciborum expulsio, in
qua nulla alteratricis facultatis actio cerni-
tur, sed tales cibi quales deuorati sunt secer-
nuntur.

Loci consentientes de leui- tate intestinorum.

Galen. aphor. 6. comment. 1, Leuitas inte-
stinorum est uelox exitus eorum quæ come-
duntur ac bibuntur, quæ talia deijciuntur,
qualia deuorata fuere, quibus egredienti-
bus nulla mutatio alteratricis facultatis in-
uenitur, siue in qualitate, siue consistentia, co-
lore & odore, &c. Lege de hac re Gordonij
definitionem & aliorum neotericorum.

De causis leuitatis intestinorum.

Causa procatarctica ipsius lienteriae sunt cibi, potus, & pharmaca secundum qualitatem, quantitatem, & ordinem uentriculi infestantia, inter quae aer quoque humidus connumeratur.

Causae antecedentes & coniunctae sunt mala stomachi intemperies, humores uel nimium frigidi, uel mordaces, flatus quoque non sinens stomacho cibum inhaerere, unde putrefit & expellitur. Item ulcera, abscessus, & similia dolorem stomacho inferentia, siue per se, siue per aliorum morborum consensum, ita quod nec uentriculus ciborum contactum toleret, unde facultas expultrix ad id expellendum irritatur. Item stomachi ac intestinorum imbecillitas, ex qua retinere contenta ne exiguo quidem tempore possunt, sed illico, perinde ac si graue aliquod onus deponerent, ea secernunt, &c.

Loci de causis.

Galen. apho. 6. com. 1, Causa leuitatis intestinorum est triplex: quarum prima est mala retentricis facultatis stomachi intemperies: secunda fit ab humorum mordacitate superfi-

Fff. ij.

ciem uētriculi exulcerāte: quare cibi & potus quum ad locū ulceratū perueniūt, membrū illos continere non potēs, absque coctione illos deiecit. Tertia est, quū pituita in uentriculo continetur, quæ cibū & potū extra uentriculū & intestina lubricare facit, &c. Itidē adserit aphor. 4. cōment. 12. Auic. 16. tra. 1. cap. 2. præter causas assignatas enumerat etiā solutiuarū medicinarū impressiōne in superficie intestinorū & stomachi. Itē imbecillitatē digestionis, qua deficiente cibus corrūpitur & expellitur. Itē catarrhū cibū corrūpentē, itē ciborū malā qualitātē, quantitātē, malitiā sui ordinis, artificiū, & denique uērositatem & inflationē. lege etiā Auic. 13. cap. de lubricitate stomachi. Itē Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1. Itē 1. de loc. aff. cap. 3. Item 6. de sympt. cau. cap. 2. ubi de nausea loquitur. Itē 6. de loc. aff. cap. 1. ibi, Sunt quedam accidentia, quæ haud absurdē intestinis & uētriculo simul affectis euenire credūtur, ut Lienteria. Vide etiam Paul. lib. 3. cap. 4. Item Marcū Cat. qui omnes causas ad octogenerium numerum reducit, cap. de Lienteria.

De signis leuitatis intestinorū.

Signa in genere sunt exitus cibi & potus indigesti, dolor in regione stomachi, & agritudo eius precedēs, sicut nausea, subuersio, uomitus: & hic fluxus ordinē non habet, sed quādocūque cib⁹ sumitur, egreditur, &c. Signa si à medicamine fiat, sunt, dolor & mordacitas stomachi, præcessit pharmacū, & statim sequutus est fluxus, sapor etiam testatur pharmacū, &c. Signa intēperiei frigida & humida sunt albedo faciei & linguae, paucitas sitis, tarda digestio, multitudo spuri, non adest grauitas uel nausea stomachi, & existēte pituita adest dolor stomachi, acetosa eructatio, læditur à frigidis, nausea adest & uomitus. Signa intēperiei calida sunt, oris amaritudo, sitis, uomitus frequēs, bilis, sapor amarus, & humores calidi per secessum emittuntur, &c. Signa ulcerum sunt uomitus saniei, eructatio, pus redolens, dolor, &c. Signa apostematis sunt, tumor, durties, grauitas, assiduus dolor, febris continua, &c. Signa flatus sunt, quum sentitur flatuosus motus, dolor modò unā, modò alteram stomachi partē

Fff.iiij.

molestat, iuuantur si crepitum uel ructum emittant. Signa imbecillitatis facultatum sunt, si imbecillus sit digestiua, egreditur cibus sine digestionem, si retentrix uel expultrix, egreditur uelociter. Signa interstinguentia lienteriam stomachi & intestinorum sunt, quia lienteria intestinorum, id est cœliaca passio habet cibum satis bene eductū, dolor est in intestinis, & præcessit agritudo intestinorū: & econuerso, si fuerit stomachi, &c.

Loci consentientes de signis
leuitatis intestinorum.

Paul. lib. 3. cap. 40, Verū in utroque leuitatis genere celerius quā in cœliacis, quæ assumpta egerūtur, tamque intensa est cruditas, ut alimenti assumpti genus cognoscatur, &c. Lege de his signis Auic. 16. tra. 1. cap. 3. ibi, Fluxus stomachicus non habet ordinem neque horas, in quibus per seipsum crescat, immò est secundum regimen: nam si digestiua est debilis, egreditur sine digestionem: si retentrix & expulsiua debilis, egreditur uelociter, &c. lege eum fusius de alijs signis. Itē Arcul. & Gord. & Mar. Cat. qui breuiter omnia

lienteria signa exponit: lege etiam alios neotericos.

De cura leuitatis intestinorum.

Consideranda est in primis a qua causa hic morbus proueniat: nam si ex parte cibi corrupti, tunc uentrē soluere uel uomitū prouocare utile est. Si uerò ex nimia cibi quantitate assumpta fiat, tunc facta euacuatione paucus cibus exhibeatur, deinde mala stomachi complexio corrigatur: si autem causa fuerit nimia humiditas in uentriculo contenta, tunc medendi insurgunt quatuor intentiones. Prima erit circa uictum: nam cibandi sunt ex chondro, oriza & pane, cum aliquibus adstringentibus, ut malis punicis, pyris, malis cydonijs, uel diacironite: conueniunt etiam testes gallinacei & pisces saxatiles, &c. 2. Intentio est humoris frigidi preparatio cum rhodomelle, sy. de menta, de absinthio, cum decoctis uel aquis menta, absinthij. 3. Intentio est euacuatio, que fit per solutionem uentris, ac per uomitum, maximè materia in suprema parte uentriculi contenta, cum pilulis aleophanginis, masticinis, & de

826 DE CONSEN. MEDIC.

hiera simpl. diaphinicone & diacitonite solutio. 4. Intentio est uentriculi roboratio, ac discrasie derelictae ablatio: & perficitur cum exterioribus unguentis calefacientibus, ac stypticitatē in se habentibus, quale est oleū de spica, de absinthio, de mastice, de menta, de citonijs, item cum emplastris & ceratis eandem uim seruantibus, ex menta, absinthio, rosis, scenoantho, spica, balustijs, galanga, ciperro, &c. Roboramus etiam cum interioribus electuarijs adhibitis, quale est aromaticum ros. diaciminū, diagalanga, diacitoniten cum speciebus & zacharo. Si uerò causa fuerit materia calida, uictus & regimē declinet ad frigidū: digestio fiat cum syr. ros. de granatis, de cydonijs, de myrtho. Euacuatio, cum rheubar. aloe lota, hiera simpl. Robur denique indimus, ac malam derelictam intemperiem remouemus cum zacharo ros. diarrhodonē Abb. cōfectione de tribus sandalis, &c. Si uerò causa fuerit ulcus, primò oportet abstergere, deinde cōsolidare, ut puta cum rhodomelle, abstergere & conglutinare cum bolo armeno, &c. Si causa fuerit uerositas, pri-

mum fiat euacuatio ac digestio, praesertim si materia fouens sit, deinde resoluatur cum electuario de baccis lauri, uel fometo, uel unguentis & emplastris ex rebus calidis stomacho conferentibus, &c.

Loci consentientes de cura leuitatis intestinorum.

Mar. Cat. Cura uariatur secundum uarietatem causarum, &c.

Gal. 8. meth. ca. 5, Cibadi sunt fluere adhuc uentre ex polenta & pane, quem Graeci oxylope uocant, qui minimum aceti habeat: inspergere tamen polentam debebis, ubi scilicet uenter adhuc plus iusto excernit, uel mali punici, uel pyrorum, uel malorum succo citoniorum: si amplius uenter non excernit, sufficit alica ad modum prisanae preparata, hoc est, aceti habens pauxillum, similiter gallinacei testiculi, saxatiles ex albo iure pisces, & fructuum aliquis ex his qui adstringunt. Lege de his cibis Paul. Aeg. lib. 3. cap. 40. ibi, Si biliosa sit deiectio, &c.

Lege etiam Auic. 13. tra. 5. cap. 7. ibi, Et sic cib⁹, &c. Vide etiam Gal. in lib. de san. tuen-

da, &c. De cura malæ cōplexionis plura habes etiam ex ipso Auic. in loc. cit. ibi, Quod si causa fuerit ex frigore, cū calefactiuis curētur ebibitis: & si illic fuerit materia, euacuetur, & administretur uomitus in omni septimana: & si fuerit malitia cōplexionis calidæ cū materia, oportet ut educatur humor cū facilitate, &c. lege fusius, & omnem curam intelliges. Lege etiam Arcul. 9. almans, & ipsum Aet. lib. 9. cap. 51. Item Auic. 16. tra. 2. cap. 2. de fluxu stomachi lubricatio, &c.

Observationes in cura.

Marc. Cat. cap. de lien. Medicinæ soluentes sint quæ à lōginquo non attrahant. Auic. 16. tra. 2. cap. 2, In quibus non sunt ulcera, fac ut permisceas styptica fortis stypticis, cum medicinis calefactiuis in potu & in emplastris, & urantur medicinis naturam iuuuantibus & confortantibus spiritum, ut iheriaca magna, &c.

Conferentia leuitati intestinorum.

Conferūt lienterie, forus ex balaustijs, radix bedegar, castanea, cupressus, aqua uel

uinum extinctionis ferri, fœx uini cum aqua myrthi : cataplasmetur fraxinus, charabe, licium, lini semen, margarita, ossifraga, anisum, polygonum, hypocystis, zingiber. Comp. athanasia Nic. diacitoniten Nic. mitridatum Nic. cum decocto balaustiarum, miua, michleta, pilula styptica Nic. electuarium inuentionis nostræ, Mes. electuarium de myrtho, Mes. sufuf de myrtho Mes. confectio de seminibus Mes. pedes constringere, manus in feruentem aquam mittere.

De prognosticis leuitatis intestinatorum.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 12, Quorum alui intestinorum leuitate laborant, hyberno tempore suprâ purgari malum, &c.

Et aphor. 6. aphor. 1, In longis leuitatibus intestinorum si ructus acidus fiat, qui prius non erat, signum bonum.

Auic. 16. tra. 1. cap. de causis fluxus, Lienteria quæ fit propter complexionem frigidam & humidam est ducens sua longitudine ad hydropem, & est in summo difficilis curationis, quum confirmatur. 2. Facta à uirtu-

te medicinarum soluentium interdum perducit ad dysenteriam & ulcera intestinorum. 3. Inquit Hippoc. quòd omnis fluxus uentris post ægritudinem subito est malus, significans mortē propinquam. 4. Et singultus cū accidit habentibus fluxum uētris, est significatio mala, significās siccitatē facientē arefactionē. 5. Et Hippoc. dixit, quòd habentibus lubricitatem intestinorum uomitus est malus, & iudicium occultam habet causam, &c. Hercules cap. de lien. Succedēs fluxibus antiquis, & ad chronicas ægritudines mortalis. Et perseuerans ex debilitate conrentiue perducit ad hydropem siccam, & tandem ad mortem, &c.

Authores dissentientes circa leuitatem intesti-
norum.

- 1 Adserere cum Erasistrato, muscosa & sanguinolenta cum crudis excrementis excerni.
- 2 Adserere, non posse inueniri lienterie speciem, in qua semper adsint acidi ructus.

Confutatio dissentientium
circa leuitatem inte-
stinorum.

Ad primum: Gal. aphor. 6. commēt. 1, Hæc Erasistratus inquit, nescio qua ductus opi-
nione, adijciens crudis excrementis muscosa
ac sanguinolenta: hoc enim nullus apposuit,
neque eorum qui eius ætate claruerunt medi-
corū, neque eorum qui posterius fuerūt, &c.

Ad secundum: Gal. eodem cōment. Quacū-
que à pituita uentriculū refrigerāte fiūt leui-
tates intestinorū, semper cū ipsis sunt acidi
ructus, ut casus quidā, & sic species liēteriae
inuenitur, in qua adsunt isti ructus acidi.

De dysenteria.

Quæ à Græcis δυσεντερία dicitur, Latini
difficultatē intestinorū, seu tormina uocāt.
Est autē dysenteria flux⁹ uētris sanguinolē⁹
cum excoriatione & ulcere intestinorū, &c.

Loci cōsentientes de dysenteria.

Gal. lib. fin. med. Dysenteria est intestino-
rum ulceratio cum phlegmone & cruento-
rum fæci que similiū strigmentorum secretio-
ne, non sine alui intestinorūque morsu ac

832 DE CONSEN. MEDIC.

cruciatus. Lege etiam Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. ibi, Sane in presentia nomē dysenteria, &c. Paul. lib. 3. cap. 42, δυσεντερία ἐλκοσίς ὅτι τῶν ἐντέρων. Lege etiam Aet. ser. 9. cap. 43.

De causis dysenteria.

Hic affectus uel per se, uel per consensum fieri potest. Per se uel ab externa uel ab interna causa orietur. Ab externa, sicut à frigidityte, ardore, uenenatorum pharmacorum potu, & ab acris cibis, &c. Ab interna, sicut ab humoribus acris paulatim erodentibus, sicut à bile, pituita salsa, ab atra bile, exusta, uel ab aliquo abscessu abrupto. Per consensum fit totius, ut in fine febrium, uel partus, sicut à crassioribus intestinis, à meseraicis, à gracilioribus, hepate, &c.

Loci consentientes de causis dysenteria.

Auic. 16. tra. 1. cap. 2, Et excoriatio est dolor abrasionis ex superficie intestinorum, quæ aut est à materia cholericæ, uel sanguineæ acutæ, aut uirulentæ, aut saniosa, &c. lege

fusus hunc locum. Gal. aphor. 6. comment. 3, Difficultates intestinorū fiunt ex humoribus acerbis intestinorū, summa primū infestantibus, deinde progressu temporis se profundentibus, ita ut ulcera putrilagini obnoxia, uentriculo etiam cōpatiēte efficiātur, etc. Vide etiam Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. Itē 1. de loc. aff. cap. 2. Vbi demonstrat quòd affectus à quapiā causa ortus, non semper remota causa remoueatur, sed permanentē habeat dispositionem, afferens de dysenteria exemplum. Hippoc. aphor. 4. aphor. 11, Quibus tormina & circa umbilicū dolores, etc. Galenus tormina fieri inquit uel propter morsum uehementem, uel spiritum flatuosum qui non habet exitum. B. Nota tamen, quòd tormina siue σποφοὶ non semper pro dysenteria accipiuntur, sed pro intestinorum torminibus, qui à mordacitate humorum, uel à spiritu flatuoso fieri solent, ut testatur Gal. aph. 5. com 41.

De signis dysenteriae.

Signa dysenteriae sunt dolor, uentris punctio, & frequens assellatio, in qua frustra intestinorum cernuntur. Signa ulcers sunt sa-

Ggg. i.

nies exiens, excoriatio, & foetidus odor. Locus ulceris pluribus modis cognoscitur, primum ex dolore supra uel infra umbilicum existente: nam in superioribus dolor magis uehemens est, quàm in inferioribus: præterea uomitus, nausea, & singultus interdum uentriculo ex consensu patiēte fiunt. Cognoscitur etiam ex corticibus intestinorum exeuntibus: nā tenues & parui ex gracilibus, crassi uerò & lati ex crassis intestinis descendūt. Cognoscitur etiam ex tēpore: nam quum inter colorem & assellationem prolixum est tempus, tunc ex gracilibus: si breue, ex crassis. Cognoscitur etiam ex qualitate eius quod egreditur: nam à superioribus proueniens est magis foetidum, & sæpenumero loturae carnis simile. At quod ab inferioribus intestinis prouenit, ex dolore infra umbilicum, & ex sanguine, & sanie ante faeces exeunte cognoscitur. Vlcus plurimæ sordis esse deprehenditur à longa ægitudine, & à quantitate eius quod egeritur, & ex dolore non sensato. Vlcus sordidū à corrosiuo secernitur ex uirulentia, aquositate albida, odore graui: ac

corrosiuū est uehemētis doloris factorisq; colore ad nigredinē uergēte. Signa ulceris profundi sunt sanguis plurimus exiēs post abrasionē intestinorū, itē agritudo uehemēs, &c.

Loci consentientes de signis
dysenteriaē.

Gal. 6. de loc. aff. cap. 1, Dysenteria non statim fieri solet, sed protinus ab ipsius initio bilis mordax secernitur, quū deinde interaneorū abrasiones sequuntur, postea paululum cruoris simul excerni uidetur, quādo affectus ipse in dysenteria esse censetur. Considerandū insuper num per se solae abrasiones exeant, aut simul cum quopiā pingui excernatur, quia tunc indicium est in crassis intestinis ulcus cōsistere, &c. lege hunc locum fusi-
us, & omnia signa intelliges. Lege etiam Gal. primo de loc. aff. cap. 1. ubi pro exemplo inquit, Quum intestini tunicam per dysenteriam deiectā cōspexeris, &c. Vide etiā Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. Item lege Auic. 16. cap. 3. ibi, Communia signa sunt dolor, punctura & alchurati, & quod ulcera cognoscuntur per excoriationem, odorem foetidum &

Ggg. 4.

per alchurati, id est abrasiones intestinorū,
 &c. Lege fusius hunc locū, & inuenies quae-
 cunque à me sub breuitate recitata sunt. lege
 etiam Arcul. & Aet. ser. 9. cap. 43. ibi, Si cir-
 ca intestina crassa ulceratio contingat, &c.

De cura dysenteriae.

Requiruntur in cura dysenteriae quatuor
 intentiones: prima circa regimen, unde si ul-
 ceratio intestinorū à causa calida pendeat,
 cibaria & aër ad frigidum alteranda erunt:
 unde comeduntur oua sorbilia, hepar gallina-
 rum, sorbitiones frumentaceae, & permitten-
 tibus febribus etiam lac, oriza, dulciarij pa-
 nes, amyllum, & quaecūque humores obducunt
 & spissant, & quae corpora laxata & ra-
 refacta adstringunt & siccant, ut pulres ex
 alica, ex oriza, milio, &c. conceditur inter-
 dum ob stomachi imbecillitatem uinum, ca-
 terum aqua pluuialis frigida aliàs conuenit.
 Secunda intentio uersatur circa causam ex-
 coriationis, quae si fuerit à biliosa materia,
 primum humores, deinde abrasiones, demum
 sanguinem educere, statim non expectata di-
 gestione, euacuanda erit, cū myrobalanis citri-

nis & rheubarbaro nō uto ut aliqui, & fa-
 cta aliquali euacuatione, tunc materiā præ-
 paramus cum syr. ros. de citronijs, de endiuia,
 myrrhino cū aquis endiuia, plantaginis, ace-
 rose rosacea, &c. & facta digestionē iterum
 euacuamus cū rheub. Et pro roborando he-
 pate epithema paramus cum sandalis, rosis,
 aqua endiuia, rosarum, spodio, &c. Deinde
 styptica exhibēda sunt. Si uerò causa fuerit
 sanguis ultra iā prædicta, uena secetur. Ter-
 tia intentio est circa excoriationem: quæ si
 fuerit sine ulcere, tunc lauare & conglutina-
 re opus est. Lauamus cū aqua hordei, uitel-
 lis ouorū, & zacharo rubeo per clysterem in-
 fusis. Cōglutinamus quotiēscūque in profun-
 do non est immersa excoriatio, sed tantū su-
 periores partes attingit: & hoc fit cū albu-
 mine ouorū, gūmi Arabico, adipe renū ca-
 prarū, oleo rosaceo, cum bolo armenio, dra-
 gacanto, brodio pingui, uel cum aqua hordei,
 si lauare simul ac conglutinare quærimus,
 omnia per clysterem infusa. Si uerò excoria-
 tio cum ulcere iuncta sit, tūc duplex erit in-
 tentio, quarū prima erit abstergere ac mū-

Ggg. iij.

838 DE CONSEN. MEDIC.

dificare, secunda consolidare. Mundificamus
 cum decocto furfurum frumēti, uel aqua mel-
 lis, iure cicerum rub. aqua lactis, urina, lixi-
 uio dulci, uino rub. rhodomelle, uel decocto
 piscium salitorum & oliuarum, demum cum
 decocto, troc. de arsenico, &c. Consolidamus
 postea cum rebus stypticis, quale est decoctū
 lentii, rosarū, balaustiarū, cor. granatorum,
 sumach, coriandrorū: & addimus boli arme-
 ni, sanguinis draconis, terræ sigillatæ, thuris
 an. 3. i. ouorum binos uitellos, ut clystere ma-
 gis intestinis adhareat. Quarta intentio est
 fluxus cohibitio, ne ex superfluo fluxu uirtus
 prosternatur. Idcirco intrinsecus conueniunt
 syru. ros. de citonijs, de granatis, troc. de spo-
 dio cū semine acetosæ, zucharū ros. trias an-
 dali, myua citoniorū cum corallis, spodio, san-
 dalis, &c. quæ nisi profuerint, ad narcotica
 procedendum, ut cum aithanasia, phylonio
 Romano, uel cū supposito ex licitio, quod
 filo complicandum est, ut cū lubeat, possit
 extrahi. Extrinsecus autem prosunt linimen-
 ta ex oleo myrtheo, masticino, uel de citonijs,
 cum aliquo puluere styptico, uel emplastro

de diaphinicone Mes. Proderit etiam suffu-
migium siue lauacrum ex uino rub. in quo
styptica aliqua incocta sint, lauando ma-
nus & pedes, uel fumum in ferro recipien-
dum, ferro continuè in dicto uino excande-
scente, &c.

Loci consentientes de cu-
ra dysenterix.

Paul. lib. 3. cap. 42, Alimentum erit per
initia, oua ex lacte, sorbitiones frumenta-
ceæ per se & cum lacte, lac mediocriter
coctum, holera non sunt necessaria, gusta-
re tamen possunt endiuia coctam, inrybum
& arnoglossum, &c. poma adstringētia, dū-
modo carnes reijciantur, cruda esui danda,
& aqua potioni frigida, sitque cœlestis, &
leso stomacho uinum propinandū, &c. B. le-
ge Auicen. 16. tra. 1. cap. 4. ibi, Ex cibarijs
eligat frigida & faciētia conglutinationem,
&c. & 16. tra. 2. cap. 7. ibi, Et cū uolueris
cibare, &c. Lege etiam fusiꝯ Aet. ser. 9.
cap. 43. & intelliges sigillatim quacūque ad
Ggg. iiij.

uictum pertinent, &c. De secunda intentione loquitur Auic. 16. Tract. 2. cap. 7. ibi, Oporter te considerare quæ sit dispositio causæ facientis excoriationem & ulcera intestinorum, & an fiat uel facta sit à ruptura, à repletionem, ab apostemate: & si fiat, prepara in abscindendo eam & constringendo ipsam: & si fuerit necessaria euacuatio propter malitiã humoris fluentis, fac eam cum timore & cautela, &c. Galen. 12 meth. cap. 2, At sanguinis missio, quæ scilicet uires non deiecit, symptoma spectantis medici opus non est, sed eius qui eorum affectum adimere studet. B. Intellige, si intoto fuerit repletio, aut si in causa fuerit iecur sanguinem multiplicans, uel sanguis hamorrhoidarum uel menstruorum retentus, &c. Auic. loc. cit. Et rheubarbaro inest proprietas mirabilis in ulceribus intestinorum, & fluxu excoriatiuo, & propriè quando datur in potu cum aqua arnoglossæ & pauco uino, &c. Lege Auic. loc. cit. cap. 3. de cura ulcerosi, ibi, Et multotiens sanat, &c. & habebis multa pro secunda intentione. Gal. 6. de loc. aff. cap. 1, Si in

superioribus intestinis fuerit ulcus, ab epotis
medicamentis petendum est præsidium: si ue-
rò in humilioribus, clysterem submittere ma-
gis conuenit. B. Hoc idem sentit Auic. loc. cit.
ibi, Oportet ut cures id quod est in supe-
rioribus intestinis, &c. De tertia intentione
loquitur fusius Auic. 16. Tra. 2. cap. 7. ibi, Et
non cures in corrosione, nisi de medicinis con-
ferentibus corrosioni, ut sunt mundificatiua,
abstersiua cum exiccatione & stypticitate:
& quum sciueris quòd ulcera sunt sordida,
mundifica cum eis quæ sunt aqua mellis, &
fortior aqua salis, aqua oliuarum salita:
& si necesse fuerit, administra tro. de Arse-
nico, &c. Lege Gal. 5. meth. cap. 1. ubi me-
thodum sanandi ulcera demonstrat, quam
non inutile foret, si ad hunc locum transser-
res. Vide etiam 12. meth. cap. 1. ubi habet du-
plicem curandi uiam, quarum altera uacat
symptomati, altera penitus morbo: lege locum
fusius, lege etiam de hac re Arcul. & Sauro.

De 4. intentione loquitur Auic. eodem in
loco, ibi, Et quãdo non cessat dolor, tunc se-
deat infirmus in tinna, in cuius aqua deco-

842 DE CONSEN. MEDIC.

Etia sint styptica cum aliquanto anethi, fœnu
græci & althea: & si adeò fortis fiat, ut ap-
propinquet syncopis, non erit excusatio nar-
coticorum, &c. lege de his Marc. Cat. Gord.
& Matthæum de Grado, &c.

Observationes circa victum.

Auic. 16. tra. 1. cap. 4, In cibis eorū oportet
ut non sit mordicatio, nec salsedo pluri-
ma, nec acetositas plurima nociua quæ virtu-
tem expulsiuam moueant: quantitas cibi sit
pauca. Secundò, cibaria sint actu frigida
non sumat in potu nisi infrigidatum: nam
frigidum constringit, tepidum uerò resoluit.
Tertiò, & rectius est, ut non comedant cibos
plurium specierum. Quartò, & scias quid
dormire est ex rebus magis iuuatiuis. Quin-
tò, & si cum fluxu fuerit tussis, dimittat id
in quo est acetositas uehemens & styptici-
tas, &c.

Observationes circa pharma-
ca & syrupos.

Marcus Cat. Non exhibeantur solutius
quæ noceant loco ulcerato, ut scamoniata.
Auic. loc. cit. Cùmque administras medici-

nas, tunc incipe cum singularibus: si uerò non ualent, tunc tende ad composita. Et sint restrictiua, aut exiccatiua, aut constipatiua, aut infrigidatiua, aut conglutinatiua, &c. Et non oportet ut sit superfluitas in assatione eorum, ne liquefiat eorum uirtus. B. Ex his intellige, quòd noua non sit opinio de non urendo rheubarbaro, sicuti plures existimarunt, sed Auicenna, &c.

Obseruationes circa narcotica.

Auic. loc. cit. In narcoticis est timor, liceat quādoque accidat, ut sint necessaria, & non oportet ut administrentur, quandiu ab eis excusatio esse potest. Et quando necessaria est administratio, non exhibeantur eis quorum infrigidatur corpus, & debilitatur uirtus, & id apparet in pulsu, &c. Hoc idē adserit Alex. lib. 3. cap. 10. ubi de prepostero medicorum imperitorum iudicio facit mentionem Auicen. Et ex regimine clysteriorum est, ut clyster fiat paulatim per uices, & pingua clysteria sedant dolorem ulceris corrosiui, sed non sanant.

Observationes circa
curationem.

Auic. 14. cap. 15, Nullus creticus fluxus cohibendus est, nisi superfluous fuerit, quia tunc à natura non regulatur, sed à multitudine humorum, uel ab eorum acredine provenit. Item nullus fluxus est constringendus, ni primum materiam peccantem euacuaueris, uel saltem minoraueris. Item fluxus diuersorum colorum nunquam cohibendus, quia multitudinem humorum ac diuersitatem significat, si uirtus tolerauerit. Item infirmus nō adeas sedem, quotiens molestatur, sed retineat, &c.

Conferentia dysenteriae.

Simplicia frigida ad dysenteriam conferentia sunt, acatia, hypocystis, balaustia, galla, gūmi Arab. lutum Armenum, spodiū, granata, sumach, berberis, acerosa, portulaca semen, coriandrū, plātago, rosa, myrthus, mora immatura, citronium, glans, aqua chalybeata, camphora, lithargyrium, panicum, milium, phlomos, nenuphar, cornu cerui ustū, pyra pōtica, papauer, lapis hematites, sanguis draconis, charaba, agresta, bleta nigra, corallus,

corigiola, dragacantum, lactuca, licium, lentes, mespila, hordeum, opium, partes animalium, semperuiua, &c. Composita frigida sunt rhob de ribes, de berberis, de citonijs, troc. de charabe, de terra sigillata, de spodio, emplastrum diaphiniconis Mes. electuarium de sorbis, michleta, diacitonites, diarrhodon Nic. & acharum ros. triasandali, manuschristi, parlatum, &c. Simplicia calida sunt uinum nigrum, stypticum, chalybeatum, thus, ciminũ, anisum, cortex citri, colophonia, laudanum, caseus, coagula, nuclei dactylorum, oriza, acorus, althea, aqua piscium salforum, butyrũ, bitumen Iudaicum, caro leporis, charta combusta in clysteri, cypressus, fenugracum, lignum aloes, mastix, rheubarbarum, adeps caprina, hircina, arietina. Composita sunt theriaca antiqua, & phylonium, athanasia magna Mes. & Nic. troc. de eupatorio, &c.

De prognosticis dysenteriae.

Hip. aph. 4. aph. 24, Difficultas intestinorũ si ab atra bile inceperit, lethalis est. B. Quia nihil ab ulcerato cæcro differt, uel quia nullũ

pharmacum illi continuo adherere potest. Pro expositione aphor. huius lege 22. aphor. ibi, Deiectiones nigrae, &c. usque ad 24. Et aphor. 4. aphor. 26, A difficultate intestinorum habito si ueluti carunculae exeant, lethale est. B. Quia carnem in his concreescere uel cicatricem induci non speramus. Nota tamen, quod dysenteria habet triplicem differentiam. Prima, quum pinguia quaedam corpora excernuntur. 2. quum ex superficie intestinorum interiore quaedam rameta exeunt. 3. quum intestinorum substantia abraditur, & haec est incurabilis, &c. Hippoc. aph. 6. aph. 3, In longis difficultatibus intestinorum inedia ex fastidio malum, & cum febre peius. B. Intellige si accidat in processu morbi: nam dictum est aph. 7. aph. 6, In morbo diuturno fastidium cibi malum. Et aphor. 6. aphor. 43, Quicumque lienosi difficultate intestinorum capiuntur, si superueniente longa difficultate intestinorum, aut aqua intercute, aut leuitate intestinorum, moriuntur. Et aph. 2. aph. 12, In profluuijs alui mutationes excrementorum iuuat, nisi ad mala mutatio fiat, &c. Et aph. 5.

aph. 34, Mulieri uterū gerenti si aluus plurimū profluat, periculū est ne abortiatur. Et aph. 6. aph. 48, Lienosis difficultas intestinorū aut dysenteria superueniens, bonum. Et aph. 7. aph. 5, A furore difficultas intestinorū bonū. B. Ratione trāsmutationis, quū à capite ad inferiora humores noxi trāfferantur. Et aph. 7. aph. 24, A deiectione sincera difficultas intestinorū malū. lege etiā aph. 30. lib. 7. ibi, Quibus in alui profluuijs excrementa spumosa sunt, &c. Aet. ser. 9. cap. 43, Dysenteria in colo aut recto cōsistens, facile curatur: quæ uerò in tenuib⁹ intestinis, maximè in ieiuno, difficilè. Secūdo, quæ post abscessuū eruptiones fiunt, graves sunt: & quæ cū inflāmatione oboriuntur, & quæ cum febre & appetitus perditione, pessimæ, quæ pori aspectum habent, sūnque nigra, plurima graueolentia: & quæ unā cum excrementis pelliculas cum sordibus mixtas emittunt. Tertiò magis in his deficiunt mulieres quàm uiri, magis senes & pueri quàm iuuenes, &c. Auic. 16. tract. 1. ca. 2, Primū magna effusio sanguinis puri post dysenteriam ualde mala, quia ad intima

adeò penetrarunt ulcera, ut uena scindantur. Secundum, ulcera intestinorum perducunt ad hydropem. Tertium, conuulsio, uomitus, singultus & conturbatio rationis post dysenteriam, mortem significant. Quartum, in lib. Hippoc. Qui habet dysenteriam, & apparet post eius aurem sinistram ueluti res nigra similis orobo cum uehementi siti, moritur in decima, & non tardatur, nec euadit, &c.

Authores dissentientes circa dysenteriam.

- 1 Adserere, omnem uehementem fluxum in principio morbi factum, esse compescendum.
- 2 Adserere, dysenteriam à sanguine deterioris esse curæ, quàm à bile.
- 3 Adserere, dysenteriam ab atra bile semper esse lethalem.

Confutatio dissentientium circa dysenteriam.

Ad primum, Damascenus in aphor. Si quis per multum tempus neque uomitum, neque solutionem uentris habuit, & ei subito eueniet, uidendum ne restringere festines, quia huic corpus prauis expurgatur humoribus, unde

Auic. 16. tertij dixit, fluxum fluxu curari: uerum si imbecillitas uirium ex fluxu fieret, esset restringendus. uide Concil. differ. 200.

Ad secundum dicimus, quod deterioris curæ est dysenteria ab atra bile: nam Gal. 4. aphor. commet. 24, Quæ ab atra bile fit, insanabilis est: deinde quæ à bile & à pituita salsa, deinde quæ à sanguine.

Obiectio.

Auic. ponit deteriore esse, quæ est per adustionem cholerae amaræ, quam nigræ: itidem Haly. Abb. in sua praxi, Quomodo igitur deteriorem dicis, quæ ab atra bile fit?

Responsio.

Dico quod ratione subitæ impressionis deterior est quæ à bile adusta fit, sed ratione eradicationis deterior est quæ fit ab atra bile. De hac re lege Concil. differentia 101.

Ad tertium respondet Gal. aph. 6. comm. 43. quod qui durum habent lienem, ijs superueniens dysenteria soluit dispositionem. Quare si atra bilis aliunde prouenerit, nec fixam ac permanentem causam in intestinis habuerit, salubris est & non lethalis: & hanc solutionem habet.

Hhh. i.

bes ab Auic. 3. can. cap. de solutione uentris
omniū modorū, & sic nō est semper lethalis.

De fluxibus hepaticis.

Omnis fluxus, qui uitio hepatis accidit,
hepaticus solet appellari, & eius species sunt
nouem, ut chylosa, pituitosa, biliosa, atrabi-
laris, sanguinea, lotiua, scitida, uirulenta, &
ultima, quando caro hepatis nigra & crassa
expellitur. Chylosa est, quando pars chyli uel
totus chylus egreditur, & hoc uitio hepatis
& non uentriculi. Pituitosa duplex: altera à
crassiori pituita, altera ab aquosa. Biliosa
uerò etiam uaria & multiplex est iuxta bilis
species, sicut flaua, uitellina, prasina, ærugi-
nosa, &c. Atrabilaris similiter fluxus niger
est, sicuti sanguis niger, aut nigri uini fæx,
aut melancholia per adustionē bilis genita,
aut melancholia naturalis, uel per adustio-
nem præter naturam genita. Sanguinea, quā
cruentam uocat Gal. interdum retinet pro-
prium colorem, interdum niger est sanguis,
interdum paucus aut multus, interdum con-
tinuus & interpolatus. Lotiua uerò est flu-
xus rei aquosa, quæ tēdit ad colorem rubē,

Est sicuti carnis recētis lotura. Foetida est fluxus rei foetentis, siue sit humor, siue sanies, siue hepatis substantia corrupta. Virulenta est fluxus rei subtilis, tendentis ad citrinitatem aut rubedinem ad modum uirulētiae. Vltimus est fluxus, ex quo res nigra non facile diuisibilis egreditur, et est substantia hepatis per putrefactionē uel adustionē separata.

Loci consentientes de fluxibus hepaticis.

Quod tot sint species fluxuū hepatis, quos nuper recitauimus, lege Arcul. et Sauonarolam, et maximē Auic. ubi agit de solutione uentris omnium modorum, et de expulsionibus rerum ex hepate et splene. Galen. 6. de loc. affect. cap. 1, Nonnulli antiquorum praeter hanc, quae ab ulceratione intestinorum fit, dysenteriam, aliam quoque cruentam ob excretorum speciem nominarunt, in qua syncerus interdum et plurimus sanguis, interdū ueluti limus et faeces ipsius non parua quantitas excernitur, &c. Lege etiam Gal. 2. de loc. aff. cap. 5.

Hhh.ij.

De causis fluxuum hepaticorū.

Causæ chylosi fluxus sunt quinque. Prima, quum chylus est pluris quantitatis, quàm pro nutriendo corpore deceat. 2. est paruitas hepatis copiam chyli continere non ualentis. 3. est abscessus in meseraicis, uel in cōcauo hepatis. 4. est obstructio attenuatoria aut carnosæ, aut coarctatoria harum partium. 5. est imbecillitas attractricis siue retentricis facultatis, &c. Causa pituitosi fluxus est mala complexio frigida hepatis, destruens alteratricem siue digestiuam facultatē. Causa aquosi fluxus est corruptio alteratricis facultatis, et fortitudo expulsoꝝ facultatis. Causa biliosi fluxus est copia bilis genita ab intēperie hepatis calida, uel regimen calidum, qualis est usus ciborum acrium, amarorum & salsoꝝ, item ira, & motus in sole, febres ardentes, abscessus calidi, obstructiones cystis fellei, & quæcunque possunt sanguinem adurere & bilem gignere, &c.

Causæ fluxus melancholici sunt sex, mala intemperies hepatis calida adurens, aut frigida congelans. Secunda, ulcus in substantia

*heparis emittens pus nigrū. Tertia, obstructio
 heparis, qua patefacta exeunt denigrata ma-
 teria, iandiu retentæ. Quarta, fortitudo uir-
 tutis tales feces separantis ac expellentis.
 Quinta, imbecillitas facultatis retentoriæ &
 alteratricis fecalem fluxum inducentes, &c.
 Causa sanguinei fluxus uel est scissura ue-
 næ, uel copiosa eius multitudo, aut obstru-
 ctio uenæ chyli, aut abscessus, aut imbecil-
 litas attractricis facultatis. Causa lotiui
 fluxus, uel est imbecillitas concoctricis fa-
 cultatis, aut retentoriæ, quæ non adeo usque
 chylum retinet, ut perfectè digeri possit: aut
 est imbecillitas secernentis facultatis, non se-
 parans a quositate à sanguine ob heparis
 imbecillitatem. Causæ harum imbecillitatum
 sunt interdum mala intemperies aut absces-
 sus aut obstructio. Causæ foetidi fluxus sunt
 longa mora humoris retenti in loco præter-
 naturali, uel ulcus, uel apostema, à quibus sa-
 nies malè olens secernitur, interdum ipsius
 heparis putrefactio. Causæ fluxus uirulen-
 ti est facultas expulsoria humores ceticè
 uel symptomaticè expellens, uel sanguinis ex
 Hhh. ij.*

aliquo apostemate in hepate aut meseraicis rupto resudatio. Causæ fluxus substantiæ hepatis sunt putredines, adustiones, ulcera corrodentia substantiam hepatis.

Loci consentientes de causis fluxuum.

Vide in alios neotericos Arcul. de his fusissimè differentem. Galen. in art. med. cap. 88. de signis hepatis patientis. Item de diff. eorū quæ excernuntur multa habet, quæ ad hunc locum adduci possunt. Paul. lib. 3. cap. 42, Iecoraria dysenteria fieri solet, quia iecur alimentum distributum non probè conficit, & retentrix eius facultas uel alteratrix imbecillis est. Galen. 1. de nat. hum. tex. 41, Fieri, inquit, frequentissimè à multa sanguinis copia in uenis contenta, quæ à natura per uenas perinde excernitur, ac in mulieribus per uterum, & alijs per nares uel mariscas: uide etiam Galen. 9. de compos. med. per loc. cap. 5. Item 2. de loc. affect. cap. 5. Vide insuper Alex. li. 3. de Iecoraria dysenteria. Ite Gord. & alios neotericos.

De signis fluxuum hepaticorum.

Signa fluxus chylosi sunt nota illis qui chy-
lum cognoscunt, & est albus subtilis, ut prisa
na hordeacea. Signa quum sit à paruitate he-
patis sunt, quia à generatione contractum est
hepar, & quòd iuuatur à paucitate cibi.
Signa quòd fiant ab apostemate siue ab ob-
structione, sunt satis nota per ea, quæ dicta
sunt de imbecillitate hepatis. Signa fluxus bi-
liosi cognoscuntur per colorem & substan-
tiam eius quod egreditur. Signa fluxus pitui-
rosi aquosi, cognoscuntur ex præcedenti re-
gimine, ut ex comestione fructuum, ex potu
aquæ superfluo. Signa malæ complexionis he-
patis & apostematis, & obstructionis pa-
tent ex supradictis. Signa fluxus humoris
melancholici cognoscuntur ex colore nigro
tendente in rubeum, & interdum est uelu-
ti sæx uini, uel sanguinis nigri congelati. Si
est à caliditate, humor magis lucet, magis-
que foetet, & præcedit liquefactio humorum,
& fluxus uentris uirulentus & febres, &c.
Quando sit à frigiditate, adsunt signa in cō-
trarium, &c. Si proueniat ab apostemate ru-
Hhh.iiij.

pro, primò præcesserint signa apostematis, sicuti gravitas, dolor, & febris continua. Si ab obstructione, præcesserunt signa obstructionis. Signa sanguinei fluxus ex hepate, sunt hepatis nocumenta præcedentia. Si à ruptura venæ, præcessit casus uel percussio hepatis, sanguinisque copia egreditur, quæ nec facile, nec statim supprimi potest. Sanguis acutus cognoscitur ex ciborum acredine, & ex eo quod per loca dum transit, mordicat. Obstructio hepatis cognoscitur ex gravitate, tumore, &c. Signa lotii fluxus cognoscuntur à chylo non probè digesto exeunte simili loturæ carnis. Cognoscitur ab imbecillitate retentricis uel digestivæ, ex caliditate & frigiditate in hepate conuenta: nam à frigiditate debilitatur digestiva siue alteratrix, à caliditate retentrix uirtus. Signa fluxus fœtidi sunt ipse fœtor rei egredientis. Signa virulenti, sunt signa hepatis calidi sub cute subtili, & signa inflammationis hepatis liquefacientis. Signa substantiæ hepatis exeuntis sunt nota, quoties res exiens similis est hepati, quod nil aliud est quàm sanguinis coagulum, nec diuidi po-

test, nec in aqua solui sicut frustum sanguinis concreti, &c.

Loci consentientes de signis.

Arcul. omnia hæc signa habet, & multò plura quàm dixerim, 9. almans. cap. proprio. Gal. 6. de loc. affe. cap. 1, Discernitur hæc à uera dysenteria, quia ab initio tenuis sanies sanguinis ab hepate reijcitur, deinde aucto malo crassus humor fecibus uini haud absimilis. Præterea in iecinoris excrementis nihil abrasum expellitur, & interim per duos uel tres dies euacuatio supprimitur, sed rursus redeunte malo excrementa prioribus multò peiora excernuntur, quod in inuestinorum ulceribus haudquaquam apparet, &c. Paul. lib. 3. cap. 42, Si retentrix uel alteratrix imbecilis est, sæpe eiusmodi descendunt, ut recens in eis caro lota esse uideatur. Lege Aet. de hac re. & Alex. Gord. & alios neotericos.

De cura fluxuum hepaticorum.

Fluxus chylosus, si à nimia quantitate chyli proueniat, cibis detur in minori quantitate. Si fuerit nimium crassus uel uiscosus, den

858 DE CONSEN. MEDIC.

sur attenuantia & incidentia, sicuti ius cic-
 cerum & decoctiones apertinae cum radic. fœ-
 niculi, petroselini, &c. Si fiat ab hepatis par-
 uitate, cibari debet frequenter cum cibis te-
 nuibus, boni nutrimenti & paucarum super-
 fluitatum, sed parum pro uice. Si fiat ab apo-
 stemate, tunc fiat diuersio & euacuatio cum
 sectione uenæ, deinde topica suis temporibus
 congruenta adhibeantur. Si uerò fiat ab ob-
 structione uel ex debilitate attractoria fa-
 cultatis, tunc tres opus sunt intentiones: pri-
 ma digestio, quæ fit cum syrup. de duabus ra-
 dicibus, bisanino, oxymelle simpl. syrupo de
 eupatorio, de cichorea cum rheub. cum aquis
 aperientibus, qualis est aqua absinthij, fœni-
 culi, cuscute, cichorij: quibus etiam interdum
 adhibemus syrupum de endiuia, ros. &c. Se-
 cunda est euacuatio, quæ fieri poterit cum
 rheubarbaro, agarico, pilulis de rheubarbaro,
 de eupatorio. Tertia est malæ complexionis
 derelictæ in hepate ablatio, quæ perficitur
 cum cōfectionibus & electuarijs, qualia sunt,
 diacalamentum, diacinnamomum, theriaca,
 diacurcuma. Troc. de lacca, de rheubarbaro,

de eupatorio . Et in causa calida, diarrho-
don, triansandali cum seminibus frigidis ape-
rientibus, &c. Omnis præterea fluxus hepa-
ticus siue à caliditate, siue à frigiditate pro-
ductus, quatuor intentionibus curari debet.
Primò regimine uitæ, secundò remouendo cau-
sam ipsius fluxus, tertio roborando omnes he-
patis facultates, quartò corrigendo sympto-
mata. Regimen in fluxu chyloso erit ex cali-
dis uel frigidis, prout hepatis discrasia re-
quireret: ut plurimum tamen ad siccum cum
stypticitate aliqua temperata uictus tendat.
In fluxu bilioso regimen sit frigidum & hu-
midum cum temperata stypticitate. In fluxu
melancholico interdum ad frigidum, inter-
dum ad calidum, interdum ad tenuitatem,
interdum ad crassitiem, iuxta longitudi-
nem & breuitatem morbi uictus ordinetur,
cum uirtutis robore. In fluxu lotiuo sit ex
his uictus qui nutrimentum bonum pauca-
rum superfluitatum inferat, facilisque dige-
stionis, spargaturque uices. Causa fluxus re-
mouetur in pituitoso fluxu, euacuando primū
humorem pituitosum cum decocto iridis &

860 DE CONSEN. MEDIC.

myrobalanorum chebulatorū, & educendo per
 urinam cum dialacca & uino albo, &c. In
 fluxu cholericō euacuetur per cholagoga cū
 decocto prunorum, tamarindorum, myroba-
 lanorum cit. rheubarb. &c. In fluxu melanco-
 lico cum myrobalanis Indis, epithimo, sena, in
 sero decoctis cū cōfectione hamech. Et si mul-
 titudo sanguinis adfuerit, fiat sectio uenae, &
 aperiantur hamorrhoides & menstrua pro-
 uocentur: in fluxu lotiuo educatur aquosi-
 tas multiplicata per secessum, per urinā, per
 sudorē. In fluxu foetido procedatur, primū
 cū mundificantibus & solutiuis, prout humor
 corruptus exegerit, ut puta cum decocto hor-
 dei aut hydromelle, oxymelle, &c. Similiter in
 uirulento mundificetur uirus cum decocto pru-
 norum, tamarindorum, myrobalanorum cit.
 &c. Roborantur facultates hepatis, & dis-
 crasia frigida aufertur cum calidis tempera-
 tis, quales sunt passule, phistici, auellanae, cin-
 namomum, hepar lupi, caro limatiarum, cro-
 cum, &c. In causa calida cum endiuiā, cicho-
 rio, semine sandalis, uino granatorum, aqua
 plantaginis, portulacae, cum camphora, &c.

In melancholico cum syrupo de absinthio, de eupatorio, de epithimo, cum diagalanga, diacalamento, theriaca, mihrdato, &c. In lottio, cum electuario de passulis Auicen. & quibuscunque in capite debilitatis hepatis dicitur. Corriguntur accidentia, ut si adsit exco-riatio, cum mundificantibus ac abstergentibus, ut puta cum aqua hordei, adipe renum caprae, albumine oui, & vitello, oleo violaceo, &c. Dolor auferatur cum clysterijs modo abstergentibus, modo anodinis, modo stupefacientibus, prout opportunum uidebitur, &c.

Loci consentientes de cura fluxuum hepaticorum.

Auicen. 16. tra. 2. cap. 1, Iam scinisti causas fluxus hepatici, & scinisti curam cuiuscunque causa: oportet igitur ut redeas ad id, & cures malitiam complexionis eius, & apostemata, & debilitatem, & oppilationem, & repletionem eius, scilicet unumquodque cum eo quod dicitur in capitulo suo: & cum haec feceris, iam curasti. Lege Arcul. Gord. Marcum Cat. Aet. & Paul. Aegin. & intelliges omnia.

Observationes in euacuatione.

Marcus Catin. Oportet cauere ne euacue-
mus cum rebus nocētibz hepati, ideo utimur
rheubarbaro in infusione.

Observationes in topicis agendis.

Auicē. 16. trac. 2. cap. de cur. fluxus hepa-
tici, Et multotiēs linit insipiens hepar in hac
assellatione cum inspissantibus sanguinem &
extinguentibus hepar, per hoc quòd sunt fri-
gida : & in hoc est mors & preparatio ad
putrefactionem, &c.

Conferentia fluxui hepatico.

Cōferunt fluxui hepatico bolum cypricum
potū, uel per clysterē impositum emplastrum
diaphiniconis, Mes. & quacunque suprā re-
citauimus, &c.

De prognosticis fluxuū hepaticorū.

De fluxu chyloso loquitur Acul. sic: Flu-
xus chylosus nisi pendeat ab apostemate, ut-
plurimum curatur. Hippoc. aphor. 7. aph.
56, Quibus hepar aqua plenum in omentum

eruperit, ijs uenter aqua repletur & moriuntur. Arcul. Fluxus cholericus perducit ad excoriationem & ulcera intestinorum, prout cholera erit magis uel minus acuta ac adusta, & curatur, nisi ab apostemate ortum habuerit. De fluxu melancholico lege aph. 4. apho. 21. ibi, Deiectiones nigrae, qualis est sanguis niger, sponte uenientes, siue cum febre, siue sine febre, pessimae, &c. Et aph. 4. aph. 22, Morbis quibuscumque incipientibus si atra bilis uel supra uel infra exierit, lethale. Et aph. 4. aph. 23, Quibuscumque ex morbis acutis aut diuturnis, uel ex uulneribus, siue quouis alio modo extenuatis, nigra bilis, siue uti sanguis niger desubter exierit, postridie moriuntur. Et aphorism. 4. aphorism. 24, Difficultas intestinorum si ab atra bile inceperit, lethalis. Et aphorism. 4. aphorism. 25, Sanguis quidem supra, qualiscumque fuerit malus, infra autem bonus est. Arcul. Fluxus sanguinis nigri foetentis & sanguinis rubei est deterior quam fluxus nigri: alij uero fluxus si ab humoribus orti habeant, ut plurimum curantur,

*si ab apostemate uel ulcere, nunquam aut
difficulter sanantur.*

**Authores dissentientes circa
fluxum hepaticum.**

- 1 Adserere, in omni fluxu hepatico conuenire styptica.
- 2 Adserere, in fluxu hepatico tenuē uictum non esse exhibendum.
- 3 Adserere, fluxum hepaticum esse facilis curationis.

**Confutatio dissentientium circa
fluxum hepaticum.**

Impugnat primū Auic. 16. tertij, de cura eius, ubi inquit: Illud quod cadit de errore in hoc est, ut dentur illi qui habet fluxum hepaticum oppilatiuum, medicinae constipatiuæ, addentes in oppilationem, ipsam confortantes ut stringant materiam, & id ad errorem maximum perducit.

Ad secundum respondet Conciliator differentia 202. dicens: Sunt quidam modernorum qui in hac passione præcipiunt non esse dietam tenuem exhibendam, cuius contrarium

indicat Auic. dicens, In assumptione assellationis hepaticæ plurimum est, ut non appropinquet panis, quia hepar non recipit ipsum, imò rectius est, ut sit contentus aqua sanic bis in die, &c. Igitur iuxta Conciliatorem & Auic. tenuis uictus cōuenit, & nō ecōtra, &c.

Ad tertiū, Haly abbas. 7. practica, Dysenteria hepaticæ medela perdifficilis est, & perpauci liberamur ab ea. & subdit, Multi enim parum cognoscunt hepatis debilitatem & eius causam. Galen. 5. de loc. aff. quosdam cognouisse ait, quibus fluxus hepaticus acciderat ex debilitate hepatis, & perijisse ex pauca curatione. Præterea auctores succinctam huius morbi causam idcirco scribunt, quia parum fidunt de eius salute, & sic potius est incurabilis, quàm curabilis, &c.

De tinesmo, id est intestinali fluxu.

Tinesmus, est mala recti intestini dispositio, in qua egerendi prompta quædam cupiditas cum gemitu ac conatu ægri adest, paucis admodum sequentibus excrementis muscosis ac sanguineis. Hic duplex est, uerus &

III. i.

mendosus. Verus, quum causam sui recto intestino affixam tenet. Mendosus, quum causa non est fixa, sed aliunde ueniens eum producit, sicuti materia fluens per intestina ad anum, &c.

Loci consentientes de tinesmo.

Gal. lib. fin. med. Tinesmus est dispositio recti intestini ad partes inferiores pertinens, in qua imperus cupiditatésque desidendi plures, sed paucae excretiones sequuntur, &c. Aer. ser. 9. cap. 43, Tinesmus est egerendi promptitudo, quæ differri ac deuitari non potest, nihil tamen præterquam pauca cruentum aspectum habentia propellens, &c. Lege de hac re Paul. lib. 3. cap. 41. Et Galen. 6. de loc. aff. cap. 1. ibi, At ulcera quæ recto intestino oriuntur, &c. lege etiam Mar. Cat. & Arcul. Auic. 16. tra. 2. cap. 16, Primùm oportet te scire indispositionem tinesmi, an sit tinesmus uerus, an tinesmus mendosus, &c.

De causis tinesmi.

In genere considerandum, num causa in lōganone existat uel à supernis partibus descendat. Si causa erit fixa in recto intesti-

no, tunc erit uel inflammatio, uel ulcus cor-
rodens, uel fistula, uel occulta hæmorrhoi-
des, uel ragadia, uel abscessus durus. Si uerò
à supernis partibus defluat, uel erit humor
impactus pungens ac stimulans, ut pituito-
sus, salsus, biliosus, aut atrabilaris adustus:
uel erunt cibi acuti, salsi, uiscoli, uel pharma-
cum acutum mordax, aut suppositoriū acre,
uel mala intemperies frigida absque alio com-
plexu, &c.

Loci consentientes de causis
tinesmi.

Paul. lib. 3. ca. 41, Causa tinesmi est inflā-
matio in longanone facta cum molli ac laxo
tumore, quod œdema uocāt, quæ stercoris in-
sidētis suspiciōē præbet, quod exitū quærat.
Auic. 16. tra. 1, Et causa Zair, id est, tinesmi,
aut est apostema calidū aut durū, aut molli-
ficatio lacerti, aut tensio ex qua lacertus im-
peditur ab operatione sua, aut superfluitas
salsa, aut baurachia, aut chylus grossus, aut
cholera ingrediens, aut frigus adueniens, aut
lōgitudo sēsionis super durū, aut crassities fæ-
cis, aut eius durities, aut hæmorrhoides, aut fi

Iii. ij.

stula, aut ragadia, aut rugitus, aut corrosio,
aut grauitas sensata, &c. lege Arcul. & a-
lios, &c.

De signis tinesmi.

Signa quòd adsit tinesmus sunt desiden-
di cupiditas cum conatu ad excernendum, u-
bi primum pingue, deinde muscosum & cru-
entum egeritur. Signa inflammationis uel abs-
cessus sunt, grauitas, dolorque continuus, qui
nec emissionem stercoris remouetur, excremen-
taque difficulter excernuntur, mollientia &
anodina ualde conferunt, alijs in contrarium
laedentibus. Signa ulceris sumuntur à præce-
dentibus rebus, ut ab humoribus ulceranti-
bus, sicut in dysenteria: aut à fluxu flauo,
prasino, & nigro præcedente: aut ex absces-
su ad uomicam deueniente, aut ex pharmaco
exulcerante iam assumpto. Signa fistulae &
hemorrhoidarum uel ragadiarum cognoscen-
tur ex his quæ suis in locis dicuntur. Signa hu-
morum sunt, quia si à bile efficiatur tinesmus,
cognoscetur ex uiclu præcedente, bilem mul-
tiplicante, & ex alijs bilem indicantibus, si-
cut ex punctione in recto intestino, ex flauis

excrementis, & quod à calidis lœditur, &c. Si pituita, cognoscitur à pituitosis excrementis, à pruritu in intestino recto, & ab alijs pituitam indicantibus. Si ab intemperie frigida absque alio complexu, aderit desidendi uoluntas & conatus ad excernendum, sed nihil egreditur, à calidis deinceps iuuatur. Si à flatu incluso, tunc indicium erit, quod emissio flatu statim tinesmus cessat, & retento augetur, &c.

Loci consentientes de signis tinesmi.

Aet. serm. 9. cap. 43, In principio si grauis distensionis sensus circa imum uentrem fiat, & maxime circa partem dextram, coniectare oportet stercorum multitudinem in caeco intestino insitam esse, &c. Galen. nulla alia signa ponit præter quedam communia, quæ sunt desidendi cupiditas cum conatu ad excernendum, ubi primò pingue, deinde cruentum egeritur, &c. Auic. 16. cap. 3. multa signa affert, ibi: Tinesmi autem diuisiones significant id quod egreditur, &c. Vide in hoc Razen 8. comment. & Arcul. 9. Almans.

Iii. iij.

De curatione tinesmi.

Si causa tinesmi fuerit bilis uel pituita sal-
sa, tunc clysteris lauatiuis indiget: sed pri-
mum prohibeatur causa antecedens cum di-
uersionibus & euacuationibus, deinde causa
coniuncta remoueatur cum clystere ex aqua
hordacea Zuch. & uitellis ouorum in causa
calida parato, aut in frigida, cum rhodomel-
le, aqua cicerum, sero caprino, &c. Quod si
ab inflammatione uel ab alio abscessu fieret
tinesmus, considerandum num per uiam de-
fluxus fiat, & tunc fluxus causam euacuatio-
ne & diuersione, si opus fuerit, amputabi-
mus. Euacuatio fiet per sectionem uenæ uel
cum pharmaco leniente. Diuersio fiet cum
urinam uel sudorem prouocantibus, cum cu-
curbitulis, frictionibus, &c. In causa coniuncta
si fuerit calida, in principio repellendum cum
anodinis, ut cum oleo rosaceo, myrthino: &
in causa frigida, cum oleo camomillino, ane-
thino, sysamino. In augmento repellentibus
calida resoluentia & emollientia addantur,
quale est oleum liliorum alborum, adeps re-
num caprae, bdellium, butyrum. Quod si ab

ulcere fiat tinesmus, tunc eductis primùm si
quæ fuerint fæcibus, ulcus abstergetur cum hy-
dromelle, uel rhodomelle: uel si putredo co-
gat, addatur aqua salsa, uel decoctio alumi-
nis, quibus interdum addi potest unguenti
Ægyptiaci uncia una: quo deinde repurga-
to, tunc his, quæ ad cicatricem perducunt, o-
pus erit. Si uerò fiat à fæcibus siccis, curetur
cum emollientibus sæpe reiteratis. Si à mala
intemperie frigida, cum calefacientibus tam
in uictu, quàm in medicamine exhibitis. Si ab
intemperie calida, cum refrigerantibus ano-
dinis. Si à flatu, per ea quæ flatum resoluunt.
Quòd si dolor magis urgeat, nec per anodina
cessare uelit, tunc urgente necessitate ad so-
porifera ueniendum, inter quæ laudatur sup-
positorium de licio, filo tamc̃ appēsū, ut ad
libitum possit remoueri, item achanasia Ni-
colai 3. i, &c.

Loci consentientes de cu-
ra tinesmi.

Aet. serm. 9. cap. 43, Si impacta fuerit ster-
corū multitudo in cæco intestino, tollēda erit
cum emollientibus clysteribus, ut fursurū deco

Iii. iiij.

cto, fœnugraci, melle, oleo, &c. lege eum fusius. Auic. 16. tra. 2. cap. 16, Si fuerit fœx sicca, cura cum clysteribus lenitiuis. Si fuerit caliditas, indigebis eis quæ sunt cassia, fistula & syrup. uiolaceus. Si fuerit causa frigus adueniens, cum potionibus & clysteribus calidis, &c. Et si fuerit causa apostema calidum, stude in retinendo id quod currit ad apostema, & curetur in principio sui cum phlebotomia & cū minoratione cibi, &c. lege eum fusius: lege etiam Arcul. 9. almans. & Marc. Catin. & reliquos practicantes. Serapio, Cura tenasmonis uertitur ad causam & ad morbum. Ad causam triplex intentio: Prima, prohibitio materię imbibitæ in intestino. Secunda, eius resolutio. Tertia, est sedatio acuitatis materię, & æquatio malæ complexionis eius, &c. Razes lib. diuis. cap. 72, In fine, inquit, iuuantur habentes tenasmonē suppositione collyrii plusquam reliquis curationibus, &c.

Observationes in curatione.

Arcul. 9. almās, Clysteria communiter debent esse pauca & quātitaris, ut decem uel duo-

decim uncijs: nō enim oportet ut trāseant ultra intestinum rectum, & cum hoc melius retinentur. Item collyria sint usque ad digitos septem. Auic. 16. tra. 2. cap. 16, Et scias quod frigus facit tenasmon in pluribus horis. B. Quia materiam frigidam siue calidam impingi illic cogit. Arcul. Sint omnia cibaria humida, insipida, pauca dulcedinis, uiuētur sicca, amara, acria, salsa, acetosa, & quæcūque faciem exiccant & exasperant. Vide Auic. ibi, Et quum eum cibas, &c.

Inducentia ac cōferentia tinesmo.

Inducunt tinesmū, colocynthis, euphorbiū, sarcocolla, scamoniū. Cōferūt tinesmo adeps porci, capræ clysterizatus, balauſtia, bdelium, brassica, cauda equina, colophonix suffumigium, scænuſracum, ferruginis cum aceto suffumigium, gumi Arab. ius galli ueteris, piscium, charabe, lac asini, litium, lini semen coctum cum oleo ros. malua, meu, eneaſma, nasturtium, myrrha cū olibano & croco, oleum persicorum, origanum, pini cortex, porrum, psyllium, sauina, spica storacis, suffumigium

874 DE CONSEN. MEDIC.

phlomos, rherebentina, ruta, confectio de st-
race Mes. electuarium nigrum Haly. 16. ant.
Micleta Auic. 4. 5. Troc. de Almezereon, de
balaustijs Auic. 8. quinti, &c.

De prognosticis tinesmi.

Razes 8. com. Tinesmus plurimum fit post
dysenteria, & quod non fit post dysenteriam
est leuioris curae: idem adserit Auic. dicens: Fa-
cilius est id quod nō succedit dysenteria. Hip.
aph. 1. ον γαστρι ἐχούση πινεσμός ἐστὶ χειρὸς
ἐκτρώσιν ποιεῖ. id est, Mulierē in utero ha-
bentē tinesmus innatus abortire facit, qui a-
phor. tantū in translatione Constantini in-
uenitur, nulla nec à Theodoro, nec à Leonice
no facta mentione. Auic. 16. tra. 1. cap. 2, Et
singultus quum accidit habētibus fluxū uen-
tris, & propriē habentibus tinesmū, est signi-
ficatio mala, significans siccitatē facientē a-
refactionem, &c.

De doloribus in genere.

Altius nunc exordiar de doloribus in ge-
nere aliquid demōstrans, deinde ad morbum
colicum me conferam. Dolor est tristis sensa-

tio à subita ac uiolenta mutatione facta, &
 tantummodo ad tactū, & non ad alium sen-
 sum. Dolorum igitur differentiæ sumuntur à
 loco, ut si dolor sit in omnibus intestinis, uel
 in eorum parte. Si uerò sit in omnibus, tunc
 erit uel cum motu, uel cum quiete. Si cum mo-
 tu, erit terciò: si cum quiete, uocabitur nomi-
 ne generis, dolor. At si sit in parte, uel erit re-
 missus, & uocatur ab Auic. punctio, uel inten-
 sus, & in crassibus intestinis, & erit colica dispo-
 sitio. Si in gracilibus, erit ileus siue uoluulus.
 Rursus dolorum species sunt sex, scilicet pun-
 ctoria, grauis, stimulans, extensiua, pulsatilis,
 & ulcerosa. Punctorius dolor circa membra-
 nas potissimum cōsistit. Grauis circa hepar,
 lien, renes. Stimulans circa partem ossibus ui-
 cinam, & in cute fieri potest. Extensiuus per-
 tinet ad partes, quibus nullæ sunt arteriæ, ut
 membranae, cutis, adenes, quibus nullæ insunt
 arteriæ: nam inflammatae extensiuo tantum
 dolore uexantur. Pulsatilis circa ipsas ar-
 terias uel in partibus ipsas continentibus, &
 in inflammationibus consistit. Ulcerosus non
 solum ad cutem, sed ad imas quoque partes

876 DE CONSEN. MEDIC.

uelut ad ossa extenditur.

Causæ horum sunt, quia punctorius, ulcerosus & stimulanus fiunt à bilioso uel pituitoso humore salso, aut à corrupto sanguine, aut à uermibus suis aculeis pungentibus, aut à quopiam ulcere. Grauis uerò extensiuus ac pulsatorius à materia pituitosa, crassa, uel ab attrahibile grauantem & extendente, uel à flatu incluso, aut à copia alicuius materie extendentis, &c.

Loci consentientes de doloribus in genere.

De diff. doloris lege Gal. 12. meth. cap. 7. Item de elementis primo. Item in lib. de placitis Hippoc. & Platonis. Quod ad sensum pertineat, lege Gal. in lib. de constit. art. med. cap. 8. Item de inæquali intemperie cap. 3. Item 3. de sympt. diff. cap. 3. De diff. dolorum Auic. Arcul. & plerosque alios practi- cantes. De speciebus dolorum, lege Gal. 2. de loc. aff. cap. 3. 7. & 8. ubi loquitur de morbo colico.

De dolore colico.

Morbus intestini plenioris, quem Græci

colicon uocāt, nihil aliud est quā dolor satis intensus in intestinis crassis, maximēque in colo uocato, cum quo ea quæ à natura ad inferiora expelluntur, difficulter exeunt, ut sunt humores, excrementa, uermes, flatus.

Loci consentientes de dolore colico.

Gal. lib. finit. med. Colica dispositio est constitutio plenioris intestini diuturna, in qua spatijs temporis interiectis cruciatus intolerabiles, difficultates spirandi, sudores, perfrictionesque adoriuntur. Auicen. 16. Tra. 3. cap. 6, Colica est passio integra, intestinalis, dolorosa, cum qua sit difficilis exitus eius quod egreditur per naturam, &c.

De causis doloris colici.

Causæ uel per se, uel per consensum fiunt. Per se binæ sunt, altera à mala intemperie cal. frig. sicca, non autem humida, quum per se dolorem non efficiat: altera à soluta continuitate. Intemperies calida dupliciter colicam efficit, uel nimis calefaciendo, uel nimis resoluendo & feces exiccando. Frigida uel obstruendo, uel facultatem expulso-riam

imbecillem reddendo . Soluta continuitas fit ab incisione, exesione, fractione, tensione, & tunc uel ab humore acri, uel multo, uel flatu, uermibus & abscessu. Cause per cōsensum fiunt uel à uentriculo humores uel flatus aggregante, uel ab hepate, uel liene, materias ad intestina expellente, uel à renibus lapidem patientibus, uel à uesica, aut utero abscessum patiēte, aut à roto, sicuti in febribus, quum ex uenis ad intestina humores extruduntur, &c.

Loci consentientes de causis doloris colici.

Gal. 12. meth. cap. 7, Porro naturalis notitia nos docet, uitium id corporis ex quo sit doliturum aut continuitatis diuisionem esse, aut alterationem aliquam. Primum illud speculabimur, cuiusnā naturæ esse debeat, quod continuitatem soluit: necesse igitur est quod sit uel ructio, uel contusio, uel erosio, &c. Et in art. med. cap. de sig. Thorac. Dolor quencunque obsederit locum, aut continuitatis solutionem, aut subitam alterationem ostendit, soluitur cōtinuitas incisione, exesio-

ne, fractione, tensione: alteratur substantia à caliditate, frigiditate, &c. lege etiā Gal. 2. de loc. aff. cap. 5. Paul. lib. 3. cap. 47, Dolores grauissimi fiūt plures ob causas: uel enim à crasso & pituitoso humore intra uenas subsidente, uel à spiritu crassiori flatuosoque exitum non habente, aut ab intestini inflammatione, uel ab ulceribus ac mordacibus succis infestantibus, &c. Lege de his Gal. 4. de loc. aff. cap. 7. ibi, Plures sunt dispositiones, quas per uehementes motus dolor comitatur, &c. Et Auic. 16. tra. 3. cap. 8. has causas etiā enumerat, & multifacit obstructionē, ex qua fieri colicā asserit. Vide illū fusiū. Vide etiā de causis spiritus flatuosi Gal. 12. meth. cap. ult. ubi à duplici causa fieri inquit, &c.

De signis doloris colici.

Indicia incipientis colicæ sunt, quia primū minimū quid excernitur, cōsuetudōq; excernēdi uariatur, appetitus minuitur: quum uerò ad incrementum tendit, dolores crescunt, aluus siccior euadit, ita ut flatus ne quidem egredi possit. Vigiliæ sitisq; multiplicātur, & si quid excernitur, simile bubulo stercorei cer-

nitur: quū uerò ad salutē tēdit, excremēta ac flatus exire incipiunt, dolor de loco ad locum mutatur, nec adeò frequens est, sed per enemata remittitur. Si uerò ad mortem tendat, dolor est intēsiſſimus, non minuitur, non remittitur, nil excernitur, uomitus ad uomitum succedit, sudor frigidus apparet, &c. Signa distinguētia colicam à nephrit sumuntur à quantitate, à loco, à motu, ab exeuntibus, à causis præcedētibz, à quantitate: quoniam nephriticus dolor parū occupat spacium, colicus quā maximū: nam totum uentrem & stomachū obtinet. À loco, quoniam nephriticus in renibus, colicus paulò altiori loco continetur. À motu, quoniā colicus ad plures partes mouetur, nephriticus fixus ac immobilis permanet. Ab exeuntibus, quoniam in colico faeces retinentur, sed non in nephritico, uerū arenosa materia in urinis apparet. À causis præcedētibz, quia in colico deijcitur appetitus, nausea & uomitus fiunt grauiorez: sed in nephritico non ita, sed præcesit urina arenosa uel crassa. Signa interſtinguētia colicū à dolore uteri sunt, quia ad

inferiora, uelut ad pubē & coxas dolor uterī,
 sed colicus ad superiora magis tēdit: item in
 dolore uteri præceſſerūt mēſiū ſuppreſſiones,
 & ſi aluus leniatur, ac fæces educātur, nō ceſ-
 ſat: at colicus habita ſede placatur. Item in
 dolore uteri mulieres ſuffocari uidentur ex
 uaporibus eleuatis, quod colicæ non accidit,
 &c. Signa humorū colicæ ſumūtur ab ætate,
 regione, tempore, uictu præcedēte & ſimili-
 bus. Signa pituitofæ colicæ habētur, ſi uictus
 pituitā generās, ſi ſenilis uel puerilis ætas, ſi
 hyems, ſi regio frigida & humida præceſſe-
 runt, ſi ſatietas, cruditas, ocium, ſi adſit gra-
 uitas, ſi obtuſus dolor, ſi lōgioris moræ abſq;
 dubio colicā pituitoſam eſſe cōiſciēs. Caue ta-
 mē ne interdū ex ſiti & inflāmatione & u-
 rina rubea decipiari, tanquā colicā calidā
 putans, ut inquit Auic. quoniā illud cōmune
 eſt omnibus colicis. Signa flatuſæ colicæ ſunt,
 quia præceſſerunt cauſæ flatus, ſicut potus a-
 quæ frigide, holera, fructus, ructus, extenſio,
 nulla adeſt grauitas ſicut in pituitoſa. Inter-
 dum etiam inflatio manu percipitur, nec e-
 gredientibus humoribus dolor miteſcit, cō

Kl²l².i.

quod in tunicis crassus flatus retinetur. Signa colica ab inflammatione sunt, tumor, durities tēsiua, dolor cōtinuus extendens, grauis permanens ac pulsans, febris acuta, sitis, uigilia, & interdum urinæ retētio: similiter cum stercore ob abscessum uias comprimente.

Loci consentientes de signis
doloris colici.

Gal. 2. de loc. aff. cap. 5, Protinus affecto colo inflatio quædā & extēsiō, & flatus cōplures, & tormina, & excrementa flatibus plena uidebuntur, quæ stercorei bubulo simulentur: quinetiam cibi tum cupiditas, tū concoctio deterior euadit, &c. Lege Auicē. 16. tra. 3. cap. 7. ubi de signis colicæ absolutæ agit, & inuenies quæcunque à me sub breuitate enarrata sunt. Lege etiam Razē in 9. almans. cap. de doloribus uētris, & ibi etiam Arcul. Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. & 2. ponit signa interstinguentia colicum à nephritico, ibi, Primum uomitus & nausea urgent, sed grauiore, & magis assidui dolente colo, &c. Lege etiam Auic. 16. tra. 3. cap. 10. Paul.

lib.3. cap.43, Qui ex humore pituitoso laborant per totum abdomen, ac si pertunderetur colon, in alto excruciantur: adsunt tormina, ructus, nausea, uomitus potissimum pituita, aluus retinetur: praecessit continuus ciborum frigidorum crassi que succi usus, satietas, cruditas, ociu, &c. Lege Auic.16. tra. 3. cap.11. ibi, Quandoque significat colicam phlegma. antecessio causarum phlegmatis ex satietate nauseatiua, & ex speciebus ciborum, & aetas, & regio, & hora, &c. Lege Gal.12. meth. cap. ult. na multa indicia declarat, dum curam aggreditur.

De cura doloris colici.

Omnis dolor in genere cura admittit dupliciter: primo remouendo eius causam, qua ablata dolor euanescit, sed quia in ablatione cause plura requiruntur, ut sunt humorum preparatio, renulsio, resolutio, & euacuatio, quae mora ad longu tempus trahunt, idcirco alia insurgit curandi intentio, quae est doloris remotio cum anodinis ex caliditate ac humiditate temperata constantibus, ex quibus plerunque

Klxx.ij.

mala intēperies illius membri aufertur, qui-
 bus etiam non proficientibus tertia medendi
 intētio oritur, quæ dolore cū narcoticis mē-
 bra stupefaciēdo remouet, alijs præsertim nō
 iuuātibus. Si igitur inducias dederit dolor, ab
 ablatione causæ incipiemus: si minus, sed in-
 tensissimè, ægrū cruciet, cū secunda intētiōne
 procedemus, scilicet cū anodinis dolorem mi-
 tigantibus, quæ tum intrinsecus cum extrin-
 secus applicari possunt: in quorū numero lau-
 dantur enemata anodina & lenitiua, sicut
 ex decocto camomillæ, anethi, mellilori, semi-
 ne lini, fœnugraci, maluæ, althea cum uncia
 cassiæ extractæ, & tantundem zuchari cum
 oleo de semine lini, butyro, &c. Conueniunt
 etiā iura pingua cū croco, aqua decoctionis
 camomillæ, &c. Extrinsicus cōueniūt inūctio-
 nes, cataplasmata, forus, balnea, quæ parari
 possunt ex oleis camomillæ, anethi, &c. cata-
 plasmata ex rebus anodinis, &c. quæ omnia
 nisi contulerint, ad narcotica transeundum,
 inter quæ debiliior est egerthea, quæ stupefa-
 cit & resoluit, parum ualidior athanasia,
 ualentius est philonium. A' proprietate co-

ran colicam, stercus lupi, ossa mespilorum,
 castoreum, lūbrici terrestres puluerizati. Cu-
 ra colicæ pituitosæ quinque intentiones re-
 quirir: prima est uentris lenitio, secunda est
 humorum digestio, tertia est euacuatio, quar-
 ta residui resolutio ac membrorum roboratio,
 quæ intentiones non solum in pituitosa,
 sed etiam in biliosa & melancholica condu-
 cūt. Vētris igitur lenitio perficitur per lenien-
 tia, qualia sunt clysteria cum cassia, zucchero,
 hiera simpl. &c. Digestio fieri potest cum
 syr. de duabus rad. bisantino, oximelle simpl.
 & rhodomelle, modò materia sit viscosa ac
 crassa. Euacuatio perficitur cū hiera simpl.
 cum diaphinicone, &c. Et nota quòd ma-
 teria in uis ductuum existens, absque alia
 præparatione euacuari debet, iuxta duo car-
 mina à Iacobo Foroiuliensi posita, quæ
 sunt,

Synocha cum colica phrenesi squinantis &
 anthrax,

Materias crudas euacuare iubent.

Resolutio residui fit cum oleis rutæ, liliorum
 alborum, camomillæ, in quibus concocta
 Klzlx. ij.

sint cuminum, fœniculum, abrotanum, pule-
gium, anisum, &c. uel fiat cū electuarijs ca-
lidis, ut cū diamusco, electuario de baccis lau-
ri, aromatico ros. diagalāga, diacymino, &c.
Cibaria sint in colica lenientia ac roborā-
tia ob appetitus imbecillitatem, sintque cali-
diora & sicciora in frigidis doloribus, qua-
lia sunt porra & allia: sed ab initio morbi
ieiunare oportet. in sequentibus diebus ciba-
ria sint boni succi, uidentur cruditas & sa-
tietas. In doloribus à materia acri, uictus sit
humidior & frigidior, uidentur acria tam in
cibo quàm in potu, uidentur etiam in genere
omnia holera, legumina, graueolentia, &c.
Conueniunt aqua carnis, uitelli ouorum, me-
dulla panis in uino carica & passula, &c.
Cura facum siccarum perficitur cum lubri-
cantibus ac mollientibus, ut cū clysteribus ex
camomilla, anetho, althea, uiolis, fœnugræco,
cum oleo amygd. dulcium, butyro, &c. uel
cum iure galli, in quo coquantur tamarindi,
sebesten, &c. Cura inflammationis in colica
est, ut primū sanguis mittatur à uena cubi-
ti: secundò considerandum, num inflamma-

tio ad suppurationem uel ad resolutionem tendat. Si ad resolutionem, in primis repercutientia in incremento, resoluentia cum re-percussiuis & mollientibus, in statu, discutiētia cum mollientibus conueniunt. Si ad sup-purationem, tunc suppuratio adiuvanda, de-inde ad uomitum irritanda. Quæ rupta ab-stergentibus primò, & lenientibus, deinde conglutinatione indiget.

Cura flatuosa colicæ consistit tantum in resoluentibus flatum, qui si habeat materiā fouētem, frigidam, obstruētem, primò abster-gentibus lenientibusque clysterijs, deinde in-cidentibus ac attenuantibus: & de obstruen-tibus indiget, quibus peractis educatur mate-ria fouens, deinde resoluatur flatus.

Loci consentientes de cura
doloris colici.

De cura in genere lege Arcul. & Mar. Cat. De cura pituitosa colicæ lege Galen. 12. meth. cap. 8. ibi, Dolores igitur, quos humor crassus excitauit, &c. Et de cura biliosa, ibi, Sin mordēs humor sit qui affligit, &c. Et de cura ex inflammatione facta, ibi in eodem

Klxlx. iij.

loco, Si sanguinis abundantia sit, quòd distendat, uelut in phlegmone fieri solet, pro-
 tinus ubi uires aëri ualentes fuerint, sanguis
 mittendus est, &c. Et de cura flatuosa etiam
 mentionem facit, ibi, Pari ratione qui ex fla-
 tuoso spiritu, &c. Auic. 16. tra. 4. cap. 2.
 etiam curam habet ibi, Curatio uera est in-
 cisio causa, &c. Lege Paul. & Aet. fusius de
 hac re. De cibarijs loquitur Auic. 16. tra. 4.
 cap. 28, & 27. ibi, Colici indigent cibo le-
 niente & roborante ob imbecillitatem appe-
 titus, &c. Lege etiam Paul. lib. 3. ca. 43. ibi,
 In doloribus frigidis uictus sit calidior &
 siccior, & per initia morbi à cibo abstinèn-
 dum: deinde acria assumantur, ut porra &
 allia, in sequentibus sim boni succi, cōcoctu fa-
 cilia, &c. lege Aet. ser. 9 cap. 30. particula-
 rem de uictu mentionem facientem. Lege etiā
 Razen in diuisi ibi, Quū sedatur dolor, &c.

Observationes in uictu.

Auic. 16. tra. 4. cap. 1, In regimine colicæ
 interdicitur repletio, & si qua sit, per uomi-
 tum expellatur, item sitis toleretur, aut si ab-
 stinere nequeat, bibat parum, &c.

Observationes in curatione.

Marc. Cat. Oportet advertere ne differatur cura colicæ, quia est dolor intentissimus, citò uirtutem prosternens, &c.

Observationes de soluentibus pharmacis.

Auic. loc. cit. Cauendum ne in principio pharmacum ualde solutiuum exhibeatur: nã humores & schibala sunt plures, & fortè penetrare non possunt, sed incipiendū à lenientibus ac lubricantibus, &c. 2. In tribus casibus medicamenta ualde soluentia exhiberi debent. Primus, si materia antecedens in cōiunctam causam transeat, ut si à uenis ad intestina. Secundus, si humores adeò crassi existant, qui nec clysteris, uel leui pharmaco educi possint. Tertius, si usque adeò uehementis sit obstructio, ut nullo pacto per prædicta aperiri possit: item nullo modo hieræ addatur agaricus, nam facit eam retineri & profundari, &c.

Observationes in clysteribus.

Auic. loc. cit. Debemus esse contenti de clysteribus, quoniam à longinquis partibus non

attrahunt, nec humores commouent, nec febrē excitant, sicut pharmaca solutiva: præterea clysteres absque nocumento reiterari possunt. 2. Si clysteres acuti non solvunt, supersedendū donec concocta sit materia: quādoque enim hepatis, cordi & capiti sua acredine nocent. 3. Non fiant clysteres, si quid crudi fuerit in uentriculo, ne ad inferiora trahatur: & hoc aduerte propter eos, qui in omni colica & in omnibus horis enemata imponi iubent. Mar. Cat. Si in intestinis causetur excoriatio, non debemus fortia & acuta clysteria administrare: sed loco eorum lauatiua, & dolorem sedantia. 2. Quod ager se taliter debet situare, ut clysteria declinent ad locum doloris. 3. Quod reiteranda sunt pluries. 4. Quod suppositoria debent esse longa ad mensuram septē digitorum, ut uirtus eorum possit longius communicari, &c.

Obseruationes de narcoticis.

Mar. Catin. Non debemus narcotica à principio approximare, sed quando alia non sufficiunt: quia ex his materia infrigidatur ac incrassatur, si fuerit frigida, si oppilatiua,

magis oppilabitur: si uētositas, magis incras-
sabitur. Hoc idem sensit Gal. 12. meth. cap.
8. ibi, Cauendus est magnopere in affectibus
qui à crassis & glutinosis humoribus fiunt,
&c. Item dixit quod extrinsecus hæc adhi-
bētur, & si intrinsecus præbeantur, sint bene
rectificata, &c.

Observationes de balneis
& fomentis.

Auic. 16. tra. 4. cap 1, Cauēdum ne caput
vapores balneorum & fomentationum susci-
piat, & hoc cū frigidis applicitis. Mar. Cat.
Non debemus uti fortibus calefactiuis, neque
fortibus resoluētibus, ubi stet repletio ma-
terierum: nam augent dolorem, & materias
crassas subtiliant, & in uentositatem conuer-
tunt, nec competit remedium de allio à Gal.
7. meth. cap. 15. descriptum, nisi sit minora-
ta materia.

Nocentia & conferentia do-
lori colico.

Inducunt colicam aqua aluminosa, capita
animalium, caseus, usus citri, citonia pōrica,
cucurbita, faba, fungi, granatū syluestre, lac

892 DE CONSEN. MEDIC.

omne, melones, menta, hordeum, pyra, tubera,
 &c. Conferunt ad colicam amygdalæ ama-
 ræ & dulces, apium, betonica, calamentum,
 chamaleonta, cartamus, cataposia, castia, fi-
 stula, centaurea, colocynthis, enula, esula, eu-
 phorbium, galāga, galerita, aus carduelis,
 gith, ius galli decrepiti, hyosciam⁹, laurus, li-
 macia, matricaria, myrobalani, chebuli, na-
 sturtiū, oximū, cyclamē, polypodiū, radix pi-
 peris, ruta, sagapenum, sisamus, stercus canis,
 capræ, colūbi, lupi, porci, urtica, aqua mellis
 ferrea, diaphinicon, electuarium de baccis
 lauri, diaprasiun Nic. diacitoniten laxa-
 rium, diaciminum, electuarium indum, ele-
 scoph, phylonium Rom. oleum de cartha-
 mo, laurinum, rutaceum, de piperibus, nardi-
 num, liliorum, pilulæ iliacæ almans. foetide
 maiores Mes. sagenea Auic. theodoricon ma-
 gnum Auic. theriaca magna, troc. de uiolis,
 troc. de epithimo.

De prognosticis doloris colicis.

Hippoc. prognost. 2. cap. 13, Dolores qui
 cum febre affligunt circa lumbos & inferas
 sedes, si præcordia attigerint, inferas sedes

relinquētes, exitiales admodum sunt: sed consideranda sunt alia signa: nam si quod horū prauum fuerit, desperandus est aeger. B. Intellige de his quæ symptomaticè mouentur ab una parte ad aliam. Hippoc. aphor. 2. apho. 6, Quicumque dolentes parte aliqua corporis dolorem non sentiunt, ijs mens ægrotat. B. Id est, quicumque dolet, & doloris qualitatem non sentit, hic sensu ægrotat: nō refert si sensum uel *ψῶμῶ*, uel animā dixeris. Et apho. 6. aphor. 7, Dolores uentris sublimes, leuiiores: qui uerò non sublimes, fortiores. B. Nota non secundum corporis longitudinem intelligi Hippoc. sed secundum profunditatem, id est, non secundum infimam & supremam corporis partem, sed secundum exteriorē & interiorē, &c. Et aphor. 6. apho. 40, Quibus dolor circa præcordia fit absque inflammatione, ijs febris superueniens morbum soluit. Et aphor. 7. aphor. 26, Inforti dolore uētris partium extremarum frigiditas, malum. B. Frigiditas fit uel ab inflammatione, uel ob caloris innati defectū (deficit calor, uel quia extinguitur, uel quia à multitudine suffoca-

eur)uel ob dolorem uehementem medias corporis partes occupantem, ad quẽ natura contracta cum sanguine partes extremas tanquam exangues relinquit. Et aphor. 7. apho. 22, A uentris dolore diuturno suppuratio. Et aphor. 4. aphor. 11, Quibus tormina & circa umbilicum labores & lumborum dolor, qui neque medicamento, neque aliter soluitur, in aquã intercutem siccam firmatur siue ἰσχυρῆται. Gal. 12. meth. cap. ult. Colica quæ à siccitate contingit, insanabilis est: cuius rationem postea ipse reddit: lege eum. Auic. 16. tra. 3. cap. 8. & 9, Si colica erit incolumis retentio, non erit uehemens, & dolor mutabitur, & patiens ex administratione clysteriorum ob exitum flatus & excrementi quietem inueniet. Si uerò fuerit mortalis, aderunt fortitudo doloris, uomitus, ad uomitum, sudor frigidus, extremitatum frigus, rationis turbatio, spasmus & retentio excrementorum: & si uestigium nigrum, uel bothor apparuerint, postmodum moriuntur, &c.

De ileos.

Ileos, quem Latini uoluulum uocant, est re-

nuium intestinorum dolor uehementissimus, cum quo excrementorum per secessum difficilis fit exitus, &c.

Loci consentientes de ileos.

Gal. aph. 6. com. 44, Ileos est intestinorū tenuium passio, in qua ob interclusam inferiorem uiam nulla excrementa inferius excernuntur. Aet. ser. 9, Voluulus est intestinorum affectio lethalem dolorē inferens. Gal. 6. de loc. aff. cap. 1, Hunc ileon, id est, uoluulū uocant, nonnulli etiam chordapson, quum scilicet tumor aliquis eminet in tenuiū intestinorum parte, ut uideatur intestinū chordarū similitudine conuolutum. B. Chordapson ab Aet. exponitur intestinorum emollitio, quae fieri dicitur, quoties admota manu durities tactui succumbit: sed quoniam emollitio, si durities adsit, intelligere nequeo, Galeni expositio mihi magis placet. Vocatur etiam hic morbus à Celso chordios.

De causa ileos.

Causa ileos est intestinorū uel obstructio, uel retētricis facultatis fortitudo & attractiōis, uel potio frigida, uel intestinorū descēsus in

scrotum. Obstructio deinde fit uel ab inflā-
matione, uel à tumore duro, uel ab alio quo-
piam abscessu, uel ab excrementis siccis, uel
ab alia intestinorum compressione facta,
aut à ueneni cuiuspiam portione, &c.

Loci consentientes de caufis
ileos.

Gal. apho. 6. comment. 44. Visum est an-
tiquioribus medicis, uel ab inflationibus, uel
ab aridi stercoris obstructione huiusmodi
tenuium intestinorum affectus oriri. Iridem
ait 6. de loc. aff. cap. 1, Vide etiā Gal. 6. de
sympt. cau. ca. 2. ibi, Fit etiam ab humoribus
præter naturam adeò intestina obstipanti-
bus, &c. Paul. lib. 3. cap. 44. & Aet. ser. 9.
cap. 28, Fieri uoluuulum dicunt intestinis unā
cum stercore in scrotum descendentibus: item
ex plagis quibusdam, ex frigore uehementi,
& ex acruata frigida portione. Auic. 16. tr.
4. cap. 29, Et quandoque accidit propter
portionem uenenorum facientium ileos. Inter-
dum fit ex fortitudine uirtutis retentricis,
nam gracilia intestina ob suam gracilitatem
magis ad retinēdū sunt parata, quā crassa.

Vide Gal. 6. de sympto. cau. cap. 2. ibi, Quē-
admodum stercus per lethales uoluulos, &c.
Et Auic. loc. cit. uult quēdā ileos ab hisdeme
causis fiat, ac dictum est in colica. Haly Ab-
bas lib. 9. cap. de col. enumerat primū ap-
stema calidum, obstructionem ex fimo sicco
uel ex humore crasso, rupturam abdominis,
priuationem ciborum, & potum lethiferi me-
dicamenti, &c.

De signis ilei.

Signa ilei sunt dolor supra umbilicum, ni-
hil ex fecibus ad inferiora descēdit: Vomitus
interdum fecum, humorum & uermium: ru-
ctus inanes, fœtor oris & totius corporis, se-
quuntur etiam mala symptomata, qualis est
tremor cordis, uigilia, animi defectus, frigus
extremarum partium, sudor frigidus, urinæ
difficultas. Signa ueneni sunt imbecillitas ui-
rium, mollificatio & tremor cordis, nec ab
alia causa ista fiunt. Signa inflammationis
sunt dolor, durities fecis, tumor, febris, &c.
Signa interstinguentia ileum à colica sunt. 1.
dolor uehementior quàm in colica. 2. locus
ilei supremam umbilici partem occupat, co-
ll. i.

lica infimam. 3. ileus magis tendit ad uomitum quàm colica, quum sit stomacho propinquior. 4. ileus non iuuatur à clysteribus & suppositorijs, sicuti colica. 5. In ileo maiora sunt & grauiora symptomata, quàm in colica, sicuti syncopis, tristitia, &c.

Loci consentientes de
signis ilei.

Galen. aph. 7. cō. 10, Primum nihil in ileis ad inferiora descendit, & hoc est proprium & inseparabile indicium: uomitus non semper adest, nisi quando exitiales sunt, si uehementius distorqueatur, ascendit eis stercus & singultiunt, quidam desipiunt & conuelluntur compatiēte neruorum principio passioni uentriculi. Et 6. de loc. aff. ca. 1, Dolores uehemētissimi in sublimioribus intestinorū partibus eueniunt grauitur uomitionibus cruciantes, &c. Aet. ser. 9. c. 28, In principio adest dolor circunvolutus, uētriculi humiditas multa, exolutio, ructus inanes & nihil alleuantes, murmura intestinorum, stercoris & flatus perfecta cohibitio: in uigore morbi, omnia sursum feruntur, adest uomitus bilis & pi-

tuita, totius corporis frigiditas, spirandi difficultas, &c. De signis distinguendis inter colicam & ileum lege Auic. 16. tra. 4. cap. 30. ibi, Amplius signa distinctionum colicæ cum signis ileos sumuntur, &c. Lege etiam de signis apostematum, ibi, Et factum ex apostemate, &c. Et nota hic in Auic. quod dicit, Et illic febris non erit, & tamen Gal. aphor. 6. comment. 44. inquit, Quāto maior ac grauior euadit, tanto maiorem febrem effici cōtingit, &c.

De curatione ileos.

Cura perficitur, ut dictum est, in colica per quatuor intentiones. Prima, cum regimine uitæ. 2. cum eius causæ ablatione. 3. cum euacuatione. 4. cum resolutione & roboratione. Victus igitur sit tenuior quā qui dictus est in colica, si que boni succi, &c. Ablatio causæ ita erit, ut si uenenum sit, danda erit opera ut uomitus prouocetur propinato calente oleo, uel aliquo iure pingui, demum theriaca exhibeatur, uel quidpiā aliud, prout species ueneni magis requirit. Si uerò in causa fuerit obstructio, procedatur tunc cum

Lll. ij.

diffecantibus ac attenuantibus pharmacis, deinde purgante pharmaco aluus solvatur. Si fuerit inflammatio, eadem erit cura ac dictum est in colica. Si causa sit descensus intestinorum in scrotum, tunc intestina ad suum locum compellantur, & resupinato patiente fascia constringatur. Interim sectione uenae opus est, tum ob uenarum meseraicarum copiam, tum ob uehementissimum dolorem: cætera fiant ac dictum est supra.

Loci consentientes de cura ilei.

De prima intentione loquitur Aet. ser. 9. cap. 28. ibi, Cibi sint boni succi, &c. De secunda intentione loquitur Paul. lib. 3. cap. 44. ibi, Qui ueneni causa ileon patiuntur, compellendi sunt ut aquæ calidæ potu euomant, deinde oleo calente propinato, uel iure aliquo pingui, deinde interpositis aliquibus diebus theriaca exhibeatur. Quod si obstructio discutiatur purgante aliquo pharmaco, aluum inanire confert. Si ex intestini in scrotum descensu ileus accidat, in inguina intestinum compelletur, & fascia supinato patiente ligabitur. Auic. 16. tract. 4. cap. 31.

tria notat, primùm q̄ ileos est colica fortior, idcirco in cura properandum, iuxta illud Hipp. Extremis morbis extrema sunt opportuna remedia. 2. quòd id quod bibitur, magis iuuat in ileo, quàm in colica: nec multùm referre, an à bibitis uel à suppositis inchoetur. 3. quòd in ileo magis sectio uenæ conuenit quàm in colica, &c.

Nocentia ac conferentia ileo.

Inducunt ileon argentum uiuum & caro porcina. Cōferunt ileo absinthiū, acorus, agaricus, allium, betonica, chamædrys, chamæpitys, camomilla, centaurea, cyperus, eupatorium, pastinaca, ruta, sauiba, stechas, turbit. Composita sunt, ung. alabastri, aragon, aureum ung. Nic. ung. laxatiuum Nic. marciaton Nic. oleum lily bibitū, oleum de cherua, confectio phar. Auic. i. lib. 5. confectio Hermetis Auic. diacironiten Nic. electuarium ducis Nic. phylonium catarcticum imperiale Nic. stomaticum calidam Nic. theriaca magna, pilulæ sine quibus & fætida, &c.

Lll. iij.

De prognosticis ilei.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 44, Quibus ex stillicidio urinæ ileos superuenerit, in septem diebus pereunt, nisi febre superueniente satis urina fluxerit. B. Quoniam adulterinum ac spurium uocauit aphor. Gal idcirco damnatur ab Auic. eo quòd causam aphor. ignoraret, quasi id non legerit Auic. quod in fine cōmenti inquit Gal. quòd scilicet si ueritatē debet habere aphor. oportet multitudinem humorum crudorum unā cum multa frigiditate causam arbutari, quam febris superueniens liquefaciat ac dissoluat, & per uiam urinæ dissolutam natura emitat, &c. Et aphor. 7. aphor. 10, Ab ileo uomitus, singultus, desipientia uel conuulsio, malum. B. Quia intestina cogūtur tandem ex se cū molestia contra naturam uidentis materiā molestantem extrudere, unde singultus, uomitus, &c. proueniunt. Aet. ser. 9. ca. 28, Familiaris ileos est puerulis, sed naturalis beneficio humiditatis euadunt: senibus uerò si accidit, nunquā conualescunt, in chordopso uocato subitum instat periculum, ut plerunque 3. uel 4. horā

non excedat. In inflammatione uerò si sup-
puratio uel longa mora contingat, periculo
non uacat, quanquam sint ex eis qui seruati
sint. Auic. 16. cap. 29, Et deterior ileos est, in
quo expellitur per superiora stercus, deinde
in quo est sudor fœtidus habens fœtorem ster-
coris: deinde in quo est anhelitus fœtidus &
eructatio fœtida, &c.

Authores dissentientes circa
ileon & colicam.

- 1 Adserere, in colicæ principio conuenire
narcotica.
- 2 Adserere, theriacam nouam esse ueneno-
sam, & non esse exhibendam.
- 3 Adserere, cum Auic. ileon posse generari
ex stranguria.
- 4 Adserere, ileon curari non posse per flu-
xum urinæ, mediante febre.

Confutatio dissentientium circa
colicam & ileon.

Ad primum respondet Conciliator diffe-
rētia 204. per plures differētiās. Prima, su-
mitur à morbo uel ab accidēte, uel à uirium
robore: unde nisi symptoma superet morbum

Lll.iiij.

stante uirium robore, quòd nullo modo conueniunt. 2. diff. sumitur à causa morbi, uel à complexione morbi: unde permanēte uirium robore, & causa existēte frigida cum dolore remisso, non conueniunt narcotica, sed adhibenda sunt anodina: uerū si symptoma esset uehementissimum, & causa esset calida, ubi esset timor de casu uirtutis, tunc posset, sed magna cum cautela, exhiberi.

Ad secundum, Gal. 5. meth. cap. 13, Mulieri cū dormitura esset dedi theriacam quatuor menses antè confectam: habet enim id ætatis adhuc prævalentem papaueris succū, qui in antiquatis ignauus redditur: igitur nō est uenenosa, & potest exhiberi.

Ad 3. Gal. aphor. 6. comment. 44, Aiunt enim quòd uestica inflammata angustia loci facta ex compressione in intestinis passionem affert, quæ ileos nominatur. Ego uerò multos me puto in tota uidisse uita, nonnullos tantū periclitantes, non paucos etiam mortuos, non potētes mingere, quorū nullus factus est ileosus: & sic tenet quòd ileos non generetur ex stranguria.

Ad quarium respondetur per id quod dictum est ex Gal. in eodem aphor. supra contra Auic. ibi, Multitudinem humorum, &c.

De renum & vesicæ calculo.

Morbus calculosus, qui à Græcis λιθίασις dicitur, est lapidis generatio ex humoribus uiscidis & immenso calore orta, in qua urinæ excretio retinetur. Id tamen notum est, quod plerique medici attestati sunt, quòd nò solum in uesica & renibus, sed & in colo, pulmone, fellis folliculo, iuncturis, stomacho & inguinibus lapides oriantur: unde lapides inter se differunt magnitudine, duritie, asperitate, colore, numero, loco & materia agente, de quibus satis copiosè infra mentionem faciemus.

Loci consentientes de renum & vesicæ calculo.

Galen. lib. finit. Med. Lithiasis, id est, calcularis morbus, est calculi generatio in renibus & uesica, ex qua urinæ excretio prohibetur. Quòd calculi in partibus enumeratis gignentur, lege Gal. 6. de loc. cap. 1. ibi, Nonnulli à forti excernendi conatu, &c. Et 4. de

loc. aff. cap. ult. ibi, Quidam diuturna tussi
 uexatus frustum quoddam paruo grandinis
 grano, &c. Deinde se uidisse lapidem in fellis
 folliculo attestatur Gentilis, & in iuncturis
 & stomacho quidā Gilbertus, & in ingui-
 nibus Arcul. Aet. ser. 2. cap. 4, Consistunt la-
 pides in renibus iuxta ipsorum uentriculos
 aut parui aut maiores, interdū plures & pau-
 ciores, magnitudine, forma, colore, asperitate,
 & multitudine inter se differentes, &c.

De causis renum & vesicæ calculorum.

Causæ initiatrices sunt cibus potusque
 crassus ac uiscidus: causæ coniunctæ sunt bi-
 na, quarum altera erit materialis, altera ef-
 ficiens. Materialis à crasso terreoque humore
 conficitur. Efficiens est ignea renum aut ue-
 sicæ caliditas, quæ tum naturalis, tum adue-
 ritia esse potest, ut quæ ab aliqua re calida
 renibus adnata proueniat. Causæ uerò hu-
 mores in renibus tardantes erunt, uel expul-
 tricis imbecillitas, uel obstructio, quæ tum at-
 tenuatoria à superflua ac uiscosa materia,

tum carnosā ab aliqua carne innata uel ab apostemate prouenit, &c.

Loci de causis renum & uentriculorum calculorum.

Gal. 2. de natura humana, tex. 13, Plerique pueri qui plurimum uoraces sunt, humorem non modicum aggregant, quem crudum propriè uocamus, qui calculo gignendo in primis opportunus est, accedente calore, tanquā causa effectrice. Itidem asserit 3. aphor. commēt. 26. ibi, Lapis est propria passio puerorum, qui ob edacitatem non paucos humores crudos coaceruant, &c. Auic. 18. cap. 16. tres causas calculi assignat, materiā scilicet quæ est humiditas uiscosa & crassa, uirtutem agentem, sicut est caliditas ab æqualitate egressa, & materiæ retentorem, qui est expultricis imbecillitas, quæ ab intemperie uel ab inflammatione & ulceribus oritur, &c.

Gal. 14. meth. cap. 4, Similiter & calculi generantur in renibus, asso scilicet in his crasso glutinosoque succo: prouenit enim hæc affectio ex ciborum crassorum succo, si quis liberalius his utatur, &c.

Obiectio.

*Quur non omnibus hoc uitium contingit,
quum utraque causa sit omnibus parata?*

Responsio.

*Dilucidatur hæc tua dubitatio à Gal. 14.
meth. cap. 16. ibi, Siquidem credendū est qui-
busdā esse dēfos admodum renes, uel per an-
gusta in iocinore ora, &c. lege eum, & rem
intelliges, &c.*

De signis renum & vesicæ
calculorum.

*Signa generationis calculi sunt urina exiēs
pura & aquosa, in qua non excernuntur a-
renosa iam prius uisa, sed retinentur. Signa
iam generati lapidis sunt dolor, grauitas, u-
rina suppressio, maximè si in utrisque reni-
bus lapis extiterit.*

*Signa motus lapidis sunt dolor uehemens
usque ad inguina communicans ad scrotū &
testes. Vehemēs inquam ob loci angustiam &
sensibilitatem, sed quum iam in uesica lapis
fuerit, dolor mitigatur & tandem mingitur.
Signa lapidis in uesica sunt pruritus puden-
di, ex cuius cōtractione penis intenditur, uri-*

na supprimitur, nec nisi magna cum difficultate & conamine emittitur. Sunt qui duos longiores digitos ano intromittant eleuatis prius sursum uersus cruribus, & aluo ab excrementis purgata, ut lapidem manifestè adesse sentiant. Arena insuper quæ subsidet, si rubra uel flaua fuerit, è renibus descendit: si alba & cineritia, ex uesica. Egreditur autem arena, dum confirmari & dissolui lapidem contingit: quo confirmato, & obstructione completa, nō amplius arena exit, &c. Item lapis renum est rotundus, uesica est oblongus, &c.

Loci consentientes de signis calculorum.

De his signis lege Auicē. 18. tra. 2. ca. 17, Signorum lapidis in renibus primum est urina crassa, quæ deinde incipit cōueri ad tenuitatem propter retentionem turbidi, &c. lege locum fusius. Gal. 1. de loc. aff. ca. 1, Indicia lapidis in uesica sunt aquæ similis urina, in qua subsident sabulosa quædam, laborantes assidue pudendum scalpunt, idque uel laxum uel intetum præter modum, postea de repente urina supprimitur. Vide Galen. 6. de

locis affectus, ca. 1. ibi, Nephritici dolores eodem in loco stabiles permanent, &c. Lege fusius. Aetius sermone 2. cap. 4. ibi, Adest loci dolor absque tumore foris apparente, & plura de signis annotatu digna inuenies. Lege etiam Arcul. 9. alm. plura enarrantem. Item Galen. 6. de locis affectus, cap. 1. ubi Hippocratem damnat in illo aphorismo, Quibus in urinis arenosa subsistunt, ijs uesica laborat calculo. Vide insuper Alex. Tra. lib. 3. cap. 34. Item Gord. & alios.

De cura calculorū renum & vesicæ.

Corpora quæ parata sunt ad calculum præseruatiuam curationem expostulant, at quæ actu egrotant, curatiua indigent. Præseruatio igitur has in se intentiones requirit: prima, ut materia quæ lapidē generat, nullo pacto efficiatur: secunda, ut si quæ facta sit, ne ad renes uel uesicam fluat, sed ad intestina mittatur, hoc efficit: tertia, ut si quid ex hac materia ad renes casu euenerit, ne illic figi ac retineri permittit: quarta, calorem renum qui est causa efficiens, remissiorefficit. Prima igitur inuentio prohibet

omnia crassa & uiscosa tam in cibo quàm in potu, unde panes azymi, caseus, & animalium extremitates, & lacticia procul absint, similiter uitentur satietates & cruditates, sed attenuatoria sit diæta, urinam ciens, uitentur etiam dulcia, &c. Secunda, qua ex renibus ad intestina materiam diducimus, cõpletur per pharmaca leniẽtia, scilicet cum cassia uel decocto glycyrrhizæ, semine alchēchengi, uel per enœmata lubricantia uctrem, uel per terebinthum assumprum: nam ualde iuuat. Tertia non permittit figi materiam in renibus, sed eam expellit cum diureticis, ut cū brodio cicerum rubrorũ, cum decocto glycyrrhizæ, in iure galli decrepiti, cum paritaria in sero lactis decocta, uel cum eius succo, &c. Quarta remouet, ac calorem intensum mitigat cum oleo uiolaceo, nenupharino, amygdalino, dulci, uitando ea quæ euidenter adstringunt, &c. Curatiua uerò ratio concretũ in uesica uel renibus lapidẽ auferre intẽdit, primò lubricando uias cū cassia, & minuendo materiam per ea quæ frangũt lapidẽ, & urinã prouocant & ora uenarũ referunt, facta in primis se

912 DE CONSEN. MEDIC.

Etione uen.e, si sanguinis multitudo ob acutos dolores ad partem laesam se cōtulerit. Comminuunt igitur lapidem quēdā à proprietate occulta, quēdam uerò à manifesta qualitate. Quæ igitur hoc à manifesta qualitate efficiunt, sunt pulegium, calamentum, origanum, saxifragia, radix graminis, amygdal. amar. Item radices petroselini, asparagi, brusci, fœniculi, apij, decoctum cicerum rub. rcort. fabarum & rad. maluarum, &c. Frangunt à proprietate occulta lapis Iudaicus, puluis leporis combusti, uitrum multoties in aqua saxifragiæ extinctum, puluis lapidum cancrorum, limatiarum & mandibularum lucij piscis, Item sanguis hircinus, cortex lauri, & inter composita laudatur Iustinianum litōtriphon dialacca, &c. Competunt etiam clysteres ex decocto maluarum, parietariæ, camomillæ, mellilori, fœnugraci cum butyro, oleo scorpionum, benedicta, cassia, zucharo, uel cum oleo amygdalarum dulcium. Extrinsecus conueniunt omnia mollientia, qualia sunt unguenta ex oleo amygdalino dulci, pinguedine gallinæ, butyro, oleo de scorpionibus, &c.

Similiter & brodia pingua exhibeantur,
 &c. Ad roborationem stomachi, qui plerun-
 que imbecillitatem in hoc morbo suscipit, ista
 conferunt, scilicet oleū de absinthio, de menta
 unguentū, de absinthio, &c. Si qua uerò opus
 fuerit digestionem, perficietur cum oxymelle
 simpl. uel composito, cum aquis saxifragiæ,
 parietariæ, granorum iuniperi, &c. Quod
 si delatus ex renibus lapis circa collum ue-
 sicæ detineatur, tunc supinatus æger, eleua-
 tisque sursum coxis, adeò concutiatur, donec
 ex ipso meatu lapis excidat, deinde si minus
 per urinā exierit, tunc per cautherem instru-
 mentum, uel per ea quæ calculos cōfringunt,
 amoueat: quod si minus per hanc curatio
 ad uota successerit, tunc per incisionem in-
 ter anū & testes in uesicæ collofactum adun-
 co ferro euelletur lapis.

Locī de cura calculorum renum & uesicæ.

De primis intentionibus lege Auic. 18. trac.
 2. cap. 18, ibi, Intentiones in curatione sunt
 abscissio materie & prohibitio generationis
 Mmm. i.

ipsius, cum abscissione causæ & rectificatio
 eius, deinde mundificatio & comminutio, &
 fractio, & compressio, & eradicatio eius, quæ
 omnia lōgo satis sermone explicat. De uictus
 ratione lege Aet. ser. 11. ca. 6. ibi, Deligant cū
 bos, è quibus neque satietates, neque crudita-
 res cōtingunt, &c. Gal. 10. de comp. med. per
 loc. cap 1. Quæ calculosis auxiliant unica fa-
 cultate indigent, quæ siccare & extergere cū
 manifesta caliditate possunt: sunt autem ta-
 lia ferè omnia amara, &c. Paul. lib. 3. cap.
 45, Medicamentis uti oportet, quæ confrin-
 gere siue siccare calculos possunt absque ma-
 nifesta caliditate: sic enim Gracè habet,
 αὐτὸν δὲ πεπραγμένον ὅτι φανῶς. Vnde uereor
 ne menda sit in Paulo, nam quæcūque ab eo
 in hoc affectu recitantur, sunt manifestè ca-
 lida, sicut & in Gal. qui utitur pipere, myr-
 rha, aniso, dauco, apio, &c. Aet. ser. 11. cap.
 5, Si timor adsit, ne multitudo sanguinis ob-
 acutos dolores materias ad affectam partem
 aduocet, secunda est uena cubiti à latere af-
 fecto, nec copia extrahenda, quum ex hoc fu-
 turum non sit, ut à renibus lapis excidat, &c.

Gal. I. de loc. aff. ca. I, Itaque supinato agro
ut crura reliquo corpore sint sublimiora, mul-
tifaria ipsum concuries, ut lapis ex meatu re-
cedat, deinde iube ut ager urinā reddere tē-
ret: quod si urina supprimitur, rursus uehemē-
tius cōcute, & si sic permāserit, demissa fistu-
la anea lapidē à cervice uesticæ repelles, &c.

Generantia ac curantia calculos.

Inducunt ac efficiunt lapidem, amyllum,
caseus, camphora, candrus, farina cum la-
cte, lac coctum, lagana, porcina carnes, tri-
ticum coctum. Curant lapidem radix aceto-
sa, acorus, amygdala amara, anisum, urina
porci, apium montanum, abrotanum, aqua
mellis & cicerum rubrorū, batheca, cap. Ven.
beronica, chamaleonta, cancer fluuiialis cum
myrrha, cardui agrestæ, cinis radicis caulis,
cicada, ciminū, cinis testarum, cochlearum, cy-
perus, condisi, cordumeni, cotula, cubebe, dau-
cus, sion, id est, cresconi, fœniculum syl-
uestre, lac ficus, genista, gumæ cerasorum,
prunorum cum uino, graminis semen & ra-
dix, lapatiū, lauri cortex & radix, renes le-
poris, lūbrici terreni, malua matricaria, semē

Mmm. ij.

mellonum, millepeda, stercus muris cum aqua
 mellis, nigella, polium montanum, porri se-
 men, succus raphani, rubus, saxifragia, sa-
 uina, senation, segapenum, serpillum, scolo-
 pendria, cinis scorpionum, scenoanthos, fi-
 mus turturis & ius, tribulus, uitis aqua ca-
 dens, uitrum ustum tritum, succus urticae,
 iringi, usnea, hypericon, agaricus. Compo-
 sita sunt, Adrianum confectio Nic. antido-
 rum hemagogum, Camerina confectio Ha-
 ly, confectio conabaris Auicen. i. semen, dia-
 lacca magna Mesu. diasulphur Mes. diapi-
 retrum Nic. diaprasiun Nic. electuarium Du-
 cis Nic. electuarium cabadij Haly, phylonium
 Rom. iustirium confectio Nic. Imperialis con-
 fectio Auicen. i. semen litotriphon Nic. miliu
 solis cum myritho syluestri, Nephrocatacti-
 cum Nic. oleum benedictum Nic. oleu de gra-
 nis citri, oleum de cerasis Mes. de piperibus,
 de scorpionibus, oleum alchechengi, de sa-
 uina, petroleum, syr. maior Nic. Theodori-
 cum magnum, theriaca magna, unguemula-
 xatuum Nic. Zeneliten cofectio Auicen. Re-
 seruant a generatione lapidis aqua mellis, cas

sia syringa, genista, grana pini maioris comesta.

De prognosticis calculorum renum & vesicæ.

Auic. 18. tra. 2. cap. 16, In illo in quo est sedimen arenosum non aggregatur lapis, quoniam materia non est coarctata. Et scias quod parum accidit puellis & mulieribus, quoniam meatas vesicæ earum ad exteriora breuior ac latior est & paucorum anfractuum, &c. Et scias quod lapis renum & vesicæ est ex ijs quæ hereditantur, &c. B. Quod dicit, mulieribus non accidere lapidem, mihi non placet: nam sua ratio potius ad facilem expulsionem, quam ad lapidis generationem pertinet: sed forte ratio potior est, quia mulieres calorem non usque adeo uehementem habent, ut materia in lapidem uerti possit, uel quia ex menstruis omnia superflua expurgantur, &c. Hippoc. aphor. 6. aphorif. 6, Renum & vesicæ uitia in senioribus difficulter sanantur. B. Quia in motu semper sunt, dum contrahuntur & dilatantur, uel quia in senibus ob calorem innatum imbecillem, nec alia ægrotudines longum.

Mmm. iij.

gè curantur, &c.

Authores dissentientes circa calculum.

- 1 Adserere, calculum generari posse à calido temperato.
- 2 Adserere, calculosis dormire super dorsum ualde nocere.
- 3 Adserere, lapidem renum curari posse per incisionem.
- 4 Adserere, diuretica in principio calculi conuenire, nulla facta euacuatione.

Confutatio.

Primum impugnat Gal. aphor. 3. cōment. 26. dicens, quòd materia crassa, cui uehementia caliditatis accedit, est causa generationis lapidum, & Auic. inquit, Virtus uerò augens est caliditas quum egressa est ab æqualitate, ubi inquit Gentilis, non nisi ab excellenti caliditate lapidem posse generari.

Ad secundum Auic. 18. cap. 16, Et dormire super dorsum est ex eis quæ lapidi conferunt: nam ad resolutionē materiæ confert: & sic nō semper nocet, imò plerunque iuuat, &c.

Ad tertium Auic. loc. cit. Et sunt quidam

qui laborant extrahere ipsum per incisionem
 ilij & dorsum, sed est tumor magnus in eo
 qui rationem non habet, quoniam oportet
 penetrare per musculos, per dorsum, per ossa
 magna, per nervos & arterias, & uenas ma-
 gnas, in quo casu accidit syncopis, & mors,
 & sic cura est potius impossibilis, quàm fie-
 ri posse putetur.

Ad quartum respondet Conciliator diff.
 205. quòd diuretica non còueniunt in corpo-
 re cacochoymo uel pletorico, nisi facta eua-
 cuatione & digestionem. Item nec conueniunt
 in ulcere recèti, nec ubi fuerit obstructio, nam
 ut ipsa calida resoluunt ac putrificant. Præ-
 terea in ardore urinæ non sunt adhibenda,
 eò quòd ad locum læsum materias ducunt, &
 plus ad mingendum stimulant, ex quo dolor
 augetur, &c.

De inflāmate, abscessu & vl- ceratione renum.

Dictum est sæpius, quid inflāmatio, quidue
 abscessus & ulceratio, quare non est ut ro-
 ties à nobis repetatur. Continet in se omnes
 hos affectus nomen nephritis iuxta Gal. 10.

Mmm.iiij.

de cōpos.med. per loc.cap.1, Vnde Nephritis lib.fin.med. ita describitur, Nephritis est renū phlegmone cū dolore uehementi, interdū cum meiendi difficultate, ac fibrosis uel arenosis excrementis cum modico sanguine, &c. Variant deinde abscessus tum ab efficiēte materia, tum ex parte locorum, pro quibus uide Auicem. 18. cap.1.

De causis horum affectuum.

• Causa inflammationum renum extrinsecæ sunt, equitationes, percussiones, attritiones, plagæ, pharmacorum potiones, &c. Causa intrinsecæ sunt uel repletio totius corporis uel membrorum consentientium, uel sanguinis mala qualitas, uel excoariatio lapidis, uel urinae retentio renes extendens: causa coniuncta est sanguinis calidi influxus. Causæ aliorum abscessuū sunt aliorum humorum influxus, uel multitudo uaporosorum spirituum. Causæ ulcerum sunt quæcūque sunt causæ solutionis continui, sicuti apostema disruptum, uel humores erodentes, biliosi, acres, uel lapis egrediens, & quicquid scindere uel aperire uel erodere has partes potest, &c.

Loci consentientes de causis horum affectuum.

Aet. ser. 2. cap. 16, Renum inflammationes non solum humores corrupti, sed & plaga, & pharmacorum potiones, & attritiones, & praesertim continuæ, aquilonares. Auic. 18. cap. 1, Causæ apostematis renū sunt repletio in toto corpore, aut in membris communicantibus, aut qualitas & quantitas sanguinis, aut excoriatio lapidis, aut retentio urinæ apud renes extendens. Gal. aphor. 4. cōment. 75, Fit magna ex parte à lapide acuto, uel admodum aspero, aut à dirupto aliquo abscessu. Et in lib. de tumorib. cap. 2. Et 2. ad Glauc. cap. 6, Abscessus fiunt ab aliorum humorum influxu, & à multitudine uaporoforum spirituum, &c. Auic. loc. cit. Causæ ulcerum sunt causæ continuitatis solutæ & apertionis, &c.

De signis Nephritidum.

Inflammationis renum & uesticæ indicia sunt, loci affecti ardor, & cum grauitate dolor, febris cōtinua, mentis alienatio, bilis syn-

cera uomitus, mingendi impotentia, praesertim existente in uesica inflammatione. At si circa ilia dolores fuerint, & horror inaequalis, & febris inordinata, abscessus in renibus cum loci cruciatu testantur. Signa ulcerum renum uel uesicae sunt urina crassa cum exiguis carunculis. Dolor in affecto rene, interdum exiguum pus mingitur, interdum sanguis & ramenta. Item fursuracea urina, squamulae & grauis odor, cum mictu sanguinis & puris, ulcerationem uesicae denotant. Cognoscitur affectus esse in renibus uel in uesica per dolorem qui in differentibus locis accidit. Nam si ulcus sit in uesica, dolor erit in pube: si in ilijs & dorso, erit in renibus: si in urinae meatibus, erit in media regione, &c.

Loci consentientes
de signis.

Hippoc. aphor. 3. aphor. 36, Quibus autem morbo renali laborantibus praedicta accidunt signa, doloresque circa spinae musculos fiunt, siquidem circa exteriora fient, abscessus quoque exterius futuros expecta: si uero dolores magis circa interiora loca fiat,

etiam abscessus interius futuros expecta. Le-
ge Gal. 6. de loc. aff. cap. 2. ibi, Renem affe-
ctum esse cognosces, si dolores cum horrore
interpellato uarioque infestare uideantur.
Hippoc. aphor. 4. aphor. 76, Quibus in uri-
na crassa existente carunculae parue aut ue-
luti capilli una exeunt, his a renibus excer-
nitur, &c. Et aphor. 4. aphor. 77, Quibus in
urina crassa fursurea quedam simul exeunt,
ijs uesica scabie laborat. Et aphor. 4. apho.
75, Si sanguinem aut pus mingat, aut renum,
aut uesicae exulcerationem significat. B. Disce
in comment. Gal. quomodo renum affectus &
uesicae inter se distinguantur. Vide etiam
Auic. 18. tra. 2. cap. 2. ibi, Signa ulcerum. Et
Hippoc. aphor. 4. aphor. 81, Si sanguinem
aut pus minxerit, aut squamulas, & grauis
dolor adsit, uesicae exulcerationem significat.
Vide de his signis Arcul. 9. almans.

De curatione nephritidis.

Cura inflammationis renū & uesicae consi-
stit in ablatione cause. Causa autē est influ-
xus sanguinis, qui si adhuc influit, prohibē-
dum est ne influat, diuertendo cum sectione

uenarum, quæ in cruribus circa poplitæ consistunt, & cum cucurbitulis, frictionibus, &c. Quod si quidpiam iam fluxum est, per euacuationem sanguinis in cubito, deinde inflammationi ipsi per cataplasmata & forus mēdēdum: ita tamen ut si ad resolutionem tendat, cum his quæ pluries dicta sunt, sicut in principio cum reprimētibz, in uigore cum mixtis, in decremento cum resoluentibus, &c. Cura ulcerū etiam in abstergentibus ac mūdicantibus consistit, deinde cum his quæ cicatricem inducunt ac consolidant, &c.

Loci consentientes de cura nephritis.

Act. ser. II. cap. 16, Si inflammationis acumen non remittatur, sed uehementior exurgat dolor, uena cubiti secanda, sanguinis detractione repetita: & si quid inflammationis relinquatur, ad cataplasmata procedendum, &c. lege eum fusius. Auicē. 18. tra. 2. cap. 3, In initio curationis est abscissio causæ per phlebotomiā ex basilica, si sanguis est uincens: interdum fit incuruatura popilitis, uel ea non ap-

parente, in saphena: & si sint cum sanguine humores acuti, calidi, per solutionem uentris, cum cassia fistula & aqua casei. Et de cura ulcerum lege eum fusius 18. cap. 12. ibi, In curatione ulcerum renum, &c. Lege de hac re Gord. & Arcul. ibi, Cause antecedenti hac conueniunt, digestio, euacuatio, & diuersio, sed coniuncte, quæcunque à me dicta sunt.

Observationes circa victum in inflammatione.

Auic. loc. cit. Oportet ut detur in potu aqua dulcis frigida, sed nō ita frigida ut prohibeas maturationem. 2. Abstineat à carne & dulcibus, aqua calida, & omne calidum nocet eis, & aqua plurima non euacuetur, quin laborare faciat renes suos incessu & motu. 3. Et non est ulceribus & apostematibus aliquid magis congruum quàm quies. 4. Et balnea conueniunt eis, nisi in declinatione apostematum calidorum, &c.

Observationes circa medica- menta.

Gal. 10. de cōpos med. per loc. cap. 1, Qua

ad inflāmatas & ulceratas affectiones medicamenta componuntur, medicamentis mitigatorijs opus habent. Quū uerò impossibile sit hæc citò ad regiones renum peruenire, ob id ipsis pharmaca urinam cientia miscemus, &c. Itidē ait 4. meth. ca. 7. ibi, Quoties in uestica, &c. Gal. 13. meth. cap. 6, Ne quum circa sedem uel aliam huic uicinam partem initium phlegmones incidit, aluum deijcies, neque cū in uestica uel cole uel renibus est cœpta, pharmaca quæ urinam prouocent, bibenda dabis. Itidem ait 13. meth. cap. 11. ibi, Si quum in renibus, &c. Et 13. met. cap. 16, Calida quoque uitanda sunt, quum renes facillimè in duritiem occallescant, &c.

Aet. ser. 2. cap. 16. notat non esse exhibendum pharmacum purgatiuum, sed per clysterem aluum esse leniendam, nec multam clysteris copiam infundendam, ne repleta intestina renes comprimant, &c.

Obseruationes circa topica.

Auic. 19. tra. 1. cap. 10, Reprimentia frigida non longo tēpore applicanda: nam illud

nocium est, & indurant apostemata uelociter. 2. statim, si fieri potest, sedandus est dolor, quū uesica sit mēbrum neruosum. 3. quōd simus solliciti in prouocāda urina, quum frequētius retineatur in apostemate uesicæ, &c.

De prognosticis nephriticorum.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 2, Atra bile uexatis & renum passionibus hæmorrhoides superueniētes, bonū. B. Ob id quōd mala qualitas humorū euacuatur, &c. Auic. 18. tra. 2. cap. 1, Omnia renum apostemata uelocia sunt ad hoc, ut in lapidem conuertantur. Et quādo apostema calidum est in rene, & non sit uacuum à febre, deinde accidat cōmixtio rationis, tunc est mortale. Et cap. 10. loquens de ulceribus inquit, Quōd multoties ex ulceribus renū proueniunt fistulæ, quæ nullo modo sanantur, & ille cuius ren disrumpitur, moritur. Et fen. 19. cap. de ulcer. uesicæ, inquit, quōd difficiliora sunt quā renum, & ille cuius uesica disrumpitur, moritur secundum plurimum : quōd si scindatur, non incarnatur, nisi in parte carnosā, &c.

De Diabete.

Hunc affectum vocant quidam hydropem matellæ, alij urinæ fluorem, alij dyspæcon ab inexplebili siti, alij diabete[m], qui nihil aliud est quàm renum affectio, in qua portio statim qualis assumpta est per urinam reijcitur, & rarò accidere solet, &c.

Loci consentientes de diabete.

Gal. 6. de loc. aff. cap. 2, Diabetes est proprius renum affectus, qui canina in ore uentriculi cupiditati proportionè respondet, accedente præterea retentricis facultatis imbecillitate. Paul. lib. 3. cap. 43, ὁ δὲ βήτης ταχὺν τῷ πινομένων ὅτι διέξοδος οὐρομένων ποιούτων οἷα ἐπύθη. διὸ καὶ διψῶσιν ἀμέτρως, ὅθεν καὶ διψακος ἐκλήθη τὸ πάθος, &c. Auic. 19. tra. I. cap. 17, Est ut egrediatur aqua sicuti bibitur tempore breui, & proportionè respondet ad lubricitatem stomachi.

De causis diabetis.

Cause sunt uel retentricis facultatis imbecillitas, uel facultatis attractoriæ uehemen

tia. Prima fit à mala intemperie frigida intrinsecus uel extrinsecus adueniente: secunda fit à uehementi renum calore nudo uel complexo, attrahens à uenis emulgentibus, & ex eis ad hepar extenditur, & ex hepate ad stomachum, & ad omnia membra, unde humiditates membra irrorantes attrahit, & fit siris uehemens, quæ potu non sedatur, unde *ἰσχυρός* dictus est, id est siccus morbus, &c. Fit etiam à resolutione lacertorum collinesicæ, &c.

Loci consentientes de causis diabetis.

Auicenn. 19. cap. 17, Causa diabetis est dispositio renum ob imbecillitatem accidentem & dilatantem orificia meatuum, quare fit ut aquositas non figatur in renibus. Et quandoque fit ex frigore, toto corpori uel renibus dominante, aut à potu aquæ frigide, aut propter uehementiam attractiuæ, &c. Lege eum diffusius. Gal. 6. de loc. aff. cap. 2, Fit hic affectus à retentricis facultatis imbecillitate, &c. Vide eum fusius, & plura intelliges.

Nnn. i.

De signis diabetis.

Signa quando fit ex caliditate sunt lum-
 borum caliditas, urina multa in principio, si-
 cut lotura carnis recentis, minus tamen infe-
 cta & rubea, ac si defectu hepatis id proue-
 niret: deinde processu temporis in qualitate
 & colore potus egreditur. Si fuerit à frigi-
 ditate, tunc circa lumbos percipitur frigus, &
 urina in principio est quantitatis consuetae:
 deinde multiplicatur, & erit sicuti lotura
 carnis, sed minus tincta, quàm in fortitudine
 attractricis facultatis. Adest semper sitis,
 nec ex bibitu satiatur, sed Quo plus sunt po-
 ta, plus sitiuntur aqua, &c.

Loci consentientes de si-
 gnis diabetis.

Aet. ser. II. cap. 1, Comitatur sitis perti-
 nax, ex qua nulla ex potu satietas contin-
 git, quare assidue bibere coguntur, &c. Vide
 de hac re Gal. 6. de loc. aff. cap. 2. Auic. nul-
 lam de signis diabetis mentionem facit, le-
 ge tamen fusius Marc. Cat. cap. de inuolun-
 tario exitu urinae, ibi, Adest sitis intensissi-
 ma, &c.

De curatione diabetis.

Cura in duabus intentionibus consistit, quarum altera ad ablationem causæ studet, altera ad mēbrorum urinæ roborationem. Si causa igitur fuerit acritudo humorum, euacuatione demitur, deinde renes intrinsecè & extrinsecè cum succo granatorum & limonum infrigidentur. Si causa fuerit frigiditas, ex qua retentrix imbecillis sit, roboranda erit cum calidis stypticis, sicut cum decocto myrthi, sumach, balaustiarum, absinthij, cum uino chalybeato, aut cum puluere tali.

℞. cupularum glandium. 3. i. thuris myrrhæ ana. 3. 5. pelliculæ stomachorum gallinarum. 3. iij. Misce, & fiat puluis. Conueniunt etiam Troc. de spond. cum semine acetosæ T. de terra sigillata, de balaustijs cum uino uel aqua absinthij. Si causa fuerit uehemētia attractoriæ facultatis à superflua caliditate innata, tunc expedit infrigidare & stypticare, qua ratione conueniunt syr. de agresta, de acetositate citri, cum aquis portulacæ, lactucæ, & ung. sandalinum committissæ infrig. Gal. Si causa esset relaxatio

Nnn.ij.

musculorum colli uestica, conueniunt quaecun-
que de paralitide scripta sunt, qualis est
diacorus, acorus cōditus, &c. Sitis remoue-
tur, si dato potu euomatur, & rursus frigi-
diore dato iterum reuomatur, donec sitis ex-
tinguatur, & aquositas à renibus diuerta-
tur. Somnus etiā hac in re cōmēdatur. Quòd
si prædicta morbum omnino non abstulerint,
non erit præter rem, si stuporem in ducenti-
bus utamur, sicuti lactuca, papauere, uel ce-
ratarum ex succo papauere admota.

Loci consentientes de cu- ra diabetis.

Auic. 19. tra. 2. cap. 18, Diabetes ut pluri-
mū accidit ex caliditate ignea: quapropter
plurimū curationis eius est infrigidatio
& humectatio, &c. lege eum fusius.

Aet. ser. 11. cap. 1, Scopus medendi est ut
humorū acredinē auferamus, sanguinēque,
ac cum eo permixtum humorem serosum ad
tardiores motū reddamus, & renū intem-
periem reuocemus. Vide etiam Aet. ibi, Vi-
ctus sit boni succi mordacitate carens, ut
sunt oua sorbilia, alica, carnes porcinae, ui-

num ruffum craſſius, frigidum, dilutum, item caſeus recens ſine ſale. Vide etiam Paulū & Marc. Cat.

Obſervationes in cura diabetis.

Auicē. 19. tra. 2. cap. 18, Quæ oportet ipſum vitare eſt labor dorſi, & aſſumptio diureticorum, &c.

Obſervationes in euacuatione.

Gal. 7. meth. cap. 13. inquit, quòd euacuatione eſt renum, thoracis, arteriarum & uenarum, & cordis, & utriuſque veſicæ commune quoddam opus, ſit tamen euacuatione leniens ut Auicē.

Conferentia diabeti.

Infrigidant renes, ac diabeti conferunt, camphora illinita uel bibita, caſſia, ſiliqua, cucurbitæ conditæ, oleum cucurbitæ, plumbum, &c.

De prognosticis diabetis.

Aet. ſer. II. cap. 1, Si amplius mordēs caliditas in uisceribus augeatur, uenter ſuperior corrugatur, & uenæ in ipſo eleuantur, uniuerſumque habent gracilem habitum, & tabes totius corporis accedit: qui uerò nō min-

Nōn. ij.

gunt, nec ex eis potus transpirat ob potus satietatem & humoris inundationem & uesica circūtensionē, acruatim uētre rūpuntur. B. Siquis Aet. intelligere uoluerit, supponere habet duas diabetis differentias: alteram, in qua talis portio, qualis assumpta est, per urinam reijcitur, alteram in qua nihil penitus mingitur, nec potus per alia loca transpirat. Qui igitur primo diabete laborant, incurrunt marasimum uel tabē, consumpta scilicet omni uenarum humiditate, unde gracilis habitus oritur & tandem mors. Qui uerò non mingunt, nec per alia loca potum excernunt, dum bibere non desinant, uentre rumpuntur. Vide Gal. 6. de loc. aff. cap. 2. ad finem: & Auicen. 19. cap. 17, Quandoque perducit ad liquefactionem & ad ethicam, &c.

De urinae stillicidio & eius difficultate.

Mingendi actio bifariam leditur in emitendo scilicet urinam, & in retinendo. Actio emittēdi urinam, uel abolita est, uel imbecillus, uel deprauata: si abolita, tunc iḡḡeīa dicitur, & est quū nullo pacto ager mingere

potest. Si uerò imbecillis fuerit, tunc δυσου-
εία à Græcis dicitur, à Latinis difficultas
urinæ, quæ nil aliud est, quàm meiendi desi-
deriū cum urinæ difficultate, & trifariā cō-
sideratur: primò, quum tenuiter mingitur: se-
cundò, quum in mingendo patiens longā mo-
ram occupat: tertio, quum mingere incipit, &
in mingendo perseuerare non potest, sed ple-
runque intercipitur. Si uerò actio mingendi
fuerit deprauata, tunc excretio urinæ nō ri-
si guttatim destillabit, & uocatur σπαρσο-
εία à Græcis, à Latinis uerò urinæ stillici-
dium, & est excretio urinæ guttatim stillātis.

Loci consentientes de stil-
licidio vrinæ & diff.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2, At huiusce-
modi ambo uesicæ morbi unam cōmune sym-
ptoma, ischuriam, id est urinæ suppressionem.
Est & aliud symptoma, quum nihil penitus
urinæ in uesicā delabitur, abolita nimirū re-
num actione, &c. Et aphor. 5. comment. 58,
Quādo aliquis parum & frequenter mingit,
hæc passio urinæ stillicidiū nominatur, &c.

Nnn.ii.

Vide hac de re Alexan. lib. 3. cap. 38. Item
Arcul. 9. almans.

De causis stillicidii & diffi-
cultatis urinæ.

Causa primitiua uel sunt extrinsecæ, qualis est casus, percussio, & læsio instrumentorum urinæ: uel non extrinsecæ, sicut sex res non naturales assumptæ, &c. Causa antecedens est triplex, uel ex parte uesicæ, aut à læsione facultatum eius, aut à dispositione urinæ. Si ex parte uesicæ, tunc læsio aut est in meatu colli uesicæ, aut uirgæ, & tunc uel est aliquis abscessus, uel ulcus, uel scabies, ex quibus dolens timet extra mittere urinam: uel erit quedam obstructio obstruens urinæ meatum. Si uerò à læsione eius facultatum, tunc uel erit uirtus sensibilis læsa, quæ nec mordacitatem aut grauitatem urinæ percipit: uel motiua uis uoluntaria læsa, dum musculi relaxantur, & incontinentia urinæ accidit, uel retentricis & expulsoriae facultatis imbecillitas, quæ à mala intemperie, aut à defectu spirituum provenit. Si à dispositione urinæ, tunc urinæ quantitate aut qualitate pec-

cat: quāritate, quum ipsa uel nimis sit pauca,
 uel nimis copiosa, unde expelli non potest:
 qualitate, quum nimis calida, mordicans,
 ulcerans, &c. Causa etiam potest esse imbe-
 cillitas renum, non ualēs aquositatem attra-
 here uel expellere, ob malam intemperie frigi-
 dam, aut calidā, aut ob earum obstructio-
 nem. Causa per consensum erit ex parte mem-
 brorum principalium, sicuti hepatis in se-
 questratione aquae deficiētis, uel ex parte ce-
 rebri spiritum animale retrahentis, &c.
 Auic. 19. tra. 2. cap. 6.

Loci consentientes de causis.

Auic. 19. tra. 2. cap. 6, Et fortasse causa
 est frigus, aut calor de foris, aut percussio,
 aut retentio urinae plurimae, &c. Aut sit pro-
 pter causam in meatu colli uesicae & capi-
 tis uirga. Aut propter causam in uirtute, aut
 propter causam in instrumento, aut propter
 causam membri mittentis, aut propter cau-
 sam in urina, &c. Gal. aphor. 3. comment. 16.
 & aphor. comment. 58. causam esse inquit
 imbecillitatem retentricis facultatis, quae ab
 intemperie, & aliquo praeter naturam tumore

fieri solet, uel acrimoniā urinae, quae etiam à renum passione, uel à superfluitate serosa ex uenis ad ipsas percolata prouenit. Et stillicidium urinae fieri inquit, recto intestino & utero inflammationem patiente, & hoc per compatiendi rationem, aut à puro ex renibus ad uesicam euacuato.

Obiectio.

Gal. stranguriam esse quoddam retentricis potentiae symptoma hinc inquit. Etenim 6. de sympt. cau. reposuit eam inter expultricis potentiae symptomata.

Responsio.

Soluit dubium Gal. 6. de loc. aff. cap. 1, dum inquit, Humores mordaces omnia intestina & uesicam ad excretionem excitant: qui uerò mordaces non sunt, imbecillitatem intestinorum sequi consueuerunt, quia retinere contenta nec exiguo quidem tempore possunt. Ac si dicat, si à mordacitate humorum stranguria fiat, ad expultricem pertinebit facultatem: si uerò ab imbecillitate, ad retentoriam, lege de his causis Act. ser. 11. cap. 19 & Paul. &c.

De signis stillicidii ac difficultatis vrinae.

Stillicidium urinae, & eius difficultas ex se manifesta sunt. Signa eius causarum erunt (si prouenit à frigore) urinae tenuitas uel crassities cum albore, & frigus sentietur. Signa ab humorum acrimonia habentur ex urina acri bilem attestante, uel ab habitu ipso, uel à colore, & ab his quae intemperiem calidam denotant. Signa apostematis sumuntur ex febre, uel quia paulatim fit affectus, & ex dolore loci, & eius extensione & tumore. Signa lapidis & obstructionis per syringam intromissam habebuntur. Signa humoris crassi cognoscuntur ex grauitate sensata & pondere. Signa flatuosi spiritus est tensio sine grauitate loci, quae interdum permutatur. Signa mollificationis musculi uesicae sunt egressiones urinae absque uoluntate. Signa contracti musculi uesicae sunt, quia urina retinetur, nec potest educi, nisi cum ualida compressione. Signa debilitatis sensus sunt, quod ager mordacitatem urinae non sentit. Signa expultricis facultatis

laesæ sunt, si ex cōpressionē facilis fiat urinae
eductio. Signa difficultatis urinae per con-
sensum hepatis & cerebri, sunt eorum agri-
tudines præcedentes, & quòd non apparent
laesiones aliæ in instrumentis urinæ.

Loci consentientes de signis.

De his signis lege Auic. 19. tra. 2. cap. 7.
ibi, Signa eius, cuius causa est frigus, est al-
bedo urinae cum crassitie & tenuitate, &
multitudo surgendi ad mingendum, & sensi-
bilitas frigoris, &c. Lege diffusius librū, &
plura inuenies. Paul. lib. 3. cap. 45, Si neque
ab inflammatione, neque à calculo, sed ab
urinae acrimonia depēdeat, cognosces per si-
gna bilem attestantia. Si uerò à frigido fiat,
aderit urinae tenuitas albōrque, & præter al-
borem crassities, quæ humorem pituitosum
denotat. lege Arcul. Alex. & Gor. &c.

De cura stillicidii & diffe- rentia urinae.

Cura huius morbi consistit tantummodo
in eius causarum ablatione, ac in urinae pro-
nocatione. Inquiratur ergo omni studio eius
causa: nam si fuerit à frigore, tunc calefaciē-

do, & regimen calefaciens instituendo facile curabitur: proderunt interim clysteres ex rebus calidis, inunctiones & foci calidi prout sermo erit. Si causa erit obstructio colli vesicæ, uel fiat ab apostemate, cura erit apostematis prout millies dictum est: si à materia lapidea, recurratur ad caput calculi. Si à materia pituitosa, saniosa, uel sanguinis coagulatione, tunc intentio erit materiam attenuare cū incidentibus, attenuantibus ac aperitiuis, scilicet cum syr. bisantino de duabus rad. oxymelle simp. cum aquis fœniculi, apij, &c. deinde urinā prouocare. Prouocatio urinae multifariā fieri potest: primò leuiter uesicam comprimendo, uel cum supposito ex sale gmeo, uel cū titillatione in capite uirgæ, cum fricatione in collo uesicæ prope anum. Proritant urinam ualidius inunctiones ex oleo scorpionum & liliorum alborum: nam præter quàm quòd calefaciunt, etiam resoluunt ac relaxant. Similiter foci ex paritaria, ex senecione, cum dictis oleis in sartagine frixis, & pubi admotis, uel ex rebus magis calidis, ut cum calamento, pulegio, sa-

bina. Intrinsicus conueniunt clysteres ex hiera picra, benedicta, castia, zacharo, & oleis scorpionum. Cōueniunt etiam decocta fœniculi, asparagi, brusci, apij, ferroselini, uel decoctum iuniperi, sabinae. Item puluis corticis oui, à quo pullus egressus sit, à suo cortice depurati, ad quātitatem drachmæ unius. Item rubea tinctorum, cātharides, amotis pedibus & alis. Prouocāt etiam urinā dialacca, diacurcuma Iustinianum, & confectio de cineribus scorpionum, &c.

Loci consentientes de cura stillicidii & difficul. urinæ.

Paul. lib. 3. cap. 45, Si ab acrimonia humorum dependeat, conuenit prisana cremor, pisces, balnea, uictusque idoneus. Acria uitanda sunt, uinum, exercitium, & tarda comestio. Si uerò à frigida intemperie, conuenit uinum calidum, & cibi qui urinā prouocent: & hæc de regimine. Aet. ser. II. cap. 19, Cōsiderandæ sunt præcedentes causæ: nā si fuerit frigiditas, cum calefacientibus & urinam prouocantibus tollenda est, addito etiam ad

pectinem fotu. Si uerò caliditas præceßit, ſicut urina acris & bilioſa atteſtatur, tunc ſanè exuberantem humorem vitioſum quàm cellerrimè purgare oportet, vitæ interim omnibus falſis & acribus. Quòd ſi nec acrimonia adhuc auferatur, lac ipſum cum amylo inueſicam deſciatur, &c. Auic. 19. T. 2. cap. 8, Si cauſa eſt humor uel ſanies, opus eſt ut curretur cum aperitiuis ac diureticis, &c. Lege eum fuſius, lege etiam Arcul. 9. almans. Item Mar. Cat. & rem aptius ac dixerim intelliges.

Conferentia ſtranguriæ.

Conferunt ſtranguriæ decoctio acori, cap. Ven. altheæ, ally, amygdala amara, apiũ, caſſia lignea, cicera, cyperus, ſemen cucurbitæ, gladiolus, gramen, chamædryſ, aſſarum, phu, cardamomum, locuſtæ ſuffumigium, maiorana, mel, meu, mezereon, millefolium, ruta, ſerpillum, ſiſimbrium, aſparagus, ſcilla, terebinthus, porcelliones, uirga paſtoris, uſnea, rapa ſatiua, raphan', miliũ panicũ. Cõpoſita ſunt cõſectio alchechegi Auic. egezea cõf. Meſ. philonium romanũ mitridatũ, oleum amygdal.

de sabina, de ossibus persicorum, oxymel scil-
liticum, socrita conf. Haly. theriaca T. de
absinthio.

De prognosticis stranguriæ
& dysuriæ.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 6, Renum & ue-
sicae uitia in senibus difficulter sanantur. B.
Et hoc aut propter inquietudinem renū, aut
humorum acrimoniam, aut uirtutem senum
imbecillem. Nam qui morbi senibus accidunt,
longi plerunque ad mortem ipsos concomitā-
tur. Auic. 19. tra. 2. cap. 6, Expertum est in
pluribus hominibus, & dictum est, qui habet
difficultatem urinae, & aduenit ei postea
tenasmos, moritur in septimo, nisi accadat fe-
bris, & plurimā prouocationē urinae faciat,
&c. Aet. ser. 2. cap. 19, Si acris humor diutius
in uesica moretur, partes ipsas corrodit &
exulcerat, &c. Hippo. aph. 3. aph. 16, In fine,
In siccitatibus lippitudines, articulorū do-
lores, urinae stillicidia, dysuriæ, &c. Lege
etiam 22. aph. 3, & 31. eiusdē, ibi, Senibus spi-
randi difficultas, urinae stillicidium, dysuriæ
sive urinae difficultates. Et apho. 5. apho. 58,

Recto intestino aut utero inflammationē patiente, urinae stillicidium accidit, & renibus purulentis urinae aduenit stillicidiū. Et aph. 49. lib. 7, Vrinae stillicidiū & mingēdi difficultatem seu dysuriam uini potio & uenae sectio soluit, incidere ante interiores in talo est bonum, &c.

De vrinae retentione.

Quae à Græcis ἰσχυρία dicitur, est exacta prorsus urinae retentio periculū afferens, &c. Et hoc attestatur Gal. lib. finit. med. ibi, Ischuria est exacta prorsus, &c. Vide etiam Gord. &c.

De causis retentionis vrinae.

Causae huius affectus sunt octo, inflammatio, durities, sanguinis grumus, expultricis resolutio, lapidis procidentia, membrorum compassio, ulceratio & lithiasis, uel alia obstructio. Retinetur etiam urina ob negotiorum importunitatem, uel per somnum, &c.

Loci consentientes de causis retentionis vrinae.

Gal. 6. de loc. aff. cap. 3, Ischuria prouenit, quum circa id quod continetur, contrahi

Ooo. i.

non potest, ut ipsum exprimat: interdum obstructio in inferiori meatu, aut à crassis humoribus, aut impacto lapide: nonnunquā ab inflammatione, uel alio tumore, ut angustior meatus reddatur, uel omnino obstruatur: lege locum hunc fusius, & antedictas causas inuenies, &c. Lege etiam Aet. ser. 2. cap. 21. ibi, Accidit & sanis saepe urinam ipsorum cohiberi ob negotiorum importunitatem, ac si diutius in cōcionibus foro iudiciario, somnisque mictionē retinuerint, &c. Lege Gal. loc. cit. & Auic. & Arcul. & alios modernos.

De indiciis retentionis vrinæ.

Ischuria ex compressione urinæ statim cognoscitur, sed causarum suppressionis indicia nō tamen usquequaq; sunt nota. Signa igitur sunt, quòd ex facultate excretoria hæc fiat, cognoscitur ex compressione uehementi ex qua urina excernitur. Signa obstructionis erunt, si minus per compressionem urina excernatur, & tunc obstructio erit à grumo sanguinis, si nulla adsit lapidis nota, & sanguis effluat: uel erit ab abscessu, si pus excernatur, uel inflammationis notæ nō aderint: uel erit

à caruncula, si ulcus & ulceris indicia præ-
cesserint: uel erit à lapide, si intromissa fistu-
la anea lapidem remouendo urina euacue-
tur. Similiter si à crassis humoribus fiat ob-
structio, cognosces ex uictu precedente, si in
otio educatus, si multis cibis crassis ac uisci-
dis humores generantibus usus fuerit, &c.

Loci consentientes de signis
retentionis urinae.

Gal. 1. de loc. aff. cap. 1, Intueri oportet
præterita & præsentia: nam si à resoluta fa-
cultate uesicae ischuria proueniat, tunc homi-
nem ita figurato, ut decliuus sit ceruicis uesi-
cae positus, ac tumorem præter naturam cõ-
prime, ut urina expellatur: quod si min⁹ pro-
feceris, tunc facultatẽ non resolutam, sed po-
tius urinae fistulam obstructam conijce. Si igi-
tur obstructio à lapide fiat, &c. Lege totum
hunc locum, & inuenies quaecunq; à me supra
posita sunt. Lege etiam Gal. 6. de loc. aff. ca.
3. ibi, Nõ fungẽte suo naturali munere uesica,
&c. B. Nota, q̃ in omnibus corporis parti-
bus est naturalis quedam uis excretoria, qua
excrementa secernũtur, naturalis dicta, eò q̃

uoluntati non obediat, sed naturaliter agit. Vnde musculus ceruicem uesicæ circundans, tanquam uoluntati ipse obediens, uolentibus nobis eo usque ab actione quiescit, donec uesica suo munere fungatur, &c.

De cura retentionis urinae.

Quamprimum ischuria causam agnoueris, facilis erit cura: nam suppressionis urinae causas amouere est curatio. Si igitur inflammatio causa sit retentionis urinae, curetur inflammationum curatione: quod si pus uel humor, uel sanguinis grum⁹ in causa sit, per dissoluentia pubi admota (uitatis urinā cietibus, ne maior uel obstructio uel extensio circa uesicā fiat) statim curabis: uel his non conducētib⁹, ea mittēda sunt in uesicā quæ dissoluit per syringā. Si uerò propter obtusum uesicæ sensū urina supprimatur, irritando excitare eius actionē expedit cū infestationibus aut cimicibus capiti uirgæ admotis. Si causa sit lapis, tūc admota syringa lapis excutiendus est, & sic de singulis, prout supra de distillationis urinae cura dictum est, &c. Aduertēdo etiam quaecunque à Paulo superius de regimine di-

eta sunt, &c.

Loci consentientes de cura
retentionis vrinæ.

Aet. ser. 2. ca. 21, Si ex inflāmatione urina
supprimitur, sectione uenæ curabitur, adhibi-
tis etiā fomētis & cataplasmatibus, quæ sæpius
ad inflāmata dicta sunt: si uerò supprimitur
à sanguinis grumo, tūc grumus eo pacto dis-
soluendus, quo de eruptione sanguinis dictum
est: si uerò lapis urinā supprimat, à loco ex-
curiendus est, &c. Lege Arcul. 9. almans. ubi
de sectione agitur, quæ alyis non iuuantibus
in collo uesticæ fieri solet, &c.

Stranguriæ & ischuriæ con-
ferentia.

Cōferunt strāguriæ & ischuriæ abrotanū,
acorus, agaricus, alliū, althea, ameos, amygd.
amar. anethū, apiū, arthemisia, bacca lauri,
balsamum, baucia, chamædrys, chamepithys,
carpobalsamū, castoreū, cētaurea, ciminum,
cimices, cīnamomū, cyper⁹, cypressus, cuscuta,
crocus, daucus, eleniū, epithimū, fœniculū, fœx
uini usta, filipēdula aus, furfur tritici, gal-
banū, genista, melāthion, iuniperus, cassia,

Ooo. iij.

650 DE CONSEN. MEDIC.

terebinthus, lapatium, lithospermō, locustarū
 suffumigium, lūbrici terreni, maiorana, ma-
 tricaria, myrthus, nasturtium, origanum, oci-
 mū, parietaria, peonia, peucedanū, cap. Ven.
 portulaca, raphanus, rapa, satiua, siser, ruta,
 rosmarinus, salaia, sabina, saxifragia, sena-
 piū, sepia, serpillū, siler, sisimbriū, sinapis, scor-
 deon, asparagus, scenoanios, stechas, tama-
 rischus, trifolium, betonica, uinum scilliticum,
 hypericon, hyringus, iris, porrum, cepæ, aspho-
 dellus, petroselinū, iūcus odoratus, calamus o-
 doratus, resina mulei pini, lētiscus, hordeum,
 mel, eruū, pepo, piper, capparis, cemauiū. Cō-
 posita sunt aureum ung. Nic. diaprasiū, dia-
 piretrum Nic. Iustinum conf. Nic. etiam mu-
 cos mingētibus, pilulæ diacastoreæ Nic. ung.
 mellinū dio. c. antidotū hemagogū Nic. etc.

De prognosticis retētionis vrinæ.

Hippocrates apho. 4. apho. 80, si sangui-
 nem mingant, et grumos et stillicidium uri-
 næ habeant, et dolor in anum incidat uen-
 trem et pectinem et fœmen, circa uesicam
 labor est. B. Intelligit pro labore morbū: nam

nō refert siue πονεί siue νοσεί quis dixerit, & intelligitur de omnibus urinae instrumentis: nā partē pro toto, id est pro vesica, totum quod vesicae annectitur, hic accipit, &c. Et Apho. 4. aph. 82, Quibus in urinaria fistula tubercula nascuntur, ijs suppuratione facta & eruptione, solutio. B. Hic subauditur, quod ex his tuberculis ischuria fiat, quibus disruptis proculdubio sanatur. Nota tamen quod in antiqua translatione Galen. pro ischuria legitur malè strāguria, &c. Aetius ser. 2. ca. 24, Quī non eijciant lotium, subiecta membra mortificantur, neque ita longē post moriuntur.

De vrinae incontinentia.

Quum urina inuoluntariē excernitur, tunc resolutione vesicam laborare dicimus, &c.

Loci consentientes de vrinae incontinentia.

Aet. ser. 2. cap. 24, Quibus resoluta est vesica, ijs uel prater uoluntatem urina excernitur uel supprimitur. Lege Auic. 19. cap. 13. de inuoluntario exitu urinae Et Pau. lib. 3. de urinae incontinentia. Lege etiam cap. 18. ubi de resolutione, quae unamquāque particulam

Ooo iiij.

obsedit, mentionem facit. Lege etiā Arcul. 9.
alm. & Sauonarolam, &c.

De causis incontinentiæ vrinæ.

In causa est ut plurimū resolutio musculi,
qui ceruicē uesticæ ambit, itē facultatis reten-
torix imbecillitas, item nimius potus, hepatis
imbecillitas segregare aquositatē non ualens,
itē nimia renū caliditas & superfluū frigus,
acuitas urinæ, & luxatio uertebrarū spinæ.

Loci consentientes de causis incontinentiæ vrinæ.

Gal. 6. de loc. affe. ca. 3, Si musculus qui ue-
sicam claudit resoluatur, tum inuoluntaria
urinæ excretio prouenit, &c. Auic. 19. tra. 2.
cap. 13, Fit ut plurimum propter superfluita-
tem frigoris & mollificationē lacerti, & de-
bilitatem uirtutis attractiue in uesticæ & re-
nibus, & propter caliditatē plurimam attra-
hentem ad uesticā resudationem à corpore, &
propter coarctionem stercoris cōprimentē, &
propter acuitatem urinæ, &c. Lege Aet. ser. 2,
cap. 24. Et Gal. de loc. aff. cap. 3. ibi, Alter lu-
xatis ad extremas partes spinæ uertebris in-
greditus urinā profudit, nullo infestante uesticam

dolore: coniecimus eius musculi neruum, qui
uesicam claudit, esse affectum, proinde spinā
curare uoluimus, &c.

De signis incontinentiæ urinæ.

Nota esse possunt signa tum ex relatione
infirmi, tum ex his quæ dicta sunt: nam quo-
tiescūque copia urinæ frequēter emittitur, &
in mictione ardor nō sentitur, nec sitim aget
patitur, nec corporis extenuationē, tunc indi-
ca musculū uesicæ esse resolutū, à quo excre-
tio inuoluntaria urinæ procedit, &c.

Loci consentientes de signis.

Lege Razem 9. almans. de fluxu urinæ, &
Auic. 19. cap. 13. ibi, Et scire facile fit ex eis
quæ præterierunt, &c.

De cura incontinentiæ urinæ.

Cura talis sit, qualē diximus in cura dia-
betis, pro quib⁹ lege diffusius Aet. ser. 2. c. 24,
& ubi ad eos qui se in somno permingunt re-
media scribit, & Auicē. ubi de mictu in lecto
sermonē facit, & est fen. 19. t. 2. cap. 15. Item
curam de inuoluntario exitu urinæ, &c.

Cōferētia inuolūtario exitui urinæ.

Cōferunt inuoluntario exitui urinæ & mol

1654 DE CONSEN. MEDIC.

ificationi uesicae, acetum scilliticum, acorus,
calamus aromaticus, chamepithys, ciminum,
cinis ungularum apri, cyperus, codex, pulmo
hædi, helenium, carnes ericy, sceniculum agre
ste, chubebe, laurus Alexandrina, cerebrū coa
gulum leporis, lignum aloes, mumia, ostraca,
grana pini, cortices populi, sisimbrium, scolo
pēdria, uesica apri, mures elixæ & comesta.

Composita, confectio Aristomachi Auic. con
fectio philosophorum Auic. ibi, i. 5. Vinum ex
tinctionis ferri, oleum nardinum, oxymel scil
liticum, electuarius piperis Haly, tamaricon
cōf. Haly, trisera magna, trisera de scoria ma
ior Auic. Tro. alchechēgi Auic hiera Galeni.
De prognostic. incontinētiae vrinae.

Aet. ser. 2. ca. 24, Qui præter uoluntatem
urinam emittunt, quanto plus eis contingit, eò
minus periculo sunt obnoxij.

De ramicum generibus, id
est, de herniis.

Quod ramicem siue herniam Latine dici
mus, Græci κήλας omnes ferè testium tumo
res uocant, & sunt numero octo. Primus Hy
drocele, quæ est incocti humoris in parte scro

ti collectio. Secundus Emierocele, est intestini in alterū locū paulatim uel semel delapsus. Tertius, Hidrēterocele, & est delapsus intestini, aquei q; humoris collectus in scroto. Quartus, Cirsoccele, & est quorundā uel omniū uasorū, quæ testē alunt, dilatatio. Quintus, Hydrocirsoccele, & est dilatatio uasorum unde aluntur testes, & crudi humoris ī scroto aliqua parte collatio. Sextus, Epiplocele, & est omenti lapsus in partē scroci. Septimus, Emierœpiplocele, & est intestini & omenti in scroci partem delapsus. Octauus, Sarcoccele, id est, carnosus ramex. Inuenitur etiam exōphalos, id est, pro cidentis umbilicus, & est umbilici prominētia diuersis de causis proueniens, sed nos de hernia aquosa & intestinali tantūm & inguinali uerba faciemus, &c.

Loci cōsentientes de generib. ramicū.

Gal. li. de Tum. præter naturā. c. 17, & 18, Induratis testibus ὀδρκοκήλω nomen impo-
suere: quū uerò in testiū tunicis humor aquo-
sus colligitur, ὕδροκήλω: si uerò omētum in
testiū tunicas descēdat, ἐπιπλοκήλω: si uerò
peritoneū ī inguina profluat, βεβωνοκήλω:

si circa umbilicū, Ἰσχυρόμφολον, & uide Gal. li. finit. med. Auic. 22. cap. 2. enumerat etiā octo species herniarū, quæ sunt uentosa, aquosa, saniosa, carnosæ, uaricosa, zirbalis, intestinalis, & apostemosa, & hoc sub ruptura nomine. Caput deinde aliud facit de umbilici augmento, quod alij de eminētia inscribūt, & habet tot species, quot de herniis nuper diximus. Vnde uentosa à Græcis dicitur πνδρμόμφολον, carnosæ σαρκόμφολον, aquosa ὑδρόμφολον, Zirbalis ἐπιπλόμφολον: & est omenti in umbilicū decursus, & sic de singulis. Lege de his fusius iuxta Aet. ser. 14. ca. 22. 23. & 24.

De causis ramicum.

Causæ sunt intrinsecæ & extrinsecæ, sicut casus, percussio, plaga, saltus, uel quicūque alius motus uiolentus. Causæ intrinsecæ sunt per se notæ: nā à flatu flatuosa in parte abdominis cōtenta, uaricosa à latitudine uenarū & ab earū imbecillitate prouenit: aquosa ab aqueo humore in scrotū delapso, & sic de reliquis. Hæc autem proueniūt peritonei membrana aut nimium extenta aut rupta, &c.

Loci cōsentientes de causis ramiciū.

Aet. ser. 14. cap. 22, Aquosa hernia interdū ex occulta, interdū à manifesta causa cōtingit. Ex occulta, quum aquosus humor circa partes corpusculorum, quæ scrotū contexunt ac implicāt, sanguini admixtus, collectus fuerit: ex manifesta, quum ex plaga collisis uel fractis nasis sanguis affluens in substantiam aquosam transmutatur. Galen. lib. de Tum. præter naturam ca. 18, Interiori membrana quam Græci *ἐντόναιον* uocant, uulnerata ac rupta fiunt ramices, &c. Lege hunc locum fusius. lege etiam Auicen. fen. 22. cap. 2. ibi, Ruptura fit propter solutionem paniculi, &c. lege etiam Arcul. & Paul.

De signis ramicum.

Signum commune omnibus rupturis est tumor inter abdomen & peritoneum apparēs. Signa herniæ apostemose sunt signa abscessuum communia, scilicet tumor, durities, grauitas, dolor, & quod paulatim augetur. Signa herniæ xirbalis sunt, quia paulatim aduenit, non sentitur, rugitus est parue quantitatatis, nec multū ad profundum olei se ex-

redit, nec resupinato agro ita facile reuertitur ac intestinalis. Signa enterocoeles, id est, intestinalis sunt, facilis reductio, cum resupinatur, rugit dum intromittitur, nisi uel flatus, uel siccae faeces in causa sint, ne tam citò introducatur: est praeterea magnae molis, acciduntque dolores uehementissimi, dum oeseum extendit, & testiculum comprimit. Signa aquosae sunt, quod tactui cedit, & extenditur oeseum: cognoscitur etiam per eius splendorem, lenitatem: item quia cum mollitiae grauis est, & paulatim fit, nec quocunque ager situetur, interiora petit. Signa flatuosae sunt, quia redit absque dolore, statim facta compressione, absque quod ager resupinetur, etiam percussa resonat: nec adest grauitas, nec lubricitas, sed cum lenitate tendit. Signa sarcocoeles, id est, carnosae sunt, quia cum duritiae tumet, & est absque dolore: non augetur, nec minuitur. Signa uaricosae sunt, quia ipsa est dura, oblonga, ueluti uirga, cuius crassities excedit aliquando crassitiem digiti: cognoscitur etiam ex repletis uenis, &c.

Loci cōsentientes de signis ramicū.

Auic. 22. cap. 3, Signum autem cōmune rupturis est additio apparens, et sentitur inter sisach et mirach. Signum herniæ intestinalis est redditio eius cum uelocitate cū resupinatur, et sensibilitas rugitus, et propriè quum premitur. Hernia uerò ex xirbo et sisach cognoscitur ex aduentu eius paulatim, et c. lege eum fusius: lege etiam Arcul. 9. alm. Item Aet. ser. 14. cap. 22. et plura intelliges.

De curatione ramicum.

Scopus curandi hydrocelem et flatuosum ramicem est, causam à qua humor aquosus uel flatuosus gignitur, amouere. Quod fiet primò cum phlegmagogis, uel aquosum humorem educantibus pharmacis siue clysteribus, deinde cum resoluentibus, sicuti cum farina fabarum, cimino, emplastro de baccis lauri, et similibus: deinceps prohibendum est ne noua eodem in loco aqua uel flatus generetur. Prohibent nonnulli extrahendo aquā, alij cū cauteriis urendo usque ad epidimin, quem Arabes didimum uocant, sed reuera in hoc casu uisionem ualde timeo: nam si epidimis

totus uratur, uereor ne testes corrumpantur.
 Si minus, certum est quòd per partem non u-
 stam adhuc aqua descēdet: quare satius mi-
 hi uidetur aquā resoluentibus extrahi, quā
 urentibus. Cura enteroceles & epiploceles, id
 est, hernia intestinalis & xirbalis in duplici
 inuentione consistit, in reductione scilicet in-
 testinorum ad suum situm, & in retentione
 in situ suo conuenienti, & in constipatione
 seu consolidatione rupti ac laxati. Reducū-
 tur ad suum situm intestina & omentum, si
 resupinato patiente cruribus sursum eleuatis
 leui manu comprimantur, & leuiter agiten-
 tur, quibus ob uentum renitētibz primum cū
 resoluentibus ac discutientibus mollientibz ūs-
 que flatum succurrimus, ut cum decocto al-
 theæ, camomillæ, melliloti, semine lini, fenu-
 græci, anisi, cimini, cum spongia applicato,
 uel cum oleis camomillæ, anethi, amygdalarū
 dulcium, adhibita interim diligētia, ut emol-
 liētibus ac unctuosius clysteribus faeces extra-
 hantur. Retinentur etiam in suo situ intesti-
 na pluribus mediis, primò cum fotu ex aqua
 uino & aceto decoctionis gallarum, nucum,

cupressi & aluminis. Secundo, cum cerato de pelle arietina, descriptione Gerili, stringendo locum in quo eminentia apparet cum angulo, quod vulgo bracherium dicitur, non mutando id, nisi ad decimum quartum diem. Tertio, cum potionibus constipantibus, unde aliqui utuntur, scrupulo uno limaturæ chalybis cum uino, in quo hepatica terrestris, gallæ virides, & nuges cupressi incoctæ sint. Quarto, cum manuali operatione, sicut cum incisione ac actuali, siue potentiali ustione. Et modum incidendi docet Auic. & Albucasis, & plerique alij, quos videre poteris. Cura sarcocèles, id est, carnosæ herniæ, eo modo erit perficienda, ac si esset quidam scirrhus. Similiter apostemosum ramice curabis non aliter, ac curari solet alij abscessus: eminentia uero umbilici eandem ferè curationem requirit, ac de herniis dictum est, &c.

Loci consentientes de cura
ramicum.

Aet. ser. 14. ca. 22, Tutissima itaque curatio herniarum chirurgia & ustione perficitur, si peritus artifex contingat: potest etiam medicamento scrotum inuri, & consumpto humore &

Ppp. i.

cicatrice inducta firmari, &c. Gal. meth. 14. c. 13, Quòd humor qui in hydrocelis uisitur, alienus à corporis substàtia tota natura sit, si cuti etiā quæ in ascitis hydropibus continetur aqua, dixisse sufficit, quarū certè euacuationē uel medicamentis quæ digerant molimur, uel chirurgia in hydrocele quidem immisso sypho ne, in asciti adhibita punctiōe, quā paracetes in uocant, &c. Vide hac de re Arc. 9. almans. Auic. & Marc. Cat. Auic. 22. ca. 5, Si ambo ad osseum descendant, possibilis est reductio cum resupinatione & qualibet compressione cum manu. Quòd si addatur ruptura, incipiatur in desiccādo illud quod dilatariū est propter humiditatem, & adunādo quod scissum est, & ingeniatur in cōsolidatione eius. Quòd si fiat inobediens ad redeundū, se-deat ager in aqua calida, & emplastretrur ruptura donec redeat, deinde cōstringatur, &c. De cura sarcocoles lege Gal. 14. meth. c. 17, nam cum scirrhis eum enumerat.

Obseruationes circa regimen.

Auic. 22. c. 4, Regimen uniuersaliter habentibus rupturam est dimittere repletionem &

motum plurimum, & saltus, & incestum subitum & coitum. Item dimittere cibos inflatuos, & non multum uti potu aquæ, & dimittere omnes res mollificantes, &c. B. Cōsidera quod cuiq; ramicis speciei uictus ratio sit in contrarium exhibenda.

Cōferētia enterocelis & hydrocelis.

Conferunt enterocelis & hydrocelis barba hirci, bdelliū, adeps canis cū alumine scisso, cupressi folia & nucus, glutē de corijs, muscus, herba, plātago, psylliū, semen lini cū resina & myrrha, pētaphilon, ruta sylvestris, symphitū, betonica, tritici paleæ, filix herba cum axungia, lenticula in modū emplastri, peucedanū, cerotū de pelle arietina. lege de his in cōsilijs Montagnana. Item Gord. Sauo. & Arcul.

De prognosticis ramicum.

Auic. 22. c. 2, Et scias quod ramex intestinorū & tribi est aegritudo multū difficilis, quātumuis sit parua, & ramex aquæ est aegritudo facilis, & si sit magna: ramex uerò ramicosus ac carnosus difficulter aut nūquā sanatur, & tandē oēs ramices inueterati, ac lōgō tēpore facti, suspecti sunt, ne testes corrūpāt.

Ppp. ij.

Aet. ser. 14. c. 24, Caterū nosse expedit intestinorū herniā, qualiscūq; fuerit, semper aquosa deteriore. Gord. Et quū pertransit septem dies, tunc labia fiunt dura & obturata, quorum unio uidetur impossibilis, &c.

De gonorrhœa.

Quod seminis profluvium Latine dicitur, Græcè γονόρροια ἀπὸ γόνος, quod est genitale semē, & ρεῖν quod est fluere, appellata est, quæ nil aliud est quàm inuita ac præter uoluntatem & pudendi tensionē, seminis excretio. Sunt tamen qui differentiam inter semen & geniturā esse dicant, ut semen tantum in his esse uelint qui generare adhuc non possunt, econtrā uerò genituram.

Loci consentientes de gonorrhœa.

Gal. 6. de loc. aff. ca. 5, Gonorrhœa est inuita ac præter uoluntatē seminis excretio. Et paulò post, significantius dices esse assiduam seminis excretionem haudquaquam cole extenso. Aet. ser. 11. cap. 33, Gonorrhœa est seminis excretio præter uoluntatem ac pudendi tentionem.

De causis gonorrhœæ.

Causæ sunt uel spermatis copia, uel eius tenuitas & acrimonia, uel multitudo eorū quæ generant sperma, uel erunt imbecillitas retentricis aut facultatis, aut expulsiuæ fortitudo in seminarijs uasis: uel gonorrhœa ex conuulsione contingere potest, aut ex renibus ob eorum adipis liquefactionem, quæ fieri potest à nimio coitus desiderio, aut à multitudine coitus, aut eius cogitatione.

Loci consentientes de causis gonorrhœæ.

Gal. 6. de sympt. cau. ca. 4, Gonorrhœa si pudendo non inteno euenerit, retentricis facultatis in seminarijs uasis imbecillitatem sequitur. Si uerò inteno cole acciderit, conuulsioni quodammodo similis erit affectus, &c. Vide Gal. 6. de loc. aff. ca. 5. ibi, Nam sicut retentio, &c. Vide etiam Aet. II. ca. 33. ibi, Fit gonorrhœa ex uasorum seminaliū fluxione, &c. Vide etiā Auic. 20. c. 30. ibi, Causa aut est in spermate, aut in uasis seminalibus, aut in renib⁹ & lacertis, aut in principijs ex spermate uel ob eius copiam, & tenuitatem, &c.

Ppp. iij.

De signis gonorrhœæ.

Signa quando fit ex multitudine seminis sunt, quia ad copiam coitus nulla corporis imbecillitas siue diminutio sequitur. Signa tenuitatis seminis sunt manifesta inspicienti sperma. Signa mordacitatis seminis sunt, quia in exitu dolor percipitur, adest ardor urinae, & color eius ad flauitiem decliuus est. Signa imbecillitatis retentricis sunt, quia sine erectione uirgæ semen egreditur: si à cōuulsione hoc malum proueniat, aderit erectio, &c.

Loci consentientes de signis gonorrhœæ.

Auic. 20. ca. 31, Illam, in qua causa est spermatis multitudo, non sequitur debilitas & diminutio cum multitudine coitus, &c. Et illa quæ fit à tenuitate eius, cognoscitur cum turmis spermatis præsentia. Et illa quæ fit propter acuitatem & mordicationem eius, sentitur ipsa in egressione, &c. Lege Aet. ser. II. ca. 33. & Gal. 6. de loc. aff. ca. 5. &c.

De cura gonorrhœæ.

Similis erit huic cura, qualis in omni fluxu

parari solet. primò cū paucō cibo & potu, & si à lassa retentrice gonorrhœa oriatur, cata-
 plasmatu, in seſſionibus adstringentibus uten-
 dum, ex lentisco, rubo, myrtho, acatia, hycisthi
 de paratu. Si fiat à multitudine seminis, eua-
 cuetur primū, deinde sperma exiccetur. Exic-
 cant sperma rad. nenupharis. 5. lactuca, por-
 tulaca, ruta, agni, id est casti, folia salicis, ci-
 minum, calamentū, myrrha, euphorbium, item
 diaciminū, &c. Si fiat à tenuitate spermatis,
 tēperetur cū stypticis calefaciētibz exiccā-
 do, & craſſitiem inducēdo. Si à facultate ex-
 pulsoria, tunc utēdum est frigidis & parum-
 per stupefacientibus, &c.

Loci consentientes de cura
 gonorrhœæ.

Auic. lo. ci. c. 32, Minoretur cibus, fiat eua-
 cuatio, & administrentur ea quæ exiccant
 sperma, & minorant ipsum. Euacuatio tenui-
 tatis eius est cū eis quibus inest stypticitas, &
 calefactio cum exiccantiis permixta, &c. Vi-
 de illum fusius. Aet. ser. 11. cap. 33, Primū in
 quiete & paucō cibo & aqua potu affectos
 observare oportet, cibi nō facile corrumpantur.

Ppp. iij.

tur, nec difficulter permutentur, & resiccan-
di uim habeant, &c. B. Quòd sint in quiete,
intelligendus est Aetius in primo morbi tem-
pore: nam post hoc exercitijs agros esse com-
mittendos ait Paul. quibus totum corpus &
affectæ partes firmentur.

Observationes circa curam.

Cauendum est primum, ne quum crassitiem
tenuitatis genituræ inducere quæras, aliquid
in medicamentorum compositione addatur,
quod genituram adaugeat, &c.

Conferentia gonorrhœæ.

Conferunt gonorrhœæ agnus, id est castus,
aqua frigida, calamentum, camphora, lac ca-
præ cum melle potatum, castoreum cum succo
agni, casticoreû, hæmatites lapis, eruca, lactu-
cæ semen, nymphaea, portulaca, plumbi lami-
na, semen rutæ, ireos, diaprassium Nicolai, e-
lectuarium Sauo.

De prognosticis gonorrhœæ.

Aet. ser. II. ca. 33, Non solum autem uiris,
sed & mulierculis hoc malum accidit, & in
fœminis agrè tollitur, &c.

De priapismo.

Priapismus est genitalis membri tentigo in longum & latum citra ueneris appetentiam aucta, & denominatur à Priapo, quem talem mēbrū habuisse suapte natura finxerūt homines. Sunt qui hanc affectionem Satyriasm nominent, à Satyro etiā priapo dictam: sed quū Pau. distincta capita de satyriasi & priapismo habeat, describatūque ab ipso ἢ Ἐπειάσις ὅτι παλμὸς τῆ ἀσδοίου, &c. fecit ut rem à priapismo distinctam aliquammodo esse dubitarem ob eorum causam, de qua infra fusi⁹ dicitur.

Loci consentientes de priapismo.

Gal. 6. de loc. aff. c. 5, Priapismus est, cū coles & in lōgitudine & circulo totus augeatur, nullo stimulante ad libidinē desiderio, aut acquisito calore, ut quibusdā accidit, qui supini decumbunt. Lege similem descriptionem iuxta Galen. 9. de cōpos. med. per loc. cap. 9. ibi, Priapismus est auctio pudendi, &c.

De causis priapismi.

Causae huius affectus sunt tres, prima arteriarum ora immodicē patentia: secunda, va-

porosus spiritus in fistuloso neruo ortus: tertia, est rei uenerea abstinentia. Ora arteriarum patent uel ob humorum uicia, uel ob flatuosum spiritum sine ordine & uiolenter euacuatū: flatuosus uerò spiritus fit ab humore uiscoso crassoque, cum caloris paucitate. Abstintēia rei uenerea accidit ob seminis re-
 tenti multitudinem, &c. Saryriasis, de qua superius mētionem fecimus, est assidua colis palpitatio, quæ cum uasorum seminis inflammatione, interdum cum intentione accidere solet: quæ si tantū à flatuoso spiritu fiat, nullo modo à priapismo differre potest.

Loci consentientes de causis
 priapismi.

Gal. 6. de loc. affect. cap. ult. Fit priapismus uel ob arteriarum ora immodicè patentia, &c. Lege etiā Gal. in lib. de Tum. præter naturam ca. 15. ibi, Pudendorū rēiones præter naturam quæ non desistunt, quidam $\alpha\tau\upsilon\epsilon\alpha\sigma\mu\acute{o}\nu$, quidam $\omega\pi\rho\iota\alpha\pi\iota\sigma\mu\acute{o}\nu$ nuncuparūt. uide horum differentiam postea, 6. de loc. aff. cap. ult. Vide etiam causas flatuosi spiritus, 14. meth. ca. 7. Itē 6. de sympt. cau. ca. 2. De

satyriasi, uide Paul. de prima palpitacione locutū. De secunda fecit mentionē Aet. unā cum priapismo. Auic. 20. c. 37, Causa propinqua tensionis est multitudo uentositatis crassae in partibus membrorum coitus aut materiae uetosa, in ipso morbo concocto, aut superueniēs eis ex arterijs aut uasis spermatis.

De indiciis priapismi.

Indicia p se sunt manifesta ex definitione data, & ex infirmi relatione: lege tamen Gal. 14. meth. ca. 5, In ijs qui sic sunt affecti, etiam inuitis pudendum arrigitur. quod ubi uiderit quispiam, statim intelliget esse ex inflammationum genere, &c.

De cura priapismi.

Si causa fuerit materia flatum efficiens, tunc tres medendi intentiones insurgunt: prima regimen uictus, secunda est euacuatio, tertia materiae discussio & resolutio. Regimē sit attenuans absque manifesta caliditate. Euacuatio fiet uel per sanguinis missionem, uel per purgationem, tum per uomitum, tum per ea quae per inferiora soluunt. Residuum materiae discutitur per frictiones crebras, per

exercitium & balnea ex aquis digerentibus,
 & per ea quæ unico uerbo calefaciunt & ex-
 iccant. Sed interim per initia si calidior ma-
 teria fuerit, ea imponenda quæ caloris pro-
 portioni respondeant, ut cum cerato rosaceo,
 infrigidante Galeni, cum lamina plumbi, &c.
 Digesta materia tunc ad dissoluentia acce-
 dendum sine calefactione uehementi: si autem
 cum camomilla agno, id est casto, &c.

Loci consentientes de cu-
 ra priapismi.

Aet. ser. 2. cap. 32. loquens de regimine in-
 quit, Hac affectione prehenso, inedia usque
 ad tres dies adseruare conuenit, utendumque
 esse cibis qui leniter attenuare ualeant citra
 manifestam caliditatem, &c. Itidem ait Gal.
 14. meth. & cap. 8. & 9. de compos. med.
 per loc. cap. 9. ibi, Palam est non oportere
 membra ipsa calefacere, sed refrigerare leniter
 per ceratum rosaceum, &c. Lege etiam fusius in
 meth. cap. 8. ibi, Principium curationis comune
 est, ut totum corpus ea quam ferre potest eua-
 cuatione euacuetur, euacuatio fiet per mis-
 sionem sanguinis, &c. lege eum fusius, &

plura à me recitata intelliges, &c.

Obferuationes in cura.

Aet. ser. 2. cap. 32. ait cauēda eſſe quacū-
que urinam citare poſſunt, & omnia quæ ue-
nerē prouocare ualeāt. Auic. ſen. 20. cap. 39,
Dimittat coitū omnino, & cogitationē in eo,
& cōſyderationē ad id quod mouet deſyde-
riū, niſi acciderit priapiſmus propter emis-
ſionē coitus: nam tūc coitus eſt curatio, &c.

Prohibentia ſatyriaſim &
venerem.

Prohibent ſatyriaſim & uenerem uitex,
allium, berbena, camphora, cicuta, cataplaſ-
mata, coriandrum, eruca, ruta, lactuca, men-
ta, ſinus muris, & nymphaea, ſalicis folia,
portulaca, roſa, plumbum, ſtannum, nepita,
faba & diaolibanum Nic.

De prognosticis priapiſmi.

Aet. ſer. 2. cap. 32, Caterūm dolores eis
contingunt, quales tetanici habent, & hi qui
reliquis membris diſtendunt, & ex præcipiti
hoc modo affecti pereunt, niſi conſeſtim eis
auxiliū feratur: quum uerò moriuntur, uēter
eorū inflatur, & frigidum exudāt, &c. Auic.

loc.cit.cap.37, Et hoc accidens quando non curatur,peruenit ad tetanum uisorum spermatis, & accidit apostema calidum cum eo, & interficit,&c.

Authores dissentientes circa Venerea.

- 1 Adserere, desyderium coitus esse tantum ex cerebro ob uirtutem imaginatiuam.
- 2 Adserere, gonorrhœam esse passionem propriam pudendi & expultricis facultatis.
- 3 Adserere,coitū nec per se;nec per accidēs ualere in .egritudinibus cerebri pituitosis.
- 4 Adserere,satyriasm esse morbum ridiculosum potius quā curandum.

Confutatio dissentientium circa Venerea.

Ad primū respōdetur,quòd duplex est desyderiū,alterū scilicet animale,quod in cōcupiscētia inuenitur:alterū naturale,ex repletionē spermatis,quā euacuare tētāt natura. Primū ut quedam cōcupiscētia à corde oritur,licet per cerebrū postea perficiatur,secundū prouenit à iecore,unde Auic. Et desyderiū coit⁹ est ab hepate,&c.igitur nō tantū ex

cerebro, sed ex alijs etiā mēbris principalib⁹.

Ad 2. dicitur, q̄ iuxta Galeni placitū gonorrhœa sit passio per se retētorie facultatis, & propria uasorū seminaliū, sed per accidens expulsoꝛia, & secundū apparentiam ipsius pudendi, & hoc affirmant Auic. & Sera. Non erit igitur proprius expultricis nec pudendi affectus, sed per accidens.

Ad 3. inquit Auic. coitū maximè præstare ad euacuationē & diuersionē superfluitatū, unde in ileo morbo præsertim iuuat, quoniā causam agritudinis, quæ fit ob amorē, remouet, & paratos cadere in agritudines phlegmaticas ex eius multitudine liberat, si moderatus præcipuè fuerit, &c.

Ad 4. Auic. Perducit hominem ad spasmus & tetanum uasorum spermatis, & interficit. Vnde morbus hic ualde timēdus est, & non ridendus, ut aliqui adserunt, &c.

De suppressione menstruorum.

Menses sunt mulierum profluvia, à uitiato humore depēdētia, eoque dicti sunt, quòd singulo mense accidunt. Tempus durationis mēstruorū multis mulieribus est à primo usq;

ad tertiū diem non paucis à primo usque ad quintū, alijs ad septimū, & rarò ad duodecimū accedit profluendo, incipitque fluere à quartodecimo anno, paucis ante 13, aut 12. nec ultra quinquagesimū fieri solet: imò à triginta quinque annis præsertim obesīs mulieribus solet cessare, &c.

Loci consentientes de suppressione menstruorum.

Gal. 6. de sympt. causis cap. 4, Menses sunt deprauatæ per uterum fluxiones, quæ expurgato per hanc partem uniuerso corpore fiunt. Paul. lib. 3. cap. 60, Mulierum plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt, paucis ante 13. aut 12. plerisque post 14. erumpunt. Haly Abb. 9. de pass. matri. latitudinem inceptions menstruorum esse inquit à quarto anno completo usque ad 14. & latitudinē desinentiæ à 36. usque ad 50. & hoc idem affirmant Auic. & Arist. 9. de animalibus, & hoc intelligitur de uniuersali durationis tēpore. Particulare uerò incipit à duobus diebus, & se extendit usque ad septem. Galen. 5. aphor. Tempus menstruatio-

nū durat à 3. die usque ad 8. quòd si ultra citràque fluxerit, talem fluxum prater naturam dicimus, &c.

De causis suppressionis
menstruorum.

Menstrua supprimuntur uel per se affecto utero, uel per consensum. Per se afficitur uterus uel ex duritie contracta, uel ex uenarum angustia, uel ratione facultatis expulsoe, quæ ob malam intemperiem oriri solet. Supprimuntur rursus, obstructis uasis, quæ ad uterum descendunt, & hoc uel ratione caloris desiccantis, uel ob copiam humorum crassorum, uel ob abscessum, uel carnem additā. Sistuntur etiā menses, si ad alia loca sanguis trāfferatur, uel ob uaria excretionū genera, &c. Per consensum etiā supprimuntur, uel ratione hepatis sanguinē non discernētis, uel ratione obstructionis totius corporis, uel aliorū mēbrorū particulariū, &c.

Loci cōsentientes de causis suppressionis menstruorum.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 4, Suppressionis causa mēstruorum uel est durities uteri, quæ

Qq. i.

uel illico ab origine cōtrahitur, uel post generationē: & hoc ratione uteri affecti, qui ex uenarū angustia, aut ex uasorū uteri cōpressionē, quū immodicē corpus crassescit, aut ex intēperie uteri procedit. Detinētur etiā menses ob materiā ipsam, quū crassum fuerit uel uiscosū quod euacuatur. Supprimūtur rursus obstructis ob huiusmodi humores, uasis, quæ ad uterū descendūt, uel ratione uniuersi corporis, &c. lege tu fusius. Aet. ser. 16. c. 51, Sistūtur menses quibus sanguis crassus est & uiscosus, & quibus ad alia loca transfertur, uelut per nares & sedē. Quin & sanguinē ex torace reiectātibus, uel quibus per uenæ sectionem multus extrahitur, &c. Lege de his causis Gal. aphor. 5. cōmem. 57. Item Auic. fen. 2 l. cap. 25. ibi, Menstrua retinentur aut propter causam propriam, aut communem, &c.

De signis suppressionis menstruorum.

Suppressio mēstruorum quæ fit à frigore, cognoscitur grauitate, somno, coloris albedine, pulsus raritate, copia urinae, & excretionē pituitosa. Quæ uerò fit à caliditate, demō-

stratur ex inflatione ac exiccatione uteri,
uel ex his quæ uterū radunt ac mordent: quæ
uerò fit à siccitate, manifestatur ex his quæ
præterierūt, præsertim ex extenuatione cor-
poris & uenarū tenuitate: quæ autem fit ab
abscessib⁹ uel carne addita per obstetricē, cū
signis abscessuū cognoscitur. Similiter quæ
fit à duritie, uel à cōceptione, per obstetricē
uteri ceruicem tangentem cognoscetur, &c.

Loci consentientes de signis sup-
pressionis menstruorum.

De signis lege Auic. 21. cap. 27, Illius quæ
pēdet à frigore, signū est grauitas somni &
profūdatio in ipso, & albedo coloris, uiridi-
tas uenarū, & raritas pulsus, & multitudo
urina, & phlegmatica egestio, & reliqua. Le-
ge eum uberius. Gal. 6. de loc. aff. cap. de
uteri aff. citat aph. 39. lib. 5. ibi, Si mulier
quæ neque grauida est, neque peperit, lac ha-
bet menstrua, huic defecerunt, & ibi alia in-
dicia suppressionis ponit: nam inquit, Graui-
tas totum corpus molestat. Item fastidium,
ut nulla adsit cibi cupiditas, horror inæqua-
lis. Quòd si inæqualitas sine horrore euenerit,

¶ 99. ij.

alienaque cupiat, iube quod obstetrix uteri
cervicem tangat: nam dictum est ab Hippoc.
aphor. 5. aphor. 34, Quibus os uteri durum est,
his uteri os comprimere est necessarium: quod si
contra duritiem clausum sit, eam pregnantem
esse conicies: quod si clausum sit cum duritie,
effectum esse uterum portendit, &c. lege tu
fusius. Lege etiam Aet. ser. 16. cap. 54. ibi, Sup-
primuntur ex frigidiore temperatura, &c.
Quod per excrementa corporis signa habere
possimus, elice ex Gal. 6. de sympt. cau. cap.
4. ibi, Talem semper refert speciem id quod
excernitur, quale est id quod in animante
redundat, &c.

De cura suppressionis men- struorum.

Cura retentionis mēstruorū duobus scopis
indiget: primum in remouenda causa, alterum
in prouocandis menstruis. Si causa igitur fue-
rit uehementissimus calor, menstrua cohibēs,
tunc prouocare ea non licet, quum sat sit ab
hoc calore superfluitates absumi. Si uerò in
causa fuerint longae aegritudines precedētes
cum imbecillitate uirium, tunc nec prouocan

da sunt, quū corpus potius reficiētibz quā
 euacuantibus indigeat. Si uerò causa fuerit
 materia pituitosa, tunc in medendo opus est,
 materiā, à qua menstrua corrūpuntur, & à
 suo naturali ordine mutātur, præparare, &
 præparatam euacuare. Præparatur crassa
 attenuādo, & obstructa aperiendo cum oxy-
 melle, sy. bisantino de duabus rad. cum aquis
 fœniculi, apij, cuscute. Euacuatur cū his quæ
 humorem superfluum educūt, ut cum agarico,
 electuario indo, diaphinicone, &c. & si qua
 mala fuerit intēperies relicta, tunc his remo-
 ueri debet, quæ stomachum & hepar robo-
 rāt, quales sunt multæ cōfectiones, &c. Quòd
 si mēses retineātur ab aliquo abscessu, cura-
 tur cura apostematū, ut pluries dictum est. Si
 causa fuerit pinguedo, tunc adhibitis resol-
 uētibus curabitur, cum exercitijs & ieiunijs,
 &c. Si causa fuerit aliquod ulcus, tunc cura
 erit impossibilis: & si quid curæ fuerit, tunc
 per regimen & frequētem uena sectionē fiet,
 ut sanguis per tenuem uictum & sangui-
 nis missionem, qui fluere per intestina con-
 suenerat, discutiatur ac euacuetur. Prouocāt

Qqq ij.

deinceps menstrua decoctum quinque rad.
cum sabina, pulegio, calamento, mentastro,
origano cum syr. de duobus uel quinque rad.
Prouocant ualenter trochisci de Razes, cas-
sia lignea, crocus, cinnamomum, borax auri-
ficum. Item balnea, frictiones & cucurbitulae
poplitibus ac coxarum parti domestica ap-
plicitis, item saphenae uenae incisio, & pessaria
ex mercuriali & melanthio cum musco
in rara syndone, &c.

Loci consentientes de cura sup-
pressionis menstruorum.

De cura lege Aet. ser. 16. cap. 53. ibi, Quae
ob nimiam caliditatem non purgatur, quam
maximè humectare oportet cum balneis, &
uberiore ac humidioris cibo & potu, quae
ob nimiam frigiditatem oppositam curatio-
nem exposcunt, &c. Gal. aph. 5. comment. 36,
Intentio sanationis est primùm ora uenarum
adaperire, quae ad uterum pertingunt, sangui-
nemque extenuare, deinde purgationem ad-
hibere: nam quando crassi euacuantur hu-
mores, tales sanantur dispositiones, &c. De
prouocandis mēstruis lege aph. 28. lib. 5. ibi,

Suffitus aromatu muliebria ducit, sæpius uerò & ad alia utilis esset, nisi capitis facerent grauitatē, &c. B. Veritatē nō cōtinet apho. in omni mēstruorū suppressione: nā si detinētur mēstrua ob uteri inflāmatōnē, aut rēsiōnē, aut ob alias similes causas, nihil suffitus aromatum prodesset, sed si sistuntur ratione sanguinis crassi uel obstructionis uasorū aut substantiæ dēsitatis, uerū est, quod per aromatu suffitus mēses euocātur, quū crassa extenuat, obstructa incidēdo reserat, & obserata aperit. Quæ uerò sint aromata docet Ga. esse amomū, cassiam, costū, cinn. &c. Vide Auic. 21. tr. 3. ca. 28. Vide etiā Arc. & Marc. Cat.

Prouocantia menstrua.

Prouocant menstrua absinthium, acorus, agaricus, agnus castus, allium, aloes, amaracum, amygdalæ amaræ, abrotanum, artemisia, assa, ciclamen, calamentum, chamædrys, chamæpithys, camomilla, cantharides, castoreum, centaurium, cinnamomum, cupressus, cyperus, cucumer agrestis, naucus, helenium, eupatorium, phaseoli rub. lens syluestris, galbanum, ammoniacum, iris lupini,

Qqq.iiij.

maiorana, cuscute, laurus, landanum, mar-
rubium, melissa, mentastrum, matricaria,
mercurialis, myrrha, nasturtium, ouum ana-
tis, organum, oximum, papauer rub. pastina-
ca, peonia, peucedanum, pulegium, rapha-
nus, rosmarinus, rubea tinctarum, ruta, sam-
bucus, salvia, satiregia, sauina, serpillum, si-
napi, scamonium, scilla, spica, urtica, usnea.
Composita sunt diacalamentum, diatrion, pi-
pereon, diaprasiū, troc. de myrrha, theria-
ca magna, triphera magna, pilula fetida de
serapino.

De prognosticis suppressionis menstruorum.

Aet. ser. 16. cap. 52, Suppressis menstruis
sanguinis reiectionis ac syderationis peri-
culum imminet, &c. Lege nonnulla etiā iux-
ta Gal. 6. de loc. affe. cap. 4, Quæ intelli-
tam possunt de menstruis quàm de retēto se-
mine. Auic. 21. tra. 3. cap. 26, Suppressis men-
sibus ei cui uirrus ad excernendum est potēs,
assimilatur utris, & multiplicantur capilli,
& nascitur ei ueluti barba. Quare frangitur
forma eius & incrassatur, deinde moritur, &

interdum prouenit ante mortem ad dispositionem, cum qua non est possibile ut prouocentur menstrua. Hippoc. aphor. 5. apho. 34, Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum. Et aphor. 57. eiusdem, Si menstrua plura fiant, accidunt morbi: & si non fiant, ex utero morbi contingunt. B. Quasi dixerit, si menstrua detinentur, necesse est processu temporis ipsum uterum pati: lege Gal. comment. Et aphor. 5. aphor. 61, Si mulieri cessent purgationes, neque febris neque rigor superueniat, & fastidia accidant, iudica ipsam in utero habere.

De mensium profluuiio & eius causis.

Duplicem hic affectus habet causam, uel ab utero unde emanat, uel ab ipso humore fluente. Prima fit aut ab uteri imbecillitate, aut ab eius uenarum apertione, aut à quopiā ulcere corrodeute uel scissura. 2. bifariā fieri contingit, uel ab ipsius sanguinis quantitate uel qualitate. Quantitate uel causa repletionis nimium corpus aggrauantis, unde fit euacuatio, quæ uel naturalis uel non natu-

ralis erit. Naturalis, quum à natura ita fiat, ut superfluum tantummodo expellatur: non naturalis, quum ob suam multitudinem & dominium immodicè profluat: qualitate, uel causa caliditatis sanguinis uel tenuitatis. Interdum etiam superfluunt menstrua causa abortiui fœtus, uel ob partus grãdiores, &c.

Loci consentientes de causis profluuii menstruorum.

Gal. aphor. 5. comment. 57, Fit immodica menstruorum euacuatio, si ora uasorum quæ ad uterum pertingunt, ultra modum aperiãtur, aut si sanguis uel calidior uel tenuior fiat, aut sua multitudine modum natura cõuenientem excedat, aut totum corpus aggrauet, &c. Lege etiam Auic. 21. tract. 3. cap. 2. ibi, Superfluitates quandoque fiunt secundũ semitam ægritudinis, aut propter dispositionem in matrice, aut propter eius debilitatẽ, aut malitiam complexionis, aut propter ulcera & corrosiones, &c. Lege etiam Paul. lib. 3. ibi, Fit etiam ob partes grandiores & crebrò ob abortiui fœtus causam, &c.

De signis profluvii menstruorum.

Signa menstrui ab imbecillitate uteri, aut ab apertione uenarum prouenientis erunt, si sanguis exierit purus, nullum dolorem inferens ab ulcere, si profluat paulatim, & maximo cum dolore prodeat. Consideretur tamen & quantitas ipsius fluentis sanguinis, & modus delationis: nam amplioribus uasis ruptis magna sanguinis copia statim profluit, minoribus uerò nō itidē. Signa ex quantitate sanguinis nimium corpus replētis sunt. Signa repletionis, ut uenarum latitudo, exuberans faciei & corporis repletio, quæ interdum cum dolore est. Signa, quando fit à mala qualitate, sunt, caliditas, tenuitas, acrimonia & color prauus. Signa immoderate euacuationis sunt, color fœdus, pedes tumescunt, concoctio uitiatur, & prosternitur corporis robur, &c.

Loci consentientes de signis profluvii menstruorum.

Auic. 21. tra. 3. cap. 3, Factam à debilitate matricis & apertione uenarum significat exitus sanguinis puri non dolorē faciei, &c.

lege eum fusius. Gal. 6. de loc. aff. ca. 4, Quñ immodicè euacuantur, sequitur color fædus, pedes molli tumore attolluntur, corporis robur prosternitur, ciborum tum concoctio, tum cupiditas uitiatur, atque in totum omnia quotquot immoderatam sanguinis euacuationem siue ex hæmorrhoidè, siue alio quopiam sanguinis fluore euenientem sequi consueuerunt, accidentia huiusmodi fæminas infestant, &c. Lege Arcul. & Aet.

De cura profluuii menstruorum.

In superfluo mensium fluxu binæ requiruntur intentiones, quarum altera in remouenda fluxus causa consistit, altera in retinendo fluxum: uerùm in praxi ultimū quod est in intentione, primum esse debet in executione. Si igitur causa multitudinis sanguinis menstrua superfluxerint, tunc sectione uene, & uictu tenui, qui sanguinem non adaugeat, succurrendum. Si uerò continui ac calidi sanguinis fluxus accidat, tunc sanguis cum syr. ros. de granatis, de suc. acer. cum aquis acetosæ, portulacæ, plantaginis alteretur: & si quid bilis secū admixtum sit, eua-

cuetur cum myrobalanis, cassia & rheub.
 Deinde sanguinis discrasia cum diarrhodo-
 ne, tria sandalis, uel cum epithemate ex aqua
 ros. plantaginis & unctionibus frigidis re-
 moueatur. Si uasorum apertio in causa sit,
 per obturationem, & ruptura per congluti-
 nationem, & erosio per renutritionem cu-
 rabuntur. Si causa fuerit uteri imbecillitas,
 per aromata styptica, quæ sua proprietate
 roborant, curabitur: si causa fuerit ulcus, tunc
 opus sunt duæ intentiones, abstersio scilicet
 & conglutinatio, &c. Et hæc de prima in-
 tentione. Secunda, intentio est sanguinis co-
 hibitio, quæ duobus medijs perfici potest, pri-
 mo diuersione, ut sanguinem ad alias partes
 reuocemus: secundo cohibitione, restringendo
 & uiam intercipiendo per quam sanguis de-
 bet fluere. Diuersio igitur fiet per sectionem
 uenæ hepaticæ uel basilicæ, aut per imposi-
 tionem cucurbitularum sub manibus ante cibum,
 uel sub brachijs cum uehementi frictione. In-
 terceptio uiarum per quas sanguis fluit tum
 intrinsecè tum extrinsecè fieri potest: intrin-
 secè cum syr. frigidis stypticis, qualis est syr.

990 DE CONSEN. MEDIC.

ros. myrthinus de portulaca, cum aquis plan-
eaginis, solatri, acetosæ, quibus adijci potest
eroc. de charabe, de terra sigillata, de spo-
dio, cum semine acetosæ, item pilulis corallo-
rum rub. lapidis hamatidis, electuar. de scoria
ferri & triphera ex arte phemonis, &c. Va-
lent etiam in hoc casu nascalia ex coto in
suc. plāg. immerso cum bolo armenio sangui-
ne draconis, &c. Itē balnea & inunctiones
ex rebus stypticis, ut ex rosis cort. granatorū,
gallis, ballaustijs, acatia, hypocysthide, &c.
Quæ omnia quum nihil profecerint, ad nar-
cotica, considerata primū uirtute, refugiē-
dum, qualis est athanasia Nic. & phyloniū.

Loci consentientes de cura.

De cura lege Auic. 21. tra. 3. cap. 4. ibi,
Facta à multitudine aggrauante corpus, &c.
Si fiat à bile, euacuetur cum myrobalanis, in
quibus est uirtus styptica: si ab uteri imbecil-
litate, dentur aromata, &c. Gal. 7. de cōpos.
med. per loc. cap. 4, Osculi uasorum apertio
per oburationem, & ruptura per congluti-
nationem, & erosio per renutritionem cura-
tur, &c. Et meth. 5. cap. 4. & 5, Existimāda

est profusionis quantitas: nam si perruptum
 uas aliquod magnum est, aut uehementer re-
 clusum hiat, utique adstringentibus medici-
 nis opus est, ueluti balaustio, hypocysthide,
 omphacio, acatia, gallis immaturis & mali-
 corio. Sin uel exiguum uas est perruptum, &
 non multus profluit sanguis, tunc aloe, &
 manna, & pini cortex, & lematum sigillum,
 lapis hematites, & alia similia ex austero
 uino nigro utilia medicamenta. Vide etiam
 de cucurbitulis ad mamillas applicandis
 meth. 13. cap. 19. ibi, Sic nanque ad mamillas
 cucurbitulas imponimus, quum sanguis ex
 utero profluit. Itidem meth. 5. cap. 3. Hippo.
 aphor. 5. aphor. 50, Mulieri si uis menstrua
 cohibere, cucurbitulam quã maximam ad
 mammas appone, &c. De regimine uictus le-
 ge Aer. ser. 16. cap. 64. ibi, Imperandum est
 unius aut alterius diei ieiunium, &c. Lege
 etiam Auicen. fen. 21. cap. 4. ibi, Cibetur
 ipse cum eis quæ sunt uitelli ouorum, &c.

Sistentia ac supprimentia
 menstrua.

Sistent ac supprimunt menstrua acatia,

acetosa, alumen, aizoon, aqua aluminosa, ba-
 laustia, barba hirci, bolus armenius, blacta
 pisantia suffumigium, castanearum cortices,
 cauda equina, cornu cerui ustum, cicuta, ci-
 tonia, coagula, consolida, coralli, coriandrū,
 lapis hematites, hepatica, uinum extinctio-
 nis ferri, finus caprae, gallae immatura, gy-
 psum, gumi arab. glādes, granatorum cort. &
 flores hyosiami, charabe, lapis iaspis, len-
 res, lentiscus, lycium, semen mādragora, mar-
 garita, mastix, menta, millofolium, myrrha,
 myrthus, frondes mori, mumia, nymphaea, oli-
 banum, oliua, polygonium, portulaca, corti-
 ces interiores quercus & ulmi, rota, rubri,
 sanguis draconis, siliqua Aegyptiae come-
 stae, solairū, sumach, scoria ferri, uernix, spo-
 dium, spica inda, uirga pastoris, flores uitis
 agrestis, hypocysthidis succus, peunidi acerbis
 & agrestis. Compos. sunt conf. alchechengi
 Auic. 1. 5. cōfectio scoriae. Auic. 3. 5. diaoliba-
 num Nic. phylonium Persicum Mes. syr. de
 myrtho, de portulaca, theodoricon magnum,
 Triphera minor fenonis, Mes. Troc. de terra
 sigillata, de charabe, de spodio, de chileta,

athanasia Haly. 6. ant. etc.

De prognosticis suppressionis
menstruorum.

Hip. aph. 5. aph. 56, In fluxu muliebri si
cōuulsio & animi defectus aduenerit, malū.
B. Nā ad omnē immodicā euacuationem, tā-
quam casus cōmunis, animi defectus accidere
solet. Vnde Gal. meth. 5. ca. 5, Profluere pro-
hibetur ob animi deliquiū, quod sæpius acci-
dere solet, etc. Et aph. 5. aph. 57, Si mēstrua
plura fiāt, accidunt morbi: & si nō fiant, ex
utero morbi cōtingunt. Auic. 21. ca. 2, Et illud
est deterius, quod ex cōplexionis malitia ori-
tur. Et quū superfluit sanguinis fluxus, sequi-
tur debilitas appetitus & digestionis, aut ex-
trematum inflatio, & coloris malitia, &
interdum perducit ad hydropem, etc.

De doloribus iuncturarum, siue ar-
ticulari morbo & podagra.

Dolor iuncturarū est tristis sensatio earū
à mala intēperie, uel à soluta continuitate eis
accidēte proueniēs. Cuius species sunt arthri-
tis, podagra, ischias, gonagra & chiragra,
Morbum igitur articularis, quē Greci ῥ-
Rrr. i.

τὸ πλὺν uocant, est defluxus humorum ad artus siue iuncturas pedum ac manuum, cum dolore & tumore. Podagra est pedum affectio, ab humore calido uel frigido, dolorem inferens, etiam nervis patientibus. Ischi. us est coxarum dolor diuturnus ac difficilis, à materia fluente ad uertebras ischia, & ligamēta, usque ad poplites & suras. Gonagra est inflammatio genuum cum intenso dolore. Chiragra est manuum dolor, à materia in nervis & tendonibus manuum contenta.

Loci consentientes de dolo. &c.

Gal. lib. fen. med. Arthritis morbus est inflammatio articulis accidens, quæ magnum dolorem nervis patientibus adfert. Et apho. 6. comm. 49, Podagra est inflammatio pedum à fluxione humorum causata. Paul. lib. 3. cap. 77, Coxendix est dolor à natibus inguinibusque ad gēua usque, in plurimis autem ad summū pedem pertingens. Auic. cap. de dolo. iūct. Sciatica est dolor, qui incipit à iūctura anche, & descēdit retro ad coxam, & quādoque extenditur usque ad genu & ad calcaneum, &c.

De causis articularis morbi.

Causæ efficientes uel sunt extrinsecæ uel intrinsecæ. Extrinsecæ sunt casus, percussio, propulsus, uel luxatio, labor intēpestiuus, portio frigida insueta, nauseatiua satietas, nimia repletio, & omne quod bonam digestionem impedit, & superfluitates multiplicat. Item consuetarum euacuationum retentio, item mœrores, cura, & reliqua animi pathemata. Causæ intrinsecæ sunt uel ex parte membri suscipientis, uel ex parte fluentis materiæ. Causa instrumētalis est dilatatio meatuum naturalium accidentalis, quæ fit uel propter membri imbecillitatem, aut propter eius malam intemperiem. Rursus imbecillitas membri uel erit à sui origine, uel propter caloris uehementiam, aut propter motum, uel dolores, uel causas extrinsecas. Causa materialis maiori ex parte erit pituita, sepe sanguis, raro bilis, rarissimè omnium atra bilis, &c.

Loci consentientes de causis articularis morbi.

Paul. lib. 3. ca. 78, Ceterum hoc malifre-

Rrr. ij.

quenter antecedit improbus labor, uehementis ambulatio, equitatus creber, usus Veneris interpestius, insueta frigida porio, &c. Lege eū fusius, & plura inuenies. Lege etiā Auic. 22. cap. de dol. iuncturarū, ibi, Et de causis eius sunt cibi generātes, &c. & paucitas digestionis, quies & demissio exercitiij, coitus plurimus, frequētia ebrietatis, & retētio euacuationum, &c. Lege locum uberius. Lege etiam Gal. 6. aphor. cōm. 28. ubi causam enumerat, quòd multi idcirco laborant, quia patres & auos habuere podagricos, in quib⁹ semē erat uitiatū, atque ideo natis uehementiorē fecerunt partiū imbecillitatem: ubi etiā inquit, quòd necesse est pedes esse natura imbecilliores, si quis podagra corripī debeat, &c.

De signis articularis morbi.

Signa causarū extrinsecarum habentur ex relatione infirmi. Signa intēperiei simplicis sunt, quòd dolor eius est sine grauitate, inflatione, & coloris alteratione. Signa intēperiei cū materia sunt, grauitas, tumor, quorū absentia nō semper significat materiæ priuā-

rione, quā fieri possit ut materia in profundo
 deliteſcat. Item permutatio caloris, loci &
 doloris materiam indicant flatuosam uel hu-
 moralem. Signa particularis causæ ſumuntur
 à iuuantibus & nocētib; item ex calore lo-
 ci, & ex pulſu, & ab egredientibus, & ex ho-
 ra doloris, & ex additione eius & repletio-
 ne. Item ex ætate, conſuetudine, & ex regi-
 mine præcedente. Signa ſanguinis ſunt, quia
 rubescit locus, niſi in profundo lateat, adest
 tenſio, pulſatio, grauitas, regimen ſanguinem
 adaugens, & diſpoſitio corporis ſanguinea.
 Signa bilis ſunt, calor intenſus, nulla graui-
 tas, paucitas rubedinis, dolor eſt ſuperficia-
 lis, mordicans, urina rubea, pulſus uelox, tem-
 peries bilioſa, regimen bilem generans. Signa
 pituitæ, color albus, liuidus, dolor grauās, re-
 miſſus, tumor magnus cum mollitie, non ſen-
 titur calor, urina alba, temperies pituitoſa, re-
 gimen pituitam generans, & ætas ſenectutis.
 Signa melancholiæ ſunt, dolor remiſſus, pro-
 fundus, tumor paruus cum duritie, urina re-
 miſſa, tenuis habitudo extenuata regimen
 præceſſit melancolicum.

Rrr. iij.

Loci consentientes de signis.

Auic 22. tra. 3. cap. de sig. dolorum iunct.
 Complexio simplex fit parumper raro, & fit
 in ea dolor sine grauedine absque inflatio-
 ne, & non est alteratio coloris, &c. De signis
 humorum lege Paulum lib. 3. cap. 78. ibi, De-
 prehendi facile humorum noxam inferentiũ
 discrimina posse, tum suis coloribus, tum his
 quæ superueniunt, &c. Lege eũ fusius etiã de
 particularib⁹ causarũ signis. Lege etiã Razẽ
 in lib. de iuncturis, & plura intelliges, &c.

De cura articularis morbi.

Pro cura articularis morbi siue podagræ
 quatuor opus sunt intentiones: prima erit
 auersio, quæ fiet sanguine peccante, cum se-
 ctione uenæ per rectam diametrum: aut cum
 euacuatione, minuendo materiam, sicuti cum
 pilulis de hermodactylis minoribus cũ rheub.
 aut cũ uomitu. Secũda est humoris siue calidi,
 siue frigidi digestio, quæ fit stypticis frigidis
 in causa calida, ut cũ sy. ros. de granatis cum
 aquis plātaginis acetosæ, &c. Et in causa fri-
 gida, cũ rhodomelle, deinde cũ sy. de stecha-
 de, cum aquis betonicæ, absinthij & saluia

perficitur. Tertia intentio est preparati humoris omnimodo euacuatio, unde in causa calida cōueniūt pilulæ de her. min. cū rheu. in frigida pilulæ de hermamai. &c. Quarta est doloris prohibitio, quæ fieri potest in causa calida cū repectiētib⁹ anodinis, qualis est cassia cū oleo ros. dissoluta, uel cū aqua solatri & ros. uel cū medulla panis in lacte cū uitello oui. Sed si fluxerit omnino materia, tūc anodina simpliciter conueniūt, sicuti camomilla, anethū, mellilotū, fœnugracū, &c. Ultimo cū his quæ resoluūt & emolliūt procedendū, sicut cū oleo camomillæ & stercore uaccino, aut cū balneo ex uino & rebus stypticis, &c. Cibaria in causa calida sint frigida & humida, ut ptisana hordeacea, cū ruzcharo, cucurbita, attriplies, cucumeres, & similia. Vitētur dulcia, acria & salsa: itē carnes & uina. In causa frigida uictus sit tenuis, & pro potu sit hydromel. Itidem curatur ac dixi ischias: uerūm quū in profundo materia lateat, repellētib⁹ in p̄cipio nō utimur, &c. Loci cōsent. de cura articul. morbi.

De prima intensione loquitur Auicen. 22.

Rrr. iij.

cap. de cur. dolo. iunct. ibi, Cùm autem causa in eis est cum materia, tunc opus ut prohibeatur quod effunditur per attractionem ad contrarium, & per minorationem, &c. In causa sanguinea opus ut administres phlebotomiam ex parte contraria, deinde administres uomitum, &c. Paul. In quibus sanguineus humor redundat, protinus sanguis mitti debet, qui tamen in pituitosis uel atrabilijs non est detrahendus, &c. Razes in lib. de iunct. Incipimus minuere ex latere opposito, propter duo commoda: quorũ unum est declinare materiam à suo loco, alterũ est retardare cursum materia ad locum doloris. Et in lib. diuis. Opus ut non prolongetur phlebotomia in sanguinea, sed fiat cũ incipit dolor & pulsatio, &c. Vide de his etiam Haly Abbatem, Arcul. Mar. Cat. &c. Gal. aphor. 6. comment. 28, Non influet humor, si omnino uacans superfluitatibus corpus extiterit: erit enim uacans, si mediocri utatur exercitio, & bene cibum concoxerit: unde & desidie & crapula eis nocent, &c. Lege de his cibis Razem loc. cit. ibi,

Diata sit frigida & humida, sicut aqua hordei, & cucurbita, & cucumeres, &c. Lege etiam Alexand. ibi, Vitetur dulcia, acuta, unctuosas, salsa, &c.

Observationes in euacuatione.

Mar. Cat. inquit, q̄ in euacuādo pituitā nō debemus tantū phlegmagogis uti, sed etiā cholagogis, quū pituita semper bili admixta sit, alioquin ex se non flueret. Secundo, quōd euacuantibus debemus styptica admiscere, quia constringendo vias, prohibent materiae fluxum. Tertiō, quōd à principio cum uehementi pharmaco non est euacuandum, quia tunc tenue egrederetur, & quod esset crassum, remaneret, &c.

Observationes circa digestionem.

Sera. super 9. alm. Digestium materiae frigidae debet esse calidum stypticū, dū materia fluit: sed in materia fluxa debet esse subtiliatium & incisiuū. Mar. Cat. Digestiua non debent esse ualde aperientia, nec quae nervis & iuncturis noceant, sicut oxymel.

Observationes circa percussione.

Gilbertus, Vti debemus percussu, do-

nec cesser dolor & apostematis pulsatio, & tunc cessabimus ab eis: quoniam si ulterius usi fuerimus, ingrossabitur materia, & reddetur difficilis dissolutionis. Auic. Repercussio non oportet ut fiat materia existente fortis effusionis plurimæ resumptionis: nam materiam inobediētem facit, & dolor accidit magnus.

Observationes circa resoluentia.

Haly Abb. in sua praxi, Non oportet uti medicaminibus calefacientibus & subtilian-ribus, nisi post digestionem & corporis purgationem: quoniam si aliter fiat, tunc humor aduritur & indurescit, & difficilis fit sanationis. Auic. Non oportet ut approximent resolutiva fortia in principio rei ante evacuationem, quoniam faciūt euenire materias plurimas, deinde resoluunt subtile earum, & inspissant residuum, & retinent ipsum, & hoc in materia uiscosa & melancholica.

Observationes circa motum.

Alex. Tra. Non superabundantem sequantur motum, quoniam nocet, sed utantur eo paulatim absque labore, quoniam motus generat bilem rubeam, & eam attrahit ad articulos.

Razes in lib. de iunct. Caueant ab ambulatione, equitatione, balneis, retentione urinae & egestionis.

Conferentia doloribus iuncturarum.

Conferunt doloribus iuncturarum resoluenda quaedam ac liquefacienda materiam condensatam, ut crocus, mellilotus, anisum, aloes, mastix, iris, stechas arab. Quaedam crassitiem attenuando, & ex profundo attrahendo, sicut carica, mel, lentiscus, abrotanum, apium sylvestre, calamentum, aristologia, ruta cum melle, urtica, nasturtium, gumi rutae sylvestris, ammoniacum, galbanum, euphorbium, resina terebenthina, costus, castoreum. Quaedam attrahendo & uesicando, ut cepa, allium, lac, ficus, anacardi, sapo, cortex, nouum atramentum, fermentum. Quaedam urendo & ulcerando, ut atramentum, uitriolum, staphisagria, fermentum, scilla, uernix pini, thapsia, catharides. Quaedam penetrando in profundum, ut aqua uitae, oleum terebenthinae, oleum philosophorum. Quaedam leniendo & mollificando, ut adeps anatis, anseris,

uulpis, leonis, ursi, medulla crurium vituli, cervi, asini, æsypus, mucilago, semē lini, fœnugræci, althææ, oleum uulpinum, costinum, liliorum, de castoreo, de sinapi, de nuce Rom. cum storace & assa. Quædā euacuando, ut pilulæ scetidæ, aggregatiuæ de hermodactylis, de serapino, de oppoponaco Mes. pilulæ artericæ Nic. pilulæ magistrales, confectio de turbit, &c.

De prognosticis articularis morbi.

Hip. apho. 2. aph. 46, Duobus doloribus simul eundē locum infestantibus uehementior alterū obscurat. Et aph. 4. aph. 20, Nō febricitantibus si tormina acciderint, & genuū grauitas, & lumborum dolor, purgari inferius oportere significatur. Et aph. 4. ca. 31, Lassitudine habentibus in febribus circa articulos & maxillas potus siue abscessus fiūt. Et aph. 4. apho. 33, Sed si ante morbum aliqua parte doluerint, hic morbus firmatur. Et aphor. 4. aph. 44, Quibus febres longæ, ijs tubercula uel dolores in articulis fiunt. Et aph. 4. aph. 45, Quibus tubercula uel in articulis labores fiunt, ijs pluribus utuntur cibis. Et aph. 6. apho. 22, Quicūque dolores ex dorso ad cubitū de-

scēdunt, uenæ sectio soluit. Et aph. 6. aph. 28, Eunuchi neque podagra laborāt, neque calui fiunt. Et aph. 29. eiusdē, Mulier podagra nō laborat, nisi menstrua defecerint. Et aph. 30. eiusdem, Puer podagra nō laborat ante usum uenereorū. Et aph. 49. eiusdē, Quicūque morbi podagrici fiunt, hi sedata in quadraginta diebus inflāmatione finiunt. Et aph. 55. eiusdem, Dolores podagrici uere et autumno magna ex parte mouentur. Et apho. 6. aph. 59, Quibuscūque à coxendicum dolore diuturno molestatis excidit coxa, et rursus incidit, his marcores superueniunt. Et apho. 60, eiusdem, Quibuscūque à coxendicū dolore diuturno molestatis excidit coxa, his crus tabescit, et claudicant, si non urantur. Auicē. loc. cit. Et humores crudi quum retinentur in corpore, nec euacuantur per egestionem uel urinam, nec per artem, non est longinquum quin currere faciant dolores iuncturarum. 2. Et aptiores ad hoc, ut in eis multiplicentur ista, sunt senes, et habētes ægritudines chronicas, et cōualescentes quū non reguntur cū rectificatione. 3. Et aptiora tēpora ad dolores iun-

cturarū sunt uer, propter motum sanguinis &
 humorū: & autumnus, propter malitiā humo-
 rū & digestionis. 4. Et cū succurritur dolo-
 ribus iūcturarū, in primis quādo apparēt, fit
 eorum cura facilis. 5. Quōd si cōfirmemur, &
 consuescam propriē illis qui generati sunt, &
 humoribus diuersis non curātur. 6. Et quan-
 do apparēt uarices in habēribus dolores iun-
 cturarum & podagram, est eorū sanatio per
 eas. 7. Et dicitur qui habet dolorē ancha, &
 apparet in coxa eius rubedo uehemēs triū di-
 gitorū, nō faciēs ei dolorē, & accidit ei in ea
 pruritus uehemēs, & desiderat olera, morie-
 tur in 25. die. 8. Et omne mēbrū in quo est do-
 lor iūcturarū macrescit & extenuatur. 9. Et
 dolores iūcturarū prāter sciaticā & poda-
 grā, quū curātur & eradicātur eorū materia,
 nō redeunt uelociter. Razes 12. com. Deterior
 iūcturarū dolor erit, quādo accidit ei, cuius
 pater uel auus illo laborauerit. Auic. Sunt æ-
 gritudines quæ hereditantur. Razes in lib.
 prognost. Dolor iūcturarum in iuuentute bre-
 uem fore uitam significat, & qui fiunt in su-
 perioribus, sunt satis deteriores, &c.

Authores erronei dissentientes circa
articulares morbos.

- 1 Adserere, in principio morbi articularis
semper esse repellendum.
- 2 Adserere, articulares morbos ad saniam
posse terminari.
- 3 Adserere, uenæ sectionē ex pede primū
et non ex manu esse committendam.

Confutatio dissentientium circa ar-
ticulares morbos.

Ad primū respondet Auic. cap. de cur. sci.
quòd reperiui et fortiter styptica sunt
in hoc casu multū suspecta, quoniam mate-
riam in loco profundo incutiunt, et nocet no-
cumento uehementi, et demum fit difficilis
eius resolutio.

Ad secundum, Razes in diuis. inquit, hoc
esse eis proprium, quòd per saniam non ter-
minantur.

Ad tertium, Auic. loc. cit. Et non fiat pri-
mū phlebotomia ex pede, nisi post phlebo-
tomiam in manu, materia sit ualde pauca, etc.

IOANNIS

BACCHANELLI

Regienſis, De cōſenſu
Medicorum in curan-
dis febribus, Lib. 4.

Febris quid ſit, & vnde dicatur.



FEBRIS, quæ à ferita-
te uel à feruore dicitur,
eſt calor præternatura-
lis accenſus in corde &
arterijs, ad alia membra
diffuſus, naturalibus a-
ctionibus incommodās. Qui calor duplex eſt,
alter natiuus & genuinus, alter uerò acqui-
ſitiuus ac ſpurius, qui ſi per totū corpus diffun-
datur, febrē efficit: ſi min⁹, laſitudinē inducit.

Loci conſentientes de febre.

Alex. lib. 5. cap. 1, Febris nil aliud eſt, quàm

immodicè auctus feruor, accensus præter naturā in corde & arterijs, qui secundū naturā ignis cor possidens corpori uniuerso dominatur. Gal. 2. de mor. cau. ca. 2, πυρετός ὅτι ὁ παντός ζωῶν θερμότης τις ἀμετρος οὖσα, id est, febris est totius animātis immodicus calor. Et 1. aph. Febris est cōuersio nativæ caliditatis ad igneā. Et 3. de diff. mor. c. 5, Vbi calor totum corpus infestat, febris nominatur: si uerò per totum corpus non diffundatur, lassitudo dicitur. Auic. 4. causa, cap. 1, Febris est calor extraneus accensus in corde, & procedens ab eo, mediante sanguine & spiritu per uenas & arterias ad totū corpus, & inflammatur inflammatione quæ nocet operationibus naturalibus. Gal. de difficul. respi. ca. 21, Duplex est caloris genus, alterum genuinum & corpori innatum, alterum acquisititium ac spurium.

Obiectio.

Erūne bini calores distincti, an unus & idem calor naturalis & extraneus. Quòd bini distincti sint, uidetur: nam naturalis reperaturus est, ut in 2. de fac. nat. & in com. aph.

ss. i.

1010 DE CONSEN. MEDIC.

Qui crescunt, plurimum habent caloris innati: sed in 1. aphor. est mutatus ad igneum, ut in definitione superius allata.

Responsio.

Dicimus unum & eundem calorem esse quod ad substantiam, sed esse diuersos calores quod ad fundamentum: nam aliter fundatur naturalis, quam praternaturalis, &c. Nota etiam quod febris est morbus calidus & siccus, calidus ὁ πυρετός, siccus uero potestate: nam febris si in superflua humiditate accendatur, non actu sicca dicetur, sed facultate.

De febrium diuisione.

Febrium aliqua sunt substantiales, aliqua accidentales. Substantiales sumuntur à materia, à modo motus, à quantitate. A materia, uel erunt membra continentia, ex quibus hectica, aut humores, unde putrida, aut ὀππύωντα, id est agitata, siue impellētia, ut spiritus, à quibus ephemera prouenit. A modo motus, quod ἔπος κινήσεως sit ratio motus quo calor mouetur. A quantitate, id est, à remissione & intentione illius caloris. Febres accidentales dicuntur quaecumque oppilationes & inflammationes siue a-

lios abscessus sequuntur, & nō sunt per se ægritudines sicut aliæ. Sumuntur etiā accidentales à calore, ut mordaces, mites: aut à colore, ut pallidæ, liuidæ. Febriū aliæ sunt breues, aliæ longæ: aliquæ salubres, aliquæ insalubres: aliæ interpolatæ, aliæ cōtinuæ: & harum aliquæ sunt simplices, aliquæ cōpositæ. Rursus interpolatarum tres sunt, quotidiana, tertiana, quartana. Cōtinuarum quæ à flaua bile proueniūt, duæ sunt species: altera synoche dicta, altera sortito generis nomine continua dicitur. Rursus synochæ tres sunt, quædā à principio usque ad finem æquales perdurant, quædam augentur, quædam decrescunt: primæ homoteneæ & acmaستica. 2. anabastica & apac mastica. 3. peracmaستica dicuntur. Continuarum rursus nonnullæ singulis tertijs diebus inualescunt, nonnullæ in quotidianarum figuræ progrediuntur, & aliæ in quartanarū formā.

Loci consentientes de diuisione februm.

Gal. I. de diff. feb. Principales ac propriæ febriū differētiæ sumuntur ab earū substantia, aliæ uerò ab aliquo accidente, &c. Aet. ser. 5.

ss. ij.

ca. 58, Differentia huius caloris maioris aut minoris ratione distinguuntur, & iuxta subiectum siue materiam, aut ipsum cordis corpus calore occupate, aut humores aut acrem substantiam, &c. Alex. lib. 5, Trifariam in summa febres ingruunt, in spiritibus, humoribus, & membris solidioribus: in spiritibus fit febris ἐφύμεγε, in humoribus bifariam, aut in uenis, ut καὶ σος, si humores cum sanguine computruerint, & quas συεχεῖς, id est, continuas uocant: aut extra uenas, per diuersas corporis partes putridi humores discurrent, & febres fiunt, quas Græci τυπικὰς uocant: in membris fiunt febres hecticae. Auic. Dicamus quod febres apostematum & oppilationum sunt febres accidentales, & aliae febres sunt ægritudines, lege Gal. 1. ad Glauconem, cap. 4. de hac re. Auic. ibi, Diuiduntur etiam febres, ut nonnullæ sint acutæ non acutæ, chronica non chronica, nocturnæ, diurnæ, salubres, & horribilia accidentia habentes, aliae dimittentes, aliae inseparabiles, &c. Gal. 2. de diff. feb. cap. 2, Intermittentium tres sunt omnes numero, quotidiana, tertiana, quartana:

quotidiana à pituita putredine, tertiana à flaua bile, quartana à nigra. Continuarum quæ à flaua bile proueniunt, duæ sunt species: altera synoche dicta, altera sortito generis nomine continua. B. Itidem ait 2. de cris. ca. 9. Et nota quòd συνεχὴς à continuo feruore dicitur, de qua Gal. 9. meth. ca. 4. mentionem facit, & harum uniuersum tempus in una accessione consumitur, &c.

De causis febrium in genere.

Causa febriū duplex est, extrinseca & intrinseca. Extrinseca fit ab aëre calido uel frigido, à mala qualitate, à corruptione, à motu, & ab orio. Intrinseca diuiditur in causas προκαταρχικάς, id est præincipiētes, & in προηγουμένας, id est antecedētes, & in consecutive siue cōiunctas. Procatartica est, quæ cū peractū est opus, recedit, ut exustio solis uel ictus scorpj. Cōiuncta est quæ quū adest, præsentem seruat morbum, sublata tollit, ut calculus in uesica. Antecedens uerò à coniuncta prorsus constituitur: nam hac præsentē adest affectus, & aucta augetur, & minuta minuitur, & sublata remouetur. Nota tamen

ss. ij.

quod hæ causæ, scilicet præincipientes, conjuncta & antecedens referuntur ad causam efficientem: nam causa materialis in febribus erunt membra, ut in hectica humores, in putrida spiritus: in ephamera causa formalis erit calefacere & adurere corpus, & causa finalis, cuius gratia hæc aguntur, erit sensibilis læsio operationum, &c.

Loci consentientes de causis febrium.

Gal. 1. de diff. feb. cap. 5, Quum febris sit in corde quædam præternaturalis caliditas, eius causas nunc ostendere intendimus: nam non unus est tantum generationis caliditatis modus, sed aut propter motum, aut propter putrefactionem, uel propter adhaesum alterius caloris, aut propter retentionem calidi effluxus, aut propter mixtionem calida substantiæ fiunt, &c. De alijs causis lege Gal. in lib. de cau. procatart. & primo meth. ca. 8. Vide etiam de causis caliditatis Gal. 2. de morb. cau. cap. 2. Et nota quod Gal. 4. meth. cap. 3. inquit, Externæ causæ cognitionem non nisi ad noscendos affectus, qui nostram notitiam fugiunt, utilem esse, &c.

De febrium temporibus.

Tempora febrium bifariam considerantur, aut quatenus uniuersalia, aut quatenus particularia. Uniuersalia sunt quæ totius morbi, siue febris circuitu absoluuntur.

Particularia sunt quæ paroxysmi siue exacerbationis partem metiuntur. Rursus uniuersalia non solum penes morbi essentiam, sed et penes symptomata et materie alterationem distinguuntur: nam sicut morbi principium tempus dicitur in quo morbus apparet, sic etiam principium erit, quum materia cruda nullum coctionis uestigium demonstrat, aut quum sympt. incipiunt. Similiter augmentum dicitur, quum morbus augetur, uel accidentia introduuntur, uel aliquod indicium appareat. Status erit quum morbus et symptomata non se mutando in sua dispositione maneant, aut quum signa concoctionis manifesta uideantur. Declinatio erit quum non solum febris declinet, sed et accidentia et materia iam digesta expellitur. Tempora uero particularia distinguuntur circa caloris modum: nam si calor à materia submergatur, in membro erit principium: quum uero

ss. iiij.

calor excitatur, erit augmentum: at quum intensiori gradu calefacit, erit status: & quum remittitur, declinatio seu remissio morbi dicitur. Nonnulli inter initium & incrementum inaequalitatis nomen connumerarunt, sicut interuallum ac quietem in declinationis fine, &c. Nota quid principium morbi interdum uidetur absconditum, & hoc quum morbi principium adeo breue sit, ut cognosci non possit, sicut in synocha, epilepsia & apoplexia, aut quum morbus est paucorum accidentium, aut quum in prima die morbi concoctionis indicia appareant, &c.

Loci consentientes de febrium temporibus.

Gal. lib. de totius morb. temporibus, cap. i. equiparat morbi tempora ad animantium aetates, unum quidem principium generationi eorum tribuens, alterum incremento, tertium uigori, quartum declinationi, quum aegri salui futuri sunt. Auic. 4. can. cap. 3, Febrium horae sunt sicut reliquarum aegritudinum, principium, augmentum, status apud ultimum, & declinatio: & sunt quinque particulares cau

se cuiusque paroxysmi, &c. Act. ser. 5. cap. 2,
 Principium febrilis exacerbationis est con-
 tractio extremarū partium omnium, & ma-
 ximè nasi: augmentū habet acciderium in-
 crementum & cessat frigiditas: uigor erit ubi
 calor equaliter per totum corpus diffundi-
 tur, &c. uide illū fusiū. Gal. in lib. de morb.
 temporibus, sex tempora enumerat, initij no-
 men, inaequalitatis, incrementi, status siue ui-
 goris, declinationis & integritatis interual-
 lum ac quietem nominans, &c. De his plura
 in hoc lib. iuxta Gal. inuenies: nā secāt etiam
 periodum in duas partes, in accessionem &
 remissionem siue interuallū. Et nota pro iu-
 nioribus, quòd periodus idem importat, ac si
 diceretur, circuitus, & est tempus in morbis
 ex intensione & remissione consistens. Ty-
 pus uerò est intensiōum remissionūque or-
 dine succedens redditio. Paroxysmus & ex-
 acerbatio idem important, & sunt, ut inquit
 Act. motus morbi particularis à remissione
 ad deterius. De principijs morbi absconditi
 lege Auic. lat. 4. can. cap. 3.

Quomodo status morbi præcognoscatur.

Cognosces morbos fore breues uel prolixos, ab ipso morbi paroxysmo: nā paroxysmi longi longum, breues breuem morbum prænūciāt. Item ab ipso genere morbi: nam apoplexia, tertiana, breui, paralysis & quartana longo tempore terminantur. Ab ipsa uirtute debili uel ualida, unde ex debili, breuis, ex ualida, longus erit. Ab ipsa ætate & tempore: nam in senio & hyeme, longus: in iuuentute & æstate, breuis. Ab ipsis accidentibus beruiter uel longo tempore durantibus. Ab ipsis excrementis exeuntibus mutatis: nam in urina nullum apparetis cōcoctionis indicium, longum morbum: & econtrā, breuem significat. Nota quòd peracuti morbi quartū diem non transcendunt: acuti uerò plerunque 14. Vocandi erunt morbi acuti, si cum seuis symptomatibus terminantur. Quare febres ephemera non erunt morbi acuti, &c.

Loci consentientes de præ-
cognitione status.

Hippoc. aphor. 1. aphor. 12, Accessiones &

constitutiones morbi indicabunt & anni tempora & circuitum, ad inuicem incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per maiora interualla fiant. Gal. non solum in hoc comment. sed etiam in 1. de crisi 6. lib. quomodo quispiam futurum morbi uigorem possit primo cognoscere, facile ostendit, quem legere poteris. Auic 4. can. cap. 4. docet cognoscere statum ex tempore & motu morbi, ex ipsa uirtute, etate, tempore, pulsu, rigore, & paroxysmo, ab accidentibus ipsis, & ex euacuatione & digestionem, &c. Vide illum latius de his. Hippoc. aphor. 2. aphor. 23, Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. Et Auic. 4. can. cap. 3, Status diuersus est in morbis: morborum enim ualde acutorum status quartum diem non transcendit, nec febres ephemera morbi acuti dicuntur, & si propinquus sit earum status, quum hoc non satis sit, sed oportet insuper quod timore inducant: acuti uero absolute morbi sunt, quorum status 14. attingunt, &c.

Authores dissentientes circa febrem.

- 1 Adserere, febrem esse complexionem calidam & siccam.
- 2 Adserere, febrem non posse diuidi in morbum & accidens.
- 3 Adserere, in omni morbo esse assignanda quatuor tempora.

Confutatio dissentientium circa febrem.

Ad primum responderetur, quod si complexio calida & sicca esset, febris tunc sequeretur, quod complexio biliosa esset febris, quod falsum est: nam febrientes siue pituitosi siue sanguinei sint, remanent semper in eadem complexione ac praediti erant. Praeterea idem homo pluries in complexione mutaretur: nam febriens esset biliosus, non febriens pituitosus, quod falsum esse omnes asseuerant.

Ad secundum Auic. & Concil. differentia 87. tenent, quod febres sunt accidentales, quum mediate uel immediate a morbo dependant: sunt autem morbi, quum nullum morbum sequuntur.

Ad tertium respondet Arcul. morbos qui nullam uarietatem medico sensibilem de se præbent, & qui in principio generationis contrahuntur, & qui ad mortem terminantur, non habere quatuor tempora, & sic falsum est quod in omni morbo sint quatuor tempora.

De febre ephemera.

Febris ephemera nil aliud est quam calor accensus in spiritibus, & dicitur ephemera siue diaria, non ex eo quod duret tantum per unam diem, sed quia plerunque accidit ut in uno die desinat: perdurare tamen potest usque ad quartum diem, sed raro tertium diem progreditur.

Loci consentientes de febre ephemera.

Gal. aphor. 4. comment. 53, Febres diariæ omnes ab ipso Hippoc. uocantur, quæcunque sui ratione una die durant: tales uel à tumoribus inguinum, uel à causis manifestis fiunt. De reliquis à me dictis lege Gal. 10. meth. cap. 2. ibi, Sanè dicuntur id genus febres omnes diariæ, quia solui una die sunt aptæ, &c. Item 9. meth. cap. 1.

Obiectio.

Anceps sum an tantum in spiritibus calor accedatur, quum sanguis & spiritus una permisceantur, ut uoluit Gal. 6. de usu partium, immò & 2. de diff. febrium cap. 9. tenet à sanguine calefacto fieri ephemeram, quare non solum in spiritibus, sed etiam in sanguine calor accendetur.

Responsio.

Dicimus utrumque à calore febrili calefieri: sed si aduertamus, quòd primò non in sanguine, sed in spiritibus calor fundatur, dubitatio nulla erit.

De causis febris ephemeræ.

Quum duplex sit ephemera, uera scilicet & spuria, uera fit tantum à causis procatarecticis, spuria uerò fit per accidens, uel ex obstructione, uel per ἀντιπερισσῶν, sicut ex cohibitione, &c. Causæ ephemerarum totidem ac suæ species sunt, quæ, teste Auic. enumerantur 21. Nam aliquæ ad animam magis quàm ad corpus pertinent, ut angustia, tristitia, cogitatio, ira, uigilia, somnus, quies, timor & gaudium: aliquæ magis spectant ad corpus

quæ in ad animam, ut motus, quies, euacuatio, dolor, syncopis, fames, sitis, obstructio, satietas, nauscativa, inflammatio, soliditas: aliqua uerò extrinsecè ueniunt, sicut ab adustione, frigore, soliditate, balneis, &c.

Loci consentientes de causis febris ephemeræ.

Auic. 4. can. cap. 5, Omnes febres diariæ fiunt aut à causis præincipientibus per se calefacientibus: aut per accidens, ut oppilando: aut per antiperistasin, ut cohibendo, &c. lege eum fusius. Gal. 2. de cris. cap. 13, Sunt autem hæc tantummodo spiritus passionibus absque humorum putredine aut membri inflammatione, nisi inflammatis inguinibus accidant: earum uerò generationis occasiones sunt uigilia, cruditas, tristitia, timor, ira, curæ, deustio, refrigeratio, lassitudo, ebrietas, & quacumque similia, &c. Vide Aet. ser. 5. cap. 58. ibi, Auspicantes ac externè lacescentes cause, &c.

De signis febris ephemeræ.

Signa febrium ephemerarum sumuntur à iocunditate caloris, non incipiunt cum frigore, rigore, somno, uelut putridæ, nec in

principio calor concernatur. Concoctio in
 urina primo die apparet: fiunt à primitiuis
 tantum causis, pulsus non est diuersus, nec sy-
 stoles magis se accelerat quam naturalis, prin-
 cipium paroxysmi leue est ac facile, augmen-
 tum non ultra duas horas se extendit, in sta-
 tu nullum uehemens symptoma uidetur. De-
 clinatio fit cum sudore, ad integritatem de-
 sinit, & adhibito balneo nullus horror senti-
 tur. Signa transmutationis ephemera in alias
 febres sumuntur ab ipsa declinatione febris:
 nam si absque sudore fiat, uel cum sudore, per
 quem integra recoualescentia non sequatur,
 iam in alias febres transit: itē si declinatio ul-
 tra 24. horas cum symptomatibus & pulsū
 non naturali se extenderit, aut si remanse-
 rint aliqua symptomata in sui recessu. Co-
 gnoscitur etiam quum in hectica transmuta-
 tur ex signis hectica, de quibus infra latius,
 aut in synocham, ex uenarum repletionē, ex
 caliditate, inflammatione, rubore faciei, &c.
 aut in putridas ex horrore, pulsus diuersita-
 te & coarctatione, ex mordaci calore & à
 uehementia symptomatum, &c.

Loci consentientes de signis.

Gal. 1. de diff. feb. cap. 7, Indicia sunt, ut si fiant à procatarteticis causis, & est signum inseparabile, sed non proprium, si concoctio in urinis, si pulsus frequentia à proprietate deficiat, si nullo modo systoles ad celeritatem tendat, si caliditatis adsit suauitas, si cum sudore aut rore, uel optimo aliquo uapore declinatio ad integritatē sequatur: hæc omnia propria & inseparabilia signa sunt, &c. De reliquis lege Auic. 4. can. cap. 6. Itē Aet. ser. 5. cap. 58. & Paul. lib. 2. ca. 15. Item Gal. 6. de cris. cap. 13. & 1. art. cur. ad Glauc. cap. 2. & 3. lege etiam Arcul. & alios neotericos, &c. De signis trāsmutationis lege Auic. 4. can. cap. 8. Item Gal. 1. de diff. feb. cap. 7.

De cura febris ephemeræ.

Si à causis procatarteticis febres ephemeræ fiant, tunc alteratione sola curantur: si uerò à causis corporeis oriātur, tūc triplex erit intentio. Prima circa causæ ablationē & febris alterationē, ita ut calida frigidis curetur, ut exustio solis cum umbra, & sic duo efficies,

Ttt. i.

causam remouebis, & malam febris discrasiam per alterationē expelles. 2. Prohibet ne fiat transitus ab hac febre ad alias, meatus aperiendo, uapores resoluēdo, cum balneis in febris declinatione adhibitis, uel cum oleo quopiā perfricando. Tertia est quæ symptomatibus occurrit, & regimen instituit: ad febrem enim sequitur dolor, sitis, uigilia, & ad eius causam syncopis epilepsia, &c. quibus occurritur opportunis præsiidijs. Regimen uerò nō solum febrē, sed eius quoque causam respicit. Victus igitur ratio humida ac boni succi in declinatione febris exhibeatur, ijs uinum interdicatur qui ex inflammatione uel furore febricitant: in uigilijs tamen cōcedendū: at in reliquis rebus non naturalibus semper contrariū est offerendū, sicuti in labore quietem iubemus, in uigilijs somnum, in ira & furore animi iocūditatem, &c. Interdū cibus modo quodā coacto & irregulari in principio febris est exhibendus, ijs præsertim qui ex labore, angustia, fame, & superflua bile febricitant, &c. Ad species ephemerarū particulares scribēdo non descendā, si quidē rarissimē

opus medici desideratur, ni prius morbus in putridam aut hecticam febrem mutetur, &c.

Loci consentientes de cura ephemerarum.

Aet. ser. 5. cap. 59. usque ad cap. 69. de omnibus febribus ephemeris particularē curā pertractat. Similiter Auic. 4. can. à cap. 10. usque ad 44. de singulis particularibus mentionē facit, signa demonstrādo, causas & curationē. Alexan. itidē agit lib. 5. cap. 1. Paul. unicum tantum caput de diarijs habet lib. 2. cap. 15. Gal. 1. art. cur. ad Glauc. ca. 3, Omnes hasce febres balneis curare oportet, & ad cōsuetam uictus rationē eos perducere, &c. Et paulò post loquens de uictu, Interdicitur, inquit, uinū, qui inflammatione inguinū laborāt, similiter & furore percitis, cibo insuper humido ac boni succi reficiendi sunt, &c. quòd aliquos cibare oporteat in principio paroxysmi, lege Auic. 4. can. cap. 9. ibi, Necesse est in principio febris cibare qui patiuntur ephemerā ex labore & angustia. Itidem ait Gal. 10. meth. cap. 5. ibi, Quum adhuc inuasura sit febris, uel quum incipit, &c.

Ttt. ij.

Observationes circa balneum
& euacuationem.

Auic. 4. can. cap. 9, Balneū non cōuenit in quatuor casibus: primo, quum timetur de casu putredinis. 2. quū adest obstructio ab humoribus crassis. 3. quum adest satietas nau-seatiua. 4. quum adest catarrhus, &c. Item dixit, quōd in ephamera, nulla euacuatio cōuenit, nisi adsit materia obstruens, aut satietas nau-seatiua, aut totius corporis repletio, &c.

De prognosticis ephemerarum.

Gal. 1. ad Glau. cap. 2, Cura harū febrium in promptu est: at earum cognitio maiorem exigit diligentiam, & de qua nemo ante nos quantum oportuerit, scriptum reliquit, &c. itidem ait Auic. 4. can. cap. 5.

Obiectio.

Gal. 1. de diff. feb. cap. 7. uidetur contrarium innuere, quum dicat, Nec earum cognitio est difficilis.

Responsio.

Dicimus hāc esse difficilis cognitionis, quū ipsum adhuc perseuerat principium, sed facilis, quum iam ad declinationē uenit manife-

stam. Hippoc. aphor. 4 aphor. 55, Ex inguinum tumoribus omnes febres malæ præter diarias. Vide in hac re Oribasii cōment. fusius. Auic. 4. can. cap. 5, Homines quibus maxime nocent febres ephemeræ, sunt calidi & sicci, quia ad hecticā citò perueniūt: aut calidi & humidi, quia in febrem putridam incidunt, &c.

Authores dissentientes circa febrem ephemeram.

1. Adserere, omnem ephemeram esse febrem accidentalem.
2. Adserere, ephemeram coniungi posse cum putrida.

Confutatio dissentientium circa febrem ephemeram.

Ad primū respōdetur, q̄ si ephemeræ sequeretur calorē aut dolorē alicuius apostematis, quòd hoc uerum esset, sed non omnes huiusmodi sunt, igitur non accidentales.

Ad secundū dicit Arcul. quòd tenenda est eorū pars, qui negāt has febres cōiungi posse: nam quotiēs calor ad humorum putredinem transit, non amplius ephemeram efficere po-

Ttt. iij.

test, sed tantum putridam.

De febre hectica.

Febris hectica est calor praternaturalis, accessus in membris radicalibus siue solidioribus, quæ Græci *μείρα* sepe uocant, consumptis tamen in ipsis humiditatibus, cuius species sunt tres, iuxta quatuor humiditates secundas: quarum prima uocatur Nomen non habens, secunda ros, tertia cambium, quarta glutē, ita tamen ut quoties humiditas prima desinit, et secunda quæ est ros, incipit accēdi, tunc prima species hecticæ dicitur: quæ si ad cambium, tertiā humiditatē peruenerit, tunc erit secunda species, et uocatur ab Auic. dubalen. id est, arefactio siue *μδρασμός*, id est tabes: si uerò ad gluten deuenierit, tunc erit tertia species, et uocatur ab Auic. almuchasif, siue curuatura: nam ferè eadem forma uidetur, ac est in decrepitis curua, etc.

Loci consentientes de febre hectica.

Auicē. 4. can. cap. 1. tra. 3, Cum inflammantur membra radicalia et propriè cor, est illud ipsa agritudo quæ est hectica, se-

cundum quòd sciisti, &c. Gal. 2. præd. comment. 60, Quum partes ipsæ corporis solidiores ignitiores euadunt, febres heclicas nominamus. Quòd sint tres species hectica, lege etiam Auicem. loc. cit. ubi etiam enumerat humiditates secundas. Lege etiam Gal. 1. de diff. feb. cap. 9, Tabida febris incipit, quum natua humiditas in unoquoque corpore in-spersa in medijs spatij partium similariū, ex qua primū partes nutriuntur, & circa cordis corpus periclitatur: quum uerò iam res eò periculi uenerit, ut nihil iam ex tali humiditate supersit, tunc exquisita talis cōsistit, &c. Et cap. 8. eiusdē, Tabida febris non tantū sicca, sed etiam calida est passio, &c.

De causis febris hecticae.

Causa febris hectica uel sunt febres ephemerae, aut putridae, aut febres ex partium nobilium inflammationibus ortae, sicuti ex pulmonis aut thoracis affectibus, praesertim ex empyemate & ptisi, aut febres ardentes cum totius animalis & cordis praesertim siccitate. Interdum causae sunt errores medicorum, qui uictum nimis tenuem instituunt,

Trr. iij.

aut aquā frigidā in inflāmate diaphragmatis prohibet, aut quū ob defectū animi, uinū & aquam carnis & diamuscū iubent, quæ omnia ob sui caliditatem ad hecticā egrum perducunt, & rarò hectica per se incipit.

Loci consentientes de causis febris hecticæ.

Auic. 4. can. tra. 3. cap. 1, Cause hecticæ sunt febres ephemeræ, aut putridæ, aut febres inflātionū, quia rarò hectica incipiendo accidit, nisi sit causa ualde fortis, &c.

Galen. 1. de diff. feb. cap. 9, Exoritur hæc passio ipsi cordi nonnūquam per se ipsam sicuti ex cādescētis, tristitijs: nonnunquam ex ardentibus febribus: aliquando ex pulmonis & thoracis affectibus, præsertim ex empyemate & pti, & ex omnib⁹ diuturnis inflātionibus nobiliores partes occupātib⁹, &c. lege locum fusi⁹. de reliquis lege Auic. 4. can. tra. 3. cap. 1. ibi, Fiunt etiam ab alijs, &c.

De indiciis febris hecticæ.

Febrium hecticarū duo sunt propria indicia: primū, qd à principio usque ad finē sunt æquales, nec accessione, nec augmentū, nec ui-

gorē, nec remissionē habēt: secūdū, q̄ ager nō se febricitare percipit. Reliqua signa sumūtur partim à calore, siquidē à comestione calor crescit: item in primo tactu cæteris ardentibus febribus est suauior, sed in processu fortior & magis erodens: item pulsus est durus, frequens, debilis, fixus, partim ab ipso corpore mutato: nam oculi sunt cōcaui, flos vitalis coloris extinctus, adsunt uigilia, corpus extenuatur, in urina apparet quedā supernatās unctuositas, cutis fit arida, squalida. Hæc febris si aliqua à læsione mēbrorum incipiat, ab eorū arida intēperie, ex qua siccitas notabilis prouenit, facile deprehendes, &c.

Loci consentientes de indiciis febris hecticæ.

Gal. lib. 3. de præ sag. puls. cap. de arteria cordis, Febriū hecticarū duo hæc sūt propria signa, ut si perpetuò sibi illæ similes sint, nec inuasionē ullam accessionis, nec incrementum, nec uigorem, nec remissionem habeant, nec se febricitare percipiat ager, &c. lege Gal. 1. de diff. feb. cap. 9. abūde enim de his signis pertractat, ibi, Adest oculi cōcauitas, amisso eorū

liquore, flos uitalis coloris extinctus, in tota cute squaliditas immoderata, palpebrae dormitantiis similes, &c. lege tu fusius. Auic. 4. can. cap. 2. tra. 3. sumit indicia à pulsu, à tactu, à cibis: nam pulsus, inquit, est durus, frequens, debilis, fixus, & sic de reliquis. Alex. lib. 5. cap. 22. seorsum de omnibus signis pertractat. quomodo scilicet hectica à diaria putridaque distet, & quomodo hectica in marasmum trāseat, lege eum si lubeat. Vide etiam Auic. de signis adubul, &c.

De curatione hecticæ.

Duplici scopo hecticā curabis, quorū alter sit ad sex res nō naturales, alter ad medicinalia. Primus fiet, si aer in æstate declinet ad frigidū, si uictus sit humidus & frigidus, plus tamen humectās quā infrigidans, qualis est ptisana hordei, carnes hœdi, perdicū, caponū, qui ex amylo & frumēto nutriti sint, pisces petrosi, cācri flumiatiles, testudines nemorales, limaciæ & ranæ, oua sorbilia, caseus recēs. Potus sit aqua hordeacea, uel uinū albū olygophoron: absint motus, uigiliæ, superflua repletio & ieiuniū: sit uictus ratio pau-

lò plenior, quàm tenuior ob morbi lōgitudi-
nem, gaudeat aeger & letetur. Circa medici-
nalia quatuor opus sunt intētiōes: prima sit
in remouēda causa hectic.e, unde si fuerit cau-
sa ulcus in pulmone, primò remoueatulr ulcus,
nō neglecta tamē hecticæ cura. Si causa fue-
rit tristitia, inducēdo letitiā auferetur. Secū-
da intētiō respicit febrē quatenus febrē hecti-
cā, & tūc infrigidatio & humectatio tā per
interiora quàm per exteriora cōpetunt, sicuti
est aqua hordeacea cū cancris fluuiialibus
decocta, sy. uiol. de papauere, de iuiubis, item
electuaria resumptiua ueluti quoddā à Gor-
donio & à Francisco Pedemontio extat de-
scriptum. Valet etiam lac asininum & mu-
liebre, modò asina & mulier ex rebus fri-
gidis & humidis nutriantur, & dosis erit
iuxta Auicēnæ placitū à tertiodécimo usque
ad uigesimumtertium, & communiter ab un-
cijs tribus usque ad quatuor: uerum lac præ-
bēdum non est, quum post eius assumptionem
sitis & difficultas spirandi & caloris rece-
pti augeri uideātur, uel ubi febris putrida he-
cticæ coniūcta sit. Extrinsecus uerò cōueniēte

unguenta ex oleo uiolaceo nenupharino, ce-
 ratum à Francisco Pedemontio descriptum,
 & epithema facultate frigidum, sed actu te-
 pidum. Tertia intentio est eorū remotio quæ
 cum febre hectica copulantur, in quorum nu-
 mero quum febris putrida adsit, tūc euacua-
 tio non ratione hectica, quæ est immateria-
 lis, sed ratione putridæ, ex qua superflua plu-
 rima aggregantur, cōuenit: sit tamen phar-
 macum non ualde soluens, tū propter uirtutis
 imbecillitatem, tum quia periculum esset de
 maxima exiccatione, quæ proculdubio fugiē-
 da sunt, sed eius loco, pharmaco leni ac leni-
 tiuo utantur. Vltima intentio est symptoma-
 tum correctio, & sunt syncopis, tussis, & flu-
 xus uentris. Syncopis tollitur cum aqua car-
 nis, uino granatorum, nitellis ouorum, & uino
 odorifero: irroretur etiam facies ex aqua ros-
 mosch. Fluxus uentris ac ipsa tussis emendā-
 tur, ac dictum est supra, pro quibus recurre
 ad sua capita.

Loci consentientes de cura
 hectica.

De prima intentione loquitur Galen. 10.

meth. cap. 2. ibi, Nutrimentum oportet esse hu-
midum & frigidum, quod hecticis febribus sit
conducturum, ut ptisanæ cremor frigidus,
&c. Vide Paul. lib. 2. cap. 22. Auerrois 2.
collig. inquit, quod magis humectatione indi-
get ager, quam refrigeratione, &c. De secun-
da intentione Gal. in art. par. inquit, Vnius-
cuiusque causam prius abscindere oportet,
deinde ad eam, quæ ex ea facta est, aegritudi-
nem deuenire. Auic. 4. can. tra. 3. cap. 4, In-
tentio curandi febrem hecticam est infrigi-
datio & humectatio, &c. Itidē ait Aet. ser.
5. cap. 93. ibi, Scopus curationis in humectā-
tibus & refrigerantibus consistit. De exhi-
bendo lacte lege Gal. 10. meth. cap. 2, Item
Paul. lib. 2. cap. 22, Et inuenies modum exhi-
bendi, &c. De balneo similiter lege Gal. 10.
meth. cap. 10. Et Auic. loc. cit. & Aet. ser.
5. cap. 93.

Observationes circa curam.

Auic. loc. cit. Caue tamen in his frigidis ob
caloris eorum imbecillitatem, ne multum in
gradu extollantur, alioqui calor eorum suf-
focaretur.

De prognosticis hecticæ.

Hip. aph. 2. aph. 28, Febricitantium non omnino leuiter permanere corpus, & non minui, uel etiam plusquā ratio expostulat, constabescere malum: hoc enim morbi longitudinem, hoc uerò imbecillitatē significat. Gal. 1. de diff. feb. ca. 8, Vbi iā febris hectica exquisitē cōsistit, & iam dudū incepit, non modò eandē curare est difficile, sed etiā impossibile. Auic. 4. can. tr. 3. ca. 1, Hectica est in principio rei difficilis cognitionis & facilis curationis, & finis adubul nō penitus recipit curationē. B. Difficilis est cognitionis, quia parū uel nihil à sua naturali dispositione corpus permutatur: idcirco postea curatur, quoniam uirtutis robur uehementē tolerat refrigerationē: at quum $\mu\delta\rho\alpha\sigma\mu\omega\delta\eta\varsigma$ efficitur, in eius curatione frustratur medici, tū ob nimiam cōsumptionē, tū ob eorū imbecillimā uirtutē.

Authores dissentientes circa
hecticam febrem.

- 1 Adserere, hecticam febrem posse absque alia febre per se incipere.
- 2 Adserere, in hectica febre fieri mutationē

ex specie in aliam speciem.

3 Adserere, cibum non esse causam, quur in hectica magis calor appareat, &c.

Confutatio dissentientium circa
febrem hecticam.

Ad primū, inquit Auic. 4. can. tra. 3. ca. 1,
Quod longinquū est, ut accidat hectica inci-
piēdo, & posse membra radicalia inflāmari,
quin prius humores & spiritus nō inflammē-
tur, & sic non posse per se incipere, nisi ab
alia urgente causa dependeat, &c.

Ad secūdū, Arcul. inquit nō esse dicēdū eū-
dē calorem numero & aquē intēsum migrare
de specie in speciem, sicuti patet in exemplo
Auic. Nā flāma accēsa in lychnio primū ab-
sumit oleū in lucerna positū, deinde oleū ly-
chnio imbibitum, demum humiditatē coti, &
sic non migrat de specie in speciem.

Ad tertiū, respōdet Gal. 1. de diff. feb. quōd
caliditas arida, humido irrorata magis ma-
nifestatur, eo quōd aliquam partem cibi te-
nuem in uapores conuertat. Vel si magis pla-
cet opinio Auerrhois, eo q̄ caliditas febrilis,
quæ non sentiebatur per cibum assumptum,

mutatur ex non sensu ad sensum apparētem:
 Et sic causa efficitur, ut calor magis appa-
 reat, &c.

De febrium putridarum diui- sione & numero.

Recitat Gal. 2. meth. cap. 7. quod tres sunt
 febriū diuisiones ex humorū putredine ortæ:
 prima ex eo, quod causa ipsius putredinis
 adsunt uel nō adsunt. Secunda ex eo, quod per
 totū animal aut eius partē aliquā est diffusa
 putredo. Tertia, quatenus cū phlegmone est,
 aut citra hanc. Enumerat deinde in lib. con-
 tra Lycū has esse febres putridas, quæ nume-
 ro sunt nouem, ut ardens, lypiria, hepiala, ty-
 phodes pestilentes, semiteriana, quotidia-
 na, tertiana, quartana, de quibus seorsum
 tractabimus, &c.

De putredinis definitione.

Putredo iuxta medicorum opinionem, est
 corruptio humoribus contingens propter ebul-
 litionem extranei caloris, &c.

Loci consent. de putredinis definit.

Gal. 2. meth. ca. 8, Putredo est mutatio to-
 tius putrescentis corporis substantiæ ad corru-

prelata à calido externo. Arist. 4. meth. Putredo est corruptio propriæ caliditatis ab aliena caliditate in unoquoque humido. B. Nō mirū quum familiaris & nativa caliditas concoctionem adiuuat, externa uerò corrumpit. lege Aet. sermo. 5. cap. 74.

De causis putredinis.

Duplex est causa putredinis, altera ipsam complens, altera præparans. Complens, si intrinseca fuerit, tunc est respirationis priuatio, quæ à multo, crasso, ac uiscido humore meatus cōstipante fiet. Si extrinseca, tūc erit ab aëris mutatione præparatoria, ueluti cibus, qui malè per suā substantiā, qualitatem, tēpus, ordinem & artificiū disponitur: nam substantia eius uel est nimis uiscosa ut anguilla, aut nimis humida ut fructus, aut renuitur à natura, aut corruptibilis per se est, ut lac. Qualitas in causa erit, ubi cibus plurimæ humiditatis erit particeps. Tēpus erit etiā causa præparatoria, si cib⁹ in tēpore nō opportuno sumatur. Ordo etiā erit causa, ubi crassa & dura tenuibus in comedēdo præponātur. Artificium, si cibaria malè parātur: at in

VIII. i.

genere loquendo, omnis putredo à calido & humido fieri potest, &c.

Loci consentientes de causis
putredinis.

De causis putredinis lege Auic. 4. can. tr. 2. cap. 1. ibi, Putredo fit à cibo, ab obstructione, aëre, humore: ubi de cibo tanquā de causa preparatoria loquitur: lege eum fusius. Similiter Aet. ser. 5. cap. 74. Et Gal. 2. de cau. morb. ca. 8. ibi, Putredinē inducunt aut medicamenta quæ suapte natura putrefacere possunt, aut excrementa in ipso animali genita, aut ea quæ transpirationem impediunt. Hip. 3. epidim. à calido & humido putredinē fieri dixit: nam si annus, inquit, calidus & humidus fuerit, necesse est ut magna pestilentia succedat. Vide de hac re Gal. 1. de temper. cap. 4. Item de inaequali intemperie cap. 4. & 7. ibi, Non tantum quæ inculcata sunt & prospiratu prohibita, sed & putrescunt alia multa, &c. Vide etiā Gal. 2. meth. ca. 8. &c.

De ratione diuersitatis fe-
brium.

Putredo est aut in uno solo membro tan-

tum, unde aliquis abscessus oriatur, & hoc uel ratione imbecillitatis membri, uel eius uehementis caloris, uel eius doloris, &c. aut erit in totius corporis ambitu diffusa: quæ si à maximis uenis ad minimas transierit, fiet febris continua: si uerò extra uenas in omnes corporis meatus distribuatur, tunc erit interpolata. Causa interpolationis est triplex: prima, quia humor uelociter uel tardè putrescit. Secunda, quia humor uelociter uel tardè in loco putredinis colligitur. Tertia, quia humor uelociter uel tardè à putredine expurgatur. Pituita igitur quotidianam facit, ex eo quòd uelocius ob sui humiditatem ad putredinem mouetur, aut citius ob sui quantitatē colligitur, cuius accessio durat horas 17. Quartana ratione suæ siccitatis duos dies interponens tardè putrescit, & ratione suæ paucitatis tardè colligitur. Tertianæ uerò inter has seruat mediū, unde si fuerit pura, durat 12. horis, sicuti quartana si fuerit à naturali melancholia, durat horis 19. Et pro eius quiete assignantur horæ 48. & in quotidiana sex, & in tertiana, 24.

Vñ. ij.

Loci consentientes de ratione
diuersitatis febrium.

Auic. 4. can. 2. tra. cap. 1, Dupliciter uariatur putredo, uel ratione humorum putrescentium, aut ratione loci: quia quandoque est in uno solum membro, quod quadrifariam contingit, uel ratione suae imbecillitatis, uel ratione uehementis eius loci caliditatis, uel ratione acuitatis & doloris, &c. Gal. 2. de diff. feb. cap. 2, Rationem reddit quur febres interpolatae, quurue conclusae sint: quā quum in longā orationē protrahat, ad illud caput te conferes. Vide etiam 2. de crisi bus cap. 3, Quāquā uberius de his pertractet Auic. &c.

De signis feb. putridarū in genere.

Indicia febrium putridarum propria sunt, quia nulla antecedit causa procatactica: incipiunt cum rigore, horrore, sed nō omnes: adest inaequalitas pulsū, calor mordax, atque tactui molestus. Sed propriū ac inseparabile est indicatiū pulsū, systolae uelocitas, & urinarū cruditas, debili sūe concoctio: praecedit etiā primū morbi insultū lassitudo, pigritia, somnolētia, uigiliae, spirādi difficultas,

uenarum tensio, sitis, dolor capitis, inquietudo, periodus cum sudore terminatur, &c.

Loci consentientes de signis febrium putridarum.

De his indicys loquutus est Gal. satis uberiorius primo de diff. feb. cap. 7. ibi, Indicia febrium, quæ humorum ratione acceduntur, hæc sunt, primum non inseparabile, sed proprium est, quod nulla ex causis procataceticis ipsas antecedit: initium sumere à rigore proprium est putridarum, sed non inseparabile signum, &c. Lege locum fusius, & plura ad hanc rem facientia inuenies: lege insuper Paul. lib. 2. cap. 2. Et Auic. 4. can. ca. 2, ibi, Vt plurimum antecedit al mellilotu, cui associatur lassitudo, pigritia, alices, saltus, commotio, somni, uigilia, anhelitus, constrictio, uenarum tensio, &c.

De cura febrium putridarum in genere.

Morbus quatenus morbus per sui contrarium auferri exposcit, febris est morbus: igitur per sui contrarium tollenda erit. Sed hæc febris minimè tolli potest, ni prius putredo, à qua depēdet, inhibeatur, quæ nec causa manente

Vuu. iij.

inhiberi potest: igitur primum erit remouenda putredinis causa, mox ipsa febris sanabitur. Causa putredinis erit trāspirationis prohibitio, quæ uario modo oriri solet: nā aut à densatis exiguis meatibus & constrictis corporibus fiet, aut ab humorū abundantia, aut à crassitie & lentore, quæ singulæ affectiones per sua contraria remouebuntur, ut densitas per rarefacientia, constrictio per dilatantia, crassities per incidētia, lentor per detergētia: & si totum corpus iam singula dictorum occupauerint, etiam toti corpori per contraria est occurrēdū. Sed quia febris est morbus de repletionē, idcirco etiam euacuari desiderat: euacuabitur manu & pharmaco: manu, per sectionem uenæ, cucurbitulas, hirudines & frictiones: pharmaco purgante per inferiora aut superiora, per urinam & sudorem. Demū symptomatibus complicatis succurrēdum, & norma uiuendi instituenda erit, &c.

Loci consentientes de cura febrium putridarum in genere.

Gal. 2. meth. c. 4. & 5, Febris sanari nō potest, nisi inhibita prius putredo sit: porro ea

inhiberi causa manente nō potest, quare sub-
mouēda eius causa erit si modò, &c. lege eum
fusiū, & habebis quacūque dicta sunt, lices
sub alijs uerbis, &c. lege etiam Auic. 4. can.
2. tract. cap. 7. ibi, Scias quòd intentio in
medicādo has febres, quandoque uertitur ad
partem febris, quare est infrigidare & hume-
ctare: interdum ad materiae partem, &c. De
uictu lege fusiū in lib. I. ubi omnes aph. ferè
ad propositum accommodauimus.

De febre tertiana pura.

Febris tertiana pura est interpolata febris,
à flaua bile pura ac tenui putrescente orta,
cuius est de tertio in tertium agrum afflige-
re, secundum naturam humoris propriam, &
in septem periodis, uel antè, iudicatur.

Loci consentientes.

Gal. 2. de diff. feb. ca. 3, Febris tertiana ex-
quisita est, quæ per sensibiles corporis partes
delata oritur, cum rigore inuadens, atque ar-
dentis febris similitudinem gerens, & bilis uo-
mitibus, aut deiectionibus, aut sudoribus: uel
ex horum quibusdā, uel omnibus soluitur, cu-
ius accessio duodecim ad summum horarum

Viii. iij.

æquinoctialium spatio finitur. Hippoc. apho.
4. aph. 59, Tertianæ exquisita in septenis cir-
cuitibus, quod tēpus longissimū est, iudicatur.

De causis febris tertianæ puræ.

Febres tertianæ puræ fiunt à flava bile pu-
trefacta ac mota, & extra uasa lata, præser-
tim in consistentiū ætate biliosissima, tēpore
æstivo, in regione calida & sicca, & in ijs
præcipuè, qui laboribus, uigilijs, & solis ar-
dore & cibis calidis & siccis, aut immodico
pharmacorum calidorum ac exiccantiū usu,
curis, & similibus usi fuerunt, &c.

Loci consentientes de causis febris tertianæ.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 3, Febris hæc à fla-
ua bile per sensibiles corporis partes delata
oritur. Et in 1. ca. eiusdem lib. Tertianæ fiūt
ab amara bile, & plerunque in corporibus,
quorum naturalis habitus ad bilem accedit,
in consistentium ætate biliosissima, tempore
æstivo, &c. B. Nota quòd tres sunt febres bi-
liosæ iuxta Auicē. placitum, tertiana, scili-
cet continua, tertiana periodica, & causon.
Periodica rursus diuiditur. nam aut est pura,

aut spuria: pura, quæ à pura bile, cui nullus
 alter humor admiscetur, oriri solet. lege de
 his causis Aet. ser. 5. ca. 79. Item Galen. 2. de
 cris. cap. 3. Item Oribas. apho. 4. com. 59. Et
 intelliges febrem interpolatam extra uasa pu-
 trefieri. lege etiam Auic. 4. can. ca. 35. Et Ga-
 len. 4. apho. com. 59. &c.

De signis febris tertianæ.

Sex sunt ex quibus indicia febris tertianæ
 sumuntur: primum à modo rigoris, ut incipiat
 cum horrore & rigore difficili, ita ut pungi
 ac uulnerari cutis uideatur. Secundum, ab u-
 rina & sudore, nam sudor per totum corpus
 apparet in paroxysmi recessu, urinæque fit ru-
 bra ac ueluti ignea. Tertium, à caloris quali-
 tate, ut sit caudsonis calore suauior, ac minus
 mordens, æqualis tamen quoquo uersus, quia
 primò acris uideatur, sed paulò pòst à manu
 remanente uincitur. Quartum, ab ipsis sym-
 ptomatibus, unde sitis quæ hominem exurit,
 & uigiliae adsunt sine capitis grauitate.
 Quintum, à pulsu, qui est uelox, magnus, non
 æqualis in diastole & sistole. 6. sumitur ab
 ætate, regione, tēpore, & à multitudine cuen-

tus tertianarum & ad infebrecitationem desinit. Signa quibus tertiana exquisita à spuria differat, sunt quatuor: primū, q̄ eius accessio non transcendit duodecim horas. Secundū, exquisita tertiana in septenis circuitibus iudicatur. Tertium incipit cum rigore breui & intenso, & terminatur cum sudore exuberante. Quartum, quia in prima, uel quarta, uel septima uidetur urinae coctio, quod in spuria nequaquam.

Loci consentientes de signis
febris tertianæ.

Gal. 2. de cris. cap. 3, Febris tertiana cognoscitur, quia æqualem & liberā celeritatē habet, neque ullū adest inflātionis signū, sitim inuehit, hominē exurit, in uigore cōsistit, calor æqualis est quaque uersus, post potū plurimus uapor per cutem exhalat, sudoris nunciū, uomitus bilis adest, uenter soluitur, & biliosum mingunt, sudor apparet uaporosus, calidus per totum corpus æqualiter sudans, pulsus uelox, magnus, ad infebrecitationem desinit, & accessionis tempus ultra 12. horas non se extendit, sæpius septem horas, interdum ci-

tius & tardius incipit cum rigore, &c. De indicijs per quæ distinguitur à spuria tertiana, lege Auicē. 4. can. ca. 37. tra. 2. Oribas. apho. 4. comment. 59, Sex modis cognoscitur exquisita tertiana, nempe materia, natura, tempore, regione, copia ciborum & temperie, &c. Galen. 2. de diff. feb. enumerat de tertio in tertium acceſſionem, breue tempus cum rigore inuadens, & per sudores & bilis uomitū & excrementa biliosa, &c. lege Paulum lib. 2. cap. 18.

De cura febris tertianæ puræ.

In cura febris tertianæ puræ sex opus sunt intētiōes, quarū prima uersatur circa regimen sex rerū non naturalium: secunda erit lenitio uentris ac materiæ in contrarium alteratio: tertia erit euacuatio: quarta urine uel sudoris prouocatio: quinta caloris remanentis alteratio, & membrorum roboratio: sexta accidentium correctio. Regimen contrarias omnino qualitates requirit, unde aër sit frigidus & humidus, sicuti & cibi humectare & refrigerare habent, ut ex oleribus attri-plex, blitum, lapathum, lactuca, endiuia,

cucurbita, cremor ptisanae, & sorbitiones alie, aqua hordeacea. Caueant à melle, sinapi, salitis, & ab omnibus acerbis, item à uinis, præcipuè uetustis: ubi uerò morbus concoqui cœperit, dandum est uinum tenue aquosum: quum uerò morbus soluitur, liberius exhibendum. Secunda intentio est uentris lubricatio & materie ulceratio: prima fiet cum clysteribus ex cassia, rhodomelle, & oleo uiolaro, uel cum cassia simplicis bolo, &c. Alteratio materie per refrigerantia & humectantia, ut cum syrup. de endiuia ros. uiol. de agresta, de suc. acet. acetoso simplici cum aquis endiuia uiol. &c. Tertia scilicet euacuatio fiet per sectionem uenæ, si sub forma antecedentis causæ materia fuerit sanguini admixta, aut in futuro de admiscenda timeatur: quæ si à sanguine fuerit separata, tunc fiet per pharmaca soluencia, sicuti cum rheubarbaro, cum cassia, diacatholicon, electuario de suc. ros. &c. Quarta eliciet sudorem & urinam non rebus calidis, sed potius id ualentibus frigidis, sicuti cum acetoso simp. cum emulsione scilicet communium frigid. in aquis

endiuiæ acetosæ, aut cum balneis temperatis
boni odoris. Quinta erit caloris derelicti al-
teratio, ac laxorum membrorum roboratio.
Relaxantur enim membra tum ob imbecilli-
tatem ex resolutione spirituum acquisitam,
tum ex calore febrili, & euacuationibus tam
naturaliter, quàm artificialiter factis: his igi-
tur succurritur cum rebus frigidis, roboranti-
bus, siccis, cum Troc. de camphora, syrup. ros.
aut cum tria sandalis, diarrhodone Abb. zu-
charo ros. uel cum epithemate tum cordi tum
hepatis applicito. Sexta remouet accidentia
quæ huic feбри contingere solent, sicut sunt si-
tis, uigilia, dolor capitis, & asperitas linguæ.
Sitis tollitur cum collutione oris multifariam
parata, sicuti cū aquis endiuiæ acetosæ, cum
uino granatorum & omphacio, addito zu-
charo, cum electuarijs de uino granatorum,
aut cum mucilagine psylli in syndone rara
inuoluto, ac in aqua immerso. Vigilia remo-
uentur cum unguento populeone, addita cas-
sia odorata, opio & croco: aut cum lotioni-
bus ex rebus somniferis, &c. Dolor capitis
collicur cum cucurbitulis, frictionibus, cum

oxyrrhodino, & pilula cap. frig. &c.

Loci consentientes.

De prima intentione loquitur Galen. 1. ad Glau. cap. 9. ibi, Semper oportet contrarias qualitates illis, quæ præter naturam inualuerint, opponere, cū hoc multò plus iuuat, quàm quomodolibet euacuare. Et paulò post, Cibi humectantes & refrigerantes omnes exquisitis tertianis sunt utiles, quantitas tanta sit, ut cōcoqui possit, ex olerib⁹ sint attriplex, blitū, lapathū, malua, lactuca, & cucurbita, & ex alijs ptisana succus, & alicæ sorbitiones, ex piscibus saxatiles, ex uolatilib⁹ quæ mollibus cōstant carnibus. Itē testiculi gallorū & suum pedes & cerebella. Itē ouorum sorbiliun uirelli, quia hi facilius quàm pars alba concoquuntur, &c. Lege locū fusius, & nota prædictam uictus rationē tantūm deliciosis esse exhibendā, robustis uerò qualem nobis monstrauit Hip. scilicet tenuem, &c. lege Paul. lib. 2. cap. 19. Et Auic. 4. can. cap. 39. De secunda intentione loquitur Galenus, & similiter de tertia, primò ad Glau. cap. 9. ibi, Exquisitam tertianam, quæ ex flaua bile commo-

ta inualefcit, quàm maximè fieri poteft, refri-
gerare oportet & humectare, &c. De cæteris
uerò intentionibus lege iuxta Auicē. loc. ci-
tato, ubi enumerat lenientia pharmaca, &
commendat fieri phlebotomiam quando eſt
poſſibile, deinde materia adæquationem cum
ſyr. acetoso, & euacuationem. demum reſol-
uentia, &c. lege eum fuſius.

Obſervationes circa victum.

Auicē. loc. cit. Et non cibes niſi apud has
conditiones: prima, niſi aluus primùm ſoluta
ſit: ſecunda, quòd prior cibus ſit cōcoctus an-
te paroxyſmi aduentum: tertia, non exhibea-
tur cibus, niſi in tempore quietis, ſicut in de-
clinatione, ſi poſſibile eſt: quarta, quotiens ad
ſtatum properatur, tunc victum magis at-
nuare oportet, &c.

De prognosticis febris tertianæ.

Gal. I. ad Glau. ca. 8, Exquiſita tertiana
ſeptē circuitibus indicatur, & præter id etiã
minimè periculosa. B. Nota quòd in febris
intermittētibz annumerātur tantū acceſſio-
nes & nō dies, unde in tertiana ſeptē circui-
tus 14. dies referūt, in quibus etiam alij acuti

morbi finiuntur. uide aphor. 4. comment. 59.

Hippoc. apho. 4. aph. 36, Sudores febricitanti si incæperint, boni tertio die. 5. 7. 9. 11. 12. 17. 20. 27. 34. Hi enim sudores indicant morbos: qui uerò non ita fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem & recidiuam. Gal. 3. de cris. cap. 3, Tertianæ uomitibus & excrementis biliosis & sudoribus toto corpore fluentibus finiri debet, quia humor tenuissimus, si modò ascēdit, uomitum irritat: si descendit, aluum mouet: si ad meatus, cutis sudorem copiosum ab sui tenuitate elicit, &c.

Auicē. 4. can. cap. 37, Et quandoque consumitur in uno paroxysmo ob suæ materiæ tenuitatem, &c. B. Gal. 2. de diff. febr. cap. 3, Quatuor causas breuitatis enumerat, quæ sunt humoris quantitas, qualitas, laborantis uigor, & corporis dispositio: ut exempli gratia, si cum pauca quantitate humoris & tenui eius qualitate, uigor cum rara dispositione corporis maior fuerit, tunc morbus erit breuis: sed si multa bilis, crassa, uigoris imbecillitas, & densa corporis dispositio simul fuerit, tunc morbus erit ualde longus, &c.

De febre tertiana notha siue spuria.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 8. enumerans signa exquisita tertianæ, inquit: Quibus uerò aliquid horum deficit, hæ non amplius exquisitæ, sed simpliciter tertianæ nuncupantur, maxime si intermissione *μικροτέρον*, id est, breuiorem habuerint, accessione uidelicet in longius tempus protracta: Et notat quatuor huius febris differentias, prima uocatur simpliciter extensa, quæ ad 24. horas extenditur. Secunda paululum extensa, et durat usque ad horas 30. Tertia dicitur amplius extensa, et durat usque ad horas 36. Quarta uocatur plurimum extensa, et durat usque ad 40. et plures horas, ita ut quotiens magis à pura siue exquisita distabit, totiens magis notha, siue spuria, siue extensa nuncupabitur, &c. Similis sensus est 1. ad Glau. cap. 8.

De causis febris tertianæ nothæ.

Causa ut plurimum est crassa bilis putrefacta, interdum bilis cum pituita admixta et unita, &c.

Loci consentientes.

De causis lege Auc. 4. can. 2. tra. c. 35. ibi,

Xxx. i.

Tertiana non pura fit à putredine bilis crassæ substantiæ, ob commixtionem bilis cum phlegmate, commixtione complexionali unita, &c. B. Intellige ita humores misceri, ac si ab utroque una forma perueniret, & in hoc ab emitriteo differt, qui à duabus inuicem distinctis formis efficitur. Et nota quòd Galen. facit differentiam inter duas tertianas & duplicem tertianam: nam duplicis tertiana causa ab una tantum minera provenit, sed duarum tertianarum causa à duabus mineris loco distinctis efficitur.

De signis febris tertianæ nothæ.

Signa sunt sex, gravitas capitis cum dolore tensivo. Secundum, Accessio durat ob humoris crassitie usque ad 24. uel 30. horas, & reporeius usque ad 48. Tertium non apparet concoctionis uestigiū, sed urina est cruda. Quartum, non extenuatur corpus sicuti in tertiana simplici. Quintum, nec cum sudore desinit, nec rigorem interdum habet, nec adest caliditas acris & mordax. Sextum, nulla adsunt seuæ accideria, ut dictum est in simplici tertiana, & idem accessionis tempus semper est.

Loci consentientes de signis tertianæ.

De his signis lege Auic. 4. can. 2. tract. cap. 37. ibi, In non pura tertiana adest gravitas capitis cum dolore extensiuo, duratque paroxysmus usque ad 24. horas, uel 30. usque ad declinationem, & tunc repescit donec compleantur 48. horæ, &c. lege eum fusius. Gal. 1. ad Glauc. ca. 8. ex historia adolescentis omnia signa huius febris demonstravit inquit: Urina cruda admodum, febris incidit cum horrore, quæ neque in caliditate, neque in pulsibus exquisitæ tertianæ est similis, accessio durat ab aurora tertiæ diei, usque ad auroram quartæ: & semper idem accessionis tempus. lege hunc locum uberius. Et nota quod non idem accessionis tempus semper est, nisi materia crassa bili dominetur, &c.

De cura febris tertianæ nothæ.

Curandi intentiones tot erunt, quot dictæ sunt in febre tertiana simpl. Versatur igitur prima circa regimen sex rerum non naturalium, unde uictus in primis non quotidie, sed alternis diebus in tempore quietis exhibendus erit, qui

Xxx. ij.

nō adeò in frigidet & humectet, ut in tertia-
na simplici, sed aliquatenus calefaciat, inci-
dat, & absterget, sitque nō tenuis adeò, sed
crassior quàm dictū est. Cætera uerò res non
naturales eadem ferè qualitate fac ut polle-
ant. Secunda quæ est uentris lenitio ac mate-
ria præparatio, efficietur primò clysteribus
ex cassia, hiera picra, oleo camomillino, &
sale paratis. Similiter præparatio materia cū
syr. acet. simp. rhodomelle, syr. de duabus rad.
bisantino, cū aquis & decoctis cichorij, bora-
ginis, fœniculi, &c. Tertia erit euacuatio quæ
peccante materia cū sanguine fiet per sectio-
nem uenæ, aut corpore existente plethorico,
quod ubi à sanguine separatum cognoueris,
tunc uomitu uel pharmaco solutiuo euacua-
bis, ut puta cum infusione rheubarbari, aga-
rici, aut cum diaphinicone & cassia, &c.
Quarta erit urinae & sudoris prouocatio,
quæ cum hordei decocto, uel petroselini, apij,
cichorij, &c. Quinta erit membrorū quæ la-
xa sunt, roboratio: & fit cum Troc. de ros. de
expatorio, aut aromatico ros. Extrinsecus cū
oleo de mastice, de spica, de menta, de absin-

ethio, aut cum fofu ex camomilla, abfinthio, menta, addendo femper aliquid vini odoriferi, &c. Vltima intentio eft quorundam fymptomatum remotio, quæ funt in appetentia, & fomnus profundus, incitatur appetitus cum capparibus cõditis in aceto, aut cum diaconite, cum zucharo, aut inunctionibus fuprà fcriptis, &c. Somnus etiã remouetur cum aceto calido, ut refert Auicen. cap. de fubet, aut cum lotionibus, & cum his fimilibus, quæ ægrum expurgifci poffunt.

Loci consentientes de cura
febris tertianæ nothæ.

Gal. 1. ad Glauc. ca. 10, Non oportet cibũ quotidie exhiberi, fed alternis diebus: uictus ratio nõ fit quæ humectet & refrigeret uniuersum corpus, qualis in exquisitis tertianis exhibetur, fed aliquem modumumat ad calefaciendum & incidendum, &c. Post uictum, fectionem uenæ commendat, ibi, Quid si sanguinem mittere oporteat, neque hoc omittendum, fed ab initio statim faciendum. Laudat etiam humorum præparationem ex hyssopo, origano, spica nardi, cum mulfâ decoctis, &

Xxx ij.

post septimum coma absinthij danda est cum oxymelle, solutionem deinde cum his quæ mollior uentrem subducunt, &c. Paul. lib. 2. cap. 20, Vomitus post cibū ijs utilissimus est, quibus hæc febris in uetustatem incidit. similiter Auic. & Razes 17. cōti. Auic. 4. can. 2. tra. ca. 40, Et quū uideris urinas eorum crassas, tunc phlebotoma, & post hæc adiuantia ad digestionem sunt syrup. acetosus, &c. quacūque à me dicta sunt de alijs intectionibus, ipse uberius pertractat. Nota tamē ex Haly Abb. non concedi in principio huius morbi pharmacum electiuum, nisi materia turgeat, quāquam iuxta Manardum in epistola ad Charandinum uideatur legi contrarium, imò uix inuenies Galen. in omni febre absque concoctione humorum pharmacum solutiuum exhibere, sed in alijs à febre morbis paucos inuenies, quos per pharmacum non expurger, &c.

Observationes de humorum concoctione.

Gal. 1. ad Glauc. cap. 10, Ab initio statim nitāda quæ nimis exiccāt & calefaciūt, &c.

Obseruat . circa pharmaca solutiua.

Auic. 4. can. & Arcul. Rarò & tardè solutiuum exhibendum est, alioqui si importuna fuerit euacuatio, tunc tenues tamùm exoluentur, & crassæ partes remanebunt, &c.

De prognosticis febris tertianæ nothæ.

Auic. 4. can. ca. 35, Hæc quidem non pura quandoque prolongatur tēpore longo, & circiter medietatem anni, & quandoque perducit ad mollitiē & magnitudinē splenis. Gal. 1. ad Glauc. ca. 8, Vidi quandoq; quū in autūno incæpisset in uere desisse, tū quia eger medici præceptis non paruisset, tū quia læsus ex hyeme esset, lien intumuit, præcordia flatibus fuerant opplata, & iam subrumida quædam aderat in facie decoloratio, & præsertim circa crura, adeò ut de adolescēte dubitare nobis cōtigerit, &c. B. Prorogationis febriliū causa, Gal. teste 2. prognost. com. 25. est triplex, prima fit propter aliquā partem affectā curatu difficilē. Secunda fit propter humores crassos, crudos, incoctosq;. Tertia, propter aliquod circa egrū cōmissū: idcirco di-

Xxx.iiij.

cebat Auic. In morbo longo resupinetur ager,
 et crura curuentur, et tãgantur eius uiscera,
 et uideatur si qua parte corp^s tumuerit, etc.
 Hipp. aph. 4. aph. 29, Quibuscũque in febribus
 sexto die rigores fiunt, difficile iudicium
 sequitur. Et aph. 4. aph. 43, Febres quacun-
 que non intermittentes tertia die fortiores
 fiunt, magis periculosæ: quocunque modo in-
 termiserint, periculum abesse significat. Et a-
 phor. 4. apho. 44, Quibus febres longæ, his
 tubercula uel labores in articulis fiunt. Et
 aphor. 4. apho. 45, Quibus tubercula uel in
 articulis labores ex lōgis febribus fiunt, ij plu-
 ribus utuntur cibis. Et apho. 46. eiusdem, Si
 rigor incidat febre non deficiente, agro iam
 debili, lethale, etc. Lege Galen. comment.

Authores dissentientes circa
 febres tertianas.

- 1 Adserere, tertianam febrem cognosci pos-
 se per accessionem tãtũm de tertia in tertiã.
- 2 Adserere, solũm humori putrido digestio-
 nem conuenire.
- 3 Adserere, omnes fructus nocere febricitan-
 tibus cum Auicen.

4 Adserere, nullum in febris uinū esse concedendum.

Confutatio dissentientium circa febres tertianas.

Ad primum respondet Auicen. 4. can. 2. tract. cap. 36, quod qui cōsiderat tertianam per paroxysmum, errat in ea, sed oportet ut attendat ad significationes alias. Hac etiam de re à Galeno irridetur Thessalus, qui diatritum in cognoscendo tertianā expectabat: 2. de cris. cap. 3.

Ad secundum dicit Gal. 1. de uic. in mor. acut. ubi loquitur de ptisana ordeacea, quod nullo modo humori putrido conuenit digestio, quum nec ad benignitatem humor reduci possit, sed continuò euaporans humidum, quoddam cineritium permaneat: nisi hoc forte acciderit in continuis febris, quia tunc humor putridus digeri debet, quum tota materia putrescere incipiat.

Ad tertium, dicimus propositionē esse ueram, modò de his omnibus fructibus intelligatur, qui sua humiditate ad corruptionem sunt proni: sed quum multi sint qui sua humi-

ditate corruptioni resistent, ut granata mala, citrina, pruna, &c. idcirco in febribus conceduntur, quum magis per suam frigiditatem iuuant, quàm per humiditatem putrescibilem noceant.

Ad quartum Galen. 3. de uic. in morb. ac. comment. 8, Vinum, inquit, aquosum maximè febrientibus est idoneum, & id est quod album est colore & substantia tenui, nullam earum, quæ in cæteris uinis insunt, habens qualitatem, nec austeritatem, nec adstringentiam, nec dulcedinem, nec acrimoniam, nec odorem, & quod in Italia imbecillum est, Sabinum, quod febrientibus administrant, & quod reperiri potest tale uinũ in Asia, Cilicia, Phœnicia, Palæstina, Scyro & Creta: unde si multa reperiuntur in Italia, Asia, Bithynia, nil mirum, imò quod plus est, miratur cur nil tæctum sit de hoc uino ab Hippocrate, quum febrientibus plus quàm cætera omnia sit iocundius, &c.

De febre quotidiana simplici.

Quotidiana est febris intermittens, à pituita extra uenas putrefacta proueniens, cuius

est agrum quotidie per sex horas cum falsa quiete dimittere. Vocatur etiam alio nomine *emphemerina*.

Loci consentientes de febre quotidiana.

Galen. 2. de diff. feb. cap. 4, Febris quotidiana exquisita est quæ ex pituita putredine ortum habet, per sentientes corporis partes à natura detrusa, &c. lege etiam cap. 7. huius libri.

De causis febris quotidianæ simpl.

Causæ præcedentes sunt reperaturæ humidiores, anni que tempora, quies, otium, repletio, balnea statim à cibo. Causæ antecedentes & coniunctæ sunt ipsa pituita, quæ quæ sit quadruplex, acida, dulcis, salsa & nitrea, quæ est acidæ qualitatis particeps, ita quatuor species siue differentia febrium efficiet.

Loci consentientes de causis febris quomodo.

Galen. 1. ad Glau. cap. 7, Fiunt hæ febres ætatibus, naturis, anni que statibus & reperaturis humidioribus, &c. uide latius textum. Itē Auic. ibi, Fit febris humidis, quietis, senibus,

infantibus, nauseatiuam satietatem patientibus & balneantibus se super repletionē, &c. Galen. 2. de diff. feb. cap. 1, Sicut tertiana à flaua bile, ita quotidiana à pituita fiunt. Et in lib. de plenit. tres species pituitæ enumerat. & 2. de diff. feb. cap. 64. esse dixit ut salsa, acida, dulcis, vitrea, quæ acidæ etiam qualitatis particeps dicitur. Vnde Auicēn. 4. can. 2. tra. cap. 47. quatuor species enumerat ibi, Et phlegma putridū quandoque est vitreum, quādoque acetosum, quādoque dulce, quandoque salsum. B. Nota tamen, si quæ sint aliæ species pituitæ, per has quatuor intelligi: nam crudum & mucilaginosum sub vitreo comprehenditur, sicut insipidum & aquosum sub dulci, & ponticum sub acetoso: gypseum uerò febrem non accendit. lege de his fusius lib. 1. cap. de humoribus.

De signis febris quotidianæ simpl.

Febris quotidiana cognoscitur, quia in primis diebus nullū habet uigorem, sed potius in progressu tēporis refrigerationē quandā, ob humoris crassitiē. Paul. Fit inæqualis, submer

sus, debilis, rarus, in principijs uerò particulari-
 ribus fit frequēs, sed nō adeò uelox nec uehe-
 mens, nec magnus ut in tertiana, sed rarus.
 Urina alba, tenuis, deinde fit rubra, nulla
 adest sitis, nisi à pituita salsa aut ualde pu-
 trida fiat, sudor nō apparet materia existen-
 te crassa. Os uētriculi & hepar malè afficiū-
 tur ob uim concoctoriā imbecillē. Præcordia
 ultra naturalē habitū intumescūt ob caloris
 imbecillitatem. Calor etiam accidit hyber-
 no tempore, & fit principium accessionis cir-
 ca uesperū: febris incipit ferè cum syncope, &
 principiū uniuersale durat 18. diebus, & de-
 clinationis 64. Calor huius febris in primo
 tactu est debilis, uaporosus: sed dum mora fit
 in tangendo, sentitur acris & mordax: si ue-
 rò febris fiat à uitreo & acetoso phlegmate,
 multiplicatur ualde frigus, & in uitreo ri-
 gor est uehementior: quæ uerò fit à salsa pi-
 tuita, sequitur horror, & non fit uehemens
 frigus: quæ uerò à dulci, rarò aduenit frigus
 uel rigor.

Loci consentientes de signis.

De his signis fusissimè loquutus est Gal. 2.

de cris. cap. 5. ibi, Febris quotidiana cognoscitur, quia nō primo statim die cum rigore inuadit, sed processu temporis refrigerationes potius quā rigores ipsis adueniunt, neq; in pulsibus seruatur ordo uel equalitas, dū accessiones fiunt, &c. lege locum hunc fusiū, & intelliges iam à me pridem dicta. Lege etiam Paul. lib 2. cap. 23. Item Razen 10. almans. Item Auicen. 4. can. cap. 48. Item Gal. 2. de diff. feb. ca. 10. Et primo ad Glauc. cap. 7, Vniuscuiusque humoris pituitosi signa etiam diffusè habes ex Auic. loc. cit. Vide etiam Aet. ser. 5. cap. 85.

De cura febris quotidianæ.

Quinis intentionibus febrē pituitosam curabis, primò cum regimine sex rerū non naturalium. 2. cū humoris crassi incisione. 3. euacuatione. 4. cum urinae prouocatione. 5. cū symptomatum remotione & membrorum roboratione. Prima intentio perficitur cum attenuantibus cibis & incisorijs, ita ut in primis diebus tenuem exhibeamus uictū, sed in processu temporis crassiorem, & hoc in cura tentatiua. Sint itaque cibi reperiati, ad aliqualem

calore uergētes, ut panis cōtritū, caro pulli,
 borago, fœniculū, uinū interdū cōceditur al-
 bum & lymphatum. In alijs rebus non natu-
 ralibus nō uniformis regula dari potest, quū
 inter salſam & crudā pituitā, inter dulcem
 & acidam magna quippe adſit differentia.
 Secūda intētio fiet, ſi primū aluum cū cly-
 ſteri lenimus: deinde humorē craſſum incidi-
 mus cum oxymelle ſimp. rhodomelle, uel ſy. de
 duabus rad. uel biſantino cū aquis uel deco-
 ctis cap. Ven. fœniculi, petroſelini, maratri,
 apij. Tertia intentio pręparari poterit cum
 agarico, troc. rheub. cōſeptione de turbit, dia-
 phinico, el. indo, &c. Quarta intentio quę
 eſt urinae proritatio, multifariā fieri poterit,
 tū cū pilulis ex ſemine urticae, cuſcuta, tū cū
 decocto apij, fœniculi, tū cum ropicis quę ad-
 hiberi poſſunt. Quinta intētio duo mala ſym-
 ptomata, quę huic feбри coniungi ſolent, re-
 mouet, ſicut eſt ſomnolentia quędam pro-
 funda in principio paroxyſmi, & rigor ual-
 de intēſus. Somnus remouetur cum aceto ma-
 nibus admoto, uel in angulis oculorū poſito.
 Rigor tollitur cum oleo rutę, in quo tandiu

uinū Creticum bullierit, donec cōsumptū uinum amoueat, facta inūctione ante rigoris aduentū circa totā dorsi spinam. Roboratur etiam stomachus cum oleo mastichino de spica, de absinthio: aut intrinsecus cum aromatico ros. diarrhodone Abb. &c.

Locī consentientes de cura
febris quotidianæ.

De prima intentione loquitur Gal. 1. ad Glauc. cap. 12. ibi, Et uniuersum totius uictus caput sit ad incidendum efficacius.

Aui. 4. can. cap. 58, Et fortasse cōtētus eris aqua hordei in primis diebus, dum speratur status propinquior: & nota q̄ instituitur uictus tenuis, dū in cognitionē febris peruenire uolum⁹, uel tenuis ratione quartanæ, uel quia processu tēporis pituita coquitur, & sanguis efficitur, modò à natura uincatur, ut refert Gal. 2. de uic. in morb. ac. De alijs intētionibus loquitur Gal. 1. ad Glauc. cap. 12. ibi, Curamus quotidianā cum oxymellite in primis diebus, & his quæ ualidè urinam cient: circa statum habēda est uentriculo sollicitudo, &c. Vide illū fusi⁹. Vide etiā Razē 10. almans:

cap. de cura febris phlegmaticæ, &c.

De prognost. feb. quotidianæ.

Hippoc. aphor. 4. aph. 63, Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur. Razes 10. almans, cap. de quot. interpol. Hæc febris multis moratur mēsisibus, & mortis suspiciōē habet. Et 18. cōment. Quotidiana est periculosa. Et Auer. 4. collig. Deterior omnibus est quæ ex phlegmate vitreo, & saluior omnium quæ est mūdorum temporum, & quæ est multi sudoris: nam humoris significat tenuitatē & corporis rarā texturam: & raro inquit Auic. euacuātur febrientes à læsione stomachi. B. Quia quū locus pituitæ sit stomachus, fieri nō potest ut si sit febris pituitosa, q̄ nō noceat stomacho, sicut tertiana felli & hepatis, et quartana spleni, &c.

De febre quartana.

Febris quartana ut plurimū periodica, est febris à melācholia non naturali putrefacta, per adustionē bilis genita plerūque eueniens. Cuius est agrū de quarto in quartū diem affligere, & hæc duplex, exquisita & spuria: exquisita fit à naturali melancholia, spuria

Yyy. i.

uerò à non naturali, & hæc cap. de hum.

Loci consentientes de febre quartana.

Causæ quartanæ sunt quacūque atrā bilē generāt, nā ex solo humore atrabilari, putrefacto oritur. Putrefit uerò atra bilis ob sui crassitiē, multitudinē, aut ob aliquā meatuū obstructionem, aut ob facultatis expulsiuæ impotētiā, quæ in corpore corrupta expellere nequit, unde sequitur putrefactio. Fiūt etiam quartanæ ex aliquo hepatis uel splenis affectu, uel successione aliarū egritudinū, &c.

Loci consentientes de causis quartanæ.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 5, Generatur quartana ex solo humore atræ bilis putrefacto: putrefit interdum ob crassitiem, aut multitudinem, aut tenacitatem materiæ inutilis, aut aliquam meatuum obstructionem, &c. Auic. 4. can. cap. 64, Eius causæ sunt que generant melācholiā, postea putrefaciunt eam, &c. Euenit autem ut plurimum ex successione egritudinum febrium diuersarum, ex quarum putrefactione quum adduntur & non

euacuatur, multiplicatur melancholia. B. Rarò quartana continua accidit ex eo, quòd quum in uenis atra bilis ad putrefactionem mouetur, tanquam uirtuti dissimilis extramittitur, quæ putrescens intermittentem efficit. Notat Arcul. ex hoc Auic. loco, quòd id uerum nō sit, quòd putridum à putrido fiat: nam atra bilis ex putredine humorū generatur, quæ non est putrida, quod etiam confirmatur à Gal. 3. de prognost. comment. 29.

De signis febris quartanæ.

Signa quartanæ uniuersalia sunt, quia ipsa incipit cum paucō frigore, quod augeatur & minuitur in eodem paroxysmo, adueniente statu caliditas non est uehemens ut in tertiana, sed maior quàm in pituitosa: præterea quartana paulatim ac insensibiliter à frigore ad calorem se confert, fit etiam plerūque in autūno. Cognoscitur ex uictu præcedēte, & si homo lienosus sit, si populariter fiat quartana, si urina tenuis, alba & aquosa fuerint. Signa particularia sunt, ut si fiat à sanguine adusto, aderit rubedo urinae, signa sanguinis præcesserūt, forma, ætas, tēpus, &

XV. ij.

fit post febres sanguineas. Signa bilis adusta sunt pulsus uelox, frequēs, incipit cū horrore, frigore, siti, sudore, inflammatione, tēpore, atre, & febriū cholericarū successione. De signis pituitæ adustæ aliquid in præsentia nō afferā, quū anceps sim, an pituita ita aduri possit, ut in melancholiam conuerti possit, &c.

Loci consentientes de signis quartanæ.

De omnibus signis tā uniuersalibus quā particularibus loquitur Auic. 4. can. cap. 65. ibi, Signa quartanæ sunt, q̄ incipit cū paruo frigore, &c. lege eū fusiū. Gal. 2. de cris. cap. 4. omnia hæc etiam habet, ibi, Quartana febris cognoscitur, si autūnus frigidā & siccam & inæqualē tēperaturā habuerit, quia tunc quartanarij circuitus frequētiore sunt, &c. lege locum ultra, de pituita utrū aduri possit, ut atra bilis euadat, lege Manardum.

De cura febris quartanæ.

Quinque in cura intēriones cōueniūt, quarū prima expostulat uictum optimū, non flatuosum, sed uentrē emolliētē. Cauēda est sūlla caro, & tenacia edulia, & quæcūque re-

frigerant ac exiccāt:uinū concedatur album,
 tenue. Cōcedantur inter uolatilia quæ optimi
 succi sunt, in statu morbi uictus tenuis adhi-
 beatur magis quàm ante & post, sitque cali-
 dus & humidus. Secūda intētio est uētris le-
 nitio, ac humoris aliqua præparatio: lenimus
 cū clysterib⁹ uel alyis leniētibus, at præpara-
 mus primū cū acetos. simp. rhodomelle, sy. de
 epitimo, de fumo terræ, de suc. borag. bisanti-
 no cū aquis uel decoctis conueniētibus, ut fu-
 mi terræ, lupulorum borag. epitimi, senæ, po-
 lypodij. Tertia intentio est euacuatio, quæ
 parari potest cum sectione uenæ interioris,
 modò sanguis admisceatur, uel abundare ui-
 deatur: aut fiet per pharmacum solutiuum,
 qualis est infusio senæ in sero caprino, aut
 decoctū myrobalanorū cheb. & ind. aut cō-
 fectio hamec. pilulæ de fumo terræ, inde de
 lapide lazuli, & hoc quum decocta ac præ-
 parata fuerit materia: interdum etiam eua-
 cuatio fiet per uomitum, per urinas, & sudo-
 rem, &c. Quarta intētio roborat mēbra, si-
 cuti cor cū ung. de nenuph. citrino, hepar cū
 rebus hepaticis, similiter lienē & stomachum

Yyy.ij.

prout suis locis dictum est. Quinta intentio
 Symptomata tollit, perficitque primò remo-
 uendo rigorem ualidum & frigus, in ungēdo
 spinam dorsi cum oleo rutaceo, costino, cum
 mithridato & theriaca, &c. Et hæc de fe-
 bre quartana exquisita. At spuria hisdemet
 intentionibus curabitur, præter quòd dicta
 magis ad humiditatem & frigiditatem uer-
 gere debet, præsertim si à sanguine adusto,
 uel à bile adusta prouenerit. Digestio etiam
 aliter ac dixi fiet, sed cum oxysachara, syr.
 uiol. aceros. simp. Variabit etiam euacuatio
 quæ fieri debet cum myrobalanis citrinis &
 indis, &c. cætera erunt prout dictum est. Cu-
 ra quartanæ continuæ erit eadem ac dictum
 de interpolata, nisi quòd infrigidationem re-
 quirat maiorem ob assiduum calorem, item
 audacius uena secatur, & tenuius cibandum,
 quum breuioris sit status.

Loci consentientes de cura fe- bris quartanæ.

De prima intentione loquitur Gal. 1. ad
 Glau. cap. 2. ibi, Victus instituendus est opti-
 mus, sine flatibus, ac uentrem emolliens: ar-

cēdi sunt à carnibus porcorum, & ab omni-
 bus edulys tenacibus & tardè exeuntibus,
 quæ corpus refrigerant & exiccant. Vide
 etiam Auic. 4. can. cap. 68. nam ibi fusius de
 victu pertractat. De alijs intentionibus lo-
 quitur ad unguem Gal. loc. cit. ibi, Quartana
 mediocriter ac leniter ab initio tractanda
 est, nullum forte medicamen aut euacuationē
 exhibentes, nisi sanguis uehementer abunda-
 re uideatur: nam tunc uena secetur interior
 uel media, quæ est in sinistro cubito: quòd si
 niger ac crassus sanguis uideatur, audacius
 mittatur: si flauus & tenuis, statim suppri-
 matur: quū morbus in suo uigore fuerit, pro-
 uidendum est uisceribus cum his quæ emol-
 liunt & laxant, deinde medicamentis uten-
 dum quæ urinam cient: & si coctionis indi-
 cia apparuerint, cum his purgandum quæ
 humores atros exoluunt, non semel tantum,
 sed sæpius si fuerit necessarium: utendum &
 à cibo uomitibus, & qui nequeunt uomere,
 per inferiora purgentur. Auic. de his fusius
 pertractat 4. can. cap. 66. Et Razes 10. alm.
 cap. proprio.

Yyy. iij.

Observationes circa euacuationem.

Auic 4. can. cap. 66, Quando quartana est à melancholia sanguinea, tunc extrahatur sanguis secundum quantitatem necessitatis: & quando non est necessaria, tunc phlebotomia est nocua, quatenus debilitat & ducit contrarium melancholiae, & quatenus mouet humores ad exteriora, &c. Gal. 1. ad Glau. cap. 11, Quicumque aliquid ex fortibus medicamentis ab initio exhibuerunt, omnino ante statum, quartanam, quæ erat simplex, sæpius duplicem fecerunt, &c.

Observationes circa victus rationem.

Auic. cap. cir. Prohibeatur in die paroxysmi à comestione: nam rectius est ut eueniat febris uentre uacuo, & non occupetur natura, sed præcipiatur ieiunium, & interdicator aqua frigida illa die.

De prognosticis quartanæ.

Hippoc. aphor. 2. aphor. 25, A Estiuæ quartanæ magna ex parte breues, autumnales longæ, & maximè quæ ad hyemen attingunt. Et aphor. 5. aphor. 70, A quartana capti non

admodum conuulsionibus capiuntur: si uerò prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur. B. Quia quum duplex sit horum sanatio, excretio scilicet & coctio, hæc duo quartana, excretionem scilicet à rigore & coctionem à calore febrili efficit. Aui. 4. can. cap. 64, Saluior quartana est illa, quæ non accidit ab apostemate splenis: quæ uenit ab apostemate splenis, perducit ad hydropem & perniciem. Quartana quæ salua est, liberat ab ægitudinibus melancholicis, ut ab epilepsia, melancholia, & in ea est securitas à spasmò, & non durat nisi per annum, modò error non accadat. Sunt & quartanæ quæ per 12. annos perdurant, quibus omnibus inimicus est autumnus, &c.

De febribus sanguineis.

Quum duplex sit genus febrium sanguinis, alterum à putrefacto sanguine, alterum à nō putrefacto, ambo sub uno tantum nomine synochi continentur: unde dicimus synochum esse febrem acutam, continuam, ex sanguine in uenis putrefacto ortam: altera uerò synochus, id est, continens, est febris acuta ex san-

guine in uenis non putrefacto in multa copia peccare, id est, succis equaliter adauctis. Harum febrium tres sunt species, acmaistica, epacmaistica & paracmaistica, id est, in uigore perseverantes, crescentes & decrescētes.

Loci consentientes de febribus sanguineis.

Gal. 9. meth. cap. 3, Duplex est genus synochi, unum quod ex natura eadem cum diariis constat, alterum est ubi in omnibus uasis ac potissimum maximis equaliter succi putrescunt. Auic. 4. can. cap. 44. inquit medium utriusque scilicet ephemera & putrida synochum sapere: nam differt ab ephemera, quia humor est qui calefactus est: differt à putridis, quia nulla adest putredo, &c. Lege de his Gal. 9. meth. cap. 2. ibi, Quædam enim febrium manifestam habent putredinis notam, quædam nō habent. Lege etiam 2. de cris. ca. 6. Et Paul. lib. 2. ca. 26. & habebis utranque synochi descriptionem. Gal. 2. de diff. feb. ca. 2. & 9. meth. ca. 3. & 2. de cris. ca. 6. tres species synochi demonstrat, quas Aet. ser. 5. cap. 70. inquit solum competere febribus à san-

guine non putrido factis, &c.

De causis februm sanguinearum.

Sex sunt sanguinearum februm causa. prima est obstructio. 2. est repletio. 3. multitudo exercitij non consueti laboriosa. 4. consuetæ euacuationis retentio. 5. aquositas ipsius sanguinis ex comestis fructibus elaborata. 6. Humoris crassi & crudi copia sanguine admixta, &c.

Loci consentientes de causis februm sang.

Paul. lib. 2. cap. 27, Continentium februm origo ex sanguine est, qui nunc efferuescens, nunc putrefactus obstruitur, &c. Galen. 9. meth. cap. 3. inquit, harum februm in gracili & frigido corpore neutrum consistere, sed tantum in corpulentis qui sanguine abundant. & cap. 4. loquens de iuvene palestræ perito inquit, quod suspicio erat hæc esse synochon, quæ ex sanguinis abundantia & obstructione præ carnis copia stipatione provenit, &c. Lege de his fusius Auic. 4. can. cap. 44. Et Aet. ser. 5. cap. 7. ibi, Conflatur hæc ob calidi sanguinis copiam, &c.

De signis febrium sanguinis.

Duodecim signis synochum cognoscas: primo febris assidua est. 2. rubedo faciei & oculorum. 3. inflatio uenarum temporum & eorum repletio. 4. nullus adest rigor uel sudor. 5. interdum adest nasi pruritus, & circa locum cui cucurbitulae applicantur. 6. somnus profundus. 7. loquendi difficultas cum faucium inflammatione. 8. effusio lachrymarum. 9. pulsus maximi, uehementes, citati, crebri, non mordaces. 10. urina neque consistentia, & colore à naturali habitu aliena. 11. estus intolerabilis. 12. graues uigiliae, &c.

Loci consentientes de signis febrium sang.

De his signis facit mentionem Auic. 4. can. cap. 45. ibi, Signa febris sanguinea sunt adhaerentia febris, rubedo faciei & oculorum, &c. Gal. 9. meth. cap. 4, Vbi se inuenisse febrem admodum calidam dicit, pulsus aequales maximos, celeres & frequentes & uehementes, calorisque qualitatem, quae tactum minimè morderet, & urinas seu sordes, id est, consistentia, ac colore non multum à natu-

rali habitu alienas, &c. Lege Paul. lib. 2. cap. 27. ibi, Indicia, &c.

De cura febris sanguineæ.

Cura febris à non putrefacto sanguine, duas tantum intentiones requirit, quarum prima est euacuatio sanguinis per sectionem uenæ usque ad animi defectum. 2. est febrilis caloris alteratio, quæ fit interdum cum aquæ frigida potu. Cura uerò febris à putrefacto sanguine quatuor exposcit intentiones, quarum prima est circa regimen, quod ad frigidum & siccum ordinari debet, unde in cibando primum morbum & uirtutem metire: nam si ultra septimum diem non se morbus extendere uideatur, parum cibabis, exhibendo prisanam hordeaceam, panem contritum cum seminum melonis expressione: similiter ualent lactuca, acetosa, endiuiæ, mala granata, &c. Secunda erit euacuatio, quæ fiet per sectionem uenæ, uel per cucurbitulas, uel per pharmaca solutiva, quæ uaria esse debent, prout humorum mixtio cum sanguine diuersa fuerit, unde bilis per cholagoga, sicuti cum myrobalanis citrinis educetur, uel cum rheubarb. cas-

fia, &c. Pituita cū phlegmagogis ut pluries
 dictū est. Tertia intētio est causarū putredi-
 nis amotio, quæ adimi solent per sui cōtraria:
 nā si à frigida causa dēsum stipatūmue cor-
 pus reddatur, tūc per relaxātia & rarefaciē-
 tia curabimus. Si ex obstructione, per aperiē-
 tia: si ex abūdātia humorū, per euacuātia: si
 ex crassitie, per attenuātia: si ex tenuitate, p
 incrassantia, &c. Quarta intētio est caloris
 febrilis alteratio, quæ fieri potest cū reb⁹ in-
 frigidatibus & attenuatibus, præsertim si san-
 guis crassus existat, ut cū oxysacharo acetos.
 simp. sy. de endiuia, uel existēte tenui cū sy. de
 iuiubis, cū aquis & decoctis acetosæ, portu-
 lacæ, &c. Vel aliquo cū eclegmate, sicuti cū
 zucchero ros. triasand. diarrhodone, &c. Cor-
 rectio accidētū, sicut dolor capitis, sitis, som-
 ni profunditas, fiet, ut pluries dictum est, suis
 in locis.

Loci consentientes de cura febris sanguineæ.

Gal. 2. meth. cap. ult. loquēs de uictu, si cō-
 tinens, inquit, ultra septimū progressū nō ui-

debitur, prorsus à cibo cōtinēdus est ager, in
 uirtutē defecturam cōiicias, &c. Auic. 4. can.
 cap. 46, Cibi sint ex iniubis, ex lentibus cum
 aceto, granatis & sumach. B. Intellige san-
 guine existente tenui. Aet. ser. 5. cap. 7, Cu-
 rādi scopus est copiā euacuare, & calorem
 praternaturalē extinguere, & si qua adest
 crassities, siccare, & debilitatis partibus an-
 tiquā temperiem bonā restituere. De sectione
 uenae lege Gal. historiā de libero & seruo, 9.
 meth. cap. 4. Auic. 4. can. cap. 46, Intētio in
 hac febre est euacuatio plurimi sanguinis us-
 que ad syncopim: & si sanguis fuerit subtilis,
 incrassandus: si cholericus, infrigidandus: si
 crassus, attenuandus. B. Cōueniunt Paul. Aet.
 Gal. & Auic. in extrahendo sanguinē usque
 ad animi deliquium, sed Auerrhois, qui aliās
 stimulus medicorum dictus est, 3. sui collig. re
 probat euidenti ratione Gal. & aliorum in
 hac sectione uenae opinionē, quae rationes nō
 parui apud me momenti sunt: uide tu eas si
 lubear. Gal. loc. cit. synochi cū putredine cu-
 ram recitat, ibi, Si putredo aequaliter in om-
 nibus uasis subsistat, aut in maximis, &c.

Observationes in cura.

Gal. 9. meth. cap. 4, In sectione serua vires, item si ciborum cruditas adfuerit, uel secessus superfluitatum in intestinis, uel alius sanguinis fluxus, uel puerilis uel senilis aetas, uel frigidum, uel gracile corpus, uenam non secabis usque ad syncopim, imò naturæ reliquos itidem ait Auic. & Aet.

De prognosticis febrium sanguinis.

Gal. 3. de cris. ca. 4, Synochi raro eueniunt, & ubi nullus sit error, in quarto finiuntur, natura proprijs circuitibus perueniente, &c. Auic. 4. can. cap. 44, Ex tribus speciebus saluior est epacmastica, deinde homotena, nequior uerò acmastica. B. Nota quòd acmastica & homotena idem significant iuxta Gal. placitum, quare in nominum significato ipse deceptus est, ita ut intelligere uellet, quòd decrescens est salubrior, sed acmastica uel homotena seruans, scilicet eundem tenorem, est minus mala, & epacmastica quæ augendo se semper procedit, ceteris est nequior: quanquam ego crediderim ceteris deteriore,

quæ ac mastica nominatur, sicuti testari uideatur & ipse Gal.

De causone febre.

Causon siue ardens est febris continua, ardentissima ex flaua bile putrefacta, accensa, putrefacta inquã, ne crederet quispiam, sicuti Auerrhois 7. collig. quòd ex bile non putrida ebulliente fieri posset, ex eo fortè Gal. comment. deceptus, qui est 59. quarti aphoris. ubi inquit, Tertiaria febris ab ea quæ ardēs nominatur, humore faciēte nō differt: utraque enim à flaua bile fit. Differūt autē, quoniam febris ardens habet in uenis unā cum sanguine bilem plurimam ebullientem, tertiaria uerò eandem bilem habet in toto corpore delatam & motam.

Loci cōsentiētes de causone.

Aet. ser. 5. cap. 78, Causon siue ardens est febris continua, &c. Gal 4. de uic. in morb. ac. tex. 13, Causon est febris, in qua urens caliditas, sitisque incompressibilis hominem torquet, &c.

De causis febris causi.

Causæ primitiue causi sunt quæcunque

Zzz. i.

calida & sicca sunt, ut uini potus, salforum
 esus, uigilia, motus laboriosi, ira, &c. Cause
 coniunctæ & antecedentes sunt, flaua bilis
 putrescens, uel pituita salsa: unde proprium
 & legitimum causum nominant, qui à bile:
 improprium & spurium, qui à pituita salsa
 prouenit. Interdum causa ipsius causi est ce-
 rebri inflammatio, &c.

Loci consentientes de cau- sis febris causi.

Hippocrates 4. de uictu in morbis acutis,
 textu 1, Causus, id est febris ardens, fit, quum
 uenula tempore aestiuo exiccate, acres ac
 biliosas, quæ tenues sunt, trahunt ad se hu-
 miditates, quas *ἰχθῆρες* uocant. Et textu 3,
 Fit causus ob longum iter, longamque si-
 tim, &c. Ex quibus intelligere potes à cau-
 sis calidis & siccis oriri causum. Si uis dein-
 de scire quomodo uenula illa ad se trahant
 humiditates, lege Galenum comment. 58. in
 4. aphorism. ibi, A febre ardente habito,
 &c. Aetius serm. 5. cap. 77, Ex flaua bi-
 le putrescente incenditur, & alternis diebus

IN CVR. MOR. LIB. II. 1091
exacerbatur, & quandam habet febris im-
minutionem siue remissionem. B. Nota quo-
modo causus differat à synocho: nam causus
à flaua bile, synochus à sanguine. Causus
habet aliquam imminutionem siue remissio-
nem, sed synochus à primordio usque ad fi-
nem, unam tantum habet exacerbationem,
ne fortè, sicuti & ipse Arcul. ambas febres
in unum confundas. Vult enim de mente
Galen. causon in epacmaesticam, homotenam,
& paracmaesticam diuidi, sicuti synochon,
quod nullibi Galen. (quod sciam) somniauit,
ne dicam scripserit. Auic. 4. can. ca. 41, Cau-
son fit secundum duos modos, aut est à cho-
lera, aut à phlegmate salso putrefacto. Hoc
idem etiam adserit Galen. 4. de uic. in mor.
ac. comment. 13. Galen. 1. prorrhœu. tex. 18,
Febris ardens tum ob alias causas, tum pro-
pter cerebri inflammationem fit, &c.

De signis causi febris.

Signa sunt, arida lingua, nigra, appeti-
tus deiectio, uomitus biliosus, uigilie, inter-
dum deliria, fluxus sanguinis narium, dolor

Zzz.ij.

1092 DE CONSEN. MEDIC.

capitis, oculi cōcavi, uentris solutio, inquietudo, sitis uehemens, nisi tussi sicca leuiter irritans adfuerit, &c.

Loci consentientes de signis
febris causi.

Auic. 4. can. ca. 42, Signa cholerica causonis sunt accidētia mala ex uigilijs, inquietudine, adustione, permixtione mentis, &c. Paulus lib. 2. cap. 28, Ardentibus hæc superueniunt, arida lingua, crassa & nigra, uentriculi rosio, deiectiones pallidæ, sitis uehemens, uigilia, & nonnunquam delirium, &c. B. Hæc omnia eueniunt ex motu bilis: sed efficacius reddit rationes. Galen. de his 4. de uic. in mor. ac. comment. 40.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 54, Quibus plurimum sicca tusses leuiter irritantes in febris ardentibus fiunt, non multum siti infestatur, &c. Vide etiam de his signis Hippoc. 4. de uic. in mor. ac. tex. 4 &c.

De cura carain febris.

Curatur hæc febris quadrifariam: primo uictus ratione quæ humidis & frigidis constet. 2. euacuatione, quæ per sectionem ue-

na, & alui eiectioem fieri potest. 3. cum
extinctione caloris febrilis. 4. cum acciden-
tium correctione, quæ omnia fient prout di-
ctum est in cura tertianæ interpolatæ, &c.

Loci consentientes de cu-
ra causi.

Paul. lib. 2. cap. 29, Dupliciter solui debet
morbus, aut excernendo humores biliosos, aut
eos extinguendo. Excernuntur per sudores, uo-
mitiones & imum ventrem, extinguuntur aqua
frigida potu, &c. Auicen. 4. can. cap. 43,
Causus curatur cura tertianæ puræ, & si in-
diget euacuatione, festina: nā euacuatio me-
lior est quàm in tertiana, sed complemen-
tum sit apud digestionem, & non phleboto-
metur, nisi in urina adsit turbiditas & ra-
bedo, &c.

De prognosticis causi febris.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 58, A febre ar-
dente habito rigore superueniente solutio.
B. Rigor incitatur à bili per sensilia mem-
bra, ueluti motu delata, unde aluus soluitur,
sudores & uomitus excitantur, & bilis ex-
purgatur. Hippoc. aphor. 4. aphor. 48, In
Zzz. ij.

febris non intermittibus si partes exteriores frigidae, interiores uruntur, & sitim habeat, lethale est. B. Intelligitur hoc de causo: nam Galen. 1. prorrh. tex. 7. quando causus interna quidem urit, externa uero nec mediocriter calefacit, lethalis est. Hippoc. aphor. 4. aphor. 43, Febres quaecunque non intermittentes tertia die fortiores fiunt, magis periculosa: quocunque autem modo intermiserint, periculum abesse significatur. Et aphor. 4. aphor. 49, In febre non intermittente, si labrum, uel oculus, uel nasus, uel supercilium peruertatur, uel non uideat, uel non audiat, tam debili existente corpore, quicquid horum euenerit, mors proxima est. Et aphor. 4. aphor. 50, Vbi in febre non intermittente difficultas spirandi & delirium acciderit, lethale. Et aphor. 6. aphor. 26, Quibus in febribus ardentibus tremores fiunt, delirio soluantur. Auicem. 4. can. cap. 41, Raro febris ardens senibus accidit: & si accidat eis, pereunt, quoniam non fit in eis nisi à causa ualde forti. B. Similis sententia habetur ex Galen. aphor. 1. comment. 14. ibi, Senibus

non acutæ febres accidunt, etsi quando rarerent talis accidat febris, qualis iuuenibus, omnino hæc ad ægrotantis interitum terminatur, quoniam indicium est, immensam quandam esse causæ febrem facientis magnitudinem, &c. Hippoc. 4. de vic. in mor. ac. tex. 10. Si è naribus fluxerit sanguis, soluitur ægrotatio, atque si sudores superuenerint iudicatorij, legitimi, cum urinis albis, crassisque, & lenibus subsidentijs, &c.

De febre epiala.

Epiala, est febris pituitosa intermittens, à pituita vitrea in locis à corde remotis putrefacta, quæ ex sua propria natura eodem tempore frigus & calorem inducit. Dicta est à leni afflictione, sicuti ἡπιᾱλος sonat.

Loci consentientes de febre epiala.

Galen. 2. de diff. feb. cap. 6, Quando quis febricitat, simul & riget, atque eodem tempore in toto corpore utrumque affectum sentit, ea febris est quæ propriè epiala uocatur. B. Si-

Zxx. iiij.

milis sententia est in lib. de inæquali intēperie, cap. 8. Idem etiam adserit Haly Abb. 6. sue theoricæ cap. 6. Et Razes 16. continēis, cap. 3. Serapio 6. sui breuiarij, Hæc febris non est continua, sed interpolata, durans tribus uel quatuor periodis. B. Nota quòd Serapio & Auicen. in hac febre plurimum à Galen. discrepant, siquidē epialem pro lypyria sumunt: nam quotiens frigus in interioribus, & calor in exterioribus sentitur, epialam esse dicunt. Galen. uerò quotiens uterque affectus unà sentitur: sed ideo errant, quia nomina simul confundunt. Vide Aet. ser. 5. cap. 87. Febris epiala à leni afflictione uocata est, quum simul febricitant & rigent, & utrunque percipiūt eodem tēpore in omni corporis parte. Paul. lib. 2, ἡ πιάλος ἢ ἀπὸ μεταφορῆς τῆς ἀλός, ἢ ἀπὸ τοῦ ἡπίως ἀλεαίνειν, ὅτι δὲ δερμαίνειν. id est, epiala dicitur per translationem à sale, uel ab epios, quod est molliter, & aleanem quod est calefacere, eò quòd uehementer non urat, sed molliter ac blandè calefacit, &c.

De causis epialæ febris.

Causa est pituita vitrea, partim cruda, partim putrefacta, interdum cum amara bile coniuncta, atque per sensilia membra delata ac mota, &c.

Loci consentientes de causis epialæ.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 6, A^l pituita tantum vitrea partim putrefacta, partim cruda remanente, unde fit ex putrefacta calor febrilis, & ex cruda frigus pari ratione gignitur. Auic. 4. can. cap. 51, Causa est phlegma vitreum in profundo corporis contentum, quod locum infrigidat in quo collocatur, cui si accidat putredo, vapor eleuatur, & partes exteriores petens calefacit. Gal. de inæquali intemperie cap. 8, Si pituitosus succus, qui est frigidus, & quem vitreum Praxagoras appellat, & amara bilis quæ calida est, simul abundat, ac per sensilia membra moueatur, nil miri est utrumque à cubante pari modo sentiri. Lege Paul. lib. 2. cap. 25. Et Aet. ser. 5. cap. 87.

De signis epialæ febris.

Signa sunt, quod una sentitur frigus & ca-

lor, urina alba, tenuis, cruda, pulsus rarus, tardus, habita scilicet aliarum febrium ratione, in quibus frequentior esse solet: seruat interdum accessionem tertianam & quartanam ob sui crassitiam & paucitatem: nam humana natura humorem hunc vitreum abundare non sinit. Spatium eius paroxysmi est à quatuor horis usque ad 24. horas, interdum pauca existente materia citius absumitur.

Loci consentientes de signis epialæ.

De his signis lege Auicem. 4. can. cap. 52. ibi, Signa eius sunt quæ prædicta sunt, & urina est frigida, cruda, &c.

De cura febris epialæ.

Eadem cura est, ac in quotidiana dictum est: uerum calidioribus magisque incidentibus præsidij indiget, &c.

Loci consentientes de cura epialæ.

Paul. lib. 2. cap. 25, Hæc febris ex pituita nascens, quum ex quotidianarum genere existat, curationi illarum subijcitur, à quotidiana tamen differt, quia tanto calidiori-

bus, magisque incidentibus indiget, quanto frigidior pituita existit.

Observatio in cura.

Auic. 4. can. cap. 60, Caue ne calidioribus in principio medicamentis utaris, sed incipe cum syr. aceroso, mellino, deinde ad sy. compositos, demum ad semina aperitiua & ad infusionem aloss, & troc. de rosis, sed os stomachi præcipuè inter alia cõfortetur, &c.

De prognosticis febris epialæ.

Serapio 6. breuia. Hæc febris non multum permanet, & fortasse durat per 20 dies, aut ultra parum, aut minuitur parum, quia ob humoris paucitatem longo tempore durare non potest.

De febre lipyria.

Lipyria febris est ea in qua exteriora & superficies refrigeratur, & profundum uritur, & excretiones detinentur, aspera sitientibus lingua est, pulsus parvus & obscurus ob calorem intra se receptum.

Loci consent. de lipyria febre.

Gal. de inæquali intemperie cap. 8, Lipyria est quum intus in ipsis uisceribus calorem sentimus, & in extremis partibus uniuersis

frigus. Itidem ait Auicen. & omnes practi-
cantes.

De causis febris lipyriæ.

Causa quur exteriora frigeant, & inte-
riora urantur, est calor ad interiora reuo-
catus, uel spiritus, quum ad interiora se con-
ferunt, exteriora relinquentes. Vel ideo frige-
scunt exteriora, quia in externis partibus pi-
uita uitrea continetur, aut quia uapor à pu-
trido humore eleuatus, dum à calore sepa-
ratur, multoties corpus infrigidat, &c.

Loci consentientes de causis
febris lipyriæ.

De his causis lege Auicen. 4. can. cap. 53,
ibi, Quia uirtus effunditur ad locum in quo
est lesio, idcirco exteriora à calore relin-
quuntur, &c. Lege etiam Gal. aphor. 4. com.
48. ibi, Quia fortis inflammatio in profun-
diori parte corporis, uel erysipelas euenit, un-
de totus ex toto corpore sanguis ad patien-
tem locum trahitur, ut sit in principijs acces-
sionum, &c.

De indiciis febris lipyriæ.

Indicia & eius cura manifesta sunt, quia

curatur ut cætera phlegmatica, & cognoscitur ex descriptione data, &c.

Loci de prognosticis lipyriæ.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 48, In febribus non intermittentibus, si partes exteriores frigide, interiores uruntur, & sitim habeat, lethale. Gal. 2. prognosticorum comment. 4, Si caput manus ac pedes frigidi sunt, uentre, costisque calentibus, malum. Est etiam cap. quæ possent etiam de lipyria intelligi.

Authores dissentientes circa febrem lipyriam.

1 Adserere, lipyriam non esse febrē, eò quòd calor extraneus non diffundatur per totum corpus.

2 Adserere, lipyriam esse posse febrem interpolatam.

Confutatio dissentientium circa febrem lipyriam.

Ad primum respondet Auicen. 4. can. cap. 53, Et si calor non diffundatur per totum corpus, hoc non prohibet, quin sit fe-

bris, dummodo calor extraneus aptus, natus sit per totum corpus diffundi, sicuti non repugnat hominem esse risibilem, etsi non rideat.

Ad secundum, Gal. 4. apho. comment. 48. respondet dicens, Nunquid huiusmodi casus possit fieri in febre intermittente? ego neque uidi inquit, neque animo capio: uidentur siquidem solis accidere febribus, quæ causones ab incendio nominantur, perniciosi, uel si aliter libeat appellare, κακὸν ἑσπέρην, uel πυρρὴν, &c.

F I N I S.

I N D E X E O R V M Q V A E
in libris de Curandis morbis con-
tinentur.

A	Ætas non dicitur
an Absinthii suc- cus magis sto- macho cōferat quàm ipsa her- ba. 339	calidavel frigi- da, nisi ratione subiecti 38
Ætas quid 35	Ægritudines cō- positionis quot 81
Ætates quot sint 36	Alfeniati 391
Ætatum tempe- ramenta quot 35	Alteratricis offi- cium 71
Ætates an sint plures , quàm quatuor 36	Alteratio corpo- ris quot modis fiat 80
Ætates an pos- sint præfiniri 37	Alteratio duplex 133
Ætatū doctrina an sit utilis 37	Alteratio, conco- ctio, humorū que præparatio ac digestio quo modo differāt 133. 134

INDEX.

- | | | |
|-------------------|------------------|-----|
| Alteratio per se | tarius | 590 |
| an sit causa do- | Anima quomo- | |
| loris | do à natura di- | |
| 207 | stinguatur | 13 |
| Angina quid sit | Animæ sedes vbi | |
| 540 | 70.71 | |
| Anginæ differē- | Animalis virtus | |
| tia 541. causæ | ex motu co- | |
| 542. indicia 545. | gnoscutur | 70 |
| cura 546. confe- | Appetentia quot | |
| rentia, progno- | modis lædatur | |
| stica 551. an cō- | 704 | |
| ueniant reper- | Appetitus du- | |
| cussiva | plex | 704 |
| 554 | Appetitus canini | |
| Angina an ma- | causæ 706. si- | |
| gis à pituita, | gna 708. cura | |
| quàm à cæteris | 709. conferen- | |
| humoribus fiat | tia 712. progno- | |
| 553 | stica | 713 |
| An omni angini | Appetitui canino | |
| conueniat | an semper vi- | |
| sectio venæ 554 | num conferat | |
| Anhelitus an sit | 717 | |
| motus natura- | | |
| lis vel volun- | | |

INDEX.

- Aperitiua** in spu
to sanguinis ex
retentione mē-
struorum facto
an cōferant 618
- Apertio** quid re-
ferat 89.90
- Apoplexiæ** spe-
cies 310. causæ
292. signa 293.
cura 297. pro-
gnostica 308
- Apoplexia** an à
calido humore
fiat 310
- Apoplexia** an à
simplici frigo-
re fiat 311
- Apoplexia** fortis
an possit sana-
ri 311
- Error** eorum qui
apoplecticum
dormire non
sinunt 305
- Aphtharū** causæ
527. indicia &
cura 528.529.530
prognostica
530
- Arquatus** mor-
bus siue auri-
go 760
- Ars** curatoria
quotuplex 114
- Arteriarum** tres
dimēfiones 102
- Arteriæ** an tantū
moueātur mo-
tu pulsus 103
- Articularis** mor-
bi causæ 994,
995. signa 997.
cura 1000. pro-
gnostica 1004
- Asciti** an semper
incisio cōferat
816.817

Aaa.i.

INDEX.

Asthma an sit ve-	Auditui nocen-
rus morb ⁹ pul	tia 460
monis 550	Ausonii epigrá-
Asthmatis cau-	ma de intētio-
sa 580. 582. indi-	nibus medico-
cia 584. confe-	rum 280
rentia 588. cura	Azaravius pro-
586. prognosti-	hibet secari ve-
ca 588	nam in phre-
Asthmati an cō-	nitide 225
ueniant valde	B
soluentia 591	Balneū quid pro-
Attrahicis offi-	ficiat in oph-
cium 72	thalmia 417
Auctio 69	Balneum quibus
Auctrix & nutrix	casibus nō con-
an sint idē 73	ueniat 1028
Auriū dolor 449	Batrachi causæ,
doloris causa	indicia & cura
450. indicia 451	424, 425
cura 453. 460.	Βρογχοι 557
prognostica 462	Bulimi 714. cau-
Auditum acuen-	sæ, signa 715 cu-
tia 444	ra & prognosti-

INDEX.

- | | | |
|------------------|-----|--------------------|
| ca | 717 | Calidū quot mo- |
| Bulimus an idē | | dis dicatur 28, 29 |
| cū appetitu ca- | | Calidiora mem- |
| nino | 717 | bra |
| Bulimo an cibi | | Calor naturalis & |
| crassi conferāt | | extraneus 1008 |
| 718 | | Calor an accen- |
| C | | di possit tan- |
| Cachexia | 791 | tum in spiriti- |
| Cachexia an sem | | bus |
| per præcedat | | 1021 |
| hydropem | 817 | Caput lædētia |
| Cachochimia | 109 | 204 |
| Calculorum re- | | Capilli cur de- |
| num progno- | | fluant |
| stica | 917 | 630 |
| Calculi an pos- | | Cardiaca passio |
| sint generari à | | 654. 655 |
| calido tempe- | | Catarrho confe- |
| rato | 918 | rentia |
| Calculosis dormi | | 567 |
| re super dor- | | Cataracta oculo- |
| sum an noceat | | rum |
| 918 | | 427 |
| | | Causæ salubres & |
| | | insalubres |
| | | 80 |
| | | Causæ morbi |
| | | quot sint in ge |

Aaaa. ij.

INDEX.

nere	81	Cerebri ventri-	
Causæ morborū		culos respirare	
calidorum	83		108
Causæ frigidorū		Cerebri substan-	
& siccorum hu-		tia an possit	
morum	83	inflammari	231
Causæ morborū		Charibitus	111
an semper con-		Chiragra	994
siderandæ	85	Cibi melancho-	
Cephalæa 165. quē		lici	331
locum occupat		Cibandū aliquan-	
166. signa	171.	do in morbi vi-	
cura 165. cur do-		gore	119
lorem per in-		Coitus an valeat	
terualla effi-		in morbis pi-	
ciat	174	tuitosis	974,
Cephalææ & he-			975
micraniæ pro-		Colicæan in prin-	
gnostica	205	cipio cōueniāt	
Cephalæa an à ce-		narcotica	734
phalalgia diffe-		Colici doloris cau-	
rat	207	sæ 877. signa	
Cepæ cur noceāt		879. cura	883.
capiti	231, 238	nocētia & con-	

INDEX.

- ferentia 891. Contraria cōtra-
 prognost . 893 riis curatur 89
 Columella 534 Conuulsio 334 an
 Cōcoctio duplex sit morbus vel
 134 . præcedit symptoma 337.
 digestionē 139. diuisio & cau-
 an à frigido sæ 338 . an sit
 fiat 139 curabilis 343.
 Concoctio quot quod fieri pos-
 modis lædatur sit à flatu 341.
 690 signa 345. cura
 Cōcoctionis cor- 348 . progno-
 ruptæ causæ stica 359
 691 Cōuulsio ex hel-
 Cōcoctionis corru leboro quomo-
 ptæ signa 694. do intelligatur
 cura 696. pro- 359
 gnost. 700,701 Cōuulsio ab ina-
 Cōcoctio an læ- nitioe an sem-
 datur à siccita- per mortalis
 te & humidita- 364
 te absque aliis Conuulsio ex re-
 qualitatibus pletione, an à
 702 febre sēper cu-
 Aaaa.ij.

INDEX.

- | | |
|---|--|
| rari possit 364 | D |
| Conuulsio incurabilis 365 | Delirium fit interdū non patiente cerebro 230 |
| Cordialis medicina quot modis dicatur 664 | Dentes an per se patiantur 516 |
| Cordi nocentia & conferentia 666 | Dētes an ab aliis ossib' ferāt 516 |
| Coriza 556 | Dētes an possint apostemari 516 |
| Corpus fluidum quomodo intelligatur 85 | Dentium dolor 458. causa 459. signa & cura 511. 514. prognostica 515 |
| Corpus respirat etiam per venas 108 | Dentibus nocentia 514 |
| Corporibus sanis quod nutrimentum 121 | Destillatio quid sit 556 |
| Cura singulorum morborū in genere 87 | Destillationū causæ 557. indicia 559. cura 561. prognost. 567 |
| Curationis præcipua intentio 88 | |

INDEX.

- | | |
|---|--|
| Destillatiões quæ
veræ vocentur
568 | petitus canini
710 |
| Desideriũ an sit
ex cerebro 973 | Diuretica an in
principio cal-
culi conueniāt
918 |
| Diabetis signa, &
ei ⁹ cura 928, 930 | Dolor, & eius spe-
cies 874 |
| Diabeti conferen-
tia, & eius pro-
gnostica 333 | Dolor an fiat ab
humido tātũm
207 |
| Differentiæ par-
tiũ quatuor 62 | Dolor an fiat à so-
lutione conti-
nui tātũm 207 |
| Difficultas spirā-
di an proue-
niat tantũm à
læsione spirita-
lium 590 | Dolor auriũ 449
causæ 450. in-
dicia 451. cura
453, 460. pro-
gnostica 462 |
| Digestio 135. du-
plex 140. an
sit humorum
alteratio 139 | Dolor dentium
458. causæ 459.
signa & cura
511. curatĩa 514.
prognostica 515 |
| Discordia Auicē-
næ cum Gale-
no in cura ap- | Aaaa.iiij. |

INDEX.

Dolores dentium	rarum cōferen
an magis calidi	tia 995
tate, quàm fri-	Dysenteria quid,
gidityate fiât 516	& eius causæ 831
Dolor stomachi	Dysenterix signa
& eius causæ	833. cura 836. cō
719. signa 720.	ferentia 844.
cura 722. confe-	prognostic. 845
rentia & nocen	Dysenteria san-
tia 727. progno	guinea an bilio
stica 728	sa deterior 848
Dolori maximo	Dysenteria ab a-
an semper phle	tra bile an sem
bothomia con-	per lethalis 848
ferat 730	δυσεντερία 935
Dolor colic⁹, cau	δυσεντερία, & ei⁹ cau
sæ 877. signa	sæ 580. 581
879. cura 883.	
nocentia & cō	Elemētum phy-
ferētia 891. pro	sicum & medi-
gnostica 893	cum 17
Dolor iunctura-	Elemēta quot 18
rum 994	Elementa homi-
Doloribus iūctu	nis 18, 19

INDEX.

Elemētorum do-	lidi & ficci 288
ctrina an sit v-	Epilepsia an ha-
tilis 12	beat cum apo-
Empyema 620	plexia eandem
Empyematis si-	causam & locū
gna 623. cura 625	affectum 288
prognostica 629	Epilepsiæ causa
Empyema an per	immediata an
vstionē vel in-	sit vapor absq;
cisionē curan-	materia fouen-
dum 633	te 288
Epilepsia an sit	Epulis qd sit 518
morb ⁹ vel sym	Euacuatio quot
ptoma 267	modis fiat 150
Epilepsiā excitā-	Euacuatiōi quot
tia, curatiāque	requirūtur 152
184	Euacuatio nimia
Epilepsia per cō-	morbū parit
sensū an post	153
pubertatem cu	Euacuationes
retur 288	quādo non de-
Epilepsia an cure	beant fieri 155
tur per omnē	Euacuatio an fie
mutationē ca-	ri possit in prin

INDEX.

- | | |
|---|---|
| cipio morbi ma-
teria nō turgē-
te 155 | priæ corporis
quot sint 68 |
| Euacuatio an sit
optima, si copia
humorū exeat
156 | Facultates natu-
rales an sint in
qualibet cor-
poris parte 71 |
| Excremēta quan-
doq; partes, quā-
doq; signa sunt
92 | Facultates an ali-
bi sint, quā-
in animato cor-
pore 72 |
| Extremis morbis
extrema reme-
dia 131 | Facultatum co-
gnitio utilis 72 |
| F | Febris quid & vn-
de dicatur 1009 |
| Facultas triplex
65 | Febris an sit cali-
da & sicca cō-
plexio 1020 |
| Facultas vitalis
an naturali sit
prior 72 | Febris an diuida-
tur in morbū
& accidēs 1020 |
| Facultates omnes
vbi collocētur
66 | Febris ephemeræ
causæ, signa &
cura 1021, 1022,
1023 |
| Facultates pro- | |

I N D E X.

- | | | |
|--------------------|------|-------------------|
| Feb. biliosa | 1049 | 1041. 1043. 1048 |
| Febris ephemera | | Febristertiana an |
| an sit acciden- | | possit per ac- |
| talis | 1029 | cessionē de ter- |
| Febris hectica an | | tio in tertium |
| possit per se | | 1064 |
| incipere | 1038 | Febres acciden- |
| Febris hectica cur | | tales |
| difficilis cogni | | 10 |
| tionis & facilis | | Febrium diuifio |
| curationis | 1038 | 1010 |
| Feb. hepiala | 1095 | Febrium causæ |
| Feb. lipyria | 1099 | in genere |
| Febris quotidiana | | 1012 |
| 1067 | | Febrium tempo- |
| Febris quartana | | ra |
| 1073 | | 1015 |
| Febris tertiana | | Febrientibus an |
| notha | 1059 | omnes fructus |
| Febris tertiana | | noceant |
| pura | 1047 | 1065 |
| Febris tertianæ | | Febribus an ali- |
| causæ, signa, cu | | quod vinū con- |
| ra, prognostica | | ueniat |
| | | 1065 |
| | | Febris sanguineæ |
| | | genera |
| | | 1081. |
| | | causæ |
| | | 1083. si- |
| | | gna |
| | | 1084. cura |

INDEX.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1085 . progno- | an conueniant |
| stica 1088 | styptica 894 |
| Febris putridæ di- | Fluxus hepaticus |
| uisio & nume- | an requirat te- |
| rus 144, 1040. | nuem victum |
| Feb. caufon 1089 | 894 |
| Finis medicinæ 9 | Fluxus hepaticus |
| Fluxionum dif- | an fit facilis cu- |
| ferentiæ 543 | rationis 894 |
| Fluxus in apo- | G |
| stematis hepa- | Generatio nō est |
| tis an mortalis | simplex natu- |
| 758 | ræ actio 68 |
| Fluxus vehemēs | Gingiuarum affe- |
| an in principio | ctus 518. causæ |
| fit compescen- | 519. signa 520 |
| du 848 | Gingiuæ cur cor- |
| Fluxus hepatici | rodantur 521 |
| species 850. cau- | Glaucoma quid |
| sæ 852. signa 855 | 427 |
| cura 858. cōfe- | Gonagra 994 |
| rentia 893. pro- | Gonorrhœa 964 |
| gnost. 893. 894 | causæ & signa |
| Fluxui hepatico | 965. confere- |

INDEX.

tia 968. progno	niat	cerussa
stica 968	758	
Gonorrhœa an	Hepatis apofte-	
fit propria pas-	matib ⁹ an con	
sio pudēdi vel	ferāt stypticio	
expultricis fa-	ra, q̄ in morbis	
cultatis 974	stomachi 188	
Grauedo 555	Hepatis apofte-	
Gurgulio 533	matian confe-	
Gutturi nocentia	rat sectio venæ	
551	in pede, an in	
H	brachio 758	
Hectica 1030	Herniarum spe-	
Hemicranix 195.	cies 953, 954	
causæ, signa 196.	Homo an possit	
cura 199	viuere sine ci-	
Hepatis imbecil-	bo vel plures	
litas 730. causæ	dies 702	
731. signa 732. cu	Humidiora mem	
ra 733. conueni-	bra quæ 130	
entia 780. pro-	Humiditas quo-	
gnostica 141.	modo efficiat	
Hepati supercale	dolorem 209	
facto an coue-	Humores quid	

I N D E X.

sint	30, 147	an semper ma	
Humores unde		la	805
generentur, &		Hypofarca an de	
quomodo	41, 42	terior ascite	818
Humores mali		I	
an possint nu-		Ictericia qd	760
trire	57	Icterici cur fla-	
Humores calidi		tuosi non sint	
& tenues num			774
præparatione		Ictericia ante se-	
indigeāt, ante-		ptimū an sem-	
quam euacuen-		per mala	775
tur	139	Ilei causæ signa	
Humores crassi		897. curatio	
an coquendi &		899. nocētia &	
maturandi	139	conferētia	901.
Hydropis species		prognostica	
798, 800. cau-			902
sæ	801. signa	Ileus an possit ge-	
804. curatio		nerari ex stran-	
807		guria	903
Hydropum signa		Ileus an possit cu-	
815		rari per fluxū	
Hydropi tussis		vrinæ	903

INDEX.

Inflāmatio quid fit 518	L
Inflammationis iecinoris causæ 741. signa 746. cura 747. pro- gnostica 756	Lac an possit ad- hiberi in oph- thalmia 421 Lac an phthificis conferat 633
Inflāmatiōni he- patis an conue- niat aqua hor- deacea 758	Lapis renum & vesicæ 905
Infania quid 366	Lapis renū num possit auferri per incisionem 918
Iocinorosi qui di- cantur 731	Lapidē generan- tia & curantia 1003
Igouvēia quid 934, 945	Lethargi 233. cau- sæ 235. signa 236 curatio 241. pro- gnostica 247
Ischuriæ causæ & signa 946. cu- ratio 948	Lethargi & phre- nitidis disci- men 239
Ischuriæ & stran- guriæ cōferen- tia 949. progno- stica 950	Lethargi & apo- plexiæ disci-
Ischias quid 994	

INDEX.

men	239	820.
Letharg' an fiat		Lienteria num
primò in cere-		detur, in qua
bro	262	sint semper aci
Lethargus ang-		directus 831
gni possit à me		Linguæ bathra-
lancholia	262	chus quid 473
Lethargo an con		Lippa quid apud
ueniat sectio ve		Arabes 407
næ, si ab humi-		Locus affectus in
ditate & frigi-		hæmicrania 195
ditate fiat	263	Locus affectus in
Lethargo an re-		lethargo 234
pellentia occi-		Locus affectus in
piti adhibean-		paralide 481
tur	263	Locus affectus in
Leuitatis intesti-		dolore dentiū
norum causæ		509
821. signa	823.	Lotium quid, &
cura	825. confe-	eius diuisio 95
rentia	828. pro-	Lotium optimū
gnostica	829	quod 98
Lienis signa	778	Lotiū an sit ex-
<i>Lienteria</i>	quid	crementū tan-

INDEX.

- | | |
|--|---|
| rum renum 99,
160 | bi species 367.
causæ 369. signa
376. cura 382 |
| Lipopsychia &
syncopis quid
differant 670 | Melancholia, mor-
bus quomodo
differat ab hu-
more melan-
cholico 395 |
| M | Melancholia cō-
firmata an pos-
sit sanari 395 |
| Mali habitus 791
signa & cura
793, 794. pro-
gnostica 798 | Melancholia per
inferiora pur-
ganda 386 |
| Medicina quid 9 | Melancholiæ per
cōsensum cura
386 |
| Medicamēti pur-
gat. non potest
dari certa quā-
titas 151 | Melancholiā in-
citantia 391 |
| Medicamentorū
species 159 | Melancholiā cu-
rantia 391 |
| Melancholia, &
eius diuifio 44 | Melancholici cur
fiant epileptici
394 |
| Melancholiæ ge-
neratio 45 | |
| Melancholia, mor-
bus 366 | |
| Melancholiæ mor | |

Bbbb.i.

INDEX.

Membra quid sint	Mensium proflu-
41	uii, signa, cura
Membra frigidiora	988. prognosti-
quæ 30	ca 983
Membra cur sen-	Modus cibandi
sus impressio-	in morbis, an
nem non reci-	cū apostemate
piant 402	223
Membrorum di-	Modus segregadi
uisio 42. 43	lac à sero 386
Memoratricis of-	Modi reuulsionū
ficiū 66	an sint sex tan-
Memoria quid 75	tū 208
Menses prouocā-	Morbus quid sit
tia 983	75
Menses suppri-	Morbus regius
mentia 992	ante septimum
Mensium suppres-	cur malus 477
sionis causæ	Morbus vetera-
977. signa 978.	nus 234
cura 982. pro-	Morbi status ve-
gnostica 984	rè non cogno-
Mensium proflu-	scitur 119
uii causæ 986	Morbi comitalis

INDEX.

265. causæ 267. Morborum nu-
 signa 271. cura merus 86
 274. prognosti- Morborum astu-
 ca 286 torum cur non
 Morbi regii 74. sunt certa præ-
 59. causæ 761. sagia 553
 signa 765. cura N
 466. cōferentia Natura quid sit
 472. prognosti- 13
 ca 477 Natura humana
 Morbi omnes an quid 14
 cognosci pos- Natura quot mo-
 sint per urinā dis accipiatur 15
 86 Naturalis sciētia
 Morbi similes medico neces-
 & instrumen- saria 12
 tarii 86 Nausea quid, &
 Morbi an cogno quotuplex 67,
 scantur, non co 34
 gnito affectu Nauseæ causæ
 secundum na- 674
 turam 85 Nephritidis cau-
 Morborū genera sæ 920. signa
 77 921. curatio 923.
 Bbbb. ij.

INDEX.

- prognost. 917
 Nerui an orian-
 tur à corde 364
 Nervis an vsus
 calidorum fre-
 quēs profit 334
 Nervis calor qd
 efficiat 334
 Notæ temperatu-
 rarum in gene-
 re 30
 Nutrire in acces-
 sionibus quan-
 doque licet 119
 Nutritio quid sit
 58
 Nutritioni neces-
 saria quæ 69
 Nutrimentū non
 datur ratione
 morbi, sed vi-
 rium 18
 Nutrimentū vi-
 scosum an no-
 ceat hepati 758
 O
 Obstructio an sit
 causa missionis
 sanguinis 148
 Oculi an sint cō-
 plexiōis igneæ
 425
 Oculis an pro-
 sint stupefaciē-
 tia 425
 Operatio natura-
 lis quibus per-
 ficitur 61
 Operatio quot
 modis lædatur
 62
 Ophthalmia qd
 396
 Ophthalmiæ spe-
 cies 397. cau-
 sæ 399. signa
 403. cura 407.
 localia 409. no-

INDEX.

centia, progno	dis prognosti-
stica 424	ca 668
Ophthalmia quo	Palpitatio & tre-
modo cogno-	mor an idē 670
scitur, longē du	Paraphrenitis vn
ratura 425	de fieri possit
Orthopnoæ cau	231
sæ 581. indicia	Paralyfis 314 cau
584. cura 585.	sæ 316. signa 320
conferētia 588	cura 321
Orthopnoæ an	Paralyfin gene-
possit fieri abs	rantia 330. cu-
que febre 590	rantia 331
Ossa etiā aposte-	cur in Paralyfi,
matur, teste A-	sensu remanen-
uicen. & quo-	te, solus amitta-
modo 232	tur motus 315
Oxyrhodinū an	Parotidum cau-
applicādum in	sæ & indicia
phrenitide 228	496. cura 499.
Ozæna quid 452	prognostic. 500
Ozænæ causæ 453	παράφρενα 532
P	Partes medicinæ
Palpitationis cor	quot 11

Bbbb.ij.

INDEX.

- | | |
|--|--|
| Peripneumonia | an sint eiusdē |
| & ei⁹ causæ 593 | naturæ 156 |
| indicia 595. cura 598. conferētia 600. prognostica 602 | Pharmaca an priores humores attrahant 157 |
| Peripneumonia | Pharmaca à nutrimento quid differant 158 |
| an fiat per viā fluxus 603 | Pharmacū an omnī tēpore possit exhiberi 158 |
| Peripneumonia | Pharmaca an indifferenter omnes humores purgent 158 |
| cur fiat à pleuritide, & non econuerso 600 | Pharmacum assumptum an dormiendum 164 |
| Peripneumonia | Phrenitidis diuissio & definitio 211. causæ 212. indicia 214. cura. 217. prognostica 229 |
| pituitosa an sit biliosa deterior 603 | |
| Peripneumoniæ | |
| ab aliis morbis ortæ, an phlebotomia conferat 603 | |
| Pharmaca si plura misceantur, | |

INDEX.

Phrenitis quæna	recens	confe-
mitior 230	rat	632
Phrenitis an pos-	Pituita & eius di-	
fit fieri absque	uisio	45
febre 231	Pituita quomo-	
Phrenitis à san-	do falsa fieri	
guine an fit si-	possit	50
gnum exitio-	Pituita non po-	
sum 231	test adeò affari,	
Phrenitidi an fri-	vt] nigra eua-	
gida cōueniant	dat	373
231	Pituita an frigi-	
Phthyfis 619. cau-	dior atra bile	56
sæ 621. indicia	quomodo ex Pi-	
222 cura 625. pro	tuita fit melan-	
gnostica 629	cholia	56
Phthyfis an à	Plenitudo ad vi-	
ficcitate per se	sa & ad vires	111
fiat 632	Plenitudo an sē-	
Phthyfi an ab-	per indicet de	
stergentia solū	secanda vena	
conferant 631	143	
Phthyficis an zuc	Plethora quid, &	
carum rosaceū	quotuplex	109
	Bbbb.iiij.	

INDEX.

- | | |
|---|--|
| Plethora quomo
do curatur 110 | prognost. 457 |
| Pleuritis quid, &
quotuplex 636.
causæ 638. in-
dicia 639. cura
642. conferen-
tia 649 | Potentia quid 63
Præparatio an sit
idem cum dige-
stione & deco-
ctione 139
Præparatio quot
modis fiat 141 |
| Pleuritis an à te-
nui pituita fiat
652 | Propriapismus
quid, & ei⁹ cau-
sæ 969. cura 970 |
| Pleuritis an dete-
rior in sinistro
quàm in dex-
tro latere 653 | Propositum artis
medicæ est sa-
nitas 9 |
| Podagra quid
994 | Principiū & ele-
mētum an idē
20 |
| 501 Polipus quid 457
causæ & cura
509 | Pubertas quot
annis duret
286 |
| Polypum & ozæ
nas curantia
457 | Pubertatis tem-
pus 36 |
| Polypi & ozænæ | Pulsus diuisio
102. vehemens |

INDEX.

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 102. plenus, va- | mido tantū 633 |
| cuus 104 | Purgatio quid |
| Pulsus ex tempe- | fit 151 |
| rie & ætate 104 | Purgatio an non |
| Pulsus ex anni | indigētib ⁹ pro- |
| temporibus & | ficiat 158 |
| regione 105 | Purgare an liceat |
| Pulsus virorum | in die critica |
| & foeminarum | 158 |
| discrimen 106 | Purgatio cur dif- |
| Pulsus ex som- | ficilis sub cane |
| no & vigilia | 163 |
| 106 | Quid vitandum |
| Pulsuum genera | in purgantibus |
| 107 | medica mentis |
| Pulsus an dilate- | 154 |
| tur ex reple- | Qui apti nō sunt |
| tione 107 | ad purgādū 154 |
| Pulmo an sit in- | Putredo an sit |
| strumentū an- | causa mittendī |
| helitus pro- | sanguinem 150 |
| prium 590 | Q |
| Pulmo an vlcera | Qualitates duæ |
| ri possit ab hu- | an sint in ele- |

I N D E X.

- | | |
|--|--|
| <p>mento 21</p> <p>Quartanæ cau-
sæ & signa 1074</p> <p>cura 1076. pro-
gnostica 1081</p> <p>Quatuor tempo-
ra an reperian-
tur in omni
morbo 1019</p> <p>Quot modis di-
catur aliquid
frigidū vel ca-
lidum 28</p> <p>Quomodo ex pi-
uita fieri pos-
sit melancho-
lia 56</p> <p>Quomodo ali-
quid per se per
consensum af-
fici cognosca-
tur 351</p> <p>Quotidiana fe-
bris quæ, & c.</p> | <p>ius causæ 1067</p> <p>Quotidianæ fe-
bris signa 1068</p> <p>Quotidianæ sim-
plicis cura 1073</p> <p style="text-align: center;">R</p> <p>Ramicum spe-
cies 955. causæ
958. signa & cu-
ra 959. progno-
stica 963</p> <p>Ranūculus quid
sit 523</p> <p>Ratiocinatricis
officium 67</p> <p>Ratio diuersitatis
februm quæ
1043</p> <p>Raucedo 556</p> <p>Reficiētia an præ-
cedere debeant
stiptica in syn-
copi 630</p> <p>Regio cōsideran-</p> |
|--|--|

INDEX.

da in tempera-	Sāguis vnde acci-
turis 31	piat suum co-
Renum & vesicæ	lorem 45
calculi 905. cau	Sāguinis sedes 45
sæ 905. signa	Sanguis sincerus
908. cura 911	in venis nō re-
Repletio duplex	peritur 57
110	Sanguis quot mo-
Repletio nimia	dis inutilis 58
quid agat 110	Sanguis spumo-
Resolutio an fiat	sus an semper
tantum sensu	indiciū affe-
omisso 333	cti pulmonis
Reuulsionū mo-	617
di 209	Sanguinis missio
Risus an possit	etiam in vige-
esse in melan-	sima die fieri
cholia 389	potest 58
Robur sanis ser-	Sanguinis missio
uadum vel au-	an tantum ma-
gendum 121	ne fieri debeat
S	148
Sanguis quid, &	Sanguinis missio
eius diuisio 44	an visum he-

INDEX.

betet	149	pleuritidi con-	
Sanguinis missio		ueniat	231
an seper in ple		Sectio venæ an	
nitudine fiat		omni ophthal-	
149		mia conueniat	
Sanguinis mittén-		425	
di scopus	138	Sedimētum vri-	
Sanguinis reiecta-		næ, an semper	
tio per superio		bonū signum	
ra an semper		100	
mala	617	Senes quādoque	
Sanitas quid sit		sectionem ve-	
74		næ perferunt	
Sanitatis cogni-		146	
tio an medico		Senum tempe-	
necessaria	85	ries	37
Sanitati quæ re-		Sicciora membra	
quiruntur	75	quæ	30
Sciatica quid	955	Signa optimæ tē-	
Scotomaticus af-		peraturæ	33
fectus an suffu		Signa morborū	
sionibus oculo		in genere	92
rū differat	148	Signorum alia di	
Sectio an omni		uisio	95

INDEX.

- | | |
|------------------|------------------------------|
| Signa per urinā | ritiei an confe- |
| an certiora, q̄ | rat oē lac 790 |
| per pulsū 107 | Sputi sanguinis |
| Signa vniuscui- | cura 609. |
| usque humo- | Stat ⁹ morbi quo- |
| ris 102 | modo cognosci |
| Somnus quomo | tur 1018 |
| do malus 247 | Sternutamentum |
| Sonitus aurium | an sit in distil- |
| 473 causæ 474 | latione salubre |
| signa 477. cura | 569 |
| 778. curantia | Strāgulatio quid |
| 484 | 540 |
| Spasmus 337 | Strangulatio an |
| Spiratio omnis | possit fieri ex- |
| an deficiat in | inflāmatione |
| apoplexia 310 | asperæ arteriæ |
| Splenis affectus | 554 |
| cura 784 | Stranguria quid |
| Splenis humores | 935 |
| an educi pos- | Stranguria cuius |
| sint pervias vri | facultatis sym- |
| næ 789 | ptoma 938 |
| Splenis omni du | Stranguriæ pro- |

INDEX.

- gnostica 944
 Subuersio 677
 Sudor in lethar-
 go deicit vires
 247
 Suffusionis cau-
 sæ 429. signa
 433. cura 437.
 obseruationes
 444. prognosti-
 ca 446
 Suffusio omnis
 an per chyrur-
 giam possit cu-
 rari 447
 Surditas quomo-
 do à graui audi-
 tu differt 446
 causæ 446. si-
 gna 449. cura
 490. prognosti-
 ca 495
 Συναΐχη quid
 540
 Syncope 656. pro-
 gnostica 668.
 indicia 658. cu-
 ra 660
 Syncopa frequē-
 ter accidens an
 sit signum mo-
 tale 670
 Singultus nō de-
 finens quid si-
 gnificet 686
 T
 Tabes qd sit 619
 Tabis species 619
 Tabidis cōferen-
 tia 628
 Tactus solus in-
 dicat tēperiē 33
 Ταγξις quid 402
 Tēperies quid, &
 quotuplex 22, 23
 Theriaca an ve-
 nenosa & non
 exhibenda 904

INDEX.

Tinesmi curatio 870	Tympanites an à frigido fiat 817
Tinnitus aurium 476	V
Tonsillarum cu- ra 537	Vacuatio quot de causis fiat in principio mor- bi 180
Tremor in parali- tide cur bonus 333	Venæ sectio quo tēpore fieri de- beat 143
Tremoris cordis cura 660	Venæ sect. an vs- que ad synco- pē faciēda 678
Tumores an fieri possint in gut- ture absque do- lore 554	Qui multam & paucam venæ sectionē expo- stulant 145
Tussis curatio 574	Venæ sectionem quādoq; senes perferunt 146
In omni tussi sic ca, nū cōueniāt pilulæ bechicæ 579	Vertigo quid 249
Tussis in hydro- pe an sit signū malum 818	Vertigo per con- sensus an at- tribuenda ca-

INDEX.

piti	263	dificantia	473
Vertigo omnis		Vlcerū brevis Ga	
an per sectionē		leni cura	471
arteriæ curan-		Vomitūs an sem	
da	263	per possit pro-	
Viā ^o ratio à qui-		uocari	688
b ^o sumitur ^o 116.		Vrina aquosa	220
vt instituēda 118		Vrinæ retētio	945
Victus ratio per		Vrinæ stillicidiū	
ætates	112	& causæ	926
Victus ratio ex		Vrinæ stillicidii	
tēporibus an-		cura	940
ni	124	Vrinæ in volun-	
Victus plen ^o 129		tario exitui cō-	
Vinum cur in pa-		ferentia	954
ralysi non con-		Vrinæ incōtinen-	
cedatur	324	tia, & eius cau-	
Vinum an in syn-		sæ 951. signa &	
copi exhiben-		cūra	153
dum	670	Vrinæ sedimen-	
Visio an fiat extra		tum an sem-	
mittēdo	425	per bonū	100
Vlcus auriū	464		
Vlcera auriū mū-			

FINIS.



IOANNIS

BACCHANELLI
De consensu Medico-
rum in cognoscendis
Simplicibus, Liber.



ABROTONVM duplex, alterum masculum,
quod omnibus notū est:
alterum foemellum, quod
uulgò dicitur sātolina,
et est humilis cypressus.
Diosc. cap. 26. tertijs libri
uersione Marcelli. Gal. 6. de fac. simp. Plin.
lib. 21. c. 10. Paul. li. 7. calefacit et siccatur in 3.
Absinthium triplex, uulgare nostram, Se-
a. 4.

4 DE CONSEN. MEDIC.

riphium, quod *marinum* appellatur: & *Santonium*, quod plurimum in Gallia ultra Alpes nascitur, & est illud iuxta *Mathiolum Senensem*, cuius semen uulgò dicitur *Sementina*, quæ pro uerberibus datur pueris. Et nota quòd *Canabel Serapionis*, non est *Sementina*, ut uolunt aliqui, sed est terra arenosa pluuialis, uide *Dioscor. cap. 24. & 25. lib. 3. & Gal. 6. de fac. simpl. ubi amaram & adstrictoriam ac acrem qualitatem illi tribuit. Paul. lib. 7. cal. in 1. sic in 3.*

Acacalis nisi sit species *tamarisci*, hand scio quid sit, quoniam nullum semen uideri potest, quod sit huic simile. lege *Dioscor. ca. 103. lib. 1. Paul. lib. 7.*

Acatia, non habetur uera, sed eius loco accipitur succus *prunioli agrestis* communiter: quāquam satius foret folijs *rhus*, *sumach* uulgò appellati, uti, quā succo *prunioli dicti*: quoniā *rhus* eisdemmet facultatibus pollet, ac ipsa *acatia*, teste *Dioscoride*. Nec eius gumi, quod à *Serapione* dicitur *gumi Arabicū*, habetur, sed eius loco gumi utimur, quod 7. de fac. simpl. à *Gal.* describitur. *Diosc. 118.*

IN COGNO. SIMPLIC. 5

cap. lib. 1. Theoph. cap. 4. lib. 3. nam acatiā
simpliciter spinam uocat. Plin. lib. 24. ca. 12.
Gal. 6. de fac. simpl. Siccat in tertio, & re-
frigerat in secundo ordine: itidem ait Paul.
lib. 7.

Acanthion quid sit nescio, etsi aliqui car-
dium montanum pro specie acanthij demō-
strent. Dioscor. cap. 16. tertij. Gal. 6. de fac.
simp. Plin. lib. 24. cap. 12. Paul. calidus est.

Acanthū domesticum & syluestrem, esse id
quod uulgo branchā ursinā dicimus, aliqui
affirmarunt: uide Plin. cap. 22. lib. 22. &
Diosc. cap. 17. & 18 tertij: & Gal. 6. de fac.
simp. Paul. lib. 7. discutit & siccat.

Achillea non est millefolium, ut putant
aliqui ex autoritate Plin. cap. 5. lib. 25. ubi
ipse habet à Latinis millefolium uocari. Se-
rapio uocat succum Achilleæ, eo quòd rubeat,
sanguinem draconis, qui nunc paratur ex
sanguine arietis, sorbis & resina, & mille
alijs miscellis. de Achillea Dioscor. cap. 34.
quarti: Gal. 8. de fac. simp.

Acinus est iuxta Manardi opinionem
basilicum syluestre, & iuxta Ruellium basi-
a. ij.

6 DE CONSEN. MEDIC.

licum domesticum : sed huic repugnat Plin. cap. 15. lib. 21. quum dicat, acinum non florere, de acino Diosc. cap. 45. tertij. Paul. lib. 7. mediocres adstringendi uires habet.

Acorus, secundum Manardum, uerus calamus aromaticus, Brasauola tenet quòd sit galanga, aliqui quòd sit uulgare gisirium, communis opinio quòd sit calamus aromaticus. De acoro, Diosc. cap. 2. primi. Gal. 6. de fac. simp. & quinto eiusdem cap. 12. Plin. lib. 27. cap. 2. Paul. calefacit & desiccatur in tercio.

Aconitum uoluit Leonardus Fuchsius esse herbam paris, sed falsò, quum nulla sit cum descriptione aconiti similitudo. Leoniceus credidit aconitum esse napellum Auicennæ, quum sint res dissimiles, nec adeò peccauit Auicennas in descriptione napelli, prout notat Leoniceus, ut uideri potest ex Andrea Belunensi, qui Auicennæ textum optimè correxit. De aconito, Dioscorid. cap. 75. & 76. quarti, duas species assignat : prima dicitur pardaliches, eo quòd pardos interficiat : altera cynoctonon & lycoclonon, eo quòd canes & lupos perdat : at mansa uel bibita ra-

IN COGNO. SIMPLIC. 7

dix non statim interficit hominem, sed aliquos in duobus uel tribus, uel sex mensibus perdit. Gal. 6. de fac. simp. & Dioscord. iterum lib. 6. cap. 7. Paul. lib. 7. lethalis uis & excedens est.

Adiantum, est uulgaris capillus Veneris. Theophrast. cap. 13. lib. 7. Adianti dua sunt species, nigra & alba. uide Plin. cap. 21. lib. 22. Et Dioscor. cap. 131. & 132. de adianto & trichomane. Vocatur & adiantum politricon & gallitrichon ab ipso effectu, quem circa capillos efficit. Galen. 6. de fac. simp. In caliditate & frigiditate symmetron est, extenuat, desiccatur, & digerit: itidem Paul. lib. 7.

AEgyptops, est id quod uulgo dicitur, segalla, & non est auena, ut aliqui uolunt. Diosc. 134. quarti. Gal. 6. de fac. simp. Paul. discutit duras inflammationes.

Agallochon, est lignum aloes, nunc habetur Venetijs, & nuper eius loco afferebatur ex Rhodo oliuistrum, quod a Ruellio Aspalathum creditur. Dioscor. cap. 21. primi. Gal. nullibi, quod sciam, nisi succidanus. Paul.

¶.iiij.

8 DE CONSEN. MEDIC.

lib. 7. iocinerosis, dysentericis & pleureticis opitulatur.

Agaricum notum est, ideo appellatum, eo quòd abundanter in Agaria Sarmatiae nascatur. Plin. lib. 16. cap. 8, Nascitur in Gal-
lia super arbores glandiferas. Diosco. cap. 1.
tertij, In Galatia Asiae supra cedros. Sunt
qui dicant in Italia iuxta laricis arboris ra-
dices nasci. Gal. 6. de fac. simp. Paul. digerit
crassos humores & incidit.

Ageraton sunt qui dicant in Hetruria in-
ueniri, simile origano. Diosc. cap. 57. quarti,
& Gal. 7. de fac. simpl. & 6. eiusdem. Paul.
lib. 7. habet uim digerendi.

Allium, Græcè σκόποδον, duplex est, dome-
sticum & sylvestre. Domesticum σκόποδον à
Græcis dictum, sylvestre ὀφιοσκόποδον, id
est, anguinum, non autem, ut Brasauola, sco-
rodoprasson uel ampeloprason: nam ampe-
loprasos nil aliud est quàm porrum sylue-
stre, quod in uineis reperitur, & scorodo-
prasos allium & porrum significat. Diosc.
cap. 141. secundi. Gal. 8. de fac. simp. desic-
cat & calefacit in quarto excessu: uide etiã

IN COGNO. SIMPLIC. 9

illum secundo de facultate alimentorum in fine.

Alcea, uulgò malua sylvestris, siue althea sylvestris, non habet proprium caput apud Gal. sed in cap. de malua, de hac mentionem facit septimo de fac. simp. Diosc. cap. 155. tertij. Volunt aliqui hanc esse quam uulgò dicunt herbam Hungaricam. Paul. lib. 7. sylvestris malua genus est.

Alypon quid sit nescio. Hoc scio plures de mente Athuarij uelle alypon esse thurbit album: nam hoc ab ipso habetur, ubi de triphe- ræ compositione agit: aliqui dicunt alypon esse alypiam, ut Paul. AEG. aliqui dubitant an sit sena. Diosc. cap. 173. quarti. Paul. bilē atram semen alypi ducit & ulcerat.

Alyma nisi ea sit, quam Ruellius & Fuchsius fistulam pastoris, & ab alijs plantaginem aquaticam, quæ uulgò dicitur barba syluana, affirmare ne quid audeo: aliqui dicunt esse speciem betæ aquaticæ. Diosc. cap. 160. tertij, & Plin. cap. 10. lib. 25. duas species assignat. Damasoniū etiā uocatur à Gal. 6. de fac. simp. & habet uim abstersoriam.

Alisson sicut ex Plin. cap. 11. 24. lib. excerpitur, uidetur esse herba quæ Rubia minor dicitur: uerum quia Aet. alisson uocat syderitim heracleam, quæ nullam præfert similitudinem cum rubia minori, idcirco quid sit affirmare non possum: de hac meminit Diosc. cap. 96. tertij, & Gal. 6. de fac. simp. Nonnulli tamen duas species assignant, inter quas facile posset rubia minor connumerari: uerum ea quæ morsibus canum opitulatur, deperdita est, nec reperitur. Paul. lib. 7. siccatoriam illi ac discussoriam, abstersoriamque uim tribuit.

Aloes tria sunt genera, hepaticum, succorinum & caballinum. Diosc. cap. 23. tertij, meminit de hepatica, & Gal. 6. de fac. simp. desiccatur in tertio, & calefacit in primo, adstringitque modicè.

Althæa, uulgò maluanischio, meminit Dioscor. cap. 154. tertij, Theoph. cap. 19. lib. 9. uocatur & hibiscus, & est malua syluestris. Gal. 6. de fac. simp. sub nomine hibisci, & 7. de fac. simp. cap. de malua. Paul. lib. 7. Discutit, relaxat, lenit & concoquit.

Alumen, iuxta Diosc. cap. 77. lib. 5. tri-

plex est, scissile, rotundum & liquidum, loquendo de his quæ in medicinæ usum ueniunt (nam plura apud nos genera nunc habentur, sicut alumen rochæ, plumæ, facis, catini, scaioli, & zucharini) scissile illud est quod nos plumæ uocamus, alumen rotundum non habetur in Italia, nec liquidum: quanquam Brasauola affirmet esse alumen rochæ, quem ualidissimis rationibus confutare Mathiolus Sen. conatur. Alumen zucharinum fit ex alumine rochæ, ouorum albumine, & aqua rosacea. Alumen catinum fit ex herba uocata soda, Arabice chal, unde etiam sal alchali prouenit. Nota est herba apud Hetruscos: alumen scaiolum fit ex petra lucida, scamosa & transparenti, uulgo dicta, spechio d'asino: alumen facis fit ex facce uini cõbusta. Galen. 9. de fac. simp. Plin. lib. 35. cap. 15. Paul. maximè adstringit.

Ambrosia, iuxta Ruellin, notissima est in Gallia, nascitur inter segetes: uerū eā nec uidi, nec scio quid sit, nisi sit species artemisiæ. Diosc. cap. 120. tertij, & Gal. 6. de fac. simp. Adstringit & repellit.

12 DE CONSEN. MEDIC.

Ambra odorifera tres sunt species, color^e distincta, citrina scilicet, albida, & nigricans, cuius mentio fit à Serap. lib. aggreg. cap. hambar. Auic. lib. 2. Calida in secundo, sicca in primo, roborat cerebrum, & cor confortat. Nullibi quòd sciam, fit mentio de hac apud Diosc. uel Gal. aut Paul. uulgò dicitur Ambracane.

Amiantus, Græcè λίθος ἀμίαντος, lapis est qui ex Cypro affertur, similis alumini scissili, similis etiā ligno : unde Brasauola dixit esse aliquos qui eū credant esse lignū crucis Christi: nā in igne positus non cōburitur, sed magis illucescit: meminit Plin. cap. 19. lib. 36. & Diosc. ca. 113. quinti lib. Paul. lib. 7.

Amylum, uoce parū deflexa amido. Optimi amyli condiciones recitantur à Plin. cap. 7. lib. 18. ut sit albus, levis, recēs, lenis. Fit amyllum ex granis frumenti, ut Dioscor. cap. 92. lib. 2. Et Galen. 1. de facul. alimentorum excerptur ex Plinio, cap. 25. lib. 22. quòd amyllum corpus restringit, & fluxum sanguinis, & in doloribus uesticæ media uncia sumitur cum oleo & passulis. Galen. 1. de fac. aliment. ἀποία, id est, qualitate carentem. Paul.

IN COGNO. SIMPLIC. 13

Refrigerat mediocriter & siccatur.

Ammi, Seplastarijs ameos, & est simile semen cymino, ut testatur Plin. cap. 15. lib. 20. Et Galen. 6. de fac. simp. huius meminit, & Dioscor. cap. 63. tertij. Quod uerò accipitur pro ammi non est uerum, sed quid sit nescio. Paul. Calefacit & siccatur in tertio. Gal. 5. de fac. simp. itidem ait.

Ammonicum, uulgò in officinis dicitur ammoniaco, & est duplex iuxta Plin. cap. 24. lib. 12. primū thrausma dictum, & altero est excellētius. alterū phyrama, & est crassum, & ueluti resina. Primum thuris similitudinem præ se fert, unde à Paulo & Aetio ammoniacum thymiama nūcupatur: meminit Dioscor. ca. 89. tertij, & Gal. 6. de fac. simpl. Auer. 5. collig. Calidum in tertio, siccū in primo. Paulus lib. 7. Molliendi uires habet.

Amomū uerum, nonnulli uolunt esse rosam de Hierico, non uerum esse quoddam semē habitum: sed credo uerum non haberi, si rectè eius descriptionem perpendamus. Vtemur igitur loco amomi acoro, ut placet Galen. Dioscor. cap. 14. primi. Plin. lib. 12. ca. 13. Gal. 6.

14 DE CONSEN. MEDIC.

de fac. simp. Paul. lib. 7. Eiusdem uirtutis cum acoro, sed paulò siccioris.

Ampelitus terra, Græcè γῆ ἀμπελίτις, sicca et terra heretria, samiachia, selinusia, sunt apud me incognita. De ijs Gal. 9. de fac. simplic. diffuse, et Diosc. c. 138. lib. 5. Paul. lib. 7.

Ampelopraßon, agreste porrum, uulgò porrandello: de hoc Gal. 6. de fac. simp. meminit et Diosc. 139. secundi. Plin. lib. 24. cap. 15. Paul. li. 7. Acerrimū calidissimūq; in summo ordine, quamobrem ulcerat.

Anagallis, morsus gallinæ: non defuerint, qui portulacā syluestrem esse affirmarent: aliqui etiam dixerunt anagallidem esse pau-rinam, uel centonē, sed longè à uero decipiuntur, quū flores illis non sint eius qualitatis, ac ab ipso Diosc. pinguntur ca. 170. secundi. De utraq; anagallide scripsit Gal. 6. de fac. simp. Deceptus est Razes, interpretās anagallidem pro matrisylua. Paul. Vis est abstersoria, subcalida et attractrix. Serapio lib. aggreg. Calefacit parum, et siccatur sine mordacitate.

Anagyris, planta est arborescens, aliquibus herbarijs ualde cognita: hanc uoluerunt

IN COGNO. SIMPLIC. 15

quidā esse, quam dicunt esse uulvariā. Refert
 Marthiolus eius copiā inueniri in Trerino a-
 gro, ego eā minimē uidi. de hac Gal. 6. de fac.
 simp. meminit, & Diosc. c. 158. tertij. Plin. lib.
 27. cap. 4. Paul. lib. 4. Calefacit & discutit.

Anchusa flores habet à buglossa non ual-
 dē dissimiles: huius tres species à Diosc. c. 25.
 26. & 27. lib. 4. connumerantur, & à Plin.
 cap. 20. 21. lib. 22. Et à Galen. 6. de facul.
 simp. quatuor species. Paul. Adstringendi uim
 habet: aliqui hanc Asini lactucam dixere.

Androsamon humani sanguinis herba, est
 species hypericonis: differt ab eo, quum fru-
 tex sit gracilibus ramulis, succosus, puniceo
 colore, rubentibus uirgis, &c. ut Dioscor. cap.
 164. tertij, & Gal. 6. de facul. simplic. Paul.
 lib. 7. Duplex genus, alterum quod diximus,
 alterum Dionysias dictum, cuius fructus pur-
 gant, & folia desiccant.

Anemone nisi ea sit, quæ à Brasanola uo-
 catur papauer syluestris, cuius flores sunt ru-
 bei, certē nescio si unquam uiderim: hoc
 scio certē non esse herbam uenti, ut Ruel-
 lius: nam herba uenti iuxta placitum Simo-

nis Ianuensis est parietaria, quæ uulgò dicitur uitriola aut grassella: sunt qui anemomem uiderint longè à papauere syluestri differentem. Dioscor. cap. 167. secundi. Plin. lib. 21. cap. 23. Paul. lib. 7. Vim habet acrem, abstersoriam, & extrahēdi ac recludendi ora uasorum.

Anethum similem fœniculo effigiem præ se fert, ut uix ab ipso nisi per gustum cognoscatur. Gal. 6. de fac. sim. & Diosc. ca. 60. tertij. Paul. lib. 7. calefacit in secundo ordine intensius, & siccat paulò remissius.

Anisum, Galen. 6. de fac. simp. semen eius dicit esse calidum & siccum in tertio gradu, & Diosc. ca. 58. tertij. Paul. lib. 7.

Angelica, calida & sicca in tertio ordine, unicè ualet contra uenena, præseruat à peste, comesta confert humori pituitoso, crasso: sanat tussim ab humore uiscoso, si eius decoctum bibatur: consolidat ulcera interiorū, coagulatum sanguinem soluit, roborat stomachum, recuperat appetitū, ualet defectui cordis & morsibus canum.

Anonis, spina est, in aratis terris nascens,

uulgò bognacho. Galen. 8. de fac. simp. Anon-
 nis calida in tertio gradu, &c. Huius memi-
 nit Diosc. ca. 19. tertij. & Theoph. cap. 5. lib.
 6. de hist. plantarum: & Plin. cap. 4. lib. 27.
 Paul. lib. 7. Vrinam ciet, calculos conterit, &
 dolores dentium mitigat.

Anthemis apud Diosc. est camomilla: duæ
 aliæ species à me non uisæ, necdum cognoscun-
 tur. Diosc. ca. 145. tertij, & Gal. ca. 9. lib. 3.
 & sex. de fac. simp. inquit, quòd camomilla ca-
 lida & sicca est in primo gradu. Paul. Virtus
 tenui discussoria laxanti que constat.

Anchylus, nisi ea sit, quæ uulgò dicitur sal-
 sola de mente Ruellij, certè quid sit diuinare
 non possum: huius duæ sunt species, de quibus
 Gal. 6. de fac. simp. meminit. & Diosc. cap.
 144. lib. 3. Plin. lib. 21. cap. 29. Paul. lib. 7.
 Exiccat & absterget.

Anthirrinò, quid sit nescio, sunt qui uide-
 rint, & uulgare in Italia nasci passim affir-
 mât Diosc. 126. li. 4. & Gal. 6. de fac. simp.

Anthera non est flos, ut nonnulli putarunt,
 in medio rosarum positus, sed potius quædam
 compositio, ut ex Gal. Paul. Corn. Cel. elici-
 b. i.

tur ad oris ulcera, & pedum scissuras, & digitorum pterigia accommodata.

Aparine inter lentes nascitur, omnibus nota, uulgò (eò quòd folia in modum calcaris habet) speronella dicitur, uel, ut aliqui uolunt, in modum stellæ folia, hæret uestibus hominum. Diosc. cap. 95. terrij. Gal. 6. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Modicè abstergit & desiccatur.

Aphace similis uiciæ, sed non est uiciæ. Theoph. 7. & 11. c. lib. 6. connumerauit aphacè inter species cichorij, similiter & Plin. li. 21. sed ca. 5. lib. 27. postea historiam ex Diosc. recitat: quare iuxta Diosc. connumeranda est inter legumina, non autem inter herbas syluestres. Diosc. ca. 137. secūdi. Gal. 2. de fac. aliment. Paul. lib. 7. Adstringit ualentius, siccatur & mediocriter calefacit.

Apium satiui, nil aliud est quàm uulgare petroselinum, ut testatur Plin. cap. 11. lib. 20.

Apium syluestre, quo utuntur seplasiarj pro uero apio, est apium aquaticum, eleoselinum à Diosc. dictum, ut testatur Theophrast. ca. 6. lib. 7. non autem est, ut placet Ruellio, quod uulgò dicitur il macerone. Petroseli-

num uerò, id est, saxatile apium, maximè Macedonicum, nuspiam in Italia nascitur: apium uerò hipposelinum dictum, id est grande apium, illud esse tenetur, quod uulgò leuisticum dicitur. De apio meminit Diosc. 67. 68. 69. 70. & 71. tertij. & Galen. 8. de fac. simp. & 6. eiusdem Paul. lib. 7. Tanti caloris, ut menses & urinas eliciat.

Apios, nisi sit species raphani, haud scio quid dicere debeam. Ruellius familiarem herbam esse rusticis Galliae, inquit, & communiter ab ipsis edi: sed quum dicat Diosc. uomitum dicere, nescio an illi credendum sit. Sunt qui dicant uidisse inter segetes nasci cum folijs rutæ, sed paulò strictioribus & uiridioribus: ego nec uidi, nec scio quid sit. Diosc. ca. 170. lib. 4.

Apiastrum, Græcè *μαλιστόφυλον*, uulgò cedronella, aut melissa, aut muliserno, in passionibus cordis (si Serapioni creditur) multum ualens. Diosc. ca. 109. tertij, & Galen. 7. de facul simpl. utitur pro marrubio duplicata dosi. Paul. lib. 7. Viribus marrubio per omnia responder.

b.j.

Arbutus, Græcè κόμπος, arbor similis cotonea malo, uulgò dicitur in Hetruria albaro. Diosc. cap. 143. primi, & Gal. 7. de fac. simp. Turdi libenter arbutifruetibus uescuntur in hyeme. Paul. lib. 7. Acerba qualitatis est, aduersatur stomacho.

Arctio, Latinis personaria, quid sit, nisi, ut Ruelli⁹, sit lappa minor, facile dicere me nescire, quâquam sint qui lappam minorem dicant à Diosc. uocari xanthion. De arctio loquitur Diosc. c. 101. quarti, & Gal. 6. de fac. simp. Personaria tamē est lappa maior. Plin. lib. 25. ca. 9. Paul. lib. 7. Vis tenuis siccans & mediocriter adstringens.

Argemone inter species papaueris cōnumeratur, ego tamē nusquā argemonē uidi, etsi ubiq; nasci Mathiolus Sen. affirmet. Hoc bene scio, non esse agrimonium siue eupatorium, ut nōnulli. Diosc. cap. 168. secundi, & Plin. cap. 8. lib. 25. De hac apud Gal. nil memini me legisse. Paul. Abstergit & discutit.

Argentum uiuum est duplex, artificiale & minerale: sed quo pacto conficiatur, lege Dioscor. cap. 64. quinti, Gal. 9. de fac. simp. num

quam ausus est experiri, an foris uel intus applicandum foret, ueluti uenenum mortiferum. Auer. 5. collig. ca. 9. Est frig. & humid. Galen. 4. de fac. simpl. cap. 18. Calidum est & siccum.

Aristolochia duplex est, rotunda & longa: tertia species eius est dematitidis uocata, que in Italia non habetur: de quarta specie facit mentionem Plin. cap. 8. lib. 25. & uocatur pistolochia. De Aristolochia meminit Galen. 6. de fac. simp. & Diosc. cap. 4. lib. 3. Comendatur in epilepsia. Paul. lib. 7. Calida, tenuis, abstergens, subacris. Auerr. Calida & sicca in secundo.

Armenius lapis, iuxta Manardi placitum, raro inuenitur: licet Mathiolus Senensis dicat in mineris argenti, huius copiam inueniri, & dici uulgò uerd'azurro, quod nec affirmare, nec negare audeo: siquidem sua experientia comprobatum refert in ijs omnibus quæ ab antiquis scripta sunt: uide Diosc. cap. 59. quinti, & Galen. 9. de fac. simp. & Alexan. Trallianum cap. 22. lib. 1. & Plin. cap. 6. lib. 35.

b.ij.

22 DE CONSEN. MEDIC.

Aron, species dracunculi sine serpentariae, uocatur in Hetruria uulgò Gingarò, & fit ex eius radicibus aqua ad dealbandam faciem. Diosc. cap. 157. secundi, & Gal. 6. de fac. simp. Plin. lib. 19. cap. 5. & lib. 24. cap. 16. Et Gal. 2. de fac. alim. Paul. lib. 7. Calore & siccitate est primi ordinis, ex terrestri calida & adstringente substantia.

Artemisia, uulgò Cermisia, in hac deceptus est Brasauola, confundens Artemisiam cum Partenio, uulgò Matricaria appellato: cognosco ego primam & tertiam speciem, & est apud Regienses in usu. Diosc. capite 118. & 119. tertij. Plin. cap. 7. lib. 25. Gal. 6. de fac. simp. Calida in secundo, & sicca in tertio ordine.

Asaron, uulgò Bacchara. Diosc. cap. 9. lib. 1. Gal. 6. de fac. simp. Plin. lib. 21. cap. 6. Paul. lib. 7. Similem acoro uirtutem habet.

Asclepias nisi ea sit herba, quam uocant hederam terrestre, aut uincetoxico, ut Fuchsius, certè nescio quid sit: hoc scio Empiricos pro mirabili portione in uulneribus sanandis hedera terrestri uti. Dioscor. cap. 97. lib. 3.

et Galen. 6. de fac. simp. Plin. cap. 5. lib. 27. Paul. lib. 7. Calida et sicca tenuisque substantia.

Aspalatus in Italia non habetur: sunt qui dicant esse sandalum rubeum. Ruellius agallochon uulgare: sed quum non præ manibus habeatur, iuxta Galeni placitum in succidaneis pro eo utemur semine uiticis. Diosc. cap. 16. lib. 1. Paul. lib. 7. Constat uirtute acri et adstringente.

Asparagus duplex est, domesticus et siluestris per se nascens. Galen. 6. de fac. simp. Sunt abstersiui. Plin. 10 cap. lib. 20. Visum corroborat, et doloribus thoracis et renum medetur. Auic. fen. ult. lib. 4. Bonum odorem in toto corpore inspirant, urinam uerò male olere faciunt. Paul. lib. 7. Medius in calore et frigiditate.

Asphodelus, uulgò apud Seplesiarios dicitur Haffrodilo, Latinis hastula regia. Gal. 6. de fac. simp. ait, cinerem eius radicis facere renasci pilos. Diosc. cap. 159. lib. 1. Plin. lib. 22. cap. 22. Paul. lib. 7. Vim habet detergentem discutientemque.

b. iij.

24 DE CONSEN. MEDIC.

Assplenon, uulgare citrach, etiam lingua ceruina est phyllitis apud Diosc. Huius meminit Gal. 6. de fac. simp. & Diosc. cap. 142. lib. 3. Ait Galen. Etsi subtilium sit partium, nihilominus non esse calidum, frangit lapidem, minuit lienem. Plin. lib. 27. cap. 5. Paul. lib. 7. Est uirtute tenui, sed non calidum, ut supra Galenus.

Aster Atticus in pratis nascitur. Serapio non distinxit hunc ab iringo, quoniam utrique flores in modum stellæ habet. Diosc. cap. 115 lib. 4. Et Gal. 6. de fac. simp. Vocatur & bubonium, eo quod bulones sanat, & uocatur à Plin. lib. 22. cap. 7. & 8. ceterum capita. Paulus lib. 7. Mixta est uirtutis, digerentis & refrigeratoria, iccirco bubonibus prodest.

Astragalus Dioscor. cap. 60. quarti. & Plin. ca. 8. lib. 26. Gal. 6. de fac. simpl. Paul. lib. 7. Non ignauiter desiccat, & eius radix adstringit.

Athara Diosc. cap. 83. secundi, genus pulricula, quod apud Teutonicos paratur ex farina, lacte & butyro, in conuiuijs, & in ci-
bandis infantibus. Galenus primo de alimēe.

IN COGNO. SIMPLIC. 25

Attractylis, à Theodoro fusus sylvestris:
Hermolaus uult carthamum, sylvestrem cni-
cum, dictum esse attractylidē. Diosc. cap. 98.
tertij. Plin. cap. 15 lib. 21. & Theoph. cap. 4.
lib. 6. Paul. lib. 7. Vi siccante & mediocri-
ter calida pollet.

Attriplex, ἀτρίπλις, uulgò trepese, non
defuerint qui spinachia uulgaria esse uolue-
rint. Diosc. cap. 110. secūdi, & Gal. 6. de fac.
simp. Facit eius semen uomere & purgare
corpus per inferiora. Razes refert se uidisse
hominem acceptis eius duabus drachmis as-
selleasse usque ad magnam debilitatem. Paul.
Est humidum & frigidum in secundo.

Auellana, Gracè κάρπου πόντικον, sylue-
stris est & domestica. Diosc. cap. 146. primi.
Galen. 7. de fac. simp. & 2. de fac. aliment.
uulgò dicitur niciola. Paul. lib. 7. Frigidio-
res sunt & austerae, in ceteris iuglandibus
æquales.

Auena, Gracis βρώμος. Diosc. cap. 85. se-
cundi, & Galen. 6. de fac. simp. Plin. cap. 25.
lib. 22. Paul. lib. 7. Siccatur & modicè discu-
rit, alicuius astrictionis compos.

Baccharis, nō est asaron, ut hucusque putatum est à Seplasiarijs, nec est scarlegia, ut uoluit Brasauola de mēte Leonicenni, quum in radicibus scarlegia bacchari non respondeat, ut uideri potest ex Dioscor. cap. 46. tertij. quare dicendum est baccharem nostris in partibus non haberi. Paul. lib. 7. βαχχα-
 eis acris est & odorata, eius folia adstrin-
 gunt.

Ballote, marrubiū nigrum, adeò simile est melissophylo, ut nisi per odorem malum agnosceretur, uix id per uisum scires discernere. Dioscor. cap. 109. tertij, & Paul. lib. 7. Acris est & abstersoria facultatis.

Balsamum uerum non habetur, sed oleum antiquū pro balsamo uendūt. de balsamo lege Plin. cap. 12. lib. 25. & Theoph. ca. 6. lib. 9. & Iustinū historicū lib. 36. & Dioscor. cap. 18. primi. Gal. 6. de fac. simp. Desiccat & excalescit in secundo excessu, & est tenuium partium: itidem asserit Paul. lib. 7.

Barba hirci, Græcè τσαρπόρων, in Hetruria uulgo dicitur sassefrica: herba nota est: sunt qui uelint similem esse scandici: hu-

IN COGNO. SIMPLIC. 17

ius aqua chymico more stellata mirabiliter
uulnera recentia carnis cum syndone appli-
cata sanat. Theoph. cap. 7. lib. 7. Dioscor.
cap. 132. lib. 2.

Bdellium, res nota est: uerum quod pingi-
tur à Diosc. non habetur, quod magis nigre-
scit & resinum est, magis mollior. Duplex re-
peritur, Sicilianum, quod folijs & radici-
bus palmæ assimilatur, & uulgò Neapoli di-
citur cephalone, cuius germen adhuc molle
comeditur. Et Iudaicum, quod describitur à
Diosc. cap. 61. primi, de primo loquens. Gal.
8. de fac. simp. dum de palma mentionem fa-
cit, dixit, medullam encephalon uocari, un-
de corrupto uocabulo uulgò cephalone uo-
catur. Paul. lib. 7. Emollit, maturatque.

Beta, Græcè πέντλον, nota est, nam pas-
sim nascitur, nigra est & alba, & tertia
species, ut refert Mathiolus in agro Tren-
tino inuenitur, quæ rubra est, & radices ha-
bet carotis similes: comeditur non minus in-
suauis, q̃ ceteræ radices in acetarijs. Galen.
8. de fac. simp. Plin. lib. 20. cap. 8. & Diosc.
cap. 112. secūdi. Succus betæ albæ per clysterē

infusus mirum in modum uentrē constipatum soluit, etiam si per alia enēmata solui non posset. Paul. lib. 7, Nitrosam nim habet, abstergit iccirco & discutit.

Betonica, Græcè κέσπον, notissima res est, habet multas uires quæ ab Antonio Musa Casaris Augusti medico exarantur. uide Dioscor. cap. 1. quarti, & Galen. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. duas species enumerat, sunt qui uelint calidam & siccam esse, ob id quod incidit & subacris est.

Bitumen, quod Græci ἄσφαλτον uocāt, est quædam mixtura cum pice & alijs miscellis, quare ad eam non confert quæ à Diosc. recitantur. Nascitur bitumen in Iudæa in eolacu quo Iordanus fluuius ingreditur, sed de his latius uide cap. de Naphtha. Diosc. cap. 84. primi. Plin. lib. 35. cap. 15. Gal. 2. de fac. simp. Bitumen in mari mortuo inuentum, uim resicatoriam & excalfactoriā habet in secundo ordine, ad glutinationes uulnorum cruentorum idoneum. Itidem ait Paul. lib. 7.

Blatæ, Græcè σιλφῆ, sunt animalia quæ circa molas & in pistrinis inueniuntur, si-

IN COGNO. SIMPLIC. 29

milia grillis uocatis, ualent ad dolores aurium: uocantur etiam blatae quæ in carnibus porci salis inueniuntur, sed non sunt quæ à Dioscor. cap. 35. secundi recitantur: quæ uerò circa molas inueniuntur, ab aliquibus uulgò pintolæ uocantur. Vide Paul. lib. 7.

Blitum, uulgò dicitur Biedone, duas habet species: alteram coloris rubei, alteram albi: nullum ferè usum obtinet in re medica, peruertit stomachum. Dioscor. cap. 108. secundi, & Plin. lib. 20. cap. 22. Galen. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Frigidum & humidum in secundo ordine.

Botrys, herba aliquibus nota est herbarijs, quæ nisi sit artemisiæ species, haud scio planè quid explicem. Meminit Dioscor. cap. 121. tertij. Plin. lib. 25. cap. 7. & lib. 27. cap. 8. Paul. lib. 7. Planta est insigniter odorata.

Brassica, nota & uulgaris est, uulgo dicitur cauolo siue uerza, cuius multæ sunt species, ut refert Theoph. cap. 4. lib. 7. & Plin. cap. 8. li. 9. Prima brassica est quæ magnum habet thyrsus cum longis folijs: est & altera quæ crispa habet folia, & dicitur apiana:

29 DE CONSEN. MEDIC.

alia est quæ caulem habet subtilem cum teneris & tenuibus folijs, est & apud Plin. lagotoria brassica, quam nonnulli uolunt esse id quod dicitur uulgo il capuzzo. Sunt & alia quamplures brassica species, quas narrare longū foret. Semina brassica inueterata si seminantur, in rapas transeunt, & e converso. Brassica marina est uulgaris soldanella. Vide Dioscor. cap. III. secundi. Galen. 3. de fac. simpl. cap. 14. & seprimo eiusdem & secundo de fac. aliment. Paul. lib. 7. Quæ comeditur siccatur & abstergit, ualentius tamen syluestris.

Britannica, nisi sit bistorta, aut betonica quæ nunc est in usu, certè nescio quid sit. Dioscor. cap. 2. quarti. Gal. 6. de fac. simpl. Plin. lib. 25. cap. 3. uocatur ab Auicen. Berzanich. Paul. lib. 7. Adstringit & conglutinat: quidam dixerunt esse lapatium acutum, sed decipiuntur.

Bromos herba, similis est auenæ, & est auena syluestris: meminit Plinius lib. 22. cap. 25. & Diosc. 135. quarti. Gale. 6. de fac. simp. Desiccatur & digeritur mediocriter & sine mor

IN COGNO. SIMPLIC. 31

su. Et primo de fac. aliment. itidem Paul. lib. 7. asserit.

Buccinae, sunt animalia ostracodermata, id est duri corticis, & nascuntur in mari, sicuti & purpure: sunt similes buccinis siue tubis, unde dictae sunt. Maiores ijs sunt purpure, & habent liquorem in gula uenis, quo infectores in tingendis uestibus purpuream colorem efficiunt. lege Plin. lib. 9. & Dioscor. cap. 4. secundi. Galen. 2. de fac. simpl. Desiccant sine morfu dum uruntur, & in polinem conteruntur.

Buglossum, lingua bouis, nil aliud est quam nostra uulgaris borago: de hac meminit Galenus 6. de facul. simpl. & Dioscor. cap. 123. lib. 4. Paulus lib. 7. Humidum calidumque temperamento est.

Bulbus uomitorius, nisi narcissi sit species, & bulb⁹ qui ededo est, nisi sit Ascalonia uulgaris, nescio profecto quid sint. Diosc. ca. 160. & 161. secundi. Scio nostras Ascalonias non esse Galeni bulbos, quoniam acerrimae sint, nec quales a Galeno scribuntur. Vide Galenum 5. de facul. simpl. cap. 22. & secundo de facul.

32 DE CONSEN. MEDIC.

aliment. Paul. lib. 7. Amari ac adstringentis
saporis modicè est, siccat, glutinat nulnera
& abstergit. Vomitorius uerò multò cali-
dior. uide & Gal. 6. de fac. simp.

Bunium, uulgò nauone saluatico, duæ eius
sunt species, ut Plin. cap. 4. lib. 20. bunion &
buniada. Huius meminit Gal. 6. de fac. simp.
& Diosc. cap. 119. quarti. Paul. lib. 7. Bunium
calidum est, urinam & menses ducit.

Buphthalmos, oculus bouis, non est cotu-
la, ut Fuchsius, sed flos similis camomilla, lu-
teus est, non circumcirca albus, ut nonnulli.
Huius meminit Diosc. cap. 147. tertij. Et Gal.
6. de facul. simp. Plin. lib. 25. cap. 8. Paulus
lib. 7. Discutit ac durities emollit.

Cacalia quum semen, ut ait Plinius cap. 2.
lib. 25. paruum producat, ac sunt margaritæ
paruæ, nescio profectò diuinare quid sit. uide
Dioscor. cap. 117. quarti. Galen. 7. de facul.
simpl. Paul. lib. 7. Valet sicuti cancamus.

Cadmia fit ære in fornacibus accenso, ad-
herente fornacum parietibus, & est res, quæ
nunc uulgò tutia dicitur. Dioscor. cap. 42.
quarti. Plin. lib. 34. cap. 13. uide Galen. 9 de

IN COGNO. SIMPLIC. 33

facul. simpl. Paul. lib. 7. Desiccat, abstergit,
& concava ulcera explet.

Calamintha, est id quod uulgo dicitur calamēto: huius sunt tres species, ut refert Diosc. cap. 38. tertiū. secunda species uulgò dicitur neuēda, nec est ea uulgaris herba quæ dicitur herba gatta, ut refert Brasauola, nec ista herba gatta est tertia species, ut Ruellius putat, quoniā similis est mentastro, non autē urticæ uel melissæ, ut herba gatta. Gal. de calamintha meminit 7. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Nepita calida & sicca in tertio ordine.

Calamus aromaticus. i. odoratus: uerū nō habetur, sed pro eo accipitur radix acorī. Meminit Theoph. 9. de historia plantarum, & Plin. cap. 22. lib. 12. Et de uiribus canarū cap. 11. lib. 24. Et Galen. lib. 7. de fac. simpl. & Dioscor. cap. 17. primi. Paul. lib. 7. Calefacit & desiccat in secundo ordine.

Calx uiua, præsertim quæ ex fluminū excoctis lapidibus fit, omnibus nota est: hæc si diu lota fuerit, omnem mordacitatem amittit, & malignis ulceribus prodest. Dioscor. cap. 87. quinti, & Galenus 9. de facul. simp.

c. i.

34 DE CONSEN. MEDIC.

Paul lib. 7. Adeò uehementer urit, ut crustam inducat.

Cancamon, est lacha, & lacha est lachryma arboris Arabia, quæ ad nos non affertur: quare caueât, qui dialacha componunt, quid per lacha imponere debeant: nam gumi rubrum quod demonstratur, non est lacha, quum odore careat. Nec debet seplasiarij lacha artificiali uti, quæ componitur uerzino, grana & cremesi, nec uti debent, quod uulgò dicitur sanguis di draco in lachryma: quoniam uires lachæ contrarias habet: hic adstringit, illa aperit. Diosc. cap. 24. primi. Paul. lib. 7. Externuat, abstergit, aperit.

Canabis duplex, satina & syluestris: sed syluestris non sic nota. Semen domesticæ genituræ extinguit, sed in gallinis contrarium agit: nam quæ ex huius semine pascuntur, multa oua pariunt. Dioscor. cap. 156. & 157. Et Gal 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. Semen discutit flatum, & ita siccatur, ut genituræ arefaciat.

Camphora, est arboris Indici, statura maximæ, quoddam gumi frigidum & siccum in tertio

IN COGNO. SIMPLIC. 35

ordine. Bona cāphora cognoscitur, si intra
panē calidū reposita resoluatur. Auic. lib. 2.
et Serapio lib. aggre. cap. de camphora.
Huius rei non memini quicquam me legisse
apud Græcos authores: multas hæc habes
species ex locorum diuersitate sumptas.

Capparis ex Alexādria affertur: de hæc
Gal. 7. de fac. sim. et 2. de fac. aliment. cap.
24. Diosc. cap. 164. secūdi. Theoph. cap. 5.
lib. 6. et Plin. cap. 8. lib. 19. Paul. lib. 7. Ra-
dix extergit, purgat, incidit, discutit, et sua
acerbitate contrahit, stringit et densat.

Cardamomon uerū non habetur, sed quod
pro cardamomo uēditur triplex est, maius et
minus, quod nielam dicūt. Tertiū uocatur ab
aliquibus mele geta, aut granum paradisi,
Arabicè dicitur cordumēni. Diosc. cap. 5. pri-
mi, et Plin. cap. 13. lib. 12. et Gal 7. de facul.
simpl. Pro cardamomo accipitur cyperus uel
myrthus, ut Gal. in succidaneis. Paul. lib. 7.
Acre est et lumbricos interimit.

Carduus, domesticus est et syluestris, dome-
stici cardones appellati, qui in postrema cæ-
na crudi et cocti cū pipere et sale comedū-

c. ij.

36 DE CONSEN. MEDIC.

tur, uulgò carchiofoli. Theoph. ca. 4. li. 6. & Gal. 8. de fac. simp. ubi habet, quòd sunt calidi & sicci in secundo ord. Diosc. ca. 14. tertij.

Carum, uulgò carui. Diosc. cap. 59. tertij, & Gal. 7. de fac. simp. Calidū siccū in tertio ordine. & 2. de fac. alimēt. itidē Paul. lib. 7.

Cassia duplex, uera quæ cinnamomum, & falsa quæ cassia lignea uocatur. Cassia uerò siliqua est cassia solutina ex Aegypto proueniens, sed nūspīā à Græcis de hac quicquam proditum est. Quum uerò apud Græcos legitur cassia, intellige de ea quæ nunc cinnamomum dicitur. Dioscor. cap. 12. primi. Gal. de antidotis, & 7. de fac. simp. Exiccat & calefacit in tertio ordine.

Castoris siue fibri testiculi, Græcè καστορος ὀρχιδες, in usu sunt & cognoscuntur, uerūm qui iuxta heplasiarios cernuntur, nō sunt ueri, sed cōpositi, ut refert Plin. ex renū partibus & testiculis in uescis repositi. Diosc. cap. 23. secūdi, & Plin. 30. cap. 8. lib. & cap. 3. lib. 32. Gal. 11. de fac. simp. de castoreo lib. scripsit Archigenes. Paul. lib. 7. Calefacit, siccāt que cum extenuandi uiribus eximj.

Castanea, res nota est. Gal. 4. de fac. simp. cap. 7. & 2. de fac. aliment. Diosco. cap. 126. primi. Vocantur etiam Græcè λόπνια, & cōnumerantur inter glandes.

Caucalis, secundū aliquos, est id quod uulgò dicitur petrosello saluatico, eo quòd apio similia folia habeat. Dioscor. cap. 128. secūdi, & Gal. 7. de fac. simpl. Paul. lib. 7. Dau- ci modo calefacit & siccat: sunt qui uocent caucalim uuam lupinam.

Cedrus, est arbor ut iuniperus, sed quid sit cedrinus liquor, nisi sit uernix, certè nescio quid dicere debeam. Diosc. cap. 9. primi, & Gal. 7. de fac. simpl. Plin. lib. 13. cap. 5. Ma- ior & minor, & minoris sunt duo genera, ly- cea & foenica. Paul. lib. 7. Calefacit & sic- cat in tertio ordine.

Cētauriū maius, nil aliud est quàm rhapō- ricum uulgare. Plin. ca. 6. lib. 25. & Gal. 7. de fac. simpl. & Diosc. lib. 3. Paul. lib. 7. Ra- dix est acris, calida & terreæ adstrictionis.

Centauriū minus, apud Hetruscos uulgò biondella, ob affectū quem circa mulierū ca- pillos facit, uentrē soluit: non autem maius, ne
c. iij.

38 DE CONSEN. MEDIC.

Arabes. Diosc. ca. 7. tertij, & Gal. ultra particularē tracta. 7. de fac. simp. etiā mētionem facit. Paul. lib. 7. Radix inefficax, sed collisculi ualidè & citra morsum siccant.

Calcanthū, latinis atramentū sutoriū, uulgò uitriol. Dioscor. cap. 68. quinti, & Gal. 9. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Carnes humidas absumit, siccātque.

Chamæcissos, nisi sit hederæ terrestris, ut Fuchsius, haud scio quid sit, quū tot hederæ terrestris genera demonstrantur. Dioscor. cap. 111. quarti, & Gal. 8. de fac. simp. Plin. lib. 24. cap. 10. & 15. Paul. lib. 7. Flos eius insigniter amarus.

Chamadaphne, est Dioscor. laureola, sed laureola non est mezereon, ut putarunt nonnulli, sed potius chamelea Diosc. Plin. lib. 21. cap. 11. id uocauit chamadaphnen, quod uulgò dicitur uinea peruinca, sed postea cap. 15. lib. 24. chamadaphnen appellauit, ut Dioscor. ca. 144. quarti, de qua Galen. 6. de fac. simpl. uerba facit. Paul. lib. 7. Calida & acris est.

Chamadris, uulgò Calamandrina, recēna

comeſta hominem à peſte præſeruat: huius meminit Theoph.ca.10.lib.9.Gal.8.de fac. ſimp. & Dioſc.cap.103.tertiy. Plin.lib.24. cap.15. Paul. lib.7. in tertio ordine caleſcit,exiccátque.

Chamelea & Thimelea apud Arabes eſt mezereon. Dioſcor.cap.166.quarti, & 167. quarti. Galen.8.de facul.ſimpl. Vincentem habet qualitatem amaram.

Chameleon albus eſt & niger:albus eſt id quod uulgò dicitur carlina,niger uerò in medicinis,quæ per os aſſumuntur,nō eſt mitēdus: nā teſte Gal.8.de fac.ſimp.nescio quid mortiferi in ſe habet. Arabes ſæpe cōfundūt chameleonē cum chamelea. In chameleonis nigri radice naſcitur uiscus, quod dicitur ixia, & eſt uenenum:unde quum in Plinio legeris remedia contra uiscum,intellige contra ixiam. Dioſcor.cap. 8. & 9.tertiy. Galen.8.de fac. ſimpl. Caleſcit in ſecundo, & ſiccatur in tertio ordine.

Chamæpitys,uulgò Iua & regij orbica, ſpecies à Dioſcor.recitantur tres cap. 166. tertiy,& Gal.8.de facul. ſimpl. Expurgat,
c.iiij.

40 DE CONSEN. MEDIC.

abstergit, calefacit in secundo, siccatur in tertio ordine.

Camasice nisi sit specics pepi, haud scio quid sit: interpretatur enim humilis & terrestris ficus. lege Diosc. cap. 164. quarti. Gal. 8. de fac. simp. Abstergendi simul & acrem vim possidet. itidem Paul. lib. 7.

Chelidonium duplex, maius quod uulgo dicitur cerdogna: & minus quod uocatur à quibusdā scrophularia minor, ob similitudinē quā cum scrophularia in radicibus tenet, in Hetruria uulgo dicitur fauoscello. Diosc. ca. 172. & 173. lib. 2. Pli. ca. 8. lib. 25. Gal. 8. de fac. simp. Chelidoniū min' calefacit, & siccatur in 4. ordine absoluto. Paul. li. 7. Chelidoniū maius calefacit in tertio, & ualēter abstergit.

Chrysanthemon, Romanis calta: putauit ego olim corrupto uocabulo id esse, quod nos uulgo dicimus colta, & est similis camomillæ: sed quia nō omnes cōditiones seruat, quas chrysanthemo tribuit Diosc. nunc certè haud scio quid sit. Diosc. cap. 56. quarti. Differt autem chrysantem' à buphthalmo, ea differētia quæ est in cap. 147. lib. 3. & cap. 56. quarti.

IN COGNO. SIMPLIC. 41

Chrysocolle, uulgò borace, duplex est, artificialis & mineralis: quæ uerò paratur ex alumine roche & sale ammoniaco, uocatur borace refacto. Viridior est in medicinis excellentior. Dioscor. cap. 58. quinti, Gal. 9. de fac. simp. & Plin. cap. 5. lib. 33. Paul. lib. 7. Abstergit, discuit, siccâtque.

Cichoriū siue intybum, uulgò endiuia siue radechi. Dioscor. cap. 121. lib. 2. & Gal. 8. de fac. simp. ubi inquit, Endiuia est herba amara, sed multò plus syluestris quæ ab amaritudine picris siue cichorium dicitur. Paul. lib. 7. Siccat, refrigerâtque in primo gradu.

Cicuta similis ferulæ, sed mali odoris. Dioscor. cap. 77. quarti, & cap. 11. lib. 6. Plin. ca. 10. lib. 21. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Habet uires summè refrigeratorias.

Cinnabaris, uulgò sanguis de draco in lachryma, est gumi cuiusdam arboris Aphricæ stillans, sanguini humano simile, unde nomen habuit. Cinnabaris uerò, quo nūc utuntur seplasiarij, duplex est, mineralis & artificialis: mineralis nascitur in mineris ubi argentum uiuum foditur: artificialis fit ex

42 DE CONSEN. MEDIC.

sublimatione argenti uiui & sulphuris, miniū
uerò Dioscor. est nostrum cinabrium. Vide
Dioscor. cap. 63. quinti. Galen. 9. de facul.
simpl. Modicè acrem facultatem habet, &
adstrictionis quippiam.

Cinnamomū uerum nō habetur, sed nostrū
duplicatū eosdē effectus quos uerū cinnamo-
mū efficit. Diosc. ca. 13. primi. Vide de cassia
Gal. 7. de fac. simpl. Calefacit in tertio, non
tamen ita desiccatur. itidem Paul. lib. 7. ait.

Circea nondum à me cognita, nec uisa est
hucusq; de hac loquitur Diosc. ca. 125. tertij.
Galen. 7. de fac. simpl. Paul. lib. 7. Calida
est eius radix & odorata, eius semen lac
generat.

Cirson, nisi sit nostra uulgaris buglossa,
nescio profectò quid sit. Diosc. cap. 14. lib. 4.

Cistos & hipocistos, apud seplasiarios uo-
catur corrupto uocabulo hipoquistidos, &
est succus radicis tragopoi, id est barbae de
becho ad solē inspissatus, & nō est id quod
habet Diosc. ca. 111. & 112. primi: nā est her-
ba saxosis locis nascēs. Gal. 7. de fac. simpl.
Paul. li. 7. Adstringit & modicè refrigerat,

Citria, siue citromala, omnibus nota sunt. in quorū numero ponuntur quæ nos uocamus limonia & aurantia poma, unde Virgil.

Aurea mala decem misi, uulgò dicuntur Arā-
tia, quasi dixeris, aurantia. Diosc. cap. 136.
primi. Plin. cap. 3. lib. 12. Gal. 7. de fac simp.
Paul. lib. 7. semen tertij refrigerantium sic-
cantiumque ordinis habetur, cortex siccatur in
secundo.

Clematis daphnoides uulgò uinea peruin-
ca, sed altera clematis, nisi sit uitis alba, aut
flamola uulgò dicta, nescio quid sit. Diosc.
cap. 7. & 8. quarti. Gal. 7. de facul. simpli-
ciū. Paul. lib. 7. Clematis daphnoides siccam
di uirtute pollet: altera uerò clematis acri &
caustica facultate donata est.

Clymenon, sunt qui uelint esse uulgare sa-
ponariam sicuti & periclymenon, matrissyl-
uam: decipiuntur uerò qui credunt matrissyl-
uam & caprifoliū esse unum & idem, quum
caprifolium sit pixia cantha Dioscor. Vide
de clymeno Diosc. cap. 14. quarti, & de peri-
clymeno cap. 15. quarti, & Gal. 8. de facul.
simpl. Plin. lib. 25. cap. 7.

Cnicus à *seplasiarijs*, dicitur *carthamo*, uulgo *zafarano sarasinesco*. *Diosc. cap. 182. quarti, & Gal. 7. de fac. simp. & Theoph. cap. 4. lib. 6. Paul. lib. 7. Tertiij ordinis siccantium est, semen purgat aluum.*

Condrilla, *cichorij* species est, & alterum *condrilla* genus, quod uulgò ab ipsius lacte *lattarola* nuncupatur: uide *Dioscor. cap. 122. secundi, & Gal. 8. de fac. simp. cap. de endiuiâ & cichorio. Plin. lib. 22. cap. 22.*

Conyza, uulgo *pulicaria*, eo quòd *pulices* enecet. *Diosc. cap. 127. tertiij, Theoph. cap. 2. lib. 6. & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. Siccatur & calefacit in tertio ordine.*

Corallium album & rubrum omnibus notum est, lithodendron etiam dictum, album rubro frigidius. Dioscorid. cap. 93. quinti, & Plin. cap. 2. lib. 32. Auic. de uiribus cordis. Paul. lib. 7. Validam siccandi uim habet, adstringendi uerò mediocrem.

Coriandrum omnibus notum: in uiribus eius dissentiunt Diosc. & Gal. nā tener Dioscorid. cap. 64. tertiij, quòd habeat uires frigidas, & similiter Auic. At Gal. 7. de facul.

simp. quòd sit tepentis facultatis cum pauxilla adstrictione: itidem Paul. lib. 7. tener.

Cornus, mas & foemina, non plantatur apud apum aluearia, ne apes corni floribus uescentes moriantur. Diosc. cap. 140 primi, & Gal. 7. de fac. simp. Exiccat ualenter, ac uulnera conglutinat. Paul lib. 7. itidem.

Coronopos est, ut placet Manardo, id quod dicitur uulgò herba stella, & non Leoniceni, sanguinella, quæ est species graminis spinosa, ut placet Plin. cap. 19. lib. 24. & uocatur dactylus. Diosc. cap. 119. secundi, & Plin. lib. 22. idem ait quod Diosc. Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. Creditur prodesse ad colicos cruciatus manducata.

Costus uerus non habetur, sed pro costo quedam uulgaris radix uenditur, nec inuenitur dulcis & amarus, ut uulgus putat, sed bene albus & niger, nunc Venetijs optimus uenditur. uide Diosc. cap. 15. primi. Gal. 7. de fac. simp. Plurimam acrem & calidam qualitatem simul & facultatem habet, adeò ut etiam exulceret. Paul. lib. 7. itidem refert.

Coronea mala, uulgò pomè codogne, fortè

46 DE CONSEN. MEDIC.

à Cydone Cretensi oppido oriunda, quæ mi-
nora, & in partes diuisa citrina & lanugi-
nosa sunt, cæteris meliora: nam odorem longè
alijs suauitorem reddūt. Struthia uerò à Gal.
appellata, sunt quæ in magnitudine maiora
& carnosiora, nec sic citrina, ut prædicta
conspiciuntur: muliana uerò à Plinio dicta
sunt cotonea, uulgò pome bastarde appellata.
Diosc. cap. 136. primi. Paul. lib. 7. Frigidi, &
terrestris tēperamēti sunt. Gal. 2. de fa. alim.

Crimnon. est ex tritico uel zea granum,
crassius trituratū quàm farina, quo antiqui
uice panis uescebantur. Diosc. cap. 81. secun-
di, & Plin. cap. 8. lib. 18. Gal. 7. de fac. simp.
& primo de fac. alim. ubi de zea loquitur.
Paul. lib. 7. Valde nutrit, agrè conficitur.

Critthmon, plures existimarūt id esse quod
uulgò dicitur fenochio marino, ouer herba
di san Petro: ego crederem esse mentam Flo-
rentinam. Diosco. cap. 118. secundi. Gal. 7. de
fac. simp. Vis eius est exiccatoria & abster-
soria. Paul. lib. 7. idem refert.

Crocodilion est species chameleontis, sed
non est carlina. Diosco. cap. 10. tertij. Pl. ca.

IN COGNO. SIMPLIC. 47

8. lib. 22. & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7.
Calidam, siccam, & discutiendi uim obtinet.

Crocus melior ex aquila Abruci affertur
Veneriis, nascitur multò preciosior in mul-
tis Lombardia locis, sed rarior. Dioscor. cap.
25. primi, & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7.
Calefacit in 2. & desiccat in primo ordine.

Cucurbita, uulgò zucha, & est uel longa,
uel rotunda, uel lata. Ex semine colli cucur-
bita fiunt longæ, & ex semine in parte ro-
tunda contento, rotundæ: sicut & in parte
lata lata oriuntur. Crassiores euadunt cucur-
bita, si semen cum acumine uersus terrā plā-
tetur. Diosc. cap. 123 secundi, & Plin. cap. 5.
lib. 18. & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7.
Humida & frigida in secundo abcessu.

Cucumis est id quod uulgò dicimus cucu-
mere ouer cedrone, ut probatur ex Plin. ca. 5.
lib. 19. & ex Diosc. nec est anguria ut uolunt
aliqui: omnes tamen species cucumerum, me-
lopeponum & peponum, ut affirmat Gal. 2.
de facult. alimen. uocantur nomine peponis.
Melopepones sunt nostri uulgares melones:
sed quid sint pepones, nisi fortè sint, quos

48 DE CONSEN. MEDIC.

Venetijs uulgò uocāt peponi, haud scio quid
sim: scio hos non esse angurias, quum seorsum
Serapio capita de omnibus faciat. Dioscor.
cap. 12 4. secundi. Paul. Refrigerat & hume-
tat in secundo ordine, semen abstergit &
incidit: uide etiam Gal. 8 de fac. simp.

Cucurbita syluestris, uulgò coloquintida,
ualet mirabiliter in asthmate & tussi anti-
qua & iūcturarum doloribus. Oleum in eius
concauitate bullitum nigros efficit capillos,
nec sinit canos fieri, & prohibet eorum ca-
sum, auribus sibilantibus medetur. Diosc. ca.
171. quarti, & Gal. 7. de fac. simp. uide etiam
Mes. Paul. lib. 7. Validā habet uim purgādi.

Cucumis syluestris, uulgò cucumere a fini-
no, ex quo fit elaterium, decoctum radicis &
eius foliorum, & succus eius ualet summopere
hydropicis, cum melle abstergit maculas liui-
das ex percussione, ualet etiam ad lentigines
& maculas faciei. Dioscor. cap. 149. quarti,
& Gal. 8. de fac. simp. Paul. li. 7. Radix de-
tergit, dissipat & emollit, succus uerò siccan-
di uires habet.

Cupressus, formicis familiarissima, nō na-

scitur ubi sit aqua, nec eius lignū marcescit.
 Diosc. cap. 87. primi, & Plin. ca. 15. lib. 24.
 & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. Siccandi
 uires habet absque calore conspicuo.

Curmi Plin. ult. potus ueluti ceruisia: uide
 Diosc. cap. 79. lib. 2.

Cuscuta tantū iuxta Arabes memora-
 tur, & est satis nota herba: habet uim ad-
 stringendi & confortandi, ualet ad obstru-
 ctiones hepatis & lienis, & sanguinem pu-
 rificat.

Cyclaminus, uulgò pan porcino, & est om-
 nibus nota: altera uerò cyclaminus dicta à
 Diosc. haud certè scio quid sit. Diosc. cap.
 153. secundi, & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib.
 7. Extergit, incidit, aperit, attrahit & dissi-
 pat. Plin. cap. 9. lib. 21.

Cyanon puto esse lapidem lazuli, inueni-
 tur in ararijs fodinis, & in quibusdam maris
 littoribus. Dioscor. cap. 60. quinti, Gal. 9. de
 fac. simp.

Cuminum satium omnibus notum, uulgò
 camino dicitur. Syluestre uerò, q̄ sciam, non
 cognoscitur, nisi sit quod uulgò dicitur ru-
 d. i.

30 DE CONSEN. MEDIC.

cheta. Calidum est, ut placet Gal. 7. de fac. simp. Diosc. cap. 61 tertij. Paul. lib. 7. In tertio ordine calefacit, flatus discutit.

Cynocrambe, canina brassica, species mercurialis herba, Diosc. cap. 184. quarti. Gal. 5. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Lethalis homini est, foedi odoris, citra siccitatem, digerit etiam.

Cynoglossa, lingua canina, duplex est. altera à Plinio descripta, altera vulgaris, quæ vera non est. Diosc. cap. 124. quarti, & Plin. cap. 8. lib. 25.

Cyperus duplex, alter passim in Longobardia inuenitur, alter angulosi iunci radicis similis, nascitur in India, & est vulgaris nostra curcuma: Curcuma uerò Serapionis, non est curcuma nostra, sed radix chelidoniæ. uide Dioscor. cap. 4. primi. & Gal. 7. de fac. simplic. Paulus lib. 7. Siccat, calefacitque citra morsum.

Cytisus, uulgò trifolio caualino, ouer tribolo. Impinguntur equi cytiso, & à quocunq; morbo liberantur libentius quàm hordeo, equi cytiso uescuntur. Dioscorid. cap. 108.

IN COGNO. SIMPLIC. 51

quarti, & Gal. 7. de fac. simp. & Plin. lib. 13. cap. 24. Paul. lib. 7. Tepida naturæ & leniter discutientis.

Daphnoides laureala, non est mezereon, quum sit chamelea Dioscoridis, ut dictum est, chamedaphne postea est species daphnoidis. Diosc. cap. 143. quarti. Plin. cap. 15. lib. 24. & Gal. 6. de facult. simplic. Paul. lib. 7. Calida, acris, & subamara est.

Daucus est secundum aliquos pastinaca sylvestris: uerus daucus nondum habetur, quoddam aliud à seplasiarijs pro dauco uenditur. Diosc. ca. 66. tertij. Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7.

Dictamnus nuper inuentus habetur Venetijs: uerum quod uendunt pro dictamno, est species fraxinellæ, quæ nec dictamno Creteni, uel salsæ conformis est: sed quæ sit fraxinella nuncupata, quum nullibi ab antiquis metio fiat, haud scio quid explicare debeam. De dictamno scribit Dioscor. cap. 32. & 33. & 34. tertij. Gal. 6. de fac. simp. Theophr. ca. 16. lib. 9. Paul. lib. 7. Virtutem habet pulegij.

Dipsacos, siue labrum Veneris, uulgò dicitur scarzo da scarzare li panni: uocatur & ineptè à seplasiarijs uirga pastoris, sic etiam Pandectarius, ubi dipsacum confundit cum polygonio, qui est centinodia siue corrigiola ouer sanguinaria de dipsaco. Dioscor. cap. 2. lib. 3. Gal. 6. de fac. simpl. Plin. cap. 13. lib. 24. & cap. 9 lib. 27. Paul. lib. 7. Desiccatur in secundo ordine, & nonnullam adstringendi uim obtinet.

Dracunculus duplex, maior & minor, & est res ab aro differens & alia, uulgò dicitur serpentaria maior & minor, non est tamen herba nomine serpentina, siue herba argentina, quæ in recentibus consolidandis uulneribus mirabilis est, & in intestinorum rapturis. Dioscor. cap. 155. & 156. secundi, & Gal. 6. de fac. simp. Magis calefactorium & tenuioribus partibus constat ipso aro: itidem Paul. lib. 7.

Dryopteris, quercuum filix, similis esset filici, sed multò minores foliorum incisuras habet, depilat hæc cum radicibus emplastri modo imposita. Dioscor. cap. 181. quarti, &

Galenus 6. de facult. simplic. Plin. cap. 9. lib. 27. Paulus. Vim habet exedentem. Deceprus est Pandectarius, credens esse polypodium.

Ebenus, species ligni guaiaci, uel sancti appellati, in quorum ordine id melius ac excellentius esse existimarunt, quod minus nigricat. Ebenus olim in multa fuit ueneratione, ut testatur Plin. cap. 4. lib. 12. & de eius uiribus scripsit Plin. cap. 2. lib. 24. Galenus 6. de facult. simp. Dioscorid. cap. 114. primi. Paulus lib. 7. Vis est excalesfactoria, deterforia & subtilis.

Ebulus & Sambucus res sunt notissimæ. Aqua ex eorum floribus elicita, dolores capitis à uaporibus calidis factos mitigat. Succus ebuli ad solem concretus ac siccatus pondere unius drachmæ cum decocto iuæ datus dolores podagricos, & iuncturarum & morbi gallici tollit, & in enæmate positus sciaticis prodest. Diosc. cap. 168. quarti, & Gal. 6. de fac. simp. Plin. cap. 8. lib. 24. Paul. lib. 7. Vterque desiccandi facultatē habet, digerit, conglutinat, & aquam per aluum educit.
d. iij.

54 DE CONSEN. MEDIC.

Ebur, ἑλεφας, uulgò auorio, & est dens elephantis. Aristot. 6. de natura animal. Ebur ualet fluxui albo mulierum cum lacte ex seminum lactuca extracto cum aqua chalybeata bibitum. Diosc. cap. 50. lib. 2.

Echion uolunt aliqui esse buglossum syluestre, flores iuxta folia purpureos habet, in quibus semen est uiperino capiti simile. Dioscor. cap. 28. quarti. Plin. cap. 19. lib. 25.

Echinus, uulgò riccio terrestre: uide eius uires iuxta Diosc. cap. 2. lib. 2. & apud Razem intra. 6. animalium. Gale. 2. de facul. simpl. Plin. lib. 9. cap. 25. & lib. 32. cap. 1. Paul. lib. 7. Fel eius pilos fluentes glutinat, caro discutit & siccat.

Echinus, herba, nisi sit species spinæ albæ, è quòd capitellū simile echino pisci habeat, certè diuinare nescirem. Plin. cap. 8. lib. 23. Gale. 6. de fac. simp. Acerba repellit & siccat. iridem Paul. lib. 7.

Electrum, Latini succinum, Arabes charabe: uulgò ambra da corone, habet uim retinendi fluores stomachi & uentris. Dioscor. cap. de populo nigra, cap. 98. primi. nec est

gumi albae populi, ut Brasauola. Plinius cap. 2. & 3. lib. 37. post longam impro-
bationem fabularum Ouidij, inquit certum
esse electrum gigni in insulis septentrionali-
bus, &c.

Elleborus duplex, albus & niger: uocatur
etiam ueratrum: & est omnibus notum, cuius
usum damnauit Mesues, sed conuenienter non
solum eius infusio, sed etiam puluis nunc in
usu est absque alicuius patientis incommodo:
radices quum extrahuntur, statim purgatur,
& abiecta parte interiore cortices tantum ad
solem exiccantur, ex quibus deinde fit puluis.
Vide de eius uiribus Actuarium. Galen. 6. de
fac. simp. & Diosc. cap. 145. & 146. quarti.
ualet suffusis felle, scabiei, leprae, uolaticis.
Paul. li. 7. Vterque calefacit, & siccatur in ter-
tio abscessu.

Ephemeron duplex, colchicon & epheme-
ron nuncupatum agrestis iris, uulgo giglio mar-
ro. Colchicum uero id est, quod nunc dicitur
hermodactylus, & est res uenenosa. Hermoda-
ctylus uerus ac legitimus non inuenitur, nec
ephemera est lilium conuallium, ut Fuchsius.
d. iij.

Paul. Mixta potestatis est repellentis & discutientis.

Epithymon, thymi inuolucrū, uerum est id quo nunc utimur. Diosco. cap. 172. quarti, & Plin. cap. 8. lib. 26. Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Siccat & calefacit in tertio abscessu.

Eryngium, uulgò Rinzzo, non est secacul Serapionis, imò nec istud secacul adhuc cognoscitur: iccirco qui eryngio uim excitandi uenerem tribuunt (quum nullibi à Gal. uel Diosco. hoc dicatur) summopere decipiuntur. Vide Diosco. ca. 22. tertij, & Gal. lib. 6. de fac. simp. Plin. ca. 2. lib. 25. Paul. lib. 7. Calefacit quidem nō manifestè, siccat uerò nec modicè.

Eruca duplex, satina & syluestris: satina, dicitur Ruchetta in Hetruria, & Ruchula in Lōbardia, & comeditur in acetarijs. eius semen tritū cum felle bouino cicatrices nigras, albas reddit, & cum melle maculas faciei & lentigines delet. Vide Diosco. cap. 129. secundi, & Gal. 2. de fac. alim. & 6. de fac. simp. cap. de uitice. Plin. ca. 13. lib. 20. Paul. lib. 7. Flareulena est & uenerem instigat, sed syluestris ualentior est.

Eruum, uulgò orobo inuenitur inter uarias segetes, & species uitiae esse praesumitur. Orobis uerò qui ex Alexandria Venerias affertur, non est uerus: Brasauola putauit id esse *Eruum*, quod uulgò dicitur Ruuione, quod à Galeno uocatur ochron, sed decipitur: nam non prouocat sanguinem cum urina ut orobus. Diosc. cap. 100. secundi. Et Galen. 8. de fac. simpl. Plin. cap. 25. lib. 22. Paul. lib. 7. Calefacit in primo, siccatur in secundo gradu.

Eupatorium est nostrum uulgare agrimonium, sed apud Arabes, & maximè apud Auicenn. & Mesu. sunt diuersa eupatoria: nam quod ab Auic. describitur, id esse uolunt quod uulgò dicitur canuarola. *Eupatorium* Mesu. est quod in Hetruria dicunt herbam Iuliam, quae uehementer uermes interficit: idcirco in compositionibus Auicennae uteretur suo eupatorio, & similiter in Mesu. herba Iulia, & iuxta Graecos agrimonio uulgari. Diosc. ca. 39. quarti, Gal. 6. de fac. sim. Paul. lib. 7. Tenuem uim & incidentem sine conspicuo calore habet.

Euphorbium est, quo uulgariter utimur.

uide de eius uiribus Mes. & Diosc. c. 87. tertij,
& Gal. 7. de fac. simp. Plin. c. 7. lib. 25. Paul.
lib. 7. Vim adurentem habet.

Faba, Græcè κὺαμος, omnibus nota: A Egy-
ptia uerò ea est, quæ uulgò dicitur colocasia,
uide Diosc. c. 96. & 97. secundi, & Theoph.
cap. 4. lib. 4. & Gal. 1. de fac. aliment. Paul.
lib. 7. Nō recedit multum à medio tempera-
mento in refrigerando & siccando.

Ferula, ῥάπινος, in Apulia maximè cogno-
scitur, ubi lignorū loco comburitur: uide Theo-
phrast. lib. 6. & Gal. 8. de fac. simp. & Plin.
ca. 24. lib. 20. & Diosc. cap. 82. tertij.

Ficus, σῦκος, satina est & syluestris: uide
Diosc. ca. 149. primi, & Gal. 2. de fac. alim.
& 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Arida siccant
in secundo, maurant, detergunt, ac discutiunt.
Ficus uerò arbor calidi tenuisque tempera-
menti, adeò succus foliorum abstergit, ut etiam
exulceret.

Filix, πέλεις, uulgò felese, mas est & foemi-
na: uide Diosc. ca. 178. quarti, & Theoph. ca.
20. lib. 9. & Plin. cap. 9. lib. 27. & Gal. 8. de
fac. simp. Paul. lib. 7. uim siccandi & amarā

habet, foetus corrumpit, lumbricos enecat.

Flos æris res est diuersa à uiridi ære, quo passim utitur seplasiarj pro flore æris. nã est pars æris tenuissima ex uapore æris fusi eleuata: quæ uerò ui quadam excutitur, ærugo æris dicitur, & est æs uiride. Dioscor. cap. 45. quini. Plin. ca. 2. lib. 34.

Fœniculum, μάραθρον, domesticum & syluestre. Domesticum omnibus notum. uide Dioscor. cap. 74. tertij, & Galen. 7. de facul. simpl. Plin. lib. 20. cap. 23. & Gale. 2. de fac. aliment. Paul. lib. 7. Calefacit in tertio, siccatur in primo ordine.

Fœnugræcū, τήλιν, omnibus notū, buceras à corniculis suis à Theoph. uocatur. Gal. 8. de fac. simp. Diosc. cap. 93. secundi. Plin. ca. 19. lib. 23. Paul. lib. 7. Calidū in secundo, siccum in primo.

Fraxinus, μελία. Dioscor. cap. 93. primi. Theophrast. cap. 11. lib. 3 uide de eius uiribus Plin. ca. 8. lib. 24. Paul. lib. 7. Morsui uiperarum folia succurrunt, ligni ramena ferunt esse lethalia.

Fumaria, κάπνος, uulgò fumus terræ, om-

nibus nota: uide Mes. de eius uiribus, & Dioscor. cap. 105. quarti, Galen. 7. de fac. simpl. Paul. li. 7. Acris & amara est, eò dicta, quòd lachrymas eius succus eliciat.

Fungi, μυκήται. Dioscor. ca. 81. quarti, Galen. 7. de fac. simp. Frigidos & humidos eos appellat. Plin. ca. 3. li. 19. Paul. lib. 7. Frigidi & humidus, nonnulli exitiosi, præcipuè putridæ qualitatibus participes.

Galbanum, uulgò galbina, liquor est cuiusdam plantæ nascentis in Syria ferulæ. Dioscor. cap. 88. tertij, & Gal. 8. de fac. simp. Calidum in primo, tertij, & siccum in primo, secundi ordinis. Plin. cap. 26. lib. 12.

Galiopsis, herba similis urticæ, & est secundum aliquos urtica foetida, uulgò urtica mortua, ouer quella ortica che ha le machie bianche. At secundum Fuchsum est scrophularia, sed reuera scrophularia non foetet, ueluti urtica mortua. Vide Dioscor. cap. 90. quarti. Plin. lib. 27. cap. 9. Paul. lib. 7. Dissipat & emollit scirrhosos humores.

Gallion, quo lac coagulatur, herba est similis rubiæ minori, quæ aparine dicitur: alia

certè à presura uocata. Dioscor. cap 91. quarti, & Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Siccan di uim cum mediocri acrimonia habet.

Garum est id iuxta Diosc. quod uulgò dicitur salamoia, sed apud Plin. cap. 7. lib. 31. erat condimentum ex interioribus gari piscis maceratis, & cum sale resolutis. Paul. lib. 7. Calefacit & exiccat.

Genista, γένιστρον, uulgò genestro. Diosc. ca. 152. quarti, Gal. 8. de fac. simp. & Mesu. inter alia sua solutiu. Plin. ca. 9. lib. 24. Paul. li. 7. Semen & flores per inferiora purgant.

Gentianæ radicis aqua per balneum mariæ elicitæ, febres oppilationum sanat, uermes interficit, & sæpe lauando maculas faciei omnes repurgat. De hac Dioscor. cap. 3. tertij. Plin. cap. 7. lib. 25. Galen. 6. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Extenuat, perpurgat, abstergit, & aperit.

Geranion, uulgò herba gruaria, quòd in summitate habeat caput gruis. Huius species sunt tres, una Latinorum, quæ est id quod uulgò dicitur rostrum gruis: & aliæ duæ Græcorum, inter quas est pes columbinus, & aliæ

quæ folia malvæ similia habet. Diosc. ca. 122. tertij. Plin. cap. 6. lib. 16. Paul. lib. 7. Radicem habet esculentam quæ inflammationes uteri dissolvit.

Gingidium, nisi sit quod vulgò dicitur cerofoglio, ut putat Ruellius & Fuchsius, nescio certè quid sit: nam in Cilicia & Syria nasci traditur. Dioscor. cap. 126. secundi. Galen. 6. de facul. simplic. & secundo de facul. alimentorum. Paul. lib. 7. Non habet calorem manifestum, sed siccatur in tertio & adstringit.

Git, μελαν'ιον, siue nigella, idè sunt. Brasauola vult id esse quod vulgò dicitur gitone: aliqui volunt esse quod vulgò dicitur rosola, aut id quod pro nigella à seplasiarj; uè dicitur: nam omnia indicia præter colorem habet. uide Diosc. cap. 84 tertij. Gal. 7. de facul. simp. Plin. cap. 17. lib. 20. Paul. lib. 7. in tertio calefacit & desiccatur.

Gladiolus Pliny est acorus, sed gladiolus Dioscor. est cuius flores in Hetruria dicuntur Monacaccie, Græcè dicitur ξιφίδιον. Diosco. ca. 22. quarti, & Gal. 8. de fac. sim. Paul.

lib. 7. Radix trahit, discutit, & siccat.

Glaucium est quod dicitur memithe, à Serapione & ab Auic. Nota tamen duo esse in Serapione capita, alterum de glaucio græcorum, alterum de chelidonia minori. Dioscor. ca. 91. tertij. Gal. 6 de fac. simp. Plin. ca. 10. lib. 27. Paul. lib. 7. Adstringit & manifestè refrigerat.

Glaux nisi sit, ut Ruellius, quod dicitur vulgò galenga, siue ruta capraria, quid esset profectò nescirem: ualet enim galenga in peste, & ad uenena serpentum epilepsia' que, si eius succus ad mediam unciam bibatur: sed quia galenga lac non facit multiplicare, dicere possem non esse glaucum, uide Diosc. ca. 136. quarti, & Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Calida & humida temperamento est, unde lac generat.

Glycyrrhiza, vulgò regolitia. Theoph. scitica, c. 13. lib. 9. Et Gal. 6. de fac. simp. Diosc. cap. 5. tertij. Plin. cap. 9. lib. 22. Paul. lib. 7. Tepidi humidi que temperamēti, alicuius adstrictionis particeps.

Gramen, ἀγρόσις, multas habet species, sed

64 DE CONSEN. MEDIC.

apud nos duæ tantùm inueniuntur: altera scilicet communis, altera quæ uulgò dicitur sanguinella ouer capriola. Nota tamen non habere proprietatem ullam contra uermes, ut communis erat opinio. Dioscor. cap. 31. & 32. quarti, Galen. 6. de facul. simpl. Plin. cap. 19. lib. 24. Paul. lib. 7. Siccatur & modicè refrigeratur, tenuis & subacerbæ substantiæ.

Halicacabus est apud Arabes Alchechengi, & est species solatri: uide igitur fusius de speciebus solatri, cap. de solatro.

Halcyonium, uulgò spuma maris, à seplarijs dicitur, cuius species quinque enumerantur à Dioscor. cap. 90. quinti, Plin. cap. 9. lib. 32. non nisi quatuor species recensuit: ego quum essem Venetijs, uix duas species uidi. Galen. 11. de fac. simp. quinque etiam memorat. Paul. lib. 7. Abstergit, discutit, acris qualitate præditum.

Harundo quinque species habet, ut Dioscorid. sed Plinius species 29. enumerat, cap. 36. lib. 16. & cap. 11. lib. 24. Vide Theophrast. cap. 12. lib. 4. & Gal. 7. de fac. simp. Diosc. cap. 99. lib. 1.

Hedera, *μαρδς*, tres habet species, & omnes cognoscuntur. Qui maiorem de hedera lectionem cupiunt, legant Theophrast. cap. 18. lib. tertij. & Plin. cap. 34. lib. 16. & Galen. 7. de facul. simp. & Dioscor. cap. 171. secundi. De hedera terrestri lege Chamacissos. Paul. lib. 7. Hedera contrarijs constat uiribus, adstringit, refrigerat, acris est & calida, aqueæ substantiæ & repida.

Hedysaron, est herba quæ crescit inter aphacen, id est uitiam, unde Theoph. ca. 8. lib. 8. inquit, quod hedysaron est ueluti aphacæ pestis, sicut lolium tritico. Vocatur etiam securidaca, eò quod semen in siliquis contentum ancipiti securi simile habeat. Diosc. ca. 137. tertij. Plin. cap. 17. lib. 18. Paul. lib. 7. Amarum est, & leuiter adstringit.

Heliochryson, nisi sit quod à nobis dicitur garyophilum Hispanicum, haud scio quid sit: uide Diosc. cap. 55. quarti. Plin. ca. 25. lib. 21. Galen. 6. de facul. simp. sub nomine amaranthi. Facultatem habet incidentem & extenuantem, unde grumos sanguinis liquat ac dissoluit. Paul. lib. 7. itidem adserit.

Heliotropiū duplex, maius & minus. Maius apud nos uulgò dicitur Mirasole, apud Hetruscos dicitur uerrucaria, & uulgò herba da porri, quoniam porros dissipat. Valet etiam mirabiliter canceris, idcirco dicitur etiam herba canceri: uide Dioscor. cap. 185. & 186. quarti. Paul. lib. 7. Maius calidam, siccam, & abstergentem uim habet: Minus uerò lumbricos interimit.

Helxine, uulgò uitriolo, alij dicunt esse speciem inuolucris, quod flores in modum campanæ albos fert. Dioscorid. cap. 37. quarti. Credo ego uerè quòd sit parietaria: uide Gal. 6. de fac. simpl. & Plin. cap. 15. lib. 21. Paul. li. 7. Vis est abstergendi & leuiter adstringendi cum humiditate subfrigida.

Hemerocallis, est lilium syluestre, non autem lilium conuallium, ut nolunt nonnulli. Germani utuntur lilio conualli ad corroborandum cor, cerebrum, & omnia membra spiritalia: ualet etiam tremori cordis, epilepsiae & apoplexie, morsibus & puncturis uenenosorum animalium. Dioscor. cap. 128. tertij. Galen. 6. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Ra-

dix uiribus lilio responder : uide etiam Plin.
cap. 21. lib. 21.

Hemionitis, herba est apud me incognita,
nec est scolopendria illa quæ dicitur lingua
ceruina, quum sit phyllitis apud Dioscorid.
ca. 143. tertij. Paul. li. 7. Adstringit, & simul
amara, lienosis succurrit.

Hiberis duplex, altera Democratis, altera
à Paulo & Plinio recitata, quæ habet folia
lauro similia. Prima est lepidion Dioscor. se-
cunda uocatur piperitis siue piperella, à sa-
pore piperis acuto: uide Diosc. cap. ult. primi,
& Plin. cap. 8. lib. 19.

Hieracion, id est lactuca erratica, est her-
ba spinosa similis soncho, id est cicerbitæ, de
qua Plin. cap. 7. lib. 20. Valet cum lacte
mixta infirmitatibus oculorum, præsertim cæ-
catricibus, suffusionibus, caligini : cum aqua
uerò & aceto bibita uentrem purgat : ualet
cum uino morsui serpentum & uulneribus,
si folia cum caule terantur : somnum excitat,
Venerem prohibet, refrigerat, & sanguinem
aiget: uide Diosc. cap. 65. & 66. tertij. Plin.
cap. 7. lib. 20.

e. ij.

68 DE CONSEN. MEDIC.

Hippoglosson, uulgò bis lingua uel bonifacia, ualet praefocationib⁹ uteri, si cochleare eius radice sumatur. Valet etiam mirabiliter ruptis siue creparis, si pulueris cochleare cū brodio carnis quotidie sumatur: uidentur tamen in primis diebus eorum uelle intestina exire, nihilominus postea conglutinantur, idcirco diligenter in primis illis diebus ligentur. Dioscorid. cap. 127. quarti. Plin. cap. 10. lib. 77. Paul. lib. 7. Molliendi uirtute pollet.

Hippuris siue equisetū, uulgò cauda equina, huius aliud genus asprella dicitur. Valet, ut testatur Galen. 6. de facul. simplic. omnibus uulneribus, etiam si nerui essent praecisi. Dioscorid. cap. 44. quarti. Paul. lib. 7. Adstringit & ualenter circa mordacitatem exiccat.

Hordeum, κριθή, ex quo paratur ptisana. Dioscorides cap. 78. secundi. Galen. 7. de facul. simplic. & primo de facultat. aliment. Refrigerat & siccatur in primo ordine cū panxilla adstrictione: itidem Paulus lib. 7.

Hordeum murinum, ποίνιξ, uulgò lolium

sylvestre, ubique nascitur ac ipsum frumentum. Dioscorid. cap. 40. quarti. Plin. cap. 25. lib. 22.

Hyacinthus, est secundum aliquos id quod uulgò dicitur cipola seluatica, nec est ille hyacinthus, de quo fabulantur poetae, ex Aiacis sanguine natus: nam ille producit florem rubrum iridi similem. Dioscor. cap. 61. quarti. Galen. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Refrigerat in secundo, siccatur in primo, semen leuiter abstergit & adstringit.

Hydropiper non est, ut Ruellius, uulgaris canuarola, sed potius quaedam species persicariae, quae nullam in folijs maculam praese fert: haec enim seruat omnes illas conditiones, quas illi tribuit Diosc. cap. 150. secundi. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Aquaticum piper calidum, sed piperis modo.

Hyoscyamus albus & niger non inuenitur, sed tantum qui flores flavos profert, uulgò dicitur iasquiamo ouer dente cabalino. Dioscor. cap. 67. quarti. Latine dicitur apollinaris herba siue altercum. Galen. 8. de facul. simp. Plin. cap. 4 lib. 25. Paul. lib. 7. Est
e. iij.

ex tertio refrigerantium ordine.

Hypecoon, uulgò ruta seluatica. Dioscorid. cap. 66. quarti. Galen. 8. de facul. simp. Plinius cap. 11. lib. 27. Paul. lib. 7. Refrigerat in tertio.

Hypericon, ascyron, androsomon, & cori, una & eadem res est, & si aliqua in folijs, caule, & floribus differentia adsit. Vocatur uulgò perforata, nec est ruta sylvestris, ut opinatur Brasauola, sed est uera perforata, qua uulgariter utimur. Dioscor. cap. 162. & 163. & 164. & 165. Galen. 8. de facul. simp. Plin. cap. 8. lib. 26. Paul. lib. 7. Tertias species calefacit, & siccat tenui substantia prædita. De alijs dictum est in Androsomon.

Hyssopus, uulgò etiam hyssopo dicitur, aliqui putarunt gratiolam esse hyssopum montanum, sed decipiuntur: nam graciola in locis humidis nascitur, & soluit uentrem, educens bilem & pituitam, & ulcera conglutinat. De hyssopo lege Dioscoridem cap. 27. tertij. Galen. 8. de fac. simp. Calidus & siccus in tertio ordine.

Iaspis, uulgò dicitur diaspro: meminit Dio-

sco. cap. 160. lib. 6. & Galen. 9. de fac. simp.
Paulus lib. 7. Confert non continentibus ci-
bum in stomacho.

Indicus lapis, uulgò endego, naturalis non
habetur: quo uerò utimur, fit ex isatide si-
ue gado. Dioscorid. cap. 61. quinti. Plinius
cap. 6. lib. 35. Paul. lib. 7. Contra hamor-
rhoidas ualet.

Inula, ἐλένιον, uulgò enola ouer iola. Dio-
scorid. cap. 27. primi. & Plin. cap. 5. lib. 19.
& Gal. 6. de fac. simp. Valet pectoris humo-
ribus uiscidis, item sciaticis in modum cata-
plasmatis, & fluxionibus paruis ab humidi-
tatibus factis. Paul. lib. 7. Calida est & sicca
cum excrementitia humiditate.

Ireon, ἐρύσιμον, modò inter segetes, modò
inter herbas nascitur, acuta est ac nasturtiū:
certè puto quòd res sit similis lysamo: nasci-
tur ubique cum folijs erucæ, floribus paruis
& flauis, à quibus corniculæ quædam, in
quibus est semen, proueniunt. Dioscorid. cap.
147. secundi. Plinius duobus in locis 7. &
10. cap. lib. 28. & cap. 25. lib. 22. simili-
ter Gal. 6. de facul. simplic. & primo de fa-
c. iij.

cul.aliment.Paul.li.7. Erisimi semen igneum calefactoriumque est.

Iris, seplasiarius irios, uulgò xilio morello, de hac nullibi iuxta Galen. nisi in Andromachi theriaca, ubi illyrica commendatur. Dioscorid. cap. 1. primi libri. Et Plin. cap. 7. lib. 21. Paulus lib. 7. Affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis substantiæ tussi utilis.

Isaris, uulgò guado da tingere: nam colores in sua uiuacitate omnes conseruat. Dioscor. cap. 107. & 108. secundi. Galen. 6. de facul. simp. Paul. lib. 7. Siccandi uires & adstringendi habet.

Isopyron hucusque non uidi, nec qui uiderit uel cognouerit adhuc intellexi. Dioscor. cap. 116. quarti. Galen. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Abstergit, incidit semen eius.

Iuncus odoratus, ῥῆϊνος, uulgò squinanto, prouocat urinam & menstrua. Vide Diosco. cap. 16. primi. Gal. 8. de fac. simp. Plin. cap. 18. lib. 21.

Iuncus, ὄζον ῥῆϊνος, uulgò xuncho. Diosco. cap. 50. quarti, & Galen. 8. de facul. simpl.

duas species iunci memorat, ut oxyschenon
 & oligoschenon. Paulus lib. 7. Oxyscheni se-
 men somnificum est, utriusque semen frixum
 desiccatur, & fluxus cohibet.

Iuniperus, ὄξυς, gummi eius sandara-
 ca siue scriptorum uernix est, sandaraca in-
 quam Arabum: nam sandaraca Dioscor. est
 res mineralis, similis auri pigmento. Fit ex
 hoc gummi & oleo de semine lini artificia-
 liter uernix liquida, qua utuntur pictores
 ad illustrandas picturas: ualet combustio-
 ni ignis & doloribus ac tumoribus hæmor-
 rhoidarum: gummi uerò iuniperi ualet ca-
 tarrhis, cohibet menstrua, fistulas exiccat,
 uermes interficit, & resolutis nervis confert.
 Dioscorid. cap. 89. primi. Galen. 6. de facul.
 simplic. Valet etiam scissuris manuum ac pe-
 dum ex frigore factis, & fluxum sanguinis,
 & hæmorrhoidarum constringit.

Ixia, uiscus est radicibus chamæleonis ad-
 hærens, quo pennæ sagittis adglutinantur.
 Diosc. cap. 21. lib. 6.

Ixus est uiscus quercinus, qui paratur à
 pueris in capiendis aubus. Dioscorid. cap.

94.tertij. Galen. 6. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Calefacit cum acrimonia, & humores ex alto elicit.

Lactuca, res nota est. Galen. 6. de facul. simplic. Frigida & humida, sed non excessiue, tollit sitim, & semen eius fluxum spermatis cohibet. Et secundo de facul. aliment. Generat sanguinem, quàm aliæ herbæ, meliorem, sed non omnino laudabilem. Diosco. ca. 125. secundi.

Labrusca, est uitis sylvestris omnibus cognita. Diosco. cap. 2. quinti. Plin. cap. 29. lib. 12. Paul. lib. 7. Germina habent uim abstergendidi nonnihil & adstringendi.

Ladanum, aromatarij laudanum dicunt. Plin. cap. 17. lib. 12. & Gale. 7. de fac. simp. Diosco. cap. 113. primi. Paul. lib. 7. Calidum in secundo, emolliens mediocriter, discutiens & maturans.

Lagopus, id est pes leporinus, nisi sit garyo phillata, ut Pandectarius: nescio certè quid sit: ualet in potionibus pro uulneribus & menstuis & sputo sanguinis, dysentericis & ramicis per os sumpta, & emplastri modo im-

IN COGNO. SIMPLIC. 75

posita: est calida & sicca. Dioscorid. ca. 19.
quarti. Galen. 7. de facul. simpl. Paul. lib. 7.
Desiccat.

Lanaria herba, siue radícula, res erat tem-
pore Dioscoridis multum in usu, sed apud nos
quid sit, nescio: ualet enim summopere in de-
albandis lanis, cuius semen conditi dicitur,
quod etiam minimè habetur. Dioscor. cap.
152. secundi. Plin. ca. 3. lib. 19. & Galen. 8. de
fac. simp. Calida in quarto quodammodo or-
dine, siccaque est.

Lapathum siue rumex, uulgò dicitur ro-
mice, de quibus plura Dioscor. cap. 106. se-
cundi. Oxylapathon enim & hippolapa-
thon, & oxalida sunt species lapathi: uoca-
tur primum lapathium, acutum: secundum,
magnum lapathium, quod folia rheubarba-
ro similia habet ex oxalida, quã acetosam,
& uulgò herbam bruscã uocant. Plin. cap.
21. lib. 20. & Galen. 7. de facul. simplic.
Paul. lib. 7. Oxylapathum discutit, & pau-
xillum repellit.

Lapsana, res est incognita, sed iuxta Plin.
est species brassicæ syluestris. Dioscorid. cap.

76 DE CONSEN. MEDIC.

107. Plin. cap. 8. lib. 20. Galen. 7. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Abstergit, discutit.

Lacer siue lacerpitium, uulgò assa, quæ in foetidam & odoratam diuiditur. Assa foetida est quæ habetur apud aromatarios: odoratus uerò lacer, est quod uulgò dicitur belzoino. Nota tamē non haberi assam dulcem, nec eius loco succū glycyrrhizæ poni, sed potius belzouino uocato. Diosc. cap. 85. tertij. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Probè calefacit, extrahit, emollit. Plin. cap. 3. lib. 19.

Lathyrus, est quæ uulgò dicitur cataputia siue carzapura maior: nam minor est riccinus. Dioscor. cap. 171. quarti. Gal. 7. de fac. simpl. Plin. cap. 11. lib. 27. Paul. lib. 7. Purgandi uim obtinet.

Laurus, arbor notissima, olim in pretio habita. Sunt qui uelint per se laurum ignem accēdere, dummodo rami simul confricentur & sulphur sursum proijciatur. Dioscor. cap. 91. primi. Galen. 6. de facul. simpl. Paulus lib. 7. Folia siccant & calefaciūt insigniter.

Laurus Alexandrina, siue laureola, & si rusco & hypoglosso similis sit, imò pro hyp-

IN COGNO. SIMPLIC. 77

poglossio à Fuchſio accipiat, quum re ue-
ra non ſit, mihi incognita reſtat. Dioſcor.
cap. 142. quarti. Galen. 6. de facul. ſimpl.
Paulus lib. 7. Calida, acris & ſubama-
ra eſt.

Lemnia terra, eſt uerus bolus Armenius, o-
orientalis dictus, ſi bene conſideretur Gale-
ni locus lib. 9. de facul. ſimpl. nec eſt terra
illa ſigillata, quam tanti faciunt. Dioſcor.
cap. 67. quinti. Plin. cap. 6. lib. 35. Paulus
lib. 7. Siccat & adſtringit mediocriter.

Lentes ſiue lenticulae, uulgò dicuntur len-
riciae. Dioſcor. cap. 98. ſecundi. Galen. 8. de
facul. ſimpl. Paul. lib. 7. Siccant in ſecundo
ordine, medio caloris & frigiditatis tem-
peramento.

Lens paluſtris, uulgò dicitur Zen uel len-
ricularia, oritur in aqua. Dioſcor. cap. 34.
quarti. Gal. 8. de facultate ſimplicium. Paul.
lib. 7. Humectat & refrigerat in ſecundo
abſceſſu.

Lentiscus arbor, Græcè *ἄνθος τὸ δένδρον*,
eſt quæ maſtichen producit. Dioſcor. cap.
77. primi. Galen. 8. de facul. ſimpl. Plin.

78 DE CONSEN. MEDIC.

cap. 6. lib. 13. Paul. lib. 7. Siccat in secundo, medius in calefaciendo & refrigerando.

Lepidium, est piperitis, ut dictū est de Iberide. Dioscor. cap. 165. secūdi. Ruellius, Hermolaus, & Manardus putant, quod sit Raphanus. Plinius cap. 8. lib. 19. Galenus 7. de facultate simplicium. Calefacit in quarto, & est simile nasturtio. Paul. lib. 7. idem refert, sed ipse inquit in tertio.

Lichen, seplasiarijs hepatica. Plinius cap. 4. lib. 26. duas species commemorat: alteram quæ solum latifolium apud radices habet, alteram quæ petris adheret, ueluti muscus. Valet lichenis, id est uolaticis. Dioscor. cap. 51. quarti. Galenus 7. de facul. simplicium. Paul. lib. 7. Extergendo purgat, mediocriter siccat & refrigerat.

Ligusticum, ab aliquibus pro leuistico accipitur, sed si litera Dioscor. bene ponderetur, non est uerum ligusticum: uide Dioscor. cap. 53. tertij. Galenus 7. de facultate simpl. Paulus lib. 7. Excalefaciunt ac probè flatus discutiunt semen & radix.

Lilium uulgare est, quod uulgò marie-

gone dicunt, de uulgari. Dioscor. cap. 107. tertij. Galenus 7. de facultate simpl. Plinius cap. 5. lib. 21. Paul. lib. 7. Flos lilij discutiendi ac emolliendi uireis habet.

Limonium, simile est betæ syluestri. Plin. cap. 8. lib. 20. Quauis affirmer Galenus se nunquam betam syluestrem uidisse. Diosc. cap. 18. quarti. Gal. 7. de facul. simpl.

Lini seminis oleum, neruorum & iuncturarū durities mollit, & est mirabile hæmorrhoidibus, ignis cōbustionibus cum aqua rosacea lotum. Sumuntur & in principio morbi lateralis ex eo uncia quatuor, & sanat. Dioscorides cap. 94. secundi. Galenus 7. de facultate simplicium. Calidum quasi in principio, medium inter siccum & humidum.

Lithargyros ex plumbo & ære prouenit, dum argentum & aurum depuratur. Dioscorides cap. 56. quinti. Plinius cap. 6. lib. 33. & Galenus 9. de facul. simpl.

Lithospermō, seplasiarij miliū solis uocāt: crederem ego id esse quod uulgò dicitur lacryme da corone. Miratur Plinius cap. 12.

80 DE CONSEN. MEDIC.

lib. 17. de lichospermo. Dioscor. cap. 149. tertij. Paulus lib. 7. Calculos frangit & urinas elicit.

Y olium, uulgò dicitur loio, nec est pseudo-melanthium, ut Fuchsius. Gal. 6. de facult. simpl. Dioscor. cap. 191. secundi. Paul. lib. 7. Calidum in primo tertij, & siccum in fine secundi.

Lorus Aegyptia, uocatur à Serapione handococa, ex cuius semine paratur oleum ad dolorem iuncturarum: uerùm de utraque loto intelligit Serapio. Dioscor. cap. 109. quarti. Galen. 7. de facult. simpl. Plin. cap. 17. lib. 13. & cap. 31. lib. 15. Paulus lib. 7. Lorus arbor extenuat & siccatur, ac mediocriter adstringit.

Lorus sativa, nisi sit melilotus uulgaris, haud scio quid sit. Lorus sylvestris ignota est. Dioscor. cap. 106. & 107. quarti. Paulus lib. 7. Lorus domestica à nonnullis triphyllon appellatur: abstersorias uireis & modicè siccanteis obtinet.

Lupini, quauis amari, coctione tamen dulcorantur & comeduntur, maximè domesti-

IN COGNO. SIMPLIC. 81

ci. Dioscor. cap. 101. secundi, & Galenus 1. de facultate aliment. & 6. de facultate simplicium. Paulus lib. 7. Esculentum obstruit, amarum abstergit, dissipat, & sine morfu desiccatur, lūbricos occidit, & viscera purgat.

Lychnis, nisi id sit quod uulgò dicitur rosete, profectò nescirem quid sit: nam Plinius cap. 4. lib. 21. inquit, rosarum speciem esse in aquosis locis nascentem cum quinque folijs. Dioscorides cap. 105. & 106. tertij. Galen. 7. de facul. simpl.

Lycium, aliud est quo seplasiarj utuntur, aliud quod à Dioscor. cap. 117. primi recitatur. Quod uerò in officinis uenditur, alij componunt ex baccis lygustri, alij ex matrissylua, utrisque simul: sed uti possumus pro lycio sumach. uide Galen. 7. de facultate simplicium: nam ex pixiacantha arbore fieri inquit, ualens ulceribus oris malignis & serpentibus. Plinius cap. 7. lib. 12. & cap. 14. lib. 24. Paulus lib. 7. Calefaciendo & refrigerando medium est, desiccatur uerò in secundo abcessu.

f.i.

82 DE CONSEN. MEDIC.

Lycopsis, nisi sit species anchusæ, aut cynoglossa vulgaris, nescio profectò quid sit. Vide Dioscor. cap. 27. quarti. Plin. cap. 11. lib. 27. Paul. lib. 7. Radix adstrictoria.

Lyncurion, est electrum siue succinum plumas siue paleas trahens, ut refert Dioscor. cap. 73. secundi: unde pterygosoron dictum: unde de Electro.

Lysimachia, non est cereta, sed alia longè diuersa herba: nam cereta folia lino similia habet, non salici. Dioscorides cap. 3. quarti. Plinius cap. 7. lib. 25. Galenus 7. de facultate simpl.

Macer, siue macis, est cortex nucis Indicæ, ut coniectari possum. Dioscorides cap. 95. primi. Galenus 8. de facul. simpl. male interpretatur à Pandectario cortex mali punici. Paulus lib. 7. Inter frigiditatem & calorem medium obtinet, siccatur in tertio ordine, & adstringit.

Malabathron, vulgò folium Indicum, nobis ignotum, pro quo utimur castia uel nar-do Indico, ut Galenus in succidancis. Diose.

cap. 11. primi. Plinius cap. 27. lib. 12.

Malua, μαλάχη. Diosc. cap. 109. secun-
di. Galenus 2. de facultate alim. Theoph.
cap. 5. primi. Plinius cap. 21. lib. 20. Paulus
lib. 7. Sylvestris mediocriter discutit & mol-
lit, hortensis uerò imbecillior.

Mandragora pluribus in locis Italiae na-
scitur. Vanum est credere mandragoræ ra-
dices habere formam hominis: uerum pro-
pter pomū, quod cum radicibus euellitur, for-
mā hominis sine brachijs præfert, unde Py-
thagoras ἀνθρωπομορφον appellauit Diosco.
cap. 74. quarti, & Galenus 7. de facultate
simplicium. Frigidus est in tertio, sed poma
eius aliquid caliditatis in se habent. plura
habet Serapio in lib. aggreg.

Manna, non dico thuris, sed solutium est
in multiplici differentia, ut referunt Arabes.
Duplex est quod ad nos affertur, masticinū
scilicet & bombicinū: masticinū dictū, quia
simile est grano mastice, & est excellentissi-
mū bombicinū nullius ferè pretij. Calabrensis
dictum ualidius est in folijs, q̄ quod in ra-
f. ij.

mis arborum colligitur, unde uulgò dicitur manna di foglia, minutis granis transparen-
rens, graue, album, dulce, & suaue, Arabes
duas species assignat, Mānam scilicet & Te-
reniabim, nec inter se hæ duæ differunt, nisi
quòd Tereniabim est liquidius. uide de man-
na Galenū 3. de fac. aliment. ad eorū confu-
sionem, qui Galenum mannā non cognouisse
affirmant, in capite de melle, ubi multa de
manna pronuntiat. Est & manna thuris, &
est quidam puluis, ut testatur Dioscor. cap.
69. primi: uide de manna Auicen. & Sera-
pionem cap. de tereniabim & menh.

Marrubium, *αγγύριον*, Galenus 8. de fac.
simpliciū, & Theoph. cap. 2. de histor. plant.
Dioscor. cap. 110. tertij. Est & alterum mar-
rubium nigrum, ballore dictum, quod adeò
melissæ est simile, ut uix ab ipsa, nisi malus
odor adesset, agnosceretur. Dioscor. cap. 108.
tertij. Paulus lib. 7. Nigrum est, acris &
abstersorie facultatis. Prasion uerò cale-
facit in secundo, siccatur, & uiscera laxat.

Marum, nisi sit quod uulgò dicitur maio-

IN COGNO. SIMPLIC. 85

rana fina, haud scio quid sit: nam bene redolet, ut marum. Vide Galenum de antidotis cap. de compos. hedicroi, & Dioscoridem cap. 44. terry.

Medica, herba in Hispania abundantissima, in Italia non habetur, Arabicè alfassat. Ruellius hanc nasci in Gallia adserit, uocarique trifolium maius. cap. 136. secundi. Plinius cap. 16. lib. 18. A' Medis inuenta dicitur.

Medium, quum nec uiderim, nec apud me de eo aliqua sit imago (in Media enim tantummodo nascitur) nescio quid affirmare debeam. Dioscorides cap. 20. quarti. Plinius cap. 12. lib. 27. Galenus 7. de facultate simplicium. Contrariam semini eius habet temperiem: nam menstrua herba constringit, quæ semen prorsus elicit.

Melilotus, quem etiam sertulam campanam uocant, affertur ex Neapoli Venetias: quo uerò utuntur seplasiarij, uerus non est, sed species trifolij: sunt tamen qui dicant melilotum uulgare esse lotum. Dioscorides f. iij.

Plinius cap. 9. lib. 21. Et Galenus 7. de facult. simplic. Dioscorid. cap. 43. tertij, Paulus lib. 7. Diuersis facultatibus pollet, adstringendi scilicet & discutiendi & concoquendi.

Melissophyllon, uulgò dicitur moliserno ouer cedronella, cardiacis & tristibus, ut referunt Arabes, & passionibus cordis ualet & aperit oppilationes cerebri. Dioscor. cap. 109. tertij. Gal. 7. de facult. simp. Paul. lib. 7. Viribus marrubio respondet.

Menta & mentastrum excitât Venerem, ut Gal. & Dioscor. quanuis contrarium sentiat Plin. cap. 14. lib. 20. Vide in hoc Galenũ 6. de facult. simplic. & Dioscorid. cap. 36. & 37. tertij. Vermes etiam interficit. Paul. lib. 7. Calida in tertio ordine, tenuis, acris cum humiditate semicocta.

Meon etsi multa copia nascatur in Hispania, nullibi tamen, quòd sciam, in Italia habetur: nam quod passim ostenditur pro meo, est radix saporis pastinacæ similis. Eius uice funguntur myrobalani, uulgo dicti ben

delli profumeri, unde etiam sub nomine nucis
unguentariae appellantur. Diosco. cap. 3. pri-
mi. Plin. cap. 23. lib. 20. Gal. 7. de fac. simp.
Paul. lib. 7. Calefacit in tertio ordine, in se-
cundo siccatur.

Mercurialis herba, ob enæmatum usum
notissima: uide Plin. cap. 5. lib. 25. Gal. 7. de
fac. simp. & Dioscor. cap. 183. quarti. Paul.
lib. 7. Aluum liberaliter subducit, & illita
discutit.

Millefolium duo capita habet. Dioscorid.
alterum de stratiote millefolia, & alterum
de myriophyllo. Sunt qui uelint, stratiotem es-
se millefolium uulgare nostrum, quum in my-
riophyllo unus tantum coliculus, & in no-
stro uulgari plures inueniuntur. De stratiote
loquitur Galenus 8. de facult. simplic. &
Dioscorid. cap. 110. quarti: de myriophyllo
cap. 100. quarti, & Galenus 7. de fac. simp.
in fine. Plin. cap. 16. lib. 24. Paulus lib. 7.
Vim siccandi adeò obtinet, ut conglutinet
uulnera.

Mora tam alba quàm nigra cognoscun-
tur: habent uim soluendi & constringendi.
f. iiij.

Diosc. cap. 147. primi. Gal. 8. de fac. simp.
Paul. lib. 7. itidem adserit.

Musculus arborum, uulgo dicitur usnea, quæ,
ut refert Serapio, somnum prouocat, uomitum
& fluorem uentris cohibet, & est medicina
cordis, ut Auic. Diosc. cap. 20. primi, Gal. 6.
de fac. simp. Paul. lib. 7. Quod cedris adhe-
ret, distrahendi simul & molliendi uim mo-
deratam habet.

Musculus odoratus est res quæ in gazellarum
folliculis continetur, recens & immatura, gra-
uis ac pessimi odoris, sed quum maturuerit,
tanquam sanies è folliculis egrediens est gra-
tissima ac pretiosissima, calida & sicca in
secundo ordine. lege Serapionem lib. aggre.

Musculus marinus est uulgaris corallina,
quæ pro enecandis uermibus datur pueris.
Gal. 6. de fac. simp. Diosc. cap. 94. quarti,
Paul. lib. 7. Infrigidat & adstringit.

Mumia uera non habetur, sed posset pa-
rari uera, si corpora mortuorum ex aloe, myr-
rha & croco condirentur: deinde id liquoris
ad tempus exciperetur. Valet ita parata
doloribus capitis frigidis, paralyti, oris tor-

turae, uertigini, si extrahatur per nares cum aqua maiorana, & doloribus aurium cum oleo uiolaceo albo. Est calida & sicca in tertio secundum Arabes.

Myos otis, id est, muris auricula, nisi sit quod uulgo dicitur centone, haud scio quid sit. Gal. 6. de fac. simp. Diosc. cap. 175. secundi. Plin. cap. 12. lib. 27. Paul. lib. 7. Refrigerat & humectat, & uocatur ab ipso alsine.

Myrrha uera non habetur, nisi forte nostra communis sit, quæ à Diosco. dicitur caucalis siue ergasine: nam nostra cunctis conditionibus requisitis indiget, quum nec sit uiridis, nec crassa, nec acuta, nec odorata, nec colore unita: quare caueant qui in potionibus ac catapotys eam imponunt. Diosc. cap. 69. primi. Gal. 8. de fac. simp. & in lib. Antid. in compos. Theriacæ. Paul. lib. 7. Calefacit in secundo, & siccatur. uide etiam Plin. ca. 16. & 17. lib. 12.

Myrrhis, herba, nisi sit cicutaria, ut communis est opinio, uel cerefolium, ut Manardus, nescio quid aliud sit. Qui tenent hanc esse angelicam herbam, ualde decipiuntur: si-

quidem angelica cicutæ folia non habet sed
potius pastinacæ. Dioscor. cap. III. quarti.
Paul. lib. 7. Calefacit in secundo, & nonnihil
extenuat.

Myrthus, μυρτὸν, frigida est & terrestris.
Gal. 7. de fac. simp. Quod uerò myrtidanum
dicunt, est quoddam gibbosum ueluti adnatū
myrtho. Diosc. cap. 33 primi. Paul. lib. 7. Va-
lentius siccatur.

Naphtha est ueluti oleum petroleum, uel
de monte zibio appellatum: reuera bituminis
genus, quod in mari mortuo, quod est stagnū
minoris Syria, nascitur. Calefacit, exiccat, &
uulnera recentia conglutinat. Dioscor. cap.
86. primi.

Napellus Auicennæ nisi sit toxicon Dio-
scoridis, ut putat Manardus, nescirem pro-
fectò, ni Dioscoridis capita huc referrem: est
enim mortiferum uenenum. Auic. lib. 2. Cali-
dum & siccum est in summo.

Napus, βερνικῆς, uulgò Nauon, ex cuius se-
mine oleum in Aegypto extrahitur. Diosc. ca.
103. lib. 2.

Narcissus, similis est hermodactylo, folia

habet porracea, tenuiora tamen & angustiora, caulem sine folijs, concavum, in quo candidus flos existit. Dioscorid. capit. 155. quarti. Theophrastus cap. 6. libr. 6. Plinius cap. 3. lib. 21. Galen. 8. de facult. simp. Paul. libr. 7. Vim habet aliquam attrahendi & abstergendi.

Nardus est, quam spicam nardi seplasiarij uocant, & est Syriaca spica, & non Indica. Sed mirari satis non possum, quod si ab una eademque radice multæ ac numerosæ spicæ pullulent (ut inquit Dioscorides) cur nō spicas, sed radices esse Galenus dixerit in Andromachi theriaca. Nec satis est dicere montanam spicam non ita oriri, quum ipsa, teste Dioscoride, non nisi bonitate odoris, torosiorēque spica differat. Quare caueat Mathiolus Senensis, quomodo in Manardum alioqui doctissimum tam aperte latret: nam & Galenus in eodem loco iubet in his & alijs Dioscoridē consuli. Paulus lib. 7. Calefacit in primo, siccatur in secundo. Vide & Gal. 8. de fac. simp. & Plin. ca. 12. lib. 12.

Nardus gallica, uulgò spica Celtica, non habetur apud nos: uide Diosc. cap. 7. lib. 1. Quòd uerò non sit saluunca Plinij, non est ut probem. Gal. 8. de fac. simp. Paul. li. 7. Calidior superiori, minùsque adstringit.

Narcaphron, uulgò tignamo, ac si diceretur thymiama, quod nihil aliud sonat, quàm suffumigium: uide Dioscor. cap. 22. primi.

Nasturtium, καρδαμὸν, uulgò agreto, est familiarissima herba, de qua Gal. 7. de fac. simp. loquitur, calida est. Dioscor. cap. 144. secūdi. Paul. lib. 7. Semen modo sinapis urit.

Nerion, uulgò dicitur oleandro, est uelut i uenenum, ut Gal. 8. de fac. simp. Enecant etiā (inquit Diosc. cap. 80. quarti) flores & folia omnes quadrupedes, ualent etiam emplastri modo morsibus uenenatorum, non autem sumpta, ut putarunt nonnulli. Plin. cap. 2. lib. 24. Paul. lib. 7. Extrinsecus uim habet discusso-riam, & si intus assumatur, occidit. Dicitur etiam alio nomine rhododaphne.

Nymphaea, uulgò nenupharo, potentior est, quæ radicem albam fert: uide Gal. 8. de fac. simp. Diosc. cap. 140. & 139. tertij. Plin. ca.

7.lib.25.Paul.lib.7.Vires habet sine erosione siccas, uentrem reprimat, & genituram arefacit.

Ocra est terra gialla, quanquam alij uelint esse terram rubeam: uide Diosc. cap. 62. quinti.

Ocymoides, uulgò basilico saluatico, Diosc. cap.29.lib.4.inuenitur inter frumēta. Gal. 8.de fac.simp.Paul.lib.7.Radix inutilis, semen sine erosione siccatur.

Ocymum, uulgò basilico domestico, Diosc. cap.130.secundi, & Gal.2.de fac.alimen.& 8.de fac.simp. Calidum in secundo ordine cum superflua humiditate: itidem Paul. lib. 7.adserit.

Ocymum aquaticū, ἐειρος, uocatur. Dioscor. cap. 30. quarti, & est fortè apud Gal. echinum dictum. 6. de fac. simp.

O Enanthe est filipendula, Fuchsi. Theophrast. cap.7.lib.6. & Plin. cap. 24. lib.21. Diosc. cap.126. tertij. O Enāthe etiam accipitur pro flore uitis syluestris, qui insigniter adstringit stomachum, & aluum firmat, sed O Enāthe Dioscorid. eijcit secundinas, stilli-

cidio urinae & morbo regio medetur. uide Paul. lib. 7.

Olosteon, est species consolidæ, & non est pilosella, ut nonnulli putarunt: nam pilosella est herba ualde adstrictoria, ita ut uulnera conglutinet, cohibet fluores uentris & sputum sanguinis, & fluxus mulierum albos. uide Dioscoridē cap. 12. quarti. Galenum 8. de fac. simp.

Olyra, est species zea, uulgo spelta nominata, nec est segala, ut Virgilius Marcellus: nam ex olyra panis dulcissimus conficitur, & ex segala amarus, nec siligo est segala, ut aliqui putarunt, sed potius species grani, ex cuius flore panis albiſſimus & optimus olim conficiebatur: quod contrarium omnino accidit nostræ segalæ seu ferragini, ut à Plinio uocatur cap. 16. lib. 18. uide Dioscor. de olyra ca. 82. secūdi, & Gal. 1. de fac. alimen. & 8. de fac. simp.

Opium fit ex lacte, quod à papaueris capite destillat, ut Dioscorid. cap. 63. quarti. Paulus lib. 7. tenet, quod sit frigidum in quarto: nihilominus eius amaritudo non

IN COGNO. SIMPLIC. 95

frigidum simpliciter, sed aliquatenus calidum potius affirmaret, quare diligentius res consideretur. uide Gal. 7. de fac. simp. ubi de papaueris specie agit.

Opopanax fit ex panacis herculei liquore. uide Dioscoridem cap. 50. tertij, & Galenum 8. de facult. simplic. calidum in tertio, & siccum in secundo. Mesu. cap. de opo. Pituitam crassam & uiscosam in remotis partibus corporis contentam soluit. Paulus lib. 7. Mollit etiam & discutit.

Origanū, quo utimur, ut refert Brasauola, est heracleoticum, sed iuxta aliorum opinionem, est origanū sylvestre & heracleoticum, & onitis nostro tempore non inueniuntur. Dioscorides cap. 29. tertij, Theophrastus cap. 2. lib. 6. Plinius ca. 17. lib. 20. Galenus 8. de facult. simplicium. Habet uim incidendi, extenuandi, siccandi & calefaciendi in tertio abscessu.

Orminum nisi sit, ut Ruellius, selarea, nescio certè an reperiatur. Diosc. cap. 126. tertij. Plin. cap. ult. lib. 22. Gal. in fine primi,

de fac. alimen. alteram speciem ormini memorat. Paul. lib. 7. Marrubio simile, calidū, mediocriter siccum & abstergens.

Ornithogalos, quanuis ubique inter segetes nascatur, nondum à me uisa est: radices habet quas edūt pueri, ut refert Ruellius. Sūt in Veronensi agro quædam radices dulces, & in sapore castaneis similes, quæ thrasse uocantur. Diosc. cap. 133. secundi.

Orobanche non solum orobum strangulat, sed omnes quæ uicinae sunt, plantas stermit, unde ab aliquibus herba lupa, ab alijs cauda leonis, ab alijs uerò herba taurina, eò quòd à bobus comesta ad coitum eas promouet. Diosc. cap. 131. secundi. Theoph. 8. de histor. & quinto de causis plant. Plin. cap. ult. lib. 22. Paul. lib. 7. Est temperamenti sicci & frigidi ad primum ordinem.

Oryza, uulgò riso, nascitur palustribus & uliginosis locis, aluum compescit: uide Diosc. cap. 86. secundi. Plin. lib. 18. cap. 7. Paul. lib. 7. Vim habet adstrictoriam.

Osyris, uulgò linaria: uide Diosc. cap. 138. quarti Gal. 8. de fac. simpl. Plin. cap. 12. lib.

27. Paul. lib. 7. Amara est, & vires iecoris laxat.

Oxyacantha, Arabiae berberi, nec est, si bene huius plantae notae considerentur, quod uulgò dicitur crespini. Dioscor. cap. 107. primi. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Fructus ipsius myrthi baccis responder. Auic. tenet quod sit frig. & sic. in tertio.

Peonia, foemina, est notissima, sed mascula non inuenitur. Gal. 6. de facult. simp. Est tenuium partium, sed non nimis calida, imò magis temperata, aut à temperie parum in calore distans. Dioscor. cap. 148. tertij. Plin. lib. 25. cap. 4. Paul. lib. 7. Radix acris leuiter, subamara & siccans, cui nonnihil adstrictionis inest.

Paliurus quid sit, re uera nescio: nam omnes antiqui in paliuro discrepant. Theoph. cap. 17. libri tertij, & capit. 4. lib. 4. Diosc. cap. 113. primi. Plin. cap. 19. lib. 13. & cap. 13. lib. 24. Paul. lib. 7. Adstringit, & semen incidit.

Palma, φοίνιξ, res nota est: nam dactylis, quos ipsa fert, libenter uescimur: in quorum
g. i.

numero ponuntur etiam tamarindi, qui nil aliud sunt quam dactyli Indiani. Diosc. cap. 129. primi. Galen. 8. de fac. simp. & secundo de fac. alim. Paul. lib. 7. Fructus iam maturus calefacit, reliqua palma ualde adstringit.

Panax quum triplex sit Asclepium scilicet ab AEsculapio, chyronium à Chyrone, & heracleum ab Hercule: & si aliquibus cognitum dicatur, reuera tamen ego non uidi. Sunt qui pro panace Asclepio mōstrant millesolium uulgare, & pro chyronio inulam campanam: uide tamen Dioscor. cap. 50. & 51. & 52. tertij. Gal. 8. de facul. simpl. Plin. cap. 27 lib. 12. & cap. 4. lib. 25. Paul. lib. 7. Herculeum calidum in tertio, & siccum in secundo, mollit & discutit: ex hoc fit opopanax Asclepium & chironium: priora sunt calidiora.

Pancration est minor & rotundior scilla: uide Dioscor. cap. 165. secundi, uide etiam de scilla Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Specie & uiribus scillæ simile est.

Panicum omnibus notum. Galen. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Siccat & refrigerat.

Papauer, *μῆκων*, duplex est, alterum sylue
stre, quod flores puniceos siue rubeos habet,
qui à uulgo in laterali morbo sicci habentur
pro efficaci remedio: alterum domesticum quod
rursus duplex est, album scilicet & nigrum,
quanquam horum à Diosc. tertia species assi-
gnetur: uide Dioscorid. cap. 62. & 63. quarti,
Gal. 7. de fac. simp.

Papauer cornutum, *μῆκων κεραυνός*, sæ-
pius à me uisum, sed spumeum, quod prope ma-
re nascitur haudquaquam. Theoph. cap. 13.
lib. 9. Qui dicunt glaucium ex hoc papauere
fieri, quod & memithe Arabes uocant, reue-
ra decipiuntur. Diosc. ca. 64. & 65. 4. Gal. 7.
de fa. sim. Paul. li. 7. Adstrigendi uires habet.

Papyrus in Italia nō habetur, ut Theoph.
ca. 9. lib. 4. & Plin. ca. 11. lib. 13. sed tantum in
Aegypto. Olim ex papyro chartæ cōficieba-
tur, unde etiam nomen adhuc retinet. Diosc.
ca. 100. primi. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib.
7. Siccat, chartæ cremata modo.

Paronychia etsi à multis herbarijs cogni-
ta, nunquam à me uisa est, scio tamen folia
iuxta radices rotunda habere similia peplo:

g. 4.

uide Diosco. cap. 52. quarti, Gal. 8. de facul. simp. Paul. lib. 7. Extenuat, siccatur, paronychijs medetur circa erosionem.

Parthenium, uulgò matricaria ouer amarrella, nomen adhuc seruans amaraci, nec est secunda species artemisia, ut Brasauola & Fuchsius, nec est cotula fœrida, nec helxine, quam parietariam dicunt, ut nonnulli sunt qui dicant athanasiam uulgò daneda uocatam, esse speciem matricariae. Dioscor. cap. 146. lib. 3.

Pastinaca, σα φυλίνοι, tā domesticæ quā syluestres, uulgò pastonache dicuntur, nec sunt carubiae siue carotæ, ut Ruellius, quum non habeant radices sanguineas, ut carobæ. Decipiuntur etiam qui pro dauci semine, semen pastinacæ accipiunt, quum alia res sit daucus à pastinaca. Diosco. cap. 54. tertij, Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Vrinæ & menses mouet, adstringendi uiribus prædita, syluestris tamen est ualentior.

Pastinaca, piscis est qui uulgò dicitur pesce columbo, in cauda habet spinam acutissimam & uenenosissimam, unde Plin. cap. 8.

lib. 32. Pastinacæ quoque radio scarificare
gingivas, & in dentium dolore utilissimum,
conteriturque is, & cum helleboro albo illitus
dentes sine uexatione extrahit. Dioscor. cap.
19. secundi, Ex oleo in quo hepar huius pi-
scis sit decoctum, scabies non solum in homi-
nibus, sed etiam in beluis probè expellitur.

Peplus à Seplasiarijs esula rotunda dici-
tur, & est herba lacte plena. Peplus uerò quæ
in maritimis locis nascatur, nunquam à me
uisus est. Diosc. cap. 162. & 163. quarti. Gal.
8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Eius liquor tithy-
malorum modo purgat.

Peucedanum olim Dioscoridi familiare,
sed quod pro peucedano monstratur, non est
uerum peucedanum, optimū in Sardinia ori-
tur. Dioscor. cap. 83. tertij. Gal. 8. de facult.
simp. Plin. cap. 9. lib. 25. Paul. lib. 7. Calefa-
cit, discutit, & siccatur in tertio ordine.

Phalaris, species lithospermi, maior & mi-
nor reperitur. Dioscorides capite 150. ter-
tij. Plinius capite 12. libr. 27. Paulus libro
7. Calida est & tenuis, doloribus vesicæ
prodest.

g. iij.

Phaselus, vulgò fasolo, huius species plures enumerantur coloribus distinctæ. Nam aliqui sunt rubri, albi, alij citrini flauique, & ex diuersis coloribus picti. Dioscorid. cap. 99. secundi. uide de smilace Auerrhoim. Declinant ad calidum & humidum, impinguant corpus.

Phu Valeriana duplex, maior & minor. Minor autem lanuginosior & breuior est, flores fert albos & purpureos, simul mixtos, multas radices tenues habet. Maior uerò similis est olusatro, caulem habet cubitalem & maiorem, & cætera quæ in Valeriana uisuntur, demptis floribus, qui Narcisso nõ sunt similes: quanquam locum hunc in Diosc. corruptum putat Ruellius, quod fieri potest, quia cætera sint satis manifesta. Dioscor. cap. 10. primi. Gal. 8. de fac. simp. Vim habet nardo similem.

Phycus marinus, φῦκος θαλάσσιος, quid sit nescio, algam uertit Theodorus, sed non est alga, quæ Venetijs in seruandis uitræ reponitur. Diosc. cap. 95. quarti. Gal. 8. de fac. simpl. Plin. cap. 23. lib. 13. Paul. lib. 7. Refri-

gerat, siccatur in secundo, & mediocriter adstringit.

Phyllitis est lingua ceruina, olim pro scolopendria habita, quum reuera nunc sit asplenon siue citrach Arabicè dictū, nec est hemiostitis lingua ceruina, ut Manardus, Leoniceus & Fuchsius & Ruellius adserunt, si locus rectè perpendatur. Diosc. cap. 112. tertij. Gal. 8. de facul. simplic. Diarrhoeam cohibet phyllitis. Paul. lib. 7. Acerba qualitate cōstat.

Phyllyrea non est tilia, ut Hermolaus, Ruellius & Marcellus Florentinus interpretantur: nam tilia, Græcè φύλλυρα, & non φύλλυρέα dicitur. De tilia scripsit Theoph. cap. 10. lib. 4. cuius cortex modo emplastri recentia uulnera conglutinat, & folia eius trita inflammationes pedum resoluunt, & facit capillos renasci, prohibens etiam eorum profluvium. Phyllyrea, arbor, ignota est nostro tempore: uide Diosc. cap. 110. primi. Paul. lib. 7. Tiliæ folia adstringunt, iccirco ulceribus oris medentur.

Phyllon, uulgò folio, nisi sit persicaria maior, ut Ruellius: nescio profectò quid sit: uide g. iij.

Diosc. cap. 131. tert. Nullibi à Gal. nec à Paulo mentio habita est.

Pityusa à seplasiarijs Esula maior uocatur, cuius radices ab ijs qui à monte Gargano siue sancti Angeli ueniunt, pro turbit ueduntur, à peritis tamen medicis neglectæ: hæc uerò Esula maior alcebrā & scebram à Mesue nominatur, cuius rei fidem facit Serapio cap. de scebram: uide Dioscoridē cap. 160. lib. 4.

Plantago, *ἄρνόγλωσσον*, maior & minor inuenitur: quanquam non desint, qui lanceolam herbam esse plantaginis affirmant. Maior constat septem neruis, media quinque, minor tribus: habent facultatem aqueam, frigidam, cum aliquali austeritate, ut Galen. 6. de facult. simplic. Dioscorid. cap. 115. secundi. Paulus libr. 7. Refrigerat & desiccatur in secundo, temperata ex aquea & terrestri substantia.

Platanus in Italia, ut refert Theophrast. non nascitur, uide tamen Diosc. de eius uiribus, cap. 92. primi. Plinium cap. 7. lib. 15. & Gal. 8. de fac. simplic. Exiccatur & infrigidatur,

à latis folijs dicta est quæ habet instar ficis folia. Paul. lib. 7. Frigidior & humidior ui constat.

Polemonia, nisi sit galego, siue gearcha dicta, ut refert Brasauola, nescio quid sit: nō habet tamen in summitate corymbos, ut refert Diosc. cap. 9. quarti. uide Gal. 8. de fac. simp. & Plin. cap. 6. lib. 25.

Polium sunt qui pluries uidisse affirmant, scio ego in hoc seplasiarios decipi: nam herbam pro polio ostendunt, quæ caules ualde tenues & lino similes, seminibus rotundis onustos habet, quæ polium reuera non est. uide Plin. cap. 7. lib. 21. & Theoph. cap. 21. lib. 9. Gal. 8. de facult. simplic. & Diosc. cap. 115. tertij. Paul. lib. 7. tertij. Calefacientium & siccantium ordinis est.

Polygonon, herba sanguinalis, tam mascula quam femina omnibus nota, uulgo corrigiola siue centinodia dicitur. Dioscor. cap. 4. & 5 lib. 4. Plin. cap. 12. lib. 27. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Habet uim adstringendi, frigida & humida in secundo ordine.

Polygonaton, uulgo frasinella siue gino-

chiella, cuius radicibus mulieres ad fucum utuntur: ab aliquibus etiam uocatur sigillum sanctæ Mariæ, & sigillum Salomonis. Manardus in hoc deceptus est, credens polygonatum esse secacul Arabum: nam Serapio scribens de secacul, nihil refert quod ad polygonatum attineat. Galenus 8. de facultate simplicium. Dioscorid. cap. 6. lib. 4. Paul. lib. 7. Variæ facultatis est, adstrictoriæ, acris & amara.

Polypodium, inquit Actuarius, purgat bilem nigram & pituitam. Manardus, soluit sine molestia. Mesues, extenuat corpora, quod & Galen. 8. de facultate simplic. ualenter exiccare inquit sine mordacitate. Dioscorid. cap. 179. quarti, Plinius cap. 8. libr. 26. Paulus libro 7. Siccat abunde citra morsum.

Pompholyx, qua utuntur seplasiarij, est potius cadmia: quod uerò tucia non sit, apparet, quum tucia uera, leuissimus quidam puluis sit, non autem ut lapis ac nostra uidetur. Quare apud pharmacopolas non inueniri tuciam nunc affirmarem, nisi aliam habere

fortè inuestigauerint. uide Dioscor. cap. 43. quinti: nec ausus est aliquis, quòd sciam, hanc in catapotys siue pharminus, quæ per os deglutuntur, tuciam imponere. Gal. 9. de fac. simp. Plin. cap. 13. lib. 34. Paul. lib. 7. Siccatur sine erosione.

Populus, αἴγυπος, tam alba quàm nigra, nota est omnibus, uulgò ab Hetruscis dicitur oppi, à Longobardis Piope, ex quibus fabulantur electrum oriri, sed reuera ab insula quapiam olim Austrania dicta à quibusdam arboribus nostro pino similibus effluit, & ad Germaniam per maris inundationem aliquando perfertur. Hoc uulgò dicitur à seplasiarijs charabe, nec est gumi populi, ut nonnulli retulerunt. Diosc. cap. 94, & 98. primi. Plin. cap. 24. lib. 16. Paul. lib. 7. Nigra calefacit in primo, modicè siccatur, tenuis substantiæ: alba aquosa est, tepida terrestriſque substantiæ & absterſoria.

Porrum capitatum dictum, quod in tempore transplantationis, si folia & radices porris incidantur, & aliquid quod illud descendere prohibeat, in plantando subterponatur,

facile capitatum euadat. Diosco. ca. 38. lib. 2.
De porro uerò agresti, lege Ampeloprasen.
Paul. lib. 7. Mali succi est & acris, extenuat
& abstergit.

Porulaca, αἰσπάρην, uulgò porcellana.
Galen. 6. de facul. simp. Frigida in tertio, &
humida in secundo, biliosos ac calidos hu-
mores cohibet, & ut refert Plin. cap. 21. lib.
20. rupturas umbilici constringit. Diosc. cap.
113. secundi. Paul. lib. 7. Refrigerat in tertio,
humectat in secundo.

Potamogeton, uulgò beta aquatica, nasci-
tur in lacustribus & aquosis locis, pruriti-
bus ac uetustis & depascentibus ulceribus
prodest. Diosc. ca. 96. quarti. Gal. 8. de facul.
simp. Paul. lib. 7. Refrigerat & adstringit.

Psylly semen, ut refert Gale. 8. de fac. simp.
frigidum est in secundo, humectat & desiccatur
mediocriter. Plin. c. 9. lib. 25. Diosc. c. 68. li. 4.

Ptarmice, uulgò oliuella, ea plerique pro
scopis utuntur, & dicitur ptarmice, eò quòd
odorata planta statim sternutamenta irritet.
Diosco. cap. 151. secundi. Gal. 8. de fac. simp.
Viridis, calida, & sicca in secundo: siccata

uerò in tertio ordine.

Pulegium omnibus notum, inuenitur masculum cum floribus albis, & foemellum cum floribus purpureis. Qui dicunt speciem calamenti esse id quod in usu est, ualde decipiuntur, siquidem calamenti species per se omnes inueniuntur. Diosc. cap. 31. tertij. Gale. 6. de fac. simp. Plin. ca. 14. lib. 20. Extenuat, calefacit, concoctionesque adiuuat, ut Gal.

Pumex, est lapis combustus ex monte *Aetnae*, uel *Vesuuino* monte *Campaniae*, qui si iterum comburatur, non erit *smyna* inferior. Dioscor. cap. 79. quinti, & Galen. 9. de facul. simplic. Habet uim exiccandi & abs-tergendi.

Pyrethrum sua radice notissimum, habet folia ueluti *daucus* & foeniculus agrestis. Dioscor. cap. 78. tertij. Gal. 8. de fac. simp. Facultas eius est caustica.

Pyrites lapis, uulgò *Marchesita*, probatur qui est aëri similis. Diosco. cap. 96. quinti. Gale. 9. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Validè discutit tumores, sanguinemque in grumo concretum.

XIO DE CONSEN. MEDIC.

Quercus, ὀρῦς, connumeratur inter arbo-
res glandiferas, sicuti etiam Elix, Fagus,
Cerrus, Suber, Farnia, Ischia: uide Dioscori-
dem cap. 126. primi. Galen. 6. de facul. simp.
Paulū lib. 7. Folia ac fructus siccant, ac te-
pida ui pollent.

Quinquefolium, πεντάφυλλον, maius folia
menta similia habet, & florē in pallido can-
didū, secūda species à prima tātū in colore
differt, tertia per terram serpit, quarta folia
similia uiti tenet, ab aliquibus diapensia, uel
sannicula dicitur: uide Diosc. ca. 40. quarti,
Gal. 8. de fac. simp. Radix eius exiccat in ter-
tio, nec euidentem habet caliditatem. Plin.
cap. 9. lib. 25.

Radix, ῥαφανός, uulgò Rauanello. Gal. 8.
de fac. simp. Calida est in tertio, & sicca in
secundo. Diosc. cap. 104. lib. 2.

Radicula, siue herba lanaria, sicuti tempo-
re Diosc. cognita, ita nūc maximè restat inco-
gnita. Diosc. 153. secūdi. Gal. 8. de fac. simp.
Paul. li. 7. Calefacit ī tertio, siccatur in secūdo.

Ranunculus, βατράχον, est apium rani-
num, cuius species quatuor enumerātur: scili-

IN. COGNO. SIMPLIC. III

cer apium, quod est pes columbinus, pes pai-
pi, pes milui, & apium risus, quod herba sar-
donia alias appellatur: unde Virgilius,
Imò ego sardonis uidear tibi amarior herbis.
Hac si ab homine deuoretur, ita interficit, ut
contractis nervis instar ridentis moriens ui-
deatur. Diosc. cap. 166. secūdi. Plin. cap. ult.
lib. 25. Paul. lib. 7. Omnia genera sunt excel-
lenter calida, sicca, acria, urentia.

Rhabarbarum, uulgò rheubarbaro, cogno-
scitur differenter ab omni rhapōtico, de quo
satis amplè tractauit Mesues.

Rhamnus, uulgò dicitur spinceruino, aut id
quod Hetrusci dicūt marucho. Diosc. ca. 104.
primi. Galen 8. de facul. simplic. Exiccat &
digerit in secundo. Plin. cap. 14. lib. 24.

Rhaponticum, Diosc. cap. 2. tertij. Plin. ca.
12. lib. 27. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. cō-
positum ex terrestri frigida & tenui substan-
tia, aëreāque, calida, & leuiter acri.

Rhodia radix, nisi sit quæ garyophyllata
dicitur, certè nescio si unquam uiderim: hoc
scio, eam rosas, unde nomen accepit, redolere.
uide Dioscor. cap. 43. quarti. Galen. 8. de

fac. simp. Paul. lib. 7. Calefacit in secundo, tenui & discutiente vi prædita.

Rhu obsoniorum, uulgò dicitur sumacho: in condendis enim cibis antiqui hoc, loco salis utebantur, quod etiam nunc in Syria & Aegypto obseruatur. Diosco. cap. 128. primi. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Constringit & exiccat in tertio, detergit in secundo.

Ricinus, frutex, uulgò mirasole, dictus est ricinus ab animale ricino, uulgò zecca, quæ in equis & canibus sæpe uisitur, quanquam heliotropios sit mirasole, dicitur à seplasiarîs cherua maior, & à Mes. granû regis. Gal. 7. de facul. simp. Dioscor. 158. quarti. Paul. lib. 7. Purgat, abstergit & digerit.

Rosmarinum, λικανωπίς, habet duas species, quæ à me nondum uisæ sunt: rosmarinum coronarium est, quo passim utimur, & uulgare nostrum. Diosc. cap. 79. & 80. tertij. Gal. 7. de fac. simp. Habet uim incidendi & abszergendi. Plin. cap. 11. lib. 24.

Rosæ, excellentiores sunt rubræ, post has purpureæ, demum albæ. Componuntur ex diuersis substantiis, ut Galen. Putarem ego ea-

rum infusionem potiore fieri, si ex Damas-
scenis rosis pararetur. Dioscor. cap. 115. pri-
mi. Galen. 8. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Iu-
xta constant substantia, aquosa scilicet, cali-
da, adstringenti & amara: flos autem magis
adstringit & desiccatur.

Rubus caninus, κυνόσβατος, nō est rosa syl-
uestris, ut nonnulli putarunt, teste Theophra-
sto, qui diuersa capita agit: nam de cynosba-
to loquitur cap. 18. tertij, & de rosa canina
cap. 6. lib. 6. Diosc. cap. 108. primi. Gal. 7. de
fac. simp. Fructus astrictorius, &c.

Rubia, ἐρυθρόδαμον, omnibus nota, cuius
caulibus & folijs ob suam asperitatem utun-
tur sœminæ ad illustrandum stannum. Dio-
scorid. cap. 151. tertij. Galenus 6. de facul.
simpl. Paul. lib. 7. Radix acerba & amara
ita iecur & renes purgat, ut sanguinem &
menses euocet.

Ruscus, ὀξύμυρτον, apud seplasiarios bru-
scus, herba spinosa, similis myrtho, quam &
syluestrem myrthum dicunt: eius germina in
acetarijs comesta, ualenter urinam prouo-
cant, & obstructions aperiunt. Dioscorid.
h. i.

cap. 141. lib. 4.

Ruta, *ῥήζανον*, duplex est, sylvestris montana, & sativa hortensis, & ambæ species cognoscuntur. Galenus 8. de facul. simpl. Calida in quarto est sylvestris, & sativa in tertio. Contra fascinationes eam commendauit Aristoteles in suis problematis. Dioscor. cap. 47. tertij.

Ruta sylvestris, *ῥήζανον ἀγρίον*, hanc harmel Arabes uocant, ex Cappadocia & Galatia affertur, nimirum nostris partibus non habetur. Qui uerò pro harmel, semen cicutæ accipiunt, ualde decipiuntur. Volunt aliqui geargam esse rutæ speciem, uulgò galega dictam, cui attribunt in peste & contra uenena miram quandam uirtutem. uide Dioscoridem cap. 48. tertij. Galen. 7. de facul. simpl. uocat eam moly.

Sabina, *βάρυτον*, tam quæ similis est cypressso, quàm quæ Tamarisco cognoscitur. Dioscor. cap. 89. primi. Galen. 6. de facul. simp. Plin. cap. 11. lib. 24. Paul. lib. 7. Calefacit & siccit in tertio.

Saccharum Dioscoridis & Galeni nonnull

li esse ex eodem liquore quo nostrum affirmant, nec à nostro differre dicunt, nisi arte & natura: alij uerò longè à nostro differentem existimant, nec eodem liquore confici, sed ueluti ex rore factum credunt. Dioscorid. ca. 74. ad finē lib. 2. Gal. ca. de melle. Paul. li. 7. ca. de melle. Sachar minus dulce nostro, sed æquales uires obtinet, nec nocet stomacho, nec sitim efficit.

Sagapenum, uulgò serapino, liquor est ferulaceæ herbæ: electissimum habetur Venetijs, potentius est orientale. De eius uiribus uide Mesuen & Diosc. cap. 86. tertij. Galen. 8. de facul. simp. Suffusioni oculorum & debilitati uisus ualet. Paul. lib. 7. Calidum & tenue, cui abstersoria uis inest.

Salix, arbor, ἰτέα: eius species tres recitantur à Theophr. & Plin. de tribus succis eius mentionem facit, scilicet de gummi, & de eo qui fit inciso eius cortice, & de eo qui incisis ramis tempore autumnali per se destillat: habent enim uim exterendi quacunque claritati oculorum officiunt. Plin. cap. 38. lib. 16. Galen. 6. de facul. simp. Paul. lib. 7. Folia & h. ij.

flores siccant citra rofionem, & nōnihil adstringunt.

Salvia, ἑλίσφακος, ab Agrippa herba sacra uocabatur, eius succus bibitus facit quæ steriles sunt mulieres, prolificas, & confert spurio sanguinis, uide tamen de his Aetium & Dioscoridem cap. 35. tertij. Gal. 6. de fac. simp. Plin. cap. 6. lib. 26, inquit, quod succus foliorum capillos generat. Paul. lib. 7. Euidenter calefacit, & leuiter adstringit.

Sambucus & ebulus, ἀκτὴ, succus corticum radicum hydropicis succurrit, & semen ebuli in decocto iuæ, dolores iuncturarum, podagræ, & morbi Gallici tollit: succus etiam eius in sole exiccatus, & in clysteribus iniectus, sciaticis medetur. fomentum etiam ex eorum radicibus factum tumores pedum, qui ex longo morbo prouenerunt, optimè resoluit. Dioscor. cap. 168. quarti. Galen. 6. de facul. simpl. Exiccat & conglutinat. Plin. cap. 8. lib. 24. Paul. lib. 7. Desiccat, modicè digerit, & conglutinat.

Sampsuchum, uulgò maiorana: nec miretur quispiam, si per diuersa capita mentio

fiat à Gale. & à Diosc. de sampsucho & amaraco : nam hoc fieri potuit, ut rem melius exprimeret Dioscor. nam in Galeno creditur in eo textu esse menda, ubi pro amaraco legi debeat maro, & non amaraco. Dioscor. cap. 4. tertij. Gale. 8. de facul. simp. Paul. lib. 7. Calefacit & siccatur in tertio, tenuis ac diffusoria natura.

Sandaracha non est uernix, ut aliqui putarunt, quum uernix sit gummi iuniperi: sed est potius res mineralis, quæ ab auri pigmento non differt, nisi in coctura: nam si quis diu auri pigmentum coxerit, facile illud in sandaracham conuerti efficiet, nec arsenicum chrysellinum ex auri pigmento per sublimationem paratur, ut nonnulli crediderunt, sed potius est res mineralis per se oriens. Verum quod uulgò dicitur risagalum, ex arsenici & auri pigmenti pari portione per sublimationem bene conficitur. uide Dioscorid. de sandaracham cap. 76. quinti. & Gale. 9. de facul. simplic. & Paulū lib. 7. Adurans est facultatis.

Sarcocolla, est gummi cuiusdam in perside
h. iij.

arboris, mirè conglutinat recentia uulnera,
 & ulcera antiqua mundificat, glutinat, &
 carnem inducit, & est mirabilis in oculorum
 destillationibus. Optima cognoscitur, si sit
 amara & alba, ualet etiam ulceribus auriū,
 si in melicrato bōbix intinguatur: deinde pul-
 ueri sarcocollæ inuolutus auri imponatur.
 Dioscorides cap. 90. tertij. Gal. 8. de facul.
 simpl. Plin. cap. 11. lib. 13. Paul. lib. 7. Sic-
 candi ac opplendi uires habet.

Satyrion non habetur nostris temporibus,
 sed eius loco testiculi canis: nec Satyrion ha-
 bet duas radices, ut putarunt nōnulli, sed unā
 tantūm bulbosam pomo similem. Plures sunt
 deinde testiculorum canis species, inter quæ
 palma christi reponitur. Diosco. cap. 134. &
 135. tertij. Galen. 8. de fac. simpl. Paul. lib. 7.
 Calidi & humidi tēperamenti est, unde Ve-
 neris appetentiam facit.

• Saxifraga, uulgò sassifragia, uulgaris her-
 ba est, in frangendis lapidibus, & in prouo-
 canda urina summopere cōmendatur. Diosc.
 cap. 17. primi, & Paul. lib. 7. Vrinam mo-
 uet, & calculos conterit.

Scammonia, uera & optima erat quæ ex Mysia Asia olim afferebatur, sed quæ à Dioscoride reprobatur, in Iudæa & Syria oriens, tantummodo nunc in usu est, nec uera sic asacriter soluit ac nostra: nam olim drachma lcamonia cū duobus granis hellebori pro dosi tribuebatur, sed nostra si ad pondus decem uel quindecim granorum exhibeatur, adeo uentrem exonerat, ut etiam quàm maximè superque euacuet. Dioscorides capite 165. quarti. Plin. cap. 8. lib. 26. Paul. lib. 7. Calefacit, digerit, & biliosa extergit, magisque eius liquor.

Scilla, uulgò deflexa uoce à seplasiarijs dicitur squilla: aiunt minutim incisam, & in uase uitreo melle pleno per totam æstatem soli expositam, deinde colatam, præsentaneum esse remedium epilepticis. Galen. 8. de fac. simpl. Incidit scilla, sed non adeo calida, ut secundum gradum transcendat. Dioscorides cap. 102. secundi. Paulus lib. 7. Incidit & calefacit & desiccat in secundo ordine.

Scordion uerū nunc inuenitur, simile chamædrio, differens tamen odore ally. Creten-
b. iij.

se à Gale. in lib. antid. laudatur. Et 8. de facul. simpl. Componitur ex diuersis substantijs, cōsolidat omnia uiscera, ruptis & sp̄asmo confert, ualet doloribus, lateris modo emplastris, & recentia uulnera ac ulcera conglutinat. Dioscor. cap. 116. tertij. Paul. Varijs constat facultatibus, quum amarum, acerbum, & acre sit: purgat igitur & calefacit.

Sedum, αἰζων, uulgò semper uiuo dicitur, cuius species tres numerantur à Dioscor. cap. 85. & 86. quarti. Maius uulgò dicitur orchicella, minus dicitur uermicularis uel pignola, & est mascula & femella. Gal. 6. de facultate simpl. Frigida in tertio mediocriter adstringit, & siccatur leuiter. Plin. cap. 2. lib. 25.

Senecio, ἡερίπων, uulgò sp̄eliciosa, coliculus quodammodo rubēs, folijs longis & incisīs ueluti in eruca uisitur, flores lutei citò in pappos desinenteis. Galen. 6. de facul. simp. Dioscorides cap. 92. quarti. Nōnulli esse carduum benedictum affirmant. Paulus lib. 7. Mixtas habet uireis, refrigerat enim & modicè discutit.

Serpyllum, Dioscor. cap. 41. tertij. Galen. 6. de facul. simpl. Plin. cap. 22. lib. 20. Paul. lib. 7. adeò calefacit, ut urinam & menses moueat.

Sesamum, est simile milio, sed aliquantulo crassius, & altius folia fert rubra cum flore uiridi, & producit in siliquis semen ueluti papauer. Dioscor. capit. 90. secundi. Gal. 8. de facul. simpl. Plin. cap. 10. lib. 18. Paul. lib. 7. Mediocriter calefacit, mollit & opplet. Auer. quinto colliget. Calidum in primo, humidum in tertio.

Seseli, Arabicè siseleos, notum est, praesertim Massiliense: ualidissimè urinam prouocat, & epilepsiae ac spirandi difficultati medetur. Creditur à ceruis inuentum: nam à partu id statim comedunt, ut denuò concipiant, sicut refert Arist. 9. de natura animalium, cap. 5. Dioscor. cap. 55. tertij, & Galen. 8. de facul. simpl. lib. Plin. cap. 5. lib. 20. Paul. lib. 7. Calefacit, tenuisque substantiae est.

Sideritis, non est herba Iudaica, ut Ruelius: nam herba Iudaica est quam uirgamo auream appellamus. Hae caulem fert rubrum

ad duorū cubitorum altitudinem cum folijs modo oliuæ circum circa incis, & floribus in summitate aureis, uulneribus & fistulis mirè confert, similiter in frangendo lapide, ut Arnaldus de uilla noua. Dioscor. cap. 33. quarti. Galenus 8. de facultate simpl. Paul. lib. 7. adstringit.

Sinapi triplex est: syluestre, quod semen habet paruum: commune, folia habet rapo similia: terciū, uulgò dicitur Rugetta, album semen ferens, & eo utimur in seruanda uinorum dulcedine. Dioscor. cap. 143. lib. 2. Gal. 8. de facul. simpl. Plin. cap. 8. lib. 19. Auic. lib. 2. Calida & sicca in quarto.

Sifer, propemodum simile est pastinacis domesticis, nascitur in Germania, & uocatur rapa citrina. uide Pliniū cap. 5. lib. 19. Dioscoridem cap. 106. secundi. Galenū 8. de facultate simplicium. Paul. lib. 7. Calidum in tertio ordine. Radix cocta stomacho utilis, urinam cit, semen tenue & discussorium, cum uino ualet singultui.

Sisymbrium, est seplasiōrū balsamita, uulgò menta Romana, uel menta Florentina.

Sisymbrium uerò aquaticum est id quod uulgo dicitur *crescione*. Dioscorides cap. 117. secundi. Theoph. cap. 7. lib. 6. & cap. 8. lib. 5. de plant. caus. & Plinius cap. 10. lib. 19. Galen. 8. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Calefacit siccátque in primo, humidum in secundo abscessu.

Sion, non est quod uulgo dicitur *crescione*, sed aliud: uerùm unum absque altero raro inuenitur. *Sion* habet folia lata olusatro similia, sed *crescionus* habet quales in *eruca* uisuntur. Dioscorides cap. 116. secundi. Plin. confundit utrumque *sium*, id est *sium* uerum & *sisymbrium* aquaticum, ut apparet cap. 22. lib. 22. Galen. 8. de fac. simpl. Paul. lib. 7. Calidum est, urinam citat, discutit, & renum calculos frangit.

Smilax aspera & *lenis*: inuenitur *aspera*, quæ folia habet *periclymeno* similia, arboribus aduoluitur, & habet innumeras uiticulas spinosas cū fructu uua, racemi modo rubenti: *lenis* uerò *hederæ* folia habet similia, & uiticulas similes antedictæ, sed non spinosas, uulgo *uiluchio*, & à *seplasiarijs* uolubilis di-

citur, flores habet orbiculatos ueluti campana. Theoph. cap. ult. tertij. Dioscor. cap. 139. & 140. quarti. Galen. non simulacem, sed milacem uocat 7. de facul. simpl. Plin. cap. 2. lib. 16. & cap. 10. lib. 24.

Smilax, arbor, uulgò deflexa uoce à taxo sic à Romanis appellata, Nasso dicitur. Vide Dioscor. cap. 78. lib. 4. Caue tamen ab huius fructibus, quoniam interficiunt. Plutarchus inquit, quòd sola umbra interficit, sed de ea tu intellige, quæ in Carbonia nascitur. Paul. lib. 7. Est uirosæ uirtutis.

Smilax hortensis, sunt qui esse existimene phaselum rubeum, qui uulgò fasolo turchesco appellatur. Manardus tenet, quòd sit Galeni dolicus, & uulgò quod dicitur rouiglione. sed credo illum decipi, quoniam quod dicimus rouiglione, Galen. & Paul. non dolicum uocant, sed potius ocrum. Dioscor. cap. 135. lib. 2. Gal. 1. de facul. aliment.

Smyrnum, uulgò dicitur Macerone, nec est imperatoria, ut nonnulli, quæ commendatur in omnibus frigidis aegritudinibus, sicut in doloribus colicu & stomachi, men-

strua prouocat & urinam, dolores dentium
 tollit, & cum uno strangulatu uulua mede-
 tur, cerebrum masticata purgat, & eius pul-
 uis ad epilepsiam, spasmus, paralysem, & ad
 febrem quartanam ante eius paroxysmum
 per horam utiliter cum uino bibitur: ualet in
 peste, & ad omnia uenena: spiritum refice-
 re, & membra sensuum roborare potest: da-
 tur insuper asthmaticis, ictericis, hydropicis
 & lienosis. Dioscor. cap. 72. tertij. Galen. 8.
 de facultate simplicium. Plinius cap. ulti-
 mo lib. 19. Paulus lib. 7. Calefacit & siccat
 in tertio ordine.

Solanum, σπύχρον, uulgò solatro, cuius
 species à Dioscor. quatuor enumerantur, hor-
 tense, halicacabum, somnificum, & furiosum.
 Hortense & halicacabum nunc passim co-
 gnoscuntur: nam halicacabum est id quod
 Arabes uoce parum deflexa Alchachengi di-
 cunt. Plures etiam species inueniri dicuntur,
 sed de his quasi per somnium loquuntur au-
 thores. Vide Dioscoridem cap. 69. 70. 71.
 & 72. lib. 4. Galenū 8. de facultate simpl.
 Pliniū cap 31. lib. 21. Paul. lib. 7. Hortense

Et *Halicacabum* adstringunt, Et in secundo ordine refrigerant.

Sonchos, sunt qui *scariolam* esse dicunt. Scio apud *Hetruscos* uocari *Circebita*. *Dioscorides* cap. 120. 2. *Galen.* 8. de facul. simplicium. *Paulus* lib. 7. Adstringit Et manifestè refrigerat.

Sparganium hucusque non uidi, etsi ab aliquibus reperta esse dicatur: hoc scio, non esse spatulam foetidam, ut *Ruellius*, ex cuius succo sanatur scabies Et uolaricæ. *Dioscorides* cap. 23. 4. *Gal.* 8. de facultate simplicium. *Paulus* lib. 7. siccandi uireis habet. *Plin.* cap. 9. lib. 25.

Spina alba, λευκὴ κενταύρεα, uulgò *bedeguar* sicuti *Arabice*. Sunt qui pro *spina alba* accipiunt *carduum benedictum*, alij *carduum carlinam* dictum, alij alium *carduum*. Aduerte tamen *bedeguar* tantum nasci in montibus Et syluosis locis. *Dioscor.* cap. 12. 3. *Gal.* 6. de facul. simpl. Radix desiccatur Et modicè adstringit, semen est tenuis essentiae Et calidae aculeatis.

Spina Arabica, est similis *alba*. Ego eam

non uidi: hoc scio nō eam esse, ut Ruellius putat, spinam arboris acatiæ. Dioscorides cap. 73. 3. Galenus 6. de facul. simpl. Validius adstringit & desiccatur.

Spondylion audiui ab aliquibus esse inuentum: ualet epilepsiæ eius fructus & orthopnœæ. Vide Dioscor. cap. 81. 3. Gal. 8. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Constat uirtute acris & discussoria.

Stachys, nisi sit marrubium album, nescio quid sit. Diosc. cap. 3. 3. Gal. 8. de fac. simpl. Plin. cap. 15. lib. 24. Paul. lib. 7. 3. In calefaciendo tertium ordinem occupat.

Stacte, est styrax liquida. Diosc. ca. 64. 1.

Staphys agria, ἄστα φῖς ἀπρῦπία, uulgò strafusano, siue uua seluatica. Dioscor. cap. 150. 4. Galen. 6. de facul. simpl.

Stribium & stibi, antimonium est, ut placet Auicennæ & Serap. Fūditur ipse, & omnia metalla facit fluida, ut ferrum. Dioscorid. cap. 53. 5. Galen. 9. de facul. simplic. Exiccatur & constringit. Plin. cap. 6. lib. 33.

Stœchas, Arabicè stichados, est res notissima. Vide Mes. & Dioscor. cap. 28. 3. Galen.

8. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Aperit, extenuat, detegit & confirmat uiscera.

Stæbe non cōuenit cum scabiosa, ut nonnulli affirmarunt, ex cuius decocto sanantur scabies & pulmonis uitia. Dioscor. de stæbe cap. 13. 4. & Galen. 8. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Semen & folia in tertio adstringunt.

Styrax, uulgò storace calamita. Dioscor. cap. 70. primi. Galen. 8. de facultate simpl. Plin. cap. 25. lib. 12. Paul. lib. 7. Calefacit, emollit, & concoquit.

Sycomorus, arbor nostro moro non dissimilis, fructum fert non ramis, sed caudice fitorum grossulis dulciorem. Dioscorides cap. 548. primi. Gal. 2. de alim. Theoph. cap. 2. lib. 4. Plin. cap. 7 lib. 13. Paul. lib. 7. Fructus nullius nutrimenti, liquor arboris emollit, uulnera conglutinat, & tumores discutit.

Tamarix domestica apud nos non inuenitur. Diosc. cap. 101. primi. Gal. cap. ultimo 7 de facul. simpl. Plin. cap. 21. lib. 13. Paul. lib. 7. Incidit, extergit, ita tamē ut manifestè non exiccet, sed adstrictionis particeps sit.

Telephium, est faba crassa, uulgò dicta.

IN COGNO. SIMPLIC. 129

Diosco. cap. ult. lib. 2. Galenus 8. de facult. simplic. Paul. lib. 7. Calefacit in primo, & in secundo desiccatur.

Tamarindi, aliàs dactyli Indi uocantur: uide suprà.

Terebinthus, res est nunc nota, olim quasi incognita recesserat. Nunc eius resina non liquida, sed potius cocta ad nos affertur. Dioscor. cap. 77. primi. Theophr. cap. 15. tertij. Inuenitur tam masculus, quàm foemina. Gal. 8. de fac. simp. Fructus adstrictorium quidam habent, sed in secundo calefaciunt & desiccant.

Teucrium adhuc non uidi. Plin. cap. 5. lib. 25. duas species teucrij memorat, & secundum habere folia fabæ similia adserit: unde nonnulli id esse uoluerunt, quod nulgò dicitur faba grassa. Dioscorid. cap. 102. lib. 3. Gal. 8. de fac. simp. Exiccatur in tertio, calefacit in secundo.

Thalictron est secundum Ruellium herba Argentina, quæ folia coriandro similia habet. Dios. cap. 93. quarti. Gal. 6. de fac. simp.

Thapsia rarò ad nos affertur. Valet lini-

i. s.

ditati carnis cum thure & cera, ut refert
 Plin. cap. 20. lib. 13. Gal. 6. de facult. simplic.
 Dioscorid. cap. 151. quarti. Theoph. cap. 23.
 lib. 9. Est radix uomitoria. Paul. lib. 7. Acris
 est & uehementer cum humiditate calefacit,
 ex alto attrahit, & attractum discutit.

Thlasi quid sit, non possum affirmare:
 nam bursa pastoris multum à thlasi differt,
 si quis rationem utriusque perpendat. Dio-
 scor. cap. 145. secundi. Gal. 6. de facult. simp.
 Paul. lib. 7. Semen uiribus acre, ut intestino-
 rum abscessus potu rumpat.

Thymbra siue Satureia, siue cunila, uul-
 go Sauorexo siue peuerella, apud Tuscos co-
 niella, pollet ac ipse thymus. Diosco. cap. 40.
 tertij. Plin. cap. 8. lib. 19. & cap. 20. lib. 20.
 Reperitur domestica & syluestris: quare non
 mirum si Columella inter Thymbra & Sa-
 tureiam, diuersitatem posuerit. Paul. lib. 7.
 Syluestris præstat, quæ thymus, hortensis ue-
 rò imbecillior.

Thymus inuenitur albus & niger: at niger
 iuxta Aetij placitum est malus. Dioscor. cap.
 39. tertij. Gal. 6. de facult. simpli. Theophr.

INCOGNO. SIMPLIC. 131

cap. 2. lib. 6. Paul. lib. 7. Calefacit in tertio,
& desiccat, & glutinosos humores incidit.

Tithymali genera sunt septē, charatias &
myrthires, quæ sunt nobis incognita: Paralī⁹
uerò ab aliquibus cognoscitur, & uulgò uo-
catur herba mora, ex qua pisces moriuntur.
Cyparisius est esula minor: dendrodes, à me
nunquam uisus. Plathyphylos, apud Tuscos
dicitur torto maglio. Nota tamen quòd cy-
parisius uocatur à Mesue alscebram, & ab
Auic. scebram, alscebram uerò mezeheregi est
pityusa à Diosc. Lac eorum depilat oleo in
sole inunctum, & ortum tandem prohibet.
Diosco. cap. 159. 4. Gal. 8. de facul. simplic.
Plin. cap. 8. lib. 26. Paul. lib. 7. Omnes è
quarto ordine calefacientium, acrimonia &
ualidæ amaritudinis participes.

Tragacantha, uulgò draganti eius gumī
uocatur, in Creta & Achaia nascitur. Gal.
8. de facult. simplic. exiccat. Dioscor. cap.
21. tertij. Plin. cap. 21. lib. 13. Paul. lib. 7. Simi-
les gumī uireis habet.

Tragion quid sit diuinare nescio, sicut etiā
de eius secūda specie dicere, nisi fortè sit pim
i. ij.

pinella, uel saxifragia hircina. Galen. 8. de fac. simp. Diosc. cap. 47. & 48. quarti. Plin. cap. 21. lib. 13 Paul. lib. 7. Calidum in tertio, attractorium, discutiens.

Tragum nisi sit species iunci, haud etiam scio quid esse possit: nam sine folijs Plin. eam cum minimis ramentis pingit, cap. ult. lib. 27. Dioscor. cap. 49. libri quarti.

Tragoriganū, ut placet Leoniceno, in acetarijs comeditur, uulgò tragone appellata. Dioscorid. capit. 30. tertij. Plin. cap. 17. lib. 20. Galen. 8. de facult. simpli. Paul. lib. 7. Virens habet origani, & nonnullam etiam adstrictionem.

Tribulus habet duas species, ut Theophr. cap. 5. lib. 6. quarum una producit fructum spinosum, cuius radices à multis pro iringo condiuntur, & re uera decipiuntur. Diosc. ca. 16. quarti. Gal. 8. de fac. simp. Plin. cap. 16. lib. 21. Paul. lib. 7. Mediocriter refrigerat, sed terrestris siccando ualentior est, aquaticus leniter humectat.

Trifolium, τριφυλλον, omnibus notū, cuius species apud nos tres enumerantur, prima

habet folia rotunda & magna, secunda longa, tertia rotunda & minuta. Plin. cap. 9. lib. 21. Scripsit etiam de trifolio acuto Scribonius, & est species trifolij acetosi, & uulgò dicitur Alleluia, siue pan cuculo. Decipiuntur qui pro andacocha semen trifolij accipiunt: nam andacocha nil aliud est quàm lotus sylvestris siue Aegyptius. Galen. 8. de facult. simplic. Dioscorid. cap. 114. tertij.

Trinitas, herba nota ferè omnibus, habet enim folium in tres partes diuisum, simile folijs cyclaminis cum caelestis flore coloris. Cōglutinat uulnera & intestinorum rupturas, & quæ in scrotum descendunt, præsertim si medium huius pulueris cochleare cum nino styptico sumatur.

Tripolium etsi ab aliquibus credatur esse turbit, nihilominus decipiuntur: si quidem nostrum turbit odorem non habet ut tripolium, sed creditur potius turbit nostrum esse alipiam Dioscoridis: sed quum uerum tripolium non habeatur, id quod à monte sancti Angeli affertur, esse cortex pityusæ creditur. Dioscorid. cap. 130. quarti. Galen. 8. de fac.

i. iij.

simpl. Plin. cap. 7. lib. 26. Paul. lib. 7. Calida radix est in tertio, & acris.

Tubera, Græcè ὄρνις, uulgò tartusi, de quibus mentionem facit Plinius cap. 2. lib. 19. Galen. 2. de facul. aliment. non habet, ut ipse inquit, euidentem qualitatem. Auicenn. 2. suorum can. Componuntur ex terrestri & aquea substantia & sapore priuantur, generant humorem melancholicum, crassum, & quandoque paralesim, stomachum aggrauant, & malè digeruntur. Dioscorid. cap. 134. secundi. Paul. lib. 7. Constant ex terrestri substantia cum modica uirtute tenui.

Tussilago, Græcè βήχων, uulgò farfara uel ungula caballina dicitur, nota est: eius fumus prodest tussientibus, unde nomen accepit. Dioscorides cap. 117. tertij. Galenus 6. de facul. simplic. Paulus. Constat ex calida & aquosa substantia.

Turbit Mesue est radix alipia, ut dictum est de Tripolio.

Typha, τυφή, uulgò marza surda, hæc nascitur in aquosis ac palustribus locis. Surda iccirco dicta, quia eius lanugo si aures ali-

cuius ingrediatur, facile ille surdescit, est nota etiam pueris, quum saepe illam primò manibus habeant. Dios. cap. 124. tertij. Theoph. cap. 13. libri primi. Apud Galenum uel Paulū nulla de hac fit mentio. Plin. cap. 10. lib. 18.

Umbilicus ueneris, Græcè κοτυληδών, uocatur apud Tuscos coopertorium. Sunt qui in Lombardia cymbaria quadam pro Veneris umbilico utuntur. Dios. cap. 87. quarti. Gal. 7. de fac. simp. Plin. ca. 2. li. 25. Paul. lib. 7. Refrigerat, repellit, abstergit, dissipat.

Verbasum, Græcè φλόμος, uulgò tasso barbasso, & est omnibus notū. Inuenitur mas & foemina: mas ex folijs strictis, foemina ex latioribus: ceteræ species nondum mihi sunt cognitæ, etsi Ruellius primulam ueris esse unam phlomi speciem crediderit, sese profectò decipiens, quum nullibi de eius flore agat Dioscorides. Succus ex flore huius herbae omnes faciei maculas abstergit. De uerbasco loquitur. Galen. 8. de facul. simpl. Dioscorid. cap. 99. quarti. Plin. ca. 6. lib. 26. Paul. lib. 7. Folium omnium siccantem & mediocriter adstringentem uim referunt.

Verbenacatā recta quā supina, à Græcis
 ῥεπειὼν dicta, uulgò berbena uocatur,
 nec uirtute hæ species inter se differunt, nisi
 quòd altera mas, quæ raris folijs constat,
 altera fœmina magis foliosa. Diosco. cap. 58.
 et 59. quarti. Plin. cap. 9. lib. 25. Galen. 8. de
 facul. simp. uim habet siccantem.

Veronica, κέσπον, uulgo notissima est, quæ
 tot uirtutes præ se fert, quot Antio. Musa, Cæ
 saris medicus, illi attribuit. Vide Dioscorid.
 cap. 1. quarti, et Gal. 8. de facul. simp. Mun
 dificat renes, pulmonem, pectus, et hepar.
 Plin. cap. 8. lib. 25.

Viola alba, λευκὴ, ex qua unguentum
 sasminum fit, nota omnibus est, sicuti et uio
 la lutea, quæ à seplasiarijs uocatur lxeiri, de
 cuius uiribus Galen. 7. de facul. simplic. tra
 ctat. Diosco. cap. 129. terrij. Paulus lib. 7. Fru
 tex abstergerendi extenuandique uiros habet,
 magis autem flores.

Vitex, Græcè ἄγνος, uulgò agno casto di
 citur, et est duplex, albus et niger, maior et
 minor, ut testatur Plinius cap. 9. lib. 24. Ga
 len. 6. de facul. simplic. Calidum et siccum.

est in tertio. Dioscorid. cap. 120 primi.

Vitis alba, Græcè ἀμπελοδύκη, uulgò brionia dicitur, siue zucha saluatica, & est res notissima: uide de eius uiribus Dioscorid. cap. 176. quarti. Galen. 6. de facul. simplic. Radix resoluit splenis duritiem.

Vitis nigra, siue ἀμπελος μέλαινα, uulgò dicitur uua tamina, & apud Tuscos tamaro, & est res nota. Dioscor. cap. 177. 4. Plin. cap. 2. lib. 23. Paul. lib. 7. Pollet, sed non ita efficaciter ut alba.

Viricella, quæ ab alijs dicitur momordica, ab alijs balsamina, ab alijs coranxana, inuolucris herba est, florē habens cucumeri similē, à quo postea fructus oritur, ouo gallinae similis, sed minor satis cū quibusdā ueluti acutis spinis uiridis existens ante maturationem, & rubens post ipsam maturationem: cuius folia neruorum uulnera conglutinant, & oleum ex infusione, eius fructus uulneribus, apostematibus, & ulceribus mamillarum non solum prodest, sed mirum in modum dolores matricis per clysterē iniectum & hæmorrhoidarum, uulnerum, & apostematum maxi-

mè leuat ac tollit, cicatrices extenuat, &c. ut uidere poteris iuxta Mathiolū Senensem cap. de uite nigra.

Vitis syluestris, Græcè ἀμπέλως ἀγρία, omnibus nota: longas enim ex se mittit uiticulas, uinū uitis modo ferentes, lignosus & asperas. Folia solatro similia, latiora tamen & longiora, florem ceu musculosum capillum, fructum exiguis uuis simile, radices in aqua decoctæ dantur contra cutē subeuntes aqua, acini uuarum asperam & discolorem cutē, omnesque alias maculas repurgant. Diosco. cap. 175. quarti. Galen. 6. de facul. simplic. Paulus lib. 7. Germina abstergunt, & nōnihil adstringunt.

Vrtica, Græcè ἀκαλύφη, res notissima est: uide de eius uiribus Dioscorid. cap. 89. quarti, & Gale. 6. de fac. simp. Plin. ca. 15. lib. 21. Paul. lib. 7. Tenuem habet substantiam, citra rofionem siccatur, tumores discutit, abstergit, & uenrem subducit.

Xanthion, uulgò lappa minor dicitur, inuenitur in pinguibus locis, & in paludibus per æstatem siccatur: uide Dioscoridem cap.

133. quarti. Galen. 8. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Fructus discutiendi vires habet.

Xyris, sunt qui cum esse uelint uulgarem acorum, ego cum nuspiam uidi: scio tamen ex Galeno 7. de facul. simplic. quod eius semen est ualidissimum in prouocanda urina, & in duritie splenis. Diosc. cap. 24. quarti. Paulus li. 7. Tenuis & discussoria & extrahentis est facultatis ac etiam exiccatoria.

Zea nil aliud est, quam nostra spelta uulgaris. Dioscorid. cap. 80. secundi. Plin. cap. 8. lib. 18. Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Viribus tritici respondet, & medium inter calorem & siccitatem obtinet.

Zingiber, res nota est seplasiarijs, & affertur ex Arabia & ex Aegypto, germinat quotannis, folia habens harundini similia. Dioscorid. cap. 149. secundi. Galen. 6. de facul. simp. Paul. lib. 7. Impense calefacit.

Zedoaria, radix est gingiberi similis, odoratio- rior tamen & aliquantulum amara, non autem sic acuta ut gingiber, impinguat, flatum discutit, & comesta affert odorem allij, ceparum & uini. Confert etiam morsibus animalium

uenenosis, resoluit apostemata matricis, curat uomitum & dolores colichos, & ut refert Auicennas, est theriaca Napelli. Serap. lib. aggr. cap. Zerumber & Auicen. lib. 2. Calida & sicca est in tertio gradu.

Zythū, siue ζυθος, nihil aliud est quam potus qui ex hordeo & frumento paratur, quemadmodum ceruisia. Vide Dioscoridem cap. 79. secundi. Plinium cap. ultimo lib. 12. Paulum lib. 7. Composita est substantia, acris enim est & frigidus.

F I N I S.

EXCVDEBAT CARO-
LVS STEPHANVS, TY-
POGRAPH. REGIVS,
PARISIIS, AN. M. D.
LIIII. ID. SEPTEMB.

